

Honorable


Excellence Baird

Cher la part de M. L. Gaussier

Inm ex libris Petri De Man
Est immortale Quod opto.



AMSTELODAMI,
Apud IOANNEM IACOBI FIL. SCHIPPER. MDCLVII.





Amst. J. G. A. M. I. 1771. J. G. A. M. I. 1771. J. G. A. M. I. 1771.

In Historiam Naturalem de Animalibus Quadrupedibus
JOHANNIS JONSTONI, priore numero historicae
descriptionis paginam exprimente ; altero verò
tabulam Iconismi designante.

A.	P.	T.		P.	T.	I.	P.	T.
Cnus	39.	22	Caryguéja	94.		Jaboti		146.
Agutivel Acuti Bräf.			Caffor	102. 158.	68	Ibex		53. 252. 8
Cunic.	63		Catus Hispaniæ	109.		Ichneumon		105. 67
Alce	65. 30. 31. 35		Catus Zibethicus Scalig.	109.		Ignavus		101. 62
Ameiva	136.		Caudiverbera	139.	79	Clufii		73
Americima Bräf.			Cavia cobyana cunic. fpec.		63	Igvana		135.
	136.	77	Chamæleon	104.	78		L.	
Animal foetidum	150.		cinereus verus		79			
Animal Zibethi	109.		Varius		78	Lacertorum genera	133.	76
Aper	74. 47. 48		Cercopithecus	97. 59.	61	Lacertus biceps		76
Aries	39.	22	barbat. Bräf.		50	Brasilienf.	135.	76
Guineenſis		46	Cluſii		73	Chalcidicus		76
Armatillo Cluſii		74	Barbat. Cluſ.		73	Cyprius ſcincoides		76
Afinus	12.	6	major feu Manticora	61		Indicus Cordylo fimilis	135. 78	
Cornutus.	22.	11	Cervus	58.	35	Tarantula quibusdam		77
			burgundicus		35	Vulgaris	133.	76
B			palmatus	63.	37	Viridis cauda bifurc.	134.	76
Bifon.	36. 16. 17		Cerva		32	Viridis exiccatus cauda bifida		76
Jubatus		17	Cervocamelus		29	Viridis	134.	76
Magnus		17	Civetta	151.		Leæna		51
Scoticus	37.		Coati	95.		Leo	77. 50. 51	
Bifulca aquatica	76.		Cordylus quadrupes	139.	78	minor.		52
Terreſtria	25.		Crocodylus	141.	79	Leopardus	81.	53
Bonaſus	37. 18. 19		Cuniculus	111.	65	Lepus	109.	65
Bos domeſticus	26. 13. 14. 15		Indus Gefneri		63	cornutus		65
Scythicus	35.	21	Cuitlamitzli	81.		Leucrocuta		52
Strepticeros	38.	24	Cynocephalus	100.	59	Lonx, Lonza		68
Boves feri	36.		Bertrandi		59	Lupus	89.	56
Bubalis	54.		D.			marinus Gefneri & Bellonii		57
Bubalus veterum	37. 18. 20		Dama	52.	27	Scythicus		58
Africanus	37.	18	vulgaris	54.		Lutaria		146.
Indicus	37.	16	Danta	149.		Lutra	104.	68
Bubali Juvenci		21	Dafypus pinuum		73	Lynx	83. 54. 71	
Buffelus	38.	20	Digitata femifera	92.			M.	
Bufo	131.	75	E.			Macamitzli	81.	
caudatus		75	Echinus terreſtris	119.	68	Mambriana Syriaca	60.	
fine dentibus		75	Brasilian.	120.		Manticora	85. 52. 61	
Butrones	36.		Ejulator	150.		Mapach		74
C.			Elephantus	17. 78. 9		Maripetum animal	150	
Cabim	149.		Equus	1.	12	Martes	107.	64
Cagni Brafil.	99.	60	Æthiopius	9.	3	Meles feu Taxus caninus		72
Caitaja	100.	60	Fricus	9.	2	Mirtz Peruan.	81.	
Camelopardus feu Giraffa	69.	39	Hirfutus		5	Monoceros	22. 10. 11.	
Camelopardalis	69. 39. 45		Hungaricus	10.	2	Mulus	15.	6
Camelus	67.		Indicus	10.	5	Mula	15.	
Bactrianus	169.	43	F.			Mures domeſtici	115.	
Dromedarius	169. 41. 42. 44		Felis	226.	71	Aquatici	116.	
Indicus		40	domeſtica		72	Mus Alpinus	117.	67
Verficolor		40	fylveſtris		72	Aquaticus	117.	
Canis	122. 69. 70		Zibethilud. Rom.	119.		Araneus	116.	66
Leporarius	122.	69	Zibethi		72	Avellanarum	116.	66
Indicus		71	Flirus	13.		Coyopollin feu Indicus	118. 67	
Venatorius		71	G.			Mufcatulus	116.	67
Vertagus dictus	122.	69	Gazella	54.	29	Pharaonis	105.	67
Caoch	150.		Genetta	108.	72	Mufmone	40. 27. 28	
Cappa		149	Genethocatus	119.		Muftela fylveſtris	107.	
Caper Hispanicus		26	Glis	114.	66	vulgaris	105.	64
fylveſtris		12	A			Zibellina	107.	
Capra Bezoartica	56.						N.	
Capra auribus demiffis	57.					Noerza		107
Capra canis		26					O.	
domeſtica	46.	26				Onager		14. 11. 12
Indica	57.					Oryx		57. 35
Lybica		25				Ovis		38.
Mambriana	51.	26	Hinnuli & hinni apud Plinium	15.		Arabica		23
Mofchi	55.	29	Hippelaphus foemina		34	Cretenſis		45
			mas		35	Mofcovitica	45.	
Capræ fylveſtres	51. 79.		Hippopotamus	76.	49	Peregrina		22
Capræ Brafil.	55.		Hircus	46.	27	Peruana		23
Caprea Plinii	54. 31. 33		Bezoarticus	54.			Pan	
Strepticeros	54.	24	Hoedus	46.				
Capricornus marinus		10	Hyæna	51. 56. 57				
Carapopeba	136.		veterum Bellonii	109.				
Cariguaeibeju	104.	60	Hyftrix	119.	62			

SYLLABUS.

P.	P.	T.	S.	P.	T.	P.	T.
Panthera minor Oppiani	109.		Salamandra	137.	77	Tejuguacu	136. 77
Pardus	81.	53	aquatica		77	Tejunhana	136. 77
Pardalis	151.		terrestris vera nigra maculis			Temapara	136. 77
Papio Papyon	100.	61	luteis distincta		77	Testudo	143. 80
Peva	150.		Scincus	138.	78	aquatica	146. 80
Porcus Guineensis		46	Sciurus	113.	66	marina	147. 80
Porcellus Indicus sic dictus	112.	65	Senembi seu Ignava	135.	77	terrestris	144.
Puma Peruan.	81.		Simia	96.	59	Tigris	84. 53
Putorius	107.	64	Stellio	138.	77	Gesneri	54
Pygargus	54.	34	Stelliones ex Matth.		77	Tlacaxolotl	149.
Pyradus	63.		Strepticeros	38.		Tlacuarzin	118. 73
Pyrandus	63.		Su	150.		Tlalmitzli.	81.
			Suhak Scytharum	57.		Tragelaphus	63. 34
			Sus	70. 47. 48.		Tupinambis	136. 77
Quadrup. solidiped.	1.		Cornuta		48		
bifulca	25.		domesticus	73.		Vacca	26. 13
digitat. vivip.	77.		Guineensis	73.	46	Indica	16
digitat. ovip.	130.		Sylvestris	73.	47	Verres Eber	47
domestic.	122.		Tapiereze Bras.	73.		Vervex	22. 23
non ruminantia	70.		T.			Æthiopicus	58
Quamitzli	81.		Tajacu Caaigora	3.		Alius	23
			Tajibi	94.		alius peregrinus	23
R.			Talpa	118.	66	Vitulus	27. 15
Rana	131.	75	Tamandua-gvacu	95.	62	marinus	68
Ranæ aquaticæ	130.		Tamandua-i	95.	62	Upalim fera	100.
terrestres	131.		Tapirouffu	146.		Ursus	86. 55
Ranæ temporaria	133.		Taraguira	136.		Urus	36. 19
Rangifer	64.	37	Taraguiyca Aycuraba	136.		jubatus	19
Ranunculus viridis	133.		Tarandus	63.	37	Lybicus	19. 20
Nebenscher	63.		Tatus seu Echinus Bras.	120. 62. 63.		Vulpes	92. 56
Rhinoceros	66.	38	Taurus	26. 15. 30.	80	Indica	93.
Ruminantia cornigera in genere	25.		castratus		14	Vulpicongeneres	194.
in specie	26.		Pœconius		30		
Ruminantia non cornigera	67.		Taxus	101.	63	Zainus	65. 46
Rupicapra	52. 27. 32		fuillus	102. 48. 64		Zebra Indica	15. 5
						Zibeth	159.

INDEX

Tabularum: quo quævis loco sit inferenda.

Tabula.	I.		XXIX.	55	LVI.	
	II.		XXX.		LVII.	
	III.		XXXI.	65	LVIII.	89
	IV.		XXXII.	52	LIX.	
	V.	16	XXXIII.	54	LX.	195
	VI.	12	XXXIV.	64	LXI.	
	VII.		XXXV.		LXII.	100
	VIII.	17	XXXVI.	55	LXIII.	101
	IX.		XXXVII.	64	LXIV.	107
	X.		XXXVIII.	66	LXV.	109
	XI.	36	XXXIX.	68	LXVI.	115
	XII.	15	XL.	69	LXVII.	105
	XIII.		XLI.		LXVIII.	102
	XIV.	25	XLII.		LXIX.	
	XV.		XLIII.	67	LXX.	122
	XVI.		XLIV.		LXXI.	
	XVII.		XLV.		LXXII.	109
	XVIII.	37	XLVI.	76	LXXIII.	154
	XIX.		XLVII.		LXXIV.	97
	XX.		XLVIII.	74	LXXV.	131
	XXI.	37	XLIX.	76	LXXVI.	134
	XXII.		L.		LXXVII.	136
	XXIII.	39	LI.	77	LXXVIII.	140
	XXIV.	55	LII.	85	LXXIX.	141
	XXV.		LIII.	81	LXXX.	143
	XXVI.		LIV.	83		
	XXVII.	53	LV.	86		
	XXVIII.					

FINIS.

ILLUSTRISSIMO ET EXCEL-

LENTISSIMO HEROI,

DOMINO

BOGUSLAO,
COMITI IN LESZNO:

Supremo Regni Poloniae Thesaurario, Ma-
joris Poloniae Generali, Samborienfi & Miedzyrzecenfi
Præfecto, &c. &c. Domino & Patrono suo
gratiosissimo :

*Hanc Historia Naturalis de Quadrupedibus partem offert,
utque se, & sua studia, sibi commendata esse velit,
observanter petit*

Illustrifs. Excellent.

addictissimus

JOANNES JONSTONUS
Med. D.


A 2

P R Æ.

PRÆFATIO AD LIBRUM

D E

Q V A D R V P E D I B V S.



Nomen.

Lacet & de Quadrupedibus in genere aliquid præfari, Benevole Lector, satis facturumque me confido, si aliquid de Nomine, Partibus, Loco, Nutritione, Augmento, Generatione, Vita, Animalibus actionibus, Usu, & Differentiis, præmiserò. Horum verò nomine Animalia illa nobis veniunt, quæ mediæ inter aërea & aquea naturæ, pilis ut plurimum, testis quandoque, obducuntur, & quaternis pedibus incedunt. Græcè τετραπόδα, τετραύλα, τετρασκελι, & τετραδάμωνα, dixero. In reliquis omnibus multiplex & incomprehensa occurrit varietas, quæ tibi, si bene per-

- penderis, stuporem injicere poterit. Partes mihi primò externas vide. *Pilos* habent quæ animal pariunt, quæ ova, testam. *Equis* sunt in juba largi, in armis leoni: *dasy-podi* & in buccis intus, & in pedibus. *Villosissimum* animalium *lepus*. Omnibus senectute crassescunt. In solo equo canitiem contrahunt. *Setis* suæ & *histrices* teguntur, *oves* lana, *capræ* aruncum de mento demittunt. *Corium* Hippopotamo tam crassum, ut inde torquentur *hastæ*: *elephantis* etiam & *rhinocerotibus* ferè impenetrabile. Nullibi major naturæ lascivia, quam in *Cornibus*. *Sparsit* hæc in ramos, ut *Cervorum*. Aliis simplicia tribuit, ut in eodem genere *subulonibus* ex argumento dictis. Aliorum finxit in palmas, digitosque emisit ex iis, unde *platycerotas* vocant. Dedit *ramosa* capreis, sed parva: nec fecit decidua. *Convoluta* in anfractum arietum generi, ceu castus daret: infesta tauris. *Rupicapris* in dorsum adunca, *damis* in aduersum. *Erecta*, rugerumque ambitu contorta & in leve fastigium exacuata, *strep-siceroti*, quem addacem Africa appellat. *Mobilia* eadem ut aures, *Phrygia* armentis: *Troglody-tarum* in terram directæ: quæ de causâ obliquâ cervicè pascuntur. Aliis singula, & hæc medio capite, aut naribus. Iamque aliis ad incursum robusta, aliis ad ictum. Aliis adunca, aliis redunca; aliis adjectum pluribus modis, supina, conversa, connexa: omnia in mucronem migrantia. *Auricula* omnibus duntaxat animal generantibus, & quidem mobiles. Minores aliis vel majores. *Cervis* tantum scissæ ac velut divisæ; foricibus pilosæ. In equis & omnium jumentorum genere, indicia animi præferunt: *fessis* emarcidæ: *micantes* pavidis: *subrectæ* furentibus: *resolutæ* ægris. *Os* magno hiatu, *cani*, *leoni*, & *venatu* viventibus rescissum; *mediocre*, suum generi. *Promusci* soli elephanto. *Maxilla* longæ jumentis, *rotundæ* simiis. *Collum* leoni tantum, & *lupo* & *hyenæ* ex singulis ossibus rigens. De *Mammis* hoc observatum à Plinio. Quibus solida ungula, nec suprà geminos fatus, hæc omnia binas habent *mammæ*, nec alicubi quàm in feminibus. Eodem loco bisulca & cornigera: *bo-ves* quaternas, *oves* capræque binas. Quæ numerofo fecunda partu, & quibus *digiti* in pedibus, hæc plures habent toto ventre, duplici ordine, ut *sues*: *generosa* duodenas, *vulgares* binis minus: similiter *canes*. Alia ventre medio quaternas, ut *Pantheræ*: alia binas, ut *leone*. *Elephas* tantum sub armis duas: nec in pectore, sed citra in alis occultas. Nulli in feminibus *digitos* habentium. *Digiti* quibus ex rapina victus, quini in prioribus pedibus, reliquis quaterni. *Leones*, *lupi*, *canes*, & pauca alia, in posterioribus quoque quinos ungues habent, uno juxta cruris articulum dependente: reliqua, quæ sunt minora, *digitos* quinos. *Ungues* omnibus quibus & *digiti*. Sed simiæ imbricati: *rapacibus* unci: cæteris recti, ut *canibus*, præter eum qui à crure plarumque dependet. *Ungulas* solidas habent quæ non sunt cornigera: *cornigera* ferè bisulca sunt. *Sues* in Illyrico quibusdam locis solidas habere dicuntur. *Veterino* tantum generi renascuntur. *Caudæ* denique, omnibus præter simias, & ova gigantibus pro desiderio corporum. *Nudæ hirtis*, ut *apris*: parvæ villosis, ut *ursis*: prælongis setosæ ut *equis*. *Amputatæ* lacertis renascuntur. *Boum* longissimus caulis, atque in imâ parte hirtus. Idem *asinis* longior quam *equis*, sed setosus veterinis. *Leoni* infima parte ut *bubus* & *forici*: *pantheres* non item: *vulpibus* & *lupis* villosus, ut *ovibus*, quibus procerior. Haud minor internorum diversitas. *Dentes* exerti verri, apro: ferrati, *cani*, *leoni*: continui, equo, bovi: acuti primores: *plani* interiores. Altero ordine carent *cornigera*. Nullis exerti, quibus ferrati. Nulli exerti vel ferrati, cui *cornua*: sed omnibus concavi, cæteris solidi, simiæ ut homini. *Ruminantibus*, *leoni* & *cani* mutantur. *Suibus* deciduum unquam. *Lingua* *Crocodilis* tota adhæret: *leonibus* ac *felibus* imbricatæ est asperitatis, ac lima similis: *Elephanto* præcipuè lata. *Costæ* *suibus* denæ, *cornigeris* tredecem. *Cor* omnibus in medio pectore est. In equorum boum & cervorum ossa reperiuntur. Maximum proportionem, muribus, lepori, asino, cervo, hyænis, & omnibus propter metum maleficis. *Pulmo*, testudini sine fan-guine:

Partes in-ternæ.

guinè: Chamæleoni portione maximus, & nihil aliud intus. *Venter* solidipedum asper & durus: terrestrium aliis denticulatæ asperitatis, aliis cancellatim mordacis. De ruminantium ventribus libro secundo diximus. *Lien* rotundus bisulcis & cornigeris: prolixus multifidis: prælongus solidipedibus: minimus pecori in regione Asiæ quæ Sceplis dicitur. *Re- nes* omnia habent quæ animal generant: ova parientium, testudo sola. *Vesica* nulli ova gignentium præter testudinem: nulli, nisi sanguineum pulmonem habenti: nulli, pedibus carentium. De *Adipe* & *Servo* observatum, *Cornigera* unâ parte dentata, & quæ in pedibus talos habent, servo pinguescere: bisulca scissisve in digitos pedibus, & non cornigera, adipe. *Concretus* hic & cum refrixit fragilis: semperque in fine carnis. *Contrapingue* inter carnem cutemque succo liquidum. *Quædam* non pinguescunt steriliora cuncta pingua. *Medulla* in juventa rubet & senecta albescit. Non nisi cavis hæc ossibus nec cruribus jumentorum aut canum. *Pinguis* iis quibus adeps: servosa cornigeris: *Ursis* nulla: leonî in feminum & brachiorum ossibus exigua. Et tantum de partibus. *Locus* plærisque terram natura designavit: paucis, ut Crocodilo, *Locus*. hippopotamo, castori, testudini marinæ, & aquam. Ex his & illis quædam latibula habent: quædam in arboribus degunt. In frigido climate nonnulla; in calido alia invenias. *Negata* in eodem situ quædam aliquibus. In *Cilicia* (Lycia alii legunt) *dorcadæ* non transeunt montes *Syris* vicinis: onagri montem qui Cappadociam à Cilicia dividit. In *Helleponto* in alios fines non commeant cervi: & circa *Arginussam* elatum montem non excedunt. In *Poroselene* insula viam *mustela* non transeunt: in *Beotia* *Lehadia* illata, solum ipsum fugiunt, quæ juxta in *Orchomeno* tota arva subruunt talpæ. In *Ithaca* lepores illati moriuntur, extremis quidem in littoribus: in *Ebuso* cuniculi non sunt. *Cyrenis* muta fuerit rana: illatis è continente vocalibus durat earum genus. In *Olympo* *Macedonia* monte non sunt lupi, nec in *Creta* insula. *Mirobilis*, cervos in eadem insula, præterquam in *Cydoniadarum* regione, non esse. In *Africa* nec apros, nec cervos, nec capreas. Frustrà & in victu uniformitatem quæris. *Herbis* & *frugibus* boves, cervi, & qui, sues vescuntur: humiliorem deprædantur oves; altiore, ramos, & germina capræ. *Carnes* lupis, leonibus & canibus in deliciis: pisces fibro & feli: muscæ chamæleoni. *Ruminant* cibum quædam, quædam non item. *Simiam* & *Cercopithecus* inter pamphaga fortè rectè posueris. *Ursus* hyeme in latebris, eo humore quem ex prioribus pedibus tum intumescitibus exfugit, vivere creditur. De *Generatione* habe, concipere quædam citra coitum, ut post *Niliâ* terris recessum in *Ægypto* mures. *Congredientium* plæraque autumno æstate vel vere coire: cum ferocitate tauros & ursos: sine ea canes. *Vivos* foetu maximus numerus profert: ova testudinis, *Crocodili*, lacertæ &c. *Molam* ex vento in *Lusitania* equas concipere ex *Refendo* disco: boves gravidos dextro duntaxat vulvæ sinu ferre, etiam cum geminos ferunt, aliunde. *Gestationis* tempus mirè variat. *Lupus* mensem vel ad summum *XL*. dies gestatur: canis novem septimanis: sus quatuor mensibus: capra quinque: ovis circiter sex: bos decem: equus undecem. Idem de numero partus intellige. *Mula* nunquam parens creditur: *lupus* semel duntaxat in vita eniti: *lepus* etiam superfætat. De *Augmento* hoc dixisse sufficiat, *μυροχολει* & bisulca, digitatis majora, *rhinocerotem*, camelum, hippopotamum &c. si exceperis: differreque in eadem specie propter loca magnitudinem. In regione *Camadu* arietes asinis non cedunt. *Testudines* ad *Taprobanam* tantæ ut *CIII*. pondo pependerint: lacertæ in *Æthiopia* Cubitor. octo. *Vita* brevis quibusdam, diuturna aliis. *Lepores* & *feles* septimum duntaxat annum attingunt: aries & caper rarò decimum. *Sus* ad vigesimum pervenit: *Canis* ad eundem aliquando: *Bos* decimum sextum vix excedit. *Equi* mares ad trigessimum aliquando attingunt. Ad septuagesimum quintum pervenire, apud *Plinium* legimus. *Mulum* octoginta annis vixisse, ex *Atheniensium* monumentis apparet: *Cervos* centum, in *Historia* invenies. Ad *Animales actiones sensus externi* & *interni appetitus*, & *locomotiva*, pertinent. *Dorcadæ* & *lynces visu* excellunt: *hyenæ* & *feles* de nocte vident: *talpæ* parum aut nihil. Acute audiunt *lepores*: *Cameli*, cervi, & equæ *Lybicæ* cantu tibiarum oblectantur. *Odoratu* canes valere nemo ignorat: sues adeo sunt debili, ut ne fætores canum moveantur. *Simia* nos gustu vincit, ut vulgari versiculo traditur. *Internos* si attendamus, insignis sunt amentiarum quædam, ut *bubalus*, qui capite abdito totum se latere credit: *Sagacissima* quædam. *Simiæ* nihil non imitantur. *Vulpes* glaciem transmissuræ, admota aure, ejusdem crassitiem explorant. *Canes* quamvis longa itinera meminere: nec ulli, præter hominem memoria major. *Cervi* audito canum latratu, secunda fugiunt aura, quò pariter recedat vestigiorum odor. *Reliqua* in capitibus de equis, capreis, lupis, & aliis vide. Maximè verò mirandum quod tam multæ quadrupedes sciant, quæ morbis suis medeantur. *Panthera* sterco humanum quærit. *Testudo* cunilæ quam bubulam vocant, pastu, vires contra serpentes refovet: *mustela*, rutæ; in murium venatu, cum iis dimicatione conferta. *Bos* in *Cypro* contra tormina, hominum excrementis sibi medetur. In *Appetitu Amor* & *Libido*, præcipue occurrit. *Simiarum* erga fætus tantus, ut magna ex parte complectendo necent. *Sues* foeminæ libidine turgentes adeo efferantur, ut hominem lacerent. *Tanti* furoris & tauri, ut vacca *enea Syracusis*, ab agresti tauro, qui pecore aberrasset, imita sit, ac semine aspersa. E contra *Camelus* coitum in propatulo refugit. *Equum* detracto

Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Plin. H. N. l. 8. c. 58.

Vitis

Generatio

Refend. Antiq. Lus. fit. l. 1.

Augmentum.

Vita.

Plin. H. N. l. 8. c. 42. & 44. Animales actiones.

Cicero de Nat. Deor. l. 2. Plin. H. N. l. 8. c. 27. Plin. H. N. l. 28. c. ult. Livius l. 41. Plin. H. N. l. 2. c. 42.

Xenoph.
I. de Venatione.

Vox.

Vfus.

Arist. H. A.
I. 5. c. 2.

Dionys.
Halicarn.
I. 2.


Plin. H. N.
I. 28. c. 7.
Plin.

Differentia.

oculorum operimento, & cognito eum matre coitu, prærupta petiisse, atque exanimatum, Plinius auctor est. Circa *Locomotivam* veloces quosdam, tardos alios novimus. Nullum animal cursu leporem æquare, credidit Xénophon: Horatius verò cum celerrimam curam dicere vellet, *ociorem cervis* dixit. Alce tantum itineris uno die conficit, quantum equis triduo. Nil de Arabicis asinis dicam: nam vulgares tardissimi sunt, ut & Tigris, docente nos Bontio. *Vocis* ferè oblitus fuisset: cujus tamen insignis in isto animalium genere est varietas. Equus namque hinnit: Taurus mugit: Asellus uncat: Aries blaterat: Ovis balar: Sus grunnit: Verres quiritat: Cervus onager glocitat: Caper circus mutit: Aper frendet. Leo rugit: Tygris raucat: Panthera caurit: Pardus felit. Lupus ululat: Barrus barrit: Canis latrat. Vulpecula gannit: Catulus glaucitat: Lepus vagit. Mus mintrat: Mustela dentrit: Sorex disticat: Rana coaxat. Sed ad *Usum* deveniamus. Bono enim nostro à Deo condita, nemo negaverit. Hinc nobis, *Alimonia*, *Medicamenta*, *Vestitus*, & talia. *Alimonia*. Lac namque nobis suppeditant pilis prædita, ex quo butyrum & caseus conficitur. Carnes jumenta, & quæ in desertis vivunt cervi, apri, damæ, alce & alia. Nec tantum ad necessitatem provifum est, deliciarum etiam oblivisci noluit Natura. Leporis carnem, *primam mattiam* Martialis vocat. Caro verò etiam domesticæ suis quinquaginta modis ita condiri potest, ut totidem ferinæ carnis species videantur. *Medicamenta*. Docuere enim quædam: nec unum est, quod suppeditet. Cunilam & rutam contra venena valere à mustela & testudine accepimus. Venas secandi artem Hippopotamus docuit. Ductu cervorum dictamnum sagittas extrahere scimus. De remediis contra morbos, Historia consulatur. *Vestitum*. Magna pecori gratia in usu vellerum: corporum tutela ipsi debetur. Caspiorum ditissimi vestimenta ex pilis camelorum conficiebant. Ex lanis etiam illa fiunt, quæ Cæsar *subcoacta*, Helmoldus Presbyter *feltra* & *flitra*. Græci *πλητά* & *πλωτά* vocant. Ex his, aut ex centonibus, aut ex coriis, tunicas aut tegmenta milites faciebant, quibus tela vitarent. Mortua pelles suppeditant. Primæ tunicæ quas Deus fecerat, ex istis. Pelle leonis induebatur Hercules. Ex agninis Rhenones Germanorum erant. Perones ex corio conficiebantur: nobiliorum calcei ex aluta. Frisii denique, jussu Drusii, coria boum in usus militares pendebant. De *aliis usibus* hoc duntaxat dicam. Canes ad custodiam facere. Feles alimenta à muribus defendere. Equum, asinum, mulam, Camelum, ad vecturam adhiberi. Ex nervis fiunt fides, Camelorum veretro optimè arcus intenduntur. Funes, quibus brachia catapultarum continentur, torquentur è nervo. Dentibus aprorum lævigatur charta. Plebejos ministros apud Romanos quidam bovillis cornibus insonantes, ad cæsus cogeant. *Per cornu fluentia in fauces hominum vina decurrere*, dixit Ambrosius. Urorum certè barbari septentrionales potabant. Delii Apollinis ex cornibus ara, inter septem orbis miracula recensetur. *Taurino felli præcipua potentia, etiam in are, pellibusque aureo colore ducendis*. Quid de *Fimo* dicam, de cujus discrimine ita Plinius: *Humanas dapes ad hoc imprimis advocant. Alii præferunt hominum potus, in coriariorum officinis, pilo madefacto. Proximè spurcitiis suum laudant: Columella solus damnat. Varro præceptis adjicit, equino, quod sit levissimum, segetes alendas: prata verò graviore, & quod ex hordeo fiat, multasque gignat herbas. Quidam etiam bubulo jumentorum præferunt, ovillumque caprino: omnibus verò asininum, quoniam lentissimè mandant. De Differentiis in infinitum agi posset. Quomodo verò in suos ordines, totum Quadrupedum exercitum digesserimus. Historia docebit. Occurrent primò Solidipeda; mox bifulca, tam ruminantia, quæ vel cornuta vel non, quàm non ruminantia: digitata tandem, tam vivipara, quæ vel terrestria vel aquatica: quam ovipara, quæ vel teguntur testâ, vel non. Sed nolo in hanc rem plura. Tu, Benevole Lector, laborem boni consule, & proximis nundinis, Historiam Serpentum & insectorum, quam Sublimium, Subterraneorum, & Hominis Historia, si Deus voluerit, excipiet, expecta.*


Equus *Pferd*

Roß *Hengst* *Gaul*



Equus

Pferd






Equus

Pferd



Equus Ethiopius *Ethiopisch Pferd*





Equus Frisicus Frisch Pferd



*Equus Pannonicus sive Hungaricus
Hungarisches Pferd*



Young Horse of the Year 1807



Young Horse of the Year 1808



HISTORIÆ NATURALIS

D E

QUADRUPEDIBUS

LIBER I.

De Quadrupedibus Solidipedibus.

CAPUT I.

De Equo.

Aldrov. de
Solidiped.
c. 1.

Rutis animantibus, quæ sanguinem habent, aliis binos, aliis quatuor pedes, largita est natura. Quæ tot habent, Latinis Quadrupedes, Græcis τετραποδα, Aristoteli πτεζα

dicuntur, & sub tribus summis generibus continentur. *Unum est αἰγιόδες, μονώνυχον*, seu *μόνυχον*, aut *μονώνυξ* seu *μόνυξ*, Euripidi *μονόχηνον*, quasi unâ tantum præditum ungulâ, dicitur. Plinius Solidipedem, Gaza Solipedem vocavit. *Alterum est*, quorum pedes binis fissuris utrinque, hoc est, à parte priorè & posteriore deducuntur. Unde *bis-ulca* Latini, *διχνηλα* Græci vocaverunt, eaque chelas seu forcipes pro ungulis habere, Aristoteles dixit. *Tertium πολυχῆδες & πολυδάκτυλον*, multifidum, & multipliciter digitatum, quod pedes manuum nostrarum instar, multifidos habeat. Omnibus pedes ad ingressum dati sunt: sed digitata prioribus præterea ad manuum officia uti nituntur, quod solidipedes posterioribus facere, Aristoteles annotavit. Ex *Solidipedibus*, sunt, *Equus*, *Asinus*, *Onager*, *Mulus*, *Monoceros*, & *Elephas*, de quibus ordine hoc primo libro agemus. Ab *Equo* autem incipimus, quod ejus singularis sit, inter *jumenta*, quæ à juvando nostras operas Latinis ita dicuntur, præstantia. Demosthenes eum inter urbis munitiones recenset. Romani in ejus emptione denis æris millia è publico persolvebant, adimebantque bello inutilibus. Consulibus aut cujusvis Imperatoris equus, phaleris exornatus, ornamentum, ut apud Halycarnassæum legimus. In multis regionibus cautum, ne quis equos extra provinciam emittat. Circassi equos plebeis permittere nolunt. M. Antonius in civitatibus federe in equis prohibuit. Atheas Scytharum Rex ipse equum suum frigili purgabat, ut Plutarchus meminit. Andromache Hectoris conjux, manibus suis avenam & fenum

Equis mariti præbuit, quod eum hisce delectari sciret. Theophylactus Lacapèni Imperatoris F. Patriarcha Constantinopolitanus ultra duo millia equorum habuit, & in eis alendis adeo fuit intentus, ut pistachia, pineas, palmulas, uvas passas, caricas, eaque omnia lectissima, vino fragrantissimo temperata, admixtis etiam, croco, cinnamomo, aliisque preciosissimis aromatibus, iis apponeret, in hoc luxu, Verum Imperatorem superans; qui, ut ait Capitolinus, equo suo nomine volucris, uvas passas, & nucleos, in vicem hordei in præsepe ponebat. Mox ii Tartariæ populi, constituto & solemniquotannis die equum post aliquot ceremonias corio exuebant, carneque in mensa absumpta, paleâ implebant, & mox erectæ aræ impositum, ut propitium numen adorabant, pellesque preciosiores offerebant, ut Josephus Barbarus in suo itineralio reliquit. Vixit Petrarchæ tempore in Italia quidam, qui ægrotanti equo quem amabat, aureum pulvinar, ac sericum cubile substravit: Cumque ipse interim podagrâ vinctus atque immobilis medicorum legibus regeretur, nihilominus tamen, aut fervorum vectus manibus, aut equo altero vix injectus, & suos medicos secum ducens, equum ægrum suum bisterque quotidie visitabat, illi suspirans atque anxius assidebat, illum leniter manu tractans, blando murmure solabatur. Tradit

Lib. 4. Na-
vig. c. 11.

Regis potentissimi equum tanti pretii esse credi, propter incredibilem margaritarum quibus oneratus est copiam, quanti est quæpiam ex nostris urbibus. In tanto apud plerasque gentes æstimio equus habetur, ut pluribus Aldrovandus ostendit. Cæterum, ut ad *Nomen* ipsum accedamus, varia tam

Nomen.

apud Græcos, quam apud Latinos sortitus est. Græcis dicitur ἵππος, πῶλος, quod de pullo propriè sumendum est; ἑλλα Caribus, unde Allabando cuidam nomen; κάλπις Hesychio & Varino, quod tamen equo gradario duntaxat competere videtur; δάμνις Liguribus, ἰνκί & Ethymologo, καβάλλος & καβάλλις, ὁ δὲ καπὸς κάπης ἀλγὶς ἐδίδων, quod ex præsepi abundè comedat; quo tamen

A

voca-

Dionys.
Halycarn.
l. 10. Antig.
Rom.

vocabulo ἐργάτης ἵππου, seu operarius equus tantum venit, ut apud Latinos vilitatis significationem habet; ἵππῳ hinnus, & γῆννῳ, quorum illud equum, qui equum habet patrem, matrem asinam: hoc matrem equam, patrem mulum, significat: ab Aristotele tamen, pro pumilo equo, ut & Suida, cui ἵπποι, οἱ κέλοισι τῶν ἵππων, sumitur; κέλης non simpliciter equus est, sed qui ab uno fessore agitur, Varino ἀζδελῖ & ἀζυξ. Aristophanis interpretes equum generosum intelligit: alii sellarem, sellarium, & nudum interpretantur; quidam, sed malè, defultorium. χερυσιμπυξ epitheton potius est quàm synonymum. Siquidem sic dicitur, quod ἀμπυξ, teste Eustathio, dicitur, ζερεῖ κατὰ χερυσι πῆς πρὸς τὸ μέτωπον τρέχας τῶν ἵππων συνδέσσει: id est, catena seu funiculus auratus, quo comæ in equorum frontibus sparsæ colligantur. A Latinis vocatur *Equus*, seu ab æqualitate, quod pares antiquitus jungebantur; seu quod quando quadrigæ jungebantur, æquabantur, paresque forma & cursu jungebantur, ut Isidoro placet; *Eniochus*, apud Firmicum, ut Scaliger notat; *Cauterius*, seu quasi cauterius, quod castratus sit & femine quod careat Varroni visum; seu quod ipsi cauterium inustum sit. Ab aliis tamen pro viliore sumitur. *Veredus* est equus viatorius, qui neque rhedam neque cisium trahit, vice rhedæ tamen est, ut Turnebus voluit. Isidorus tamen & Festus rhedarium esse vult, Procopius cursus publici. *Mannus*, parvus equus dicitur Acroni & Porphyrio apud Horatium, quod mansuetudine manuum ductus familiaris sequatur, solutos *tollutares* cognominat Seneca. Dicuntur & Burdones, Burichi, buridi, buridi, & burici apud Vegetium, fortè ἀπὸ τῶν φέρων ab oneribus, ut Gesnerus reliquit. Strabo Gygenios appellat. *Musimones* fortè dicuntur, quod iisdem ex locis habeantur. Et tantum de Nominibus. Equum *Describere*, utpote animal omnibus notissimum, non est opus. Itaque de *partibus* tantum agemus, & vocabula quæ apud authores occurrunt, explicabimus. *Ungula* ὄπλαι Græcis, quasi ὀπλαι, quod nec bifidæ, nec multifidæ sint. *Chelidon*, seu hirundo, est unguicularum concavitas à nido hirundinis dicta. *Batrachos* sive Rana, est ea pars quæ clavis solearum sæpe malè adactis læditur; seu teneritas ossium referens formam unguiculæ, quam nutrit etiam, ejusque radices in se continet. Barbari Tuellum vocant, Germani cinen Kern / nucleum. Si unguiculæ pleniores fuerint carnosæque; citra civitatem, Xenophon teste Cælio, χαμήλας vocat. Commisuram unguiculæ cum pede, seu unguiculæ exortum, Græci σεφάνιον, Hippocrates & ἔνυχον ἀρμονίαν dicit. κύνες Hefychio & Varino sunt unguicularum pars; alii vicinam iis esse volunt, ideoque κύνοπλον vocari. Ges-

Isidor: Orig
l. 12. c. 43.

Partes
Equi.

nerus putat à Rustico appellari *Falcem*. Dicit enim (inquit) locum esse delicatum & nervosum, parumque carnosum, quod forsitan erit μεσοκύνιον. *Talos* nulli solidipedum esse scribit Aristoteles, Asino Indico excepto. *Suffrago*, id est in posterioribus pedibus quadrupedum, quod in prioribus genu, vel, est nodus aut articulus sub crure quo pedis versura constat, tibiæque ita annectitur pes, ut verti possit. Barbari *garrectum* nominant. *Basis* sunt ossa quædam sub tibiis Vegetio, Calcaneos fortè intelligit. *περόνη* est ostibia, quod radius vocatur. *Cirri* & subcirri, equorum sunt ornamenta. Crura equi Vegetius vocat *gambas* quasi campas: Hippia tri Græci βραχίονας & χέλη vocare videntur. Vegetius etiam Latine *brachiola* in equis dixit. *Coxendices* maximas & validissimas habet, iisque ut plurimum valet. Inde fieri putat Ambrosius Nolanus, quod fessorem ephippiumve juxta humeros amet, contra ac asini & muli. *Ἐδεα* Xenophonti est dorsi ea pars qua infidetur. κύνικτα vocant veterinarii partem quandam inter arimos, seu ἐν σπινῳρία interscalpio: Absyrtus κύνικον appellat. Hinc *Ætogenes* equi, quod genitivam quandam notam ἐν τοῖς ὠμοῖς καὶ τῷ κύνικῳ habeant. Gesnero vero, *Coccyx*, est pars in medio dorso, juxta spinam eminens. *Armus* idem quod humerus. *Dorsum* Garresum barbari vocant. *Mammæ*, tam mares in hoc genere, quam feminae habent; & feminae quidem omnes binas inter femora, mares, illi tantum, qui matri similes prodire, ut Aristoteles testatur. *Caudam* habet bovillæ contrariam, tenorem videlicet brevem, quem Plinius caussem appellat, pilos prolixos. Illam Vegetius *muscerium*, à muscarii flabelli similitudine; hos Plinius *setas*, & longiones quibus muscas abigunt, Græci σέτας vocant. Duriores, sunt in equis quam equabus, quod harum caudæ urinâ madefactæ, setas invalidas habeant. Quæ de Sertorio setas vellere jubente dicuntur apud Plutarchum vide. Qui ex collo dependent crines, *Iuba* Latinis, Xenophonti χαίτη, Aristoteli λοφία, seu cristæ, dicuntur: qui à vertice juxta oculos & tempora propendent, capronas Latini, Protocomium, Vegetius, περὶ κύνιον Xenophontes dixit. *Palpebra* inferior pilis caret: ideo reprehensus pictor, (Apelles is Ephesus an Nicon, Micon, vel Polygnostus fuerit, ambiguum) quod eos addidisset. Soli præter hominem canescere, præter Aristotelem, Plinius prodidit, quod os in quo cerebrum, tenuius quàm cætera pro magnitudine habeat, sed falsò. Nam & canes canescunt, sub ephippiis etiam in citatrice semper albi proveniunt, seu quod cum ea pars sit debilis, nutrimentum non ut antea digeritur, sed quodammodo corrumpitur, ut Aristoteli placuit; seu aliam ob causam

Plutarch.
de soleit.
animal.
in Sertorio

Unicolores tamen evadunt, si hordeum totum & in pulverem redactum, quod vim discutiendi, detergendique obtinet, insperferis. De Coloribus in Differentiis agemus. *Dentes* utraque oris parte habere continuos, tradit Plinius & Aristoteles inter ἀνεπίδαντα recenset. Habet autem præter agnatos qui lupini & sylvestres aliis & proximâ maxillæ parte, pullis præsertim adnascuntur, (ἐκὸς τῷ πρὸς φωνῶν) quadraginta. Ante cæteros, dentes parvi, magnitudine fabæ, in cibo capiendi impediunt, unde jumentum strigosius evadit. Aristoteles maribus quàm fœminis plures esse notavit. Eos pro ætatis ratione equus mutat, ut & alia veterina. Anteriores qui prius mutantur, Græcè ἐμπροσθέντες & πόμεις vocant, quasi sectores, aut incisores, Latini medios, Vegetius lactentes, Plinius fortè pullinos. Sunt autem numero duodecim, sex nempe in superiore, totidem in inferiore maxilla. Xenophon γνάμονες ut & alii Græci nominarunt, quasi ætatis indices Equus enim triginta mensium, primum dentes medios dicitur amittere, duos superiores, totidem inferiores. Incipientes quartum agere annum, itidem ejiciunt & totidem, proximose eorum quos amiserunt, & incipiunt nasci quos vocant Columellares. Quinto anno, incipiunt iterum eodem modo amittere binos, quos caninos habent, tum renascentes eis sexto anno impleri. Septimo omnes habere solent renatos & completos, ut Varro, exposuit. A complemento, inquit Absyrtus, cum reliquum trimatum agunt, dens rumpitur & rotundatur, & in triangularem figuram exit, quo tempore præcipue defluxio in ora equorum decumbit. Fiunt nonnunquam à septimo anno prominuli, quos πρὸς πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν Absyrtus, Varro brochos vocavit. Columella quoque & Palladius, septimo anno omnes expleri æqualiter, asserunt, & ex eo cavatos gerere, postea verò quot annorum sit comprehendendi non posse: decimo tamen anno, tempora cavari, & supercilia canescere, & dentes prominere. Duodecimo anno nigredinem in medio dentium apparere. Vegetius adjecit: at Aristoteles & Varro, nitescere in senecta scribunt. Plinius rubescere legit. Ab hac dentium varietate sunt & aliquot equorum cognomina; λιδογνάμων Hefychio & Varino dicitur, qui nullum ex dentibus reliquum ætatis habet indicium, qui πρὸς ἀλὸς γνάμων & ἀγνάμων dicitur. Ἀβσολῶ & ἀβσολήτωρ qui eos dentes non amisit: δευτέρω & δευτέρω qui secundum eos dentes projicit. πρὸς ἀλὸς, qui primum. Petrus Crescentienis præter indices istos, habere scaliones & molares, ait: fierique posse, ut nonnulli plures habeant: sed tunc dentes esse duplices. Dentibus autem ad senectutem firmis utitur, quamvis durissimis cibis vescatur, quod à calidis abstineat, si Cardano credendum. γνάθος & in homine

maxillam denotat, dicitur tamen de equis potissimum. Eandem vel saltem proximam partem ὡδάλιον Hippia tri appellare videntur. Maxima illis maxillæ, & à maximis moventur musculis, quia proni erant sumpturi cibum. In *Corde* os aliquando reperiri, præter Aristotelem, Plinius prodidit. *Fel* quidam habere dicunt, habere, superius citati & cum iis Absyrtus negant. Hic tamen de felle vesica in hepate intelligendus est, quam non habere ait; sed quendam inhærere solutionem nervulum, in quem se genus hoc humoris insinuet. Ruinus verò, qui Anatomen equi edidit, istiusmodi bilis receptaculum, à dextris hepatis esse ait, in ipsa cavitate, plurimisque in ipsius visceris substantiam, ramulis inferi, atque adeò facillimè ab omni bilioso onere jecur exonerare; deponere verò etiam in duodenum intestinum: additque etiam, naturam in hoc animante, folliculo, ut in homine, & aliis animantibus, recludibilem noluisse, quod cum animum habeat semper in patinis, voracitatisque modum nullum, ventrem quoque exonerare multo quàm alia cogatur frequentius, ideoque bilis stimulus semper in promptu adeste debeat. In *figura* hoc observandum tradit Aristoteles, quod pulli paulò submissiores suis parentibus sint, atque adulti caput attingere non possint, quod novelli facile faciunt. Proditur iis innasce amoris veneficium, *hippomane* appellatum, in fronte, caricæ magnitudine, colore nigro, quod statim edito partu devorat foeta, aut partum ad ubera non admittit. Id apud Aristotelem, Plinium, Theocriti scholiasten, & alios invenies. Est & alterum quod ex genitali equæ manat, cuius & Aristoteles, cum de immoderata equarum libidine agit, meminit. Plinius, qui hoc equarum virus à coitu vocat, tantas habere vires, ait, in veneficiis, ut affusum æris mixturæ, in effigiem equæ Olympiæ, ad motos mares equos ad rabiem coitus egerit, quod etiam apud Pausaniam & Ælianum invenies. Ælianus confundit cum hippomane pulium seu *pullum*, quod Aristoteli est ὡδάλιον Plinio, teste Hermolao Barbaro, polea, estque illud quod equa prius emittit quàm pullum. Plinius eo nomine alicubi pulli asinini finum, quem primum edidit, intelligit. *Locum* si spectes, ubique ferè locorum hoc animal invenitur. Paludibus & riguis gaudet, gaudet & ipsa planicie: nec montes, modò rigui sint, aspernatur. Quin Columella, equorum gregibus, inquit, spatiosa & palustria, nec non montana pascua eligenda sunt; rigua, nec unquam siccanea, vacuave magis quàm stirpibus impedita, frequenter molibus potius quàm proceris herbis abundantia. Locum pascendis idoneum ἰπποπόρσειον vocant. Pompicus & bellator stabulo continetur. Id equile alii, Varro

Plin. H. N.
l. 8. c. 42.
Aristot. H.
A. l. 2. c. 15.
Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

Theophrast. de
animal. in-
vident.

Plin. H. N.
l. 8. c. 42. &
l. 24. c. 11.

Arist. Hist.
An. l. 6.
c. 15.

Ælian. H.
A. l. 3. c. 17.
& 14. c. 18.

Columella
R. R. lib. 6.
c. 27.

Equarium, Grapaldus propriè præsepe dixit. Græcis ἵππων, ἵπποποιός, ποιός, φάτις, ut Pollux annotavit. Hefychius & Varinus apud Lacones ἵπποποιή dici tradunt. Lignum ad quod capistris alligantur, vacerra nominatur. Plura de loco in Differentiis vide. Quantum ad *Cibum*, frugibus victitare, ideo inter sapientissima animalia censeferi inquit Plinius. Inter has præcipua sunt, Hordeum, quod minus quam avena vel triticum inflat; & tum equus *ἀνίσταται* dicitur; quod hordeum Nicandro acoste vocetur; Avena, cujus usus apud nos fuit. Triticum, quod tamen Serapio reprehendit; Panis denique, qui in Anglia & alibi ex fabis & Pis in hunc usum conficitur. Victitant tamen frequentius gramine & aliis, propriumque hoc equorum alimentum. Melilotus ideo in Italia Trifolium Caballinum dicitur. Medicam herbam, quæ in Media crescit, præcipuè equos nutrire, apud Strabonem habemus. Prima falx, teste Aristotele, vitio datur, & cum fatida aqua rigatur, incommoda est. Quater autem rectè, interdum sexies demetitur per annum, ut Columella prodit. Ad maciem equorum nulla res tantum quantum illa prodest. De *Cytisò* hæc Plinius. Datur animalibus post biduum semper, hyeme verò quod inaruit, madidum. Satiant equos denæ libræ, pauciores, minora animalia. Multis in locis vicia manipulatim collecta apponitur. Damasci ervilia & ervum, ut Bellonius prodidit. Necessitas ut & alia apponerentur, coegit. Equi Cæsaris à Scipionis exercitu in Africa obsessi, referente Hirtio, algæ à littore collectæ, & aqua dulci elota nutriebantur. Pompejani ad Dyrrhachium obsessi, foliis ex arboribus strictis, & arundinum radicibus. In regno Senegæ, ob aridam tellurem, phaseolorum laceramentis & milio utuntur. Thraces, qui ad Strymona amnem habitabant, tribulifoliis. Parthi Hippace herbâ. Tartari arborum ramis & corticibus, herbarumque radicibus, ungulis è terra excussis. In provincia Aden piscibus, quorum ibi ingens copia, ut apud Paulum Venetum legimus. Iidem siccati in Golcondâ provinciæ Persiæ apponuntur: quod & de Gedrosiis, Celtis, Macedonibus, Lydis, Pæonibus qui Prasiadem paludem habitant, Ælianus & Herodotus prodidere. Arabes camelino lacte bis de die nutriunt. Vere tantum teneris herbis pasci sinunt. *Potum* amant aquam, seu turbidam, ut Aristoteles voluit; seu limpidam ac frigidam, perennem ac profluentem, ut Vegetius: seu leniter fluentem & parum turbidam, ut Crescentienfis, seu palustres, ut Baccius. Sunt qui vinum præbuere, cum animosos vellent. Sed & sanis, verum macilentis, Columella propinat. Cerevisiam quoque & olim præbitam, ex Varino colligi

Plin. H. N.
l. 13. c. 24.

Hirtius de
bello Afri-
cano.

Scalig. Ex.
206. 5.
Ælian. H. A.
l. 14. c. 15.

potest, cui βῆρτρον est avena, & secundum alios frumentacea equorum potio. *Etatem* si attendamus. In hujusce animalis genere ætas longior maribus: legimus sanè equum ad usque septuaginta annos vixisse. Jam illud non venit in ambiguum, quod in annum tertium & tricesimum generet, utpote qui etiam post vicesimum mittatur ad sobolem reparandam. Notatum etiam advertimus, Opuntem nomine equum ad gregariam venerem durasse annis quadraginta. Annotatis proditum à veteribus indicium, si contracta armorum pellis lentè explicetur: in juvenibus ad suum statim locum redit. Sunt qui ex juncturis caudæ judicent, ubi ex dentibus non amplius dignoscitur. Quinquennio equas finem crescendi capere; mares anno addito, à Plinio habemus. Addit Aristoteles, post, annis sequentibus totidem crescere in corpulentiam, & ad viginti usque annos pergere proficiendo: verum celerius foeminas quàm mares perfici. Salacissimum omnium animalium equum esse, Aristoteles prodidit. Hinc ἵπποβῆν, ἵπποπορῆν, ἵπποερίνης & ἵπποερ, ille inter homines dicitur, qui plus æquo veneri addictus est; & ἵππομανεῖν ille, qui more equini generis, furius ad eandem agitur. Famosior tamen equarum quàm equorum salacitas. Ideo Poëtæ Cupidinem inter equarum armenta natum fingunt: mulieresque libidine prurientes caballæ, meretrices vero πόλῳι dicuntur. Has societate conjunctas, olfactu mares dignoscunt, etsi paucis admodum diebus una fuerint: quod si foeminæ diversæ permisceantur, mares alienas morfu expellunt, suasque singuli seorsim habentes, pascuntur. Gravidæ coitum pati apud Aristotelem legimus: Absyrtus negat. An sint homine salaciores, Gryllus apud Plutarchum in dubium vocat, quod capros, porcas, equas, iniverint viri, & foeminæ infano bestiarum amore exarserint: ad coitum verò nullum à bestia sollicitatum. Fuit tamen Athenis locus qui diceretur ad equum & puellam, quod quidam Codridarum Hippomanes nomine, qui & postremus imperavit, filiam in loco quodam cum equo furibundo inclusit, quod clandestino concubitu virginitatem lassisset, & equus puellæ vim intulit. De *Etate* coitui apta diversa produntur. Coire incipere bimum, tam marem quàm foeminam, prodidit Aristoteles. Sed hoc in paucis fieri, & pullos imbecilliores esse: ut plurimum trimatu seu tricesimo mense incipere, & proficere subinde ad prolis præstantiam in vicesimum usque annum: dignè procreare posse, cum dentibus mittendis cessare: sed idoneum maximè tempus cum annum & sex menses complevere: juniorum, aliquando pabuli bonitate & copia contingere. Plinius verò equas post tertium annum aut post unum ab enixu utiliter admitti putari

Ælianus.
Plin. H. N.
l. 4. c. 42.

Generatio.
Aristot. H.
A. l. 6. c. 12.

Aristot. l. 4.
de gener.
animal. c. 5.

Aristot. H.
A. l. 5. c. 14.
& l. 6. c. 21.

Plin. H. N.
l. 10. c. 63.

tari ait, cogique invitas: domitas autem sexaginta diebus equire, ante quam gregales dici. In Hispaniola, si Petro Martyri credimus, decimo postquam natæ sunt mense concipiunt, & geminos saepe unico partu excludunt. Columellæ equa bima rectè concipere potest; equus mas non trimo minor. Illa post decennium inutilis, quod ex annosa iners proles prodeat. Sic ad vicesimum durat. Anatolius vult, ut admissarius (sic latinis vocatur, qui ad prolem diligenter servatur, Græcis ὀχέιον, ὀχέτης, ἀναβάτης, κήλων Hippiatricis, ut opus ipsum ὄχια, & Proriga ille qui admittit) sit quinquennis, decimum quartum verò ingressus annum, ut conquiescat. Prurire agnosces, cum sese colligere, caudam frequentius jactare, humorem è genitalibus genituræ similem emittere, pluries etiam mingere, videris. Mas aliquando uno, aliquando duobus tribusve, aliquando pluribus diebus implet. Equa intermissio tempore, & melius quarto aut quinto anno interposito procreat. Omnino si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi novale fecere necesse est. *Fatura* initium ab æquinoctio verno ad solstitium, locis calidis mense Aprilis, frigidioribus Majo. Sic, quia mense duodecimo partum edit, circa herbescentem & temperatissimam anni constitutionem pariet. Elei finibus suis educatas iniri faciebant, quod sexcentis experimentis cognitum haberent, miræ felicitatis prolem sic provenire. Mares matutinum tempus appetunt, foeminæ post meridiem blandiuntur. Dantur & salacitatis irritamenta. Absyrus, ustam cervi caudam cum vino terere, & genitalia illinire jubet. Alii cicer exhibent; nonnulli urticam ori indunt; pulverem testiculorum equi in potu exhibent; deterfa foeminæ spongia loca naribus admovent: scillâ cum aqua ad mellis crassitudinem contrita, naturam equarum cum menses ferunt, tangunt: urtica vulvam perfricant: quidam denique fimo gallinaceo cum Terebinthina trito partes oblinunt. Lybicæ & Myfiæ equæ, tibiæ cantu excitantur, & gravidæ fiunt, ut apud Ælianum legimus: Genus tibiæ Hippophorbum Pollux vocat: materia, laurus detracto cortice. Non omnes tamen concipiunt; nec omnes postquam concepere, edunt. Cujus rei indicium ajunt, quod foetus circumrenes alia quædam, specie propemodum renum, ita continet, ut rescissus, quatuor renes habere videatur. Si, quot equæ uni equo sufficiant quæras, Columella, nec minus quàm quindecim, nec rursus plures quàm viginti, unum implere debere inquit. Aristoteles tricenæ foeminas & paulò plures singulis maribus tribuit. Palladius æstimatis unius cujusque admissarii viribus, pauca vel numerosa conjugia submitti consilii: juveni equo & viribus & forma con-

stanti, duodecem vel quindecim adscribit. *Concepisse* comperies, secundum Aristotelem, cum menses cessarunt; secundum Absyrum, si marem respuat; secundum Plinium, quod colorem illicò rubriore pilo, aut quocunque pleniore mutent. *Marem edituram* ajunt, si tertio ante plenilunium die admittatur; si tertio post, foeminam. Illum seminatam colligunt, si dextra admissarius desiluerit; hanc, si sinistra. Justa equa in Pharsalia dicebatur, quæ semper similem equo cui conjuncta erat, produxit. Vento in Lusitania concipere, Columellæ, Varro-
ni, Plinio, Solino, Alberto, Avicennæ visum; in Cappadocia idem fieri Augustinus prodidit; at Justinus in fabulis id recenset, Aristoteles fieri posse negat. Circa prægnantem quænam facienda sint, Oeconomi docebunt. Abortiunt si fumigantis lucernæ odorem persenserint, vel cum prægnantibus asini coiverint. Annum, secundum plerosque, uterum ferunt, secundum Absyrum, undecem menses & decem dies. Uteri durities in causa, si Aristotelem sequimur. Facillimè omnium quadrupedum partus edunt, & quidem erectæ. Eumelus author est, cum tardius pullitium enititur, continuo parituram, si comprehensas leniter nares constrinxeris. Pariunt magna ex parte singulos, aliquando gemellos. Vacat admodum à purgantibus in partu, minimumque emittit sanguinis profluvium, pro corporis magnitudine. Cum peperit, statim secundinas devorat, illudque fronti annatum hippomanes. Visum prodiisse & hermaphroditos. Nero tales equas ex agro Treverico, carpento suo subjuges ostentabat, ceu planè visenda res esset, principem terrarum insidere portentis. De *androgyno* Princivalli Vicecomitis ita Cardanus. Unum habebat tantum testem proprio loco, cum mammis tumidis, ut equæ habent. Inde vulvam proprio loco, & ex vulva penis emittebatur, non major palmo cum eum exereret. *Vocem* equi cum exprimere Græci volunt *χρεμελίζεν*, & *παχεμελίζεν*, *Φρυμάθεα*, vel potius *Φρυάθεα*, ut Ammonius monet, dicunt; Latini fremere & hinnire. Vox ipsa, *χρεμελισμός*, *βελχάλ*, *μυρίγμ* vocatur. De ejus mutatione ita Aristoteles. Equorum etiam voces, differre palam est. Foeminæ enim simul ac natæ sunt, vocem exiguam mittunt ac tenuem: Mares exiguam quidem & ipsi, sed plenior tamen & gravior quàm foeminæ & indies majorem reddunt. Bimus cum est, atque inire incipit, vocem magnam gravemque mas mittit: foemina majorem quàm ante & clariorem, usque ad vigesimum ætatis annum, magna ex parte: sed ab hoc tempore imbecillior tam mares quàm foeminæ reddunt. Qui nunquam in aliorum equorum turba hinnit, hunc mutum esse scribit Mizaldus. Cum incedunt,

Columella
l. c. Varro
R. R. l. 2.
Plin. H. N.
l. 8. c. 42.
Solin. Poly
hist. c. 36.
August. de
Civ. Dei
l. 21. c. 5.

Plin. H. N.
l. 11. c. 47.

Cardan. de
rer. var. l. 7.
c. 33.

Vox.

Motus.
soni.

Columella
R. R. l. 6
c. 28.

Ælian. H.
A. l. 12. c. 44.

Columella
R. R. l. 6.
c. 27.

Cardan. de
Var. Rer.
l. 13. c. 3.

sonitum edunt, pedibus terram pulsantes. Inde Latinis sonipedes, Homero ὤψιχες, quasi altisoni dicuntur. Quoniam poplites non adeò flectere possunt, ascendendo magis fatigantur, & lapsi, majore cum impetu ruunt: descendendo, quòd quatuor habeant crura, magis contra pondus obnuntantur. Agilitatem & epitheta quæ apud authores occurrunt, & exempla testantur. Homero ὠκύποδες, ἀερίποδες, ἀελλόποδες, πεχύποδες, ἐλαφρόποδες &c. vocantur. Oppianus, tantæ Iberos scripsit esse celeritatis, ut solæ cum eis Aquilæ, aut Circi accipitres comparari possint. Persei Pegasus alatus fingitur. Sarmatas longinqua facturos itinera, etiam si nihil offerrent pabuli; per centena & quinquaginta milliaria infedisse, non nemo prodidit. In Arabia, si Vartomanno credimus, citatissimo cursu diem ac noctem integram nunquam cessant. In Alanico bello captum à Probo Principe memorant, qui unius diei spacio centum obiret milliaria, vel in decimum haud interpellato labore. Cæterum *an equi equabus, aut vice versa velociores sint*, disquiritur. Homerus equabus Pheretiadis palmam tribuit. Menelai Ætha perniciosissima erat. Horatius quoque equum quàm equam quadrigis aptiorem dicere maluit. Equas inter currendum urinam emittere Plinius dixit. Crauxidæ equa octava Olympiade omnes vicit defultorios.

Horat. l. 2.
Car. od. 16.

Plin. H. N.
l. 15. c. 21.

Aldrov.
P. 40.

Natura.

Galen. in
Aphorif.
l. 2. 45.

Hecratitis Thessali (Echecratidem Plinius vocat) prægnantem equam Olympia vicisse invenimus. At Oppianus mares ad venationis usum præstare tradit; foeminas minus celeres ad longos per nemora decursus. *Quid equus admissus* Ciceroni sit, in Aldrovando vide. Imminuitur, imò perditur celeritas, si ocio domi marcescat. Quamobrem Antigonus Rex cum suo equitatu obsessus, cum exercere equos propter loci angustiam non possêt, eorum capita loco substrinxit altius, quàm ut prioribus pedibus terram possent attingere: deinde cogebat ipsum equitatum posterioribus exultare ac calces emittere; qui motus non minus sudorem excitabat, quàm si terræ spaciū decurrissent. Ex putrescentium medullis evolare vespas, notissimum. *Naturam* si spectes, Φορβίδες quoque sunt, seu ἀγελᾶνοι: bibunt sorbendo, & os profundius aquæ immergunt, quod audaciæ inscribitur: animum & os semper in patinis habent, & facilius sitim quàm famem tolerant: equæ crebrius mingunt, & per menses purgantur: plus excrementi sicci quàm humidi, quòd siccis magis vescantur, egerunt: Spumant si cursu defatigentur, cujus causam Galenus exactè prodidit; somniant de iis quibus assuevere: dormiunt plerumque stantes, canterii magis, qui quod castrati sint, somniculosiores videntur. Cum irascuntur, canum modo dentes denudant mordentque:

blanditiis maximè deliniuntur: pullos vehementer amant: Hinc factum ut Darius equâ consensâ, quæ domi pullum habebat, ex prelio ad Issum rebus suis inclinatis evaderet: & Tartari, prædæ gratia regionem quandam, in qua multo per annum tempore sol non apparet ingressuri, pullos in limitibus relinquunt. Sic enim equæ nocturno itinere diligentius observato, rectâ ad suos pullos in reditu contendunt. Rara denique, sed nota equarum rabies est, ut cum in aqua suam viderint imaginem, amore inani capiuntur, & per hunc oblitæ pabuli, tabe cupidinis intereant. Mentis error discutitur, si deducas ad aquam detonsâ jubâ: tum demum speculatæ deformitatem, pristinae imaginis aboletur memoria. Lycospadas equos maximè dare operam, ut aurigis suis formosi videantur, Ælianus prodidit. Ad *sensus internos*, ingenium, docilitas, memoria, amor & fides erga dominum, pudicitia, & magnanimitas pertinent. *Ingenio* debentur, quòd inimicos partis suæ norunt, adeò ut inter prælia hostes. morsu petant: quòd rectoribus perditis quos diligebant, mortem fame accersant: quòd auribus quæ audire indicent: & quòd equitationis peritum agnoscant. Bucephalus Alexandri, accepto regio stratu, neminem unquam alium præter dominum vehere dignatus est; & vulneribus altis in prælio acceptis, non prius concidit, quàm dominum extra periculum deposuisset. Equum Caji Julii Cæsaris nullum præter Cæsarem dorso recepisse Solinus & Suetonius author est. Cuiusdam medici Pannonici præ foribus solutus, etiam per integrum diem, donec ab agris rediisset, expectabat; adventanti gratulabundus occurrebat. Choreas tripudiarumque *edoceri* Sybaritarum exemplo notissimum, qui eo devenerant dementiæ, ut in symposiis equos ad tibiam saltare docerent. De illo verò quem Scaliger vidit, ita idem. Equum pusillum deformem circumducebat agyrta quidam, cujus iussu atque etiam loco interdum ille omnia faceret; ambulare, succussim properare, currere, saltare, vel quadrupes, vel bipes. Vinum bibere vidimus, in clunibus sedentem; anteriores pedes ad pateram ferri: pelvim sive malluvium cruribus sustinere, quasi à tonsore lavaretur; qualem pictum videmus asellum cucullatum: humo se sternere; porrectum atque projectum jacere: ciliorum compressionem annuere: caput ad heri nutum attollere: in terga vertere: supinus ostendere, quo corporis situ mulier ineuntem admittat virum. Stabulum agnoscere, & sponte domum reverti, notum. Ideò Galba cum de equi possessione disputaretur, velatum duci ad flumen præcepit, & ubi bibisset, amoveri velum oculis, ut stabulum petere posset. Deuxippi equus,

Paulus Venerus l. 9. c. 47.

Ælian. H. A. l. 16. c. 24.

Sensus interni.

Sueton. in Cæsare.

Scaliger Exercit. 209. f. 1.

Suidas in ιτα

ita erat edoctus, ut & sine habenis ocyssimè ferretur, & illo pedetentim procedente, placidissimè staret. Nigritarum quoque equos non aliter dominos ac canes sequi, Strabo author est. In ventre cubare edoctos à Jarcis, apud Herodotum legimus. Nervam in Parthia equus adorabat. Lutetia alter Reginam Ludovici XII. conjugem, genibus flexis salutabat. Circulos ligneos transilisse, more canum, saltuatimque vivacissima pernecitate sese gylando revolvisse, Venetiis anno 1636. vidimus. *Memoria* valere inprimis tubæ sonus indicat, quo audito, aures arrigit, nares inflat, hinnit, frena cum strepitu rodit: pedibusteram quatit, loco manere difficulter potest. Paralitus etiam quidam apud Tzetzem, cum equo veheretur curili, prandio frustratus est, quod equus, cum in columnam metæ forma incidisset, circum esse putans, usque ad vesperam circum eam se flexisset, cum impetu semper currens. Taceo quod Tholossanus de equo cujusdam Episcopi scribit, quem frater ejus ita adsuverat, ut quoties verba, Deus in adjutorium meum intende, audiret, saltibus crebris se extolleret. De *Amore, gratitudine & fide erga Dominum*, quorundam exempla testantur. Antiochi equus, occiso in prælio domino, se & suum sessorem Centeretrium Gallum præcipitem dedit. Scytharum reguli, hostem cum victor ad spoliandum venisset, ictibus & morfu confecit. Dionysii, ab eodem in cœno relictus, ut apud Plinium ex Philisto legimus, ut sese exemisset, vestigia Domini secutus est, etsi apum examen tergo hæreret. Homerus Patrocli equos flevisse dicit, Virgilius Pallantis, Cæsaris Suetonius, suum Asturconem Cardanus. Plinius quoque, eo effectum plerosque equorum in dominos esse ut affectos lugeant, lachrymasque interdum desiderio fundant, tradidit. Interfecto Nicomede Rege, equus ejus vitam inedia finiit. Idem de Soclis juvenis Atheniensis equo, postquam ab eo venditus fuisset, dicitur. De *Pudicitia* apud Ælianum, Varronem & alios invenies. Plinius ita brevissimè. Alium, inquit, equum, detracto oculorum operimento, & cognito cum matre coitu, petiisse prærupta atque exanimatum. Equam eadem ex causa in Reatino agro; laceratumque pariter aurigam invenimus. Namque & cognationum intellectus in iis est: itaque in grege prioris anni forore, libentius etiam quam matre, equa comitatur. De pulli ex incesto domini concubitu nati zelotypia, vide Aldrovandum. De *Magnanimitate* idem prolixè agit, sufficiat dixisse, quod Plinius habet, nempe, Equorum jubar tonderi præcipere, ut asinorum in coitu patiantur humilitatem: comantes enim gloriâ superbire: Inventi quoque qui

sine auriga certamen vicissent. In Circo, inquit Plinius, ad currus juncti, non dubiè intellectum adhortationis & gloriæ fatentur. Claudii Cæsaris secularibus Circensibus, excussio in carceribus aurigâ, albatos equos palmam occupasse, opposita effundentes omnia, quæ contra æmulos debuissent, perito auriga insistente, facientes: cum puderet hominum artes, ab equis vinci, & peracto demum legitimo cursu ad metam stitisse. moxque subjungit. Majus augurium apud priscos, plebeis Circensibus excussio auriga, ita ut staret, in Capitolium cucurrisset equos sedemque ter lustrasset: maximum verò, eodem pervenisse ab Vejis, cum palma & coronis: effuso Ratumena, qui ibi vicerat: unde postea nomen portæ est. Phidoti Corinthii etiam equa, cui Aurænonomen, apud Pausaniam, ab ipsis statim carceribus sessore suo collapsa, & cursum pristinum æquè ac si rectorem haberet retinuit, & circa metam se convertit: audito verò sono tubæ ad cursum concitata est vehementius: cumque ad ludorum præfectos antevertisset, jam quasi victoriæ se competentem intelligens, constitit. *Sympathiam & Antipathiam* si attendas, singularis equo cum gallinis & otide amicitia: cum *camelo, elephante, lupo, urso, leone, sue, ovibus, asino, serpentibus, trachuro pisce, phoca, pomis & ficibus, hordeo quodam, gentiana, colore atro*, & cadaveribus, inimicitias exercent. *Camelos* cum Cyrus equitatu Cræsi opposuisset, in fugam equos conjecere. Xerxes Arabes camelis usos, ultimos in exercitu locavit, ne equi consternarentur. In bello Tarentino elephantorum tum magnitudine tum deformitate, & novo colore simul ac stridore consternati equi, cum incognitas sibi belluas amplius quam erant, suspicarentur, fugam stragemque latè dederunt. Cæsar ingentem fluvium in Britannia trajecturus, consenso elephante, equos Britannorum terruit. Ne tympana quidem ferre posse, si ex pellibus vel elephantis, vel cameli, vel lupi facta fuerint, à Porta author est. Rumpi eos traditum est, teste Plinio, qui vestigia *luporum* sub equite sequuntur, si calcaneum equi quadrigam trahentis conculcent, sisti, tanquam cum quadriga congelati essent, apud Ælianum legimus. Nunquam transituros equos, ubi lupi intestina sint defossa, Pierius Valerianus prodidit. Dentes verò maximos, infatigabilem cursum præstare equis dici, sicis alligentur, Plinius author est. De Lycospadis & Lycophoris equis in Differentiis agemus. *Ursos* in solitudine tympano ex equi pelle confecto, terreri Portæ quoque debemus. Castrati *leonem* nulla ratione accedunt, dextrarii seu non castrati adoriuntur. *Oves* si stabulo in quo mulæ, equi, aut asini steterunt, facile in scabiem incidunt. Rudentes *asini*, in Darii

Plin. H. N. l. 8. c. 42.

Pausan. in Corinthiacis.

Sympathia & Antipathia.

Herodot. Hist. l. 1. p. 15.

Plin. H. N. l. 20. c. 20.

Plin. H. N. l. 28. c. 19.

Columella R. R. l. 6. c. 30.

contra

Pl. l. 8.

Pl.

contra Scythos expeditione, equos perturbant. De *serpentibus* Silius Italicus prodidit. Cauda *trachuri* ventri equæ appensa, abortum procurat; si Æliano credimus. *Phoca* aspectum ferre nequeunt. Animo linquuntur, si aut mala aut ficus dorso comportarint; exanimati, panis objectu revocantur. Hordeo illo abstinent, quod in quodam, circa Scytharum & Medorum dictam Thraciæ regionem, loco, provenit. In rabiem, aguntur, si lasere nares illiveris. Gentianam abortus equabus causam esse, Gesnerus ex quodam sene audivit. Securi-dacam si calcaverint, soleas exuunt. Si equi ex Sybari fluvio biberint, sternutamentis exagitantur: si ex Cossinire Thraciæ, quod in agrum Abderitarum defluit, in rabiem aguntur. Idem de puteo haud procul à Potniis Bæotiæ urbe dicitur. Equum Catonis in Maurum aterrimum, aterrimis armis indutum, calcaribus adactus, sese inferre recusasse, Silius Italicus reliquit. A cadaveribus abhorre apud Homerum habemus. Maximus quidem equorum in Cibus, medicina, bello, venatione, itineribus, triumphis, & aliis usus est; nos tamen, quo loco duntaxat in *Cibus* & *Medicina* habendi sint, videbimus. *Carnibus* usos non tantum obfessos, quod in Veronensi sub Maximiliano I. Novariensi, sub Ludovico Aureliano; Rupelleni, sub Ludovico XIII. Gallorum Rege Christianissimo, ut alia taceam, factum, sed & gentes, apud auctores habemus. Notum est, Nomadum, Scytharum, Sarmatarum, & Tartarorum modernorum nomen. His volupe, vulnerare incidereque equos, carnibusque etiam semicrudis vesci: caballos pridè tum spontè tum morbo absumptos, exciso loco apostemato comedere; eorundemque reges, si quando commeatum suis distribuerent, quadraginta hominibus equum unum dare solebant. Sed & apud Persas, in conviviis die cuiusque natalis, affli toti apponebantur: à Germanis verò tam agrestes quàm domestici caballi, tam diu comedebantur, donec à Gregorio III. abrogaretur. Ab Alpini populis pullos edi, Brujerinus se audivisse refert. Fuit & *Sanguis* in deliciis. Plinius sanè Sauromatas è milio, maximè pulte, & cruda etiam farina sanguine è cruris venis admixto vivere, prodidit. Miechovius verò & Paulus Venetus, equitantes si fames invaserit, sitisque molesta fuerit, venas aperire, haustoque eorum sanguine, famem sitimque pellere, reliquerunt. Gavissos eodem Cancanos, qui secundum quosdam Virgilio Bisaltæ, secundum Acronem & Porphyrium Hispaniæ gentes, apud Horatium habemus. De *Lacte* nullum dubium. Scythæ namque liberis statim atque nati sunt, lac equinum porrigunt. Inde Hippomulgorum, & Galactophagorum nomen. Idem Soli exponunt, ut crassior

pars subsideat, mox fervefaciunt. Evadere produnt, ut vinum album esse putetur. Molichi verò olim Tartarorum servi, potum lactis equini illis tributum petentibus perducem suum in itinere offerre consueverant.

De Hippace quid sit, inter scriptores non constat. Hippocrates, Dioscorides, & Plinius, caseum esse scribunt, quem ille virus redolere, & bubulo proportionem respondere, adjicit. Alii equinum coagulum esse credunt. Theopompus scythicum ex lacte equino, edulium esse scribit. Ut ut sit, hæc & glycyrrhiza, undecim & duodecim dies vitam tolerari apud Theophrastum legimus: plurimam temporis partem caseo equino usos Hippocratis testimonium est.

Nec est quod quisquam illud miretur; cum Zoroastrem interdum solo lacte sex menses transegisse, quod de quodam alio Athenæus narrat, referant. *Medicinam* quod spectat, habet in ea locum, lac, serum,

sanguis, axungia, coagulum, dentes, lingua, os de corde, jecur, testes, fel, pili, ungula, sudor, spuma, saliva, urina, & sterces. Lac maximè

perpurgat, ut purgare Dioscorides tradat. Serum ad ulcera renum perpurganda, con-

ducit, si Ætio credimus; illud nempe, quod per decoctionem ex lacte separatur. Rhasis mulierem quæ non concipit, si lac equinum ignorans biberit, & mox cum viro congressa fuerit, concepturam scribit. Invenio & apud Plinium, vulvas collutas juvari eodem lacte. *Sanguis* septicus est: Equarumne quæ admissuram expertæ sunt, an verò marium *ἐχιδνῶν* quod Hermolao Barbaro placet, vel equorum utriusque sexus, quod Plinio, experientia dirimere potest. Eundem Plinius regio morbo prodesse scribit: & hippiatræ eodem ad diversos morbos utuntur. Phragmaticum de matri-

ce detractum, cum oleo vinoque tepescit, & toti jumento contra pilos inun-

ctum, curat. *Fel*, maleficæ naturæ est, si Plinio credimus, qui tantum inter venena damnari tradit, ut idèò flammæ sacro equum tangere non liceret. *Axungia* suffumigata, partum mortuum, si Sexto credimus, foras ejicit, & secunda sequitur. Medulla unguentis ad spasmodum miscetur. *Coagulum* inter dysenteriacorum & coeliacorum remedia censerit, Dioscorides, Galenus, Avicenna, & Haly auctores sunt. *Dentium* farina verendorum vitis inspersa medetur. Qui primi equo cadunt, infantibus adalligati, dentitionem facilem præstant, idque efficacius, si terram non attigere, ut Plinius prodidit. Sextus eos, si dentem qui doluerit, tetigerint, remedio esse scribit.

Nam & infans, addit, si equi rostrum basaverit, dentium dolorem non sentit, & nec equus mordebit infantem. *Lingua*, ex vino inveterata, ad lienem præsentaneo remedio sedandum datur, si Cæcilio Bioni apud

Plinium

Ælian. H. A. l. 13. c. 27.
Plutarch. Symp. l. 6. q. 8.

Ufus.

Bruyer. l. 13. c. 40.

Plin. H. N. l. 18. c. 10.

Horat. l. 3. Carmin.

Cromerus Hist. Polon. l. 29.

Hippocrat. l. 4. de morbo. Plin. H. N. l. 28. c. 9.

Theophr. H. P. l. 9. c. 13.

Ufus in Medicina.

Dioscor. M. M. l. 2. c. 75.

Veger. l. 1. c. 17.

Plinium fides. Os de corde, dentibus caninis maximè simile est. Hoc Scarificari dolorem, aut exento dente demortui equi maxillis ad humerum ejus qui doleat, demonstrari, Plinius author est. *Jecur* thecà cedrinà repositum, dein vino Chio & aqua dilutum, ne jecur amplius exedatur, efficit. *Lien* ex aqua dulci potus, mortuum partum ejicit, apud Plinium. *Testiculi* aridi hausti Venerem stimulant. *Lichenes* in genibus, & super ungulas inflexu harum partium indurati *calli*, triti & in aceto exhibit, comitialibus profunt, ut Dioscorides, Galenus, & Plinius, scribunt. *Pilus* ad ostium domus alligatus, ne culices, aut Cniphes per ostium involent prohibet. Id Rhafis & Albertus prodidere. In inguinum ulceribus equi setæ tres, totidem nodis alligatæ intra ulcus, remedio sunt. Eorundem ex capite & femine cinis, sanguinis profluvium sistit. Pilo circumligato verrucæ tolluntur, quod propter adstrictionem alimento privatae arescant. *Vngularum* cinis cum oleo & aqua illitus, panos & apostemata, in quacunque parte discutit: sed & strumas, si urina calefacta admisceatur. Ex vino & aqua potus adversus calculos prodest. Suffitus partum deturbat. Ramenta per nares equo infusa, urinam ejusdem promovere, Hierocles scribit. *Sudor* cum urina in balneo bibitus, tineas & serpentes è ventre hominis exigit, si promissis quorundam credendum. Mistus cum vino & à gravida potus, abortum facit. Si cultelli vel gladii calefacti eum imberint, inficiuntur adeo, Alberto prodente, ut locus ab eis vulneratus, sanguine, ante mortem animantis, manare non desinat. *Spuma* equi recens detracta, & cum oleo rosaceo infusa, auricularum quamvis vehementes dolores resolvit. Eadem, Marcellus, si ab equitando vexata fuerint inguina, aut intertrigines doluerint, fricari tanquam præsentaneo remedio, jubet. Ex *Saliva* commendat Gefnerus, in fervido faucium malo, quod æstare nonnunquam, pestilenti lue, in milites inprimis grassatur, remedium. *Saliva*, inquit equi, avenam aut hordeum pasti, os ægroti diligenter colluitur: deinde ex cancriis vivis contusis, humorem exprimes, eodemque rursus lavabis. Quos si vivos habere non potes, pollinem de cancriis aridis in clibano tostis insperge: postquam equi saliva ablueris. Phthificis jam desperatis, salivam vel spumam cum aqua calidaper triduum dabis. Æger sine cunctatione sanabitur; sed equus morietur. Id à Plinio, Marcello, & Sexto proditum habemus. De *Vrina* & *Stercore* hoc dixisse sufficiat: illam aquæ ferrariæ ex officinis contra comitalem morbum misceri: hoc, ad colicam in vino albo decoctum, contra scorpionum ictus; & fluentem ventrem in aqua, Dioscoridi, Plinio & Sexto adhiberi. Recens naribus admotum, sanguinem reprimi,

inprimis si cum creta & aceto acerrimo agitetur. Cum putaminibus ovorum in cinerem redactum mistum, ne ex vulnere immodicè fluat, prohibet. *Anhelitum* præservare à peste quorundam commentum est. *Differentia seu Genera* equorum varia sunt: præcipua, à *Locis*, *partibus*, & quibusdam accidentibus sumuntur. A *Locis* equi sunt, *Acaranici*, qui maximi fuisse dicuntur. Unde in proverbium de re maxima cessere. *Ethiopici*, quos, feros credo, & pennatos, cornibus ornatos ferunt: malè à calore habentur. *Agrigentini*, qui olim ad agones Græciæ mittebantur, & victores recedebant. *Alanici*, qui veloces & robustissimi. Probi tanta celeritate fuisse perhibetur, ut diurnis spatiis centum obiret milliaria, vel in decimum diem haud interpellato labore ut diximus. *Angli*, quorum bona pars non succussat, ut Polydorus Virgilius prodit. *Apamienses* in Syria, ubi supra triginta millia alebantur equæ, & emissarii trecenti. *Apuli*, quos Varro laudat, & Volaterranus bello aptissimos facit. *Arabes*, celeritatis, equæ inprimis, tantæ, ut per diem noctemque circiter, centena milliaria itineris conficiant, si Vartomanno credendum. *Arcades*, à quibus ideò Arcadia *ἵππων*. Equis & asinis admissariis ad mulos procreandos clara erat. *Armenii*, qui à Parthis genus ducunt, nisi quod capite sint graviores, ideò *Βαρυνέφαλοι* Absyrto. *Astures*, seu *Asturco-* Martial. *nes*, quibus forma minori præditi, mollis est Epigr. alterno crurum explicatu glomeratio, fuere olim in precio: sed bellis apti non sunt. *Attici*, qui Sophocli præstantissimi. *Barbari*, qui ex regno Tunetano, & Numidia habentur, sunt perniciosissimi. *Bengalenses*, qui tam duras ungulas habent, ut ferreis soleis non indigeant, utcunque per saxa & montes currant. In Bisnagar quadringentis aut quingentis nummis aureis venduntur, octingentis quandoque, quod aliunde advebantur. *Britones*, qui cruribus & auribus sunt mutili. *Burgundiones*, qui injuriæ tolerantes. *Calabri*, qui itineri peragendo aptissimi. *Cappadoes* omnium ferè optimi Solebant incolæ Persis mille quingentos annuatim persolvere. *Carajani*, qui à mercatoribus in Indiam ducuntur, & quibus incolæ auferre de osse caudæ nodos duos vel tres solent, ne fessorem feriant. *Celtiberi* *ἱπποφάροι* subalbidi; in exteriorem Hispaniam traducti, colorem mutant. *Cilices*, quorum trecenti sexaginta albi Dario pendebantur. *Corfici*, qui breves admodum, sed generosi. Procopius tradit, paulò supra oves magnitudine esse. Alii, nisi clausis obequitari oculis, addunt. *Cretenses*, elatioris animi, & qui accessum agrè ferunt. *Cyrenaici*, ilibus substrictis & parvis, pedibus bonis, longiore inter equitandum animæ ductu, magnitudine pollent. *Paci* perniciosissimi, quibus juba ab armis ad terram usque, cauda proluxa, caput parvum.

Polydor.
H. Angl. l. 1. r.
Strabo Geogr. l. 16.

Martial.
Epigr.

Galen. de
Euporist.
l. 2. c. 38.

Gefnerus
de Equo.

Dani speciosi, & viribus clari. *Oelandi* ex Gothici maris insula, totius orbis minimi, sed perdociles. *Elei*, qui à pernicitate laudabantur. Incolæ equas finibus suis educatas iniri faciebant, quod esset experimento cognitum, miræ felicitatis prolem inde provenire. *Epirotici*, qui mordaces & perversi. Apud Elidem palmas merebantur. Nunc *Albanos* vocant. *Frigisci*, quos non minus velocitate quàm continuatione cursus, invictos commendat Vegetius. *Germani*, qui plerumque succussatores. *Transylvani*, qui docilitate ab aliis vincuntur: cursu verò iugi & longo nulli cedunt. *Græcanici*, quos Absyrto scribit, pedibus bonis fultos esse, vasto corpore, capite venusto, ardua antica parte statura, concinnoque corpore, sed clunium compago incommoda, nec respondente; pernices & animosos. *Hetrusci*, arguto capite, & densa juba. *Hispani*, qui teste Absyrto, magno sunt corporis habitu, concinno & erecto, eleganti capite, compage corporis luculenter dividuâ; sed adstrictis clunibus, itineribus obeundis pares & robusti; corpore nec gracili, nec ad maciem opportuno; cæterum ad cursum habiles, qui in equitatione calcaribus non incitantur. Quin & ab ortu ad integram usque ætatem morati & obsequentes: deinde improbi & mordaces fiunt. Tantam eorum fidem, Rodericus Santius ait, ut cum se percussos in bello sentiunt, fessores suos incolumes extra prelium reponant. *Ianettos* vulgò vocant. *Hollandi* australes inprimis, lacertosi sunt. In Frisia generosi, torosi, & panopliæ ferendæ idonei. *Hunniscis* est secundum Vegetium, grande & aduncum caput, extantes oculi, angustæ nares, latæ maxillæ, robusta & rigida cervix, juba ultra genua pendentes, majores costæ, incurva spina, cauda sylvosa, tibiæ validissimæ, parvæ basæ, plenæ & diffusæ ungulæ, illa cavata, totumque corpus angulosum, nulla in clunibus arvinâ, nulli in musculis tori, in longitudine magis quàm altitudine statura, propensior venter exhaustus, ossa grandia, macies grata, & quibus pulchritudinem præstet ipsa deformitas. Animus moderatus & prudens, vulnere patiens. Hunnicos aliàs vocant: fortè sunt Ungarici, seu Pannonii, quibus Camerarius dentes cadere negari ait. *Iberi* Oppiano sunt celeres, sed cursus celeritatem pauca emensi stadia amittunt, corpore venusto, sed ungulâ minus solidâ. Fortè sunt diversi ab Hispanis, & ex Iberia inter Armeniam & Colchidem sita oriundi. Oppianus tamen eosdem facit. De *Indicis* dicit Ælianus, difficulter currentes coerceri, nisi ab iis, qui à prima ætate in equestri scientia instituti sunt. Hi currum in orbem versare planè norunt. *Insabres*, sunt arduâ præ cæteris cervice, & micantibus oculis. *Istriei*, proceri, individuâ spinâ cavaque. *Lybies*, corpore

oblongo, costis & lateribus crassioribus, & ampliore ad rectum impetum pectore. Solis æstus & sitim meridianam facile tolerant. *Massæyli* sunt parvi & celerrimi, & solâ virga reguntur, quod & de Mauris dicitur. *Menapii* seu Geldri, Germanicorum equorum soli bellatores, & idè in precio. Eosdem & *Sicambros* dici volunt. *Mosci* soleis carent, ut Herbersteinus prodidit. *Murcibii*, vix ora tenacia ferro concedunt. *Neapolitani*, sunt animosi, speciosi, & robusti. *Nigriti* ob æstus nimium ferè nulli. Idem facit, ut eorum inguina intumescant, ne mejere possint. Pro fæno utuntur faselorum laceramentis, sole exsiccatis: loco avenæ, milio. Pro equo phaleris & reliquo ornatu instrato, dant mancipia novem, ad summum quatuordecem. *Nisæi*, quos maximi Oppianus facit omnium pulcherrimos, gressu molli, & freno faciles, capite parvo, jubâ longa & multa, comis utrinque demissis, subflavis. Medicos fuisse Stephanus & Ammianus Marcellinus testantur, qui & Neseos vocant. Viginti millia quotannis ad Regem Persarum mitti fuisse solita, sub tempus quo festum Mithræ celebrabatur, Strabo auctor est. *Norvegia* mediocris magnitudinis alit, sed admirandæ fortitudinis & pernicitatis, in saxosis viis, eosdem. *Numidici*, neque hordeum, neque triticum gustant, solo gramine & fæno contenti. *Parthi*, teste Absyrto, magno & amplo sunt corpore, Oppiano βαρυπλάκαμον id est comam gestantes densis cincinnis nexam. De *Persicis* ita Vegetius. Persis & statura & positio à cæteris equorum generibus non plurimum differt, sed solius ambulatoriæ quadam gratia discernuntur à cæteris. Gradus est minutus & creber, & qui sedentem delectet & erigat, nec arte doceatur, sed naturæ velut jure præstetur. Inter tollutarios enim & eos quos totonarios vulgus appellat, ambulatoria eorum media est, & cum neutri sint similes, habere creduntur ab utrisque commune. In brevi amplius gratiæ, in prolixo itinere sævior patientia, animus superbus & nisi labore subjugatus, assiduè adversus equitem contumax, tumens, prudens: & quod mirum est, in tanto fervore, cautiissimè decoris est observator: incurvata in arcum cervix, ut recumbere videatur in pectore. Inter *Pharsalicos* equam fuisse asserit Aristoteles, nomine justam, quæ pullos pareret omnes admissariis equis similes. Unde fortè ei nomen factum. *Polæni*, ut scribit Cromerus, partim ob pernicitatem & laboris incommodorumque tolerantiam, partim propter molliorem incessum, à remotioribus expetuntur. Apud *Pssylos* arietibus non majores esse Ælianus nugatur. Qui sint *Saphareni* quorum simul cum Armeniis Vegetius meminit, postquam Persicos laudasset, apud neminem reperitur. Ego à Saphara Arabiaæ foelicis oppido

Santius
Hist. Hisp.
p. l. c. 2.

Oppianus
Cyneget.,
l. 1.

Ælian. H.
A. l. 13. c. 9.

Oppian.
l. c.

Aristot. H.
A. l. 7. c. 5.

Ælian. H.
H. l. 16.
c. 37.
Veget. in
Veterinaria.

pido in mediterraneis, cujus apud Plinium mentio, quodque Ptolomæo *αιφάγγ*, dictos putò. *Sardi* laudatissimi sunt, caudâ pro-cera atque lata, juba brevi, ungulis afininis; lacertoso corpore, arrectis auribus, si benè Stradanus expressit. *Sarmatici*, genus equorum est, testè Absyrto, non inelegans, & in suo genere concinnum, ad cursum idoneum; simplex, grandi corporis habitu, valido capite, cervice decora. Castrantur, ne aut foeminarum visu exagitati raptentur, aut subsidiis ferocientes, prodant hinnitu densiore vectores. Plinius hocce populos cum longinqua acturi sunt itinera, inediâ pridie præparare equos ait; exiguum tantum potum impartientes, atque ira per centena millia, & quinquaginta continuò cursu euntibus insidere. *Scenite*, tantæ habent pernicitatis, Evagrius teste, ut propter velocitatem eorum vinci nequeant. *Suecia* & *Gothia* magnos & ad cataphractorum prælia aptissimos, teste Olao Magno, producit, qui, regio edicto extra regnum educi prohibentur. *Tartarorum* plerique sunt albi. Venetus magnum Chamum numerum XM. alere prodidit. Tantæ velocitatis sunt Michovio, ut uno die XX. miliaria Germanica magna equitent. Sunt depressâ cervice, & pedibus aquam & pabulum subnivibus quærunt. Perniciores sub Tartaris quàm aliis esse, Mosci affirmant. *Thessalis* nota bovilli capitis inuri solebat. *Thrace*s Absyrtus turpes esse scribit, deformi specie, rigido corpore, prægrandibus armis, spinâ curvâ, varos, ideoque ingressu vacillante, cursuque. Delphicum tamen oraculum & Virgilius laudat. *Toringos* quoque Vegetius commendat, & proximos Hunniscis facit. *Tyrrheni maris* insularum præsertim Sardinæ & Corsicæ equos, breves admodum, sed animo generoso, & ingressu irrequeto, Volateranus facit. Et tantum de generibus à locis desumptis. A *Partium* constitutione haud paucæ quoque occurrunt differentia: præcipuæ *Elaphopodes* sunt à corvino pede sunt qui suffraginum articulo ossa continent, & ideo pessimo gressu nituntur, vectoremque contundendo fatigant. *Cynobata*, qui iisdem in locis breviter condunt ossa & humilia, ob idque ungulas ad internam calcium partem adferunt, ac pedes tractim agunt, in eisque claudicant. *επεροσκελεις* & *επερόπιδας* dicit Absyrtus illos qui in alteram partem vergunt seu inclinant. *εψάυχλω* Homero *εραύχλω*, est ille qui cervicem attollit. *επρόγναθω*, qui dispare maxillas, unam nempe duriores, alteram molliorem habet. Ex *ascidentibus* color nobis aliquot præbet differentias, alia prætermittimus. Hujus ratione sunt, *maculati*, *trabeati*, *transrabe-*

ati, *unicolores*, *albi*, *nigri*, *spadices*, *baliarda*, *carulei*, *parvi*, *heterophthalmi*, *aitogenes*, & *alphorynchi*. *Maculati* *ἀρύγες* Oppiano inprimis maximis nigris maculis & zonis, seu per crura extensis, seu per dorsum, seu in collo distincti, nobilissimi habentur, eoque præstantiores fore creduntur, quo natura in his ordinem quandam servasse videbitur, seu numeri seu paritatis ac loci, seu rectitudinis: post hos sunt qui maculas rubras aut rubiginosas habent. Ad hos spectant *Scutulati*, qui oblongis tæniis ornantur: *Guttati* *τινδοί* qui rotundis fasciantur, ut pantheræ: & *Variegati*, *πικιλοδέρμονες*, *pica* nonnullis, aliis Homeri *αιολόπῳλοι*, qui *pica* instar albo & nigro variant. *Trabeati*, dextros ambos aut sinistros pedes albos habent, & pessimi esse censentur. *Transrabeati*, alternatim pedes habent candidos, & omnium deterrimi sunt. Causa utriusque quod illorum pedes in utero materno juncti fuerint, ob id simul contraxisse maculam. *Unicolores* Palladius admissarios legi jubet. *Albi* Claudiano sunt veloces, Platoni laudatissimi. Cæcios habent oculos; quod cum hi triplici ratione distinguantur, nigro, caprino, & cæcio, corporis totius colorem, oculi quoque color consequatur. *Nigricantes* laudibus efferuntur, maximè si in fronte, vel asteriscum, vel lineam albicantem, vel denique altero pede, candoris aliquid habeant. *Αἰθνας* Homeri quidam interpretantur, id est nigros & quasi igne exustos quales *αἰθνας* & *πυρλαμπτας* in aprorum venatione commendat Oppianus. *Spadices*, sunt sanguinei fulgoris, à colore palmei furculi. Alii palmatos vocant, Varro badios, Cassius Medicus balios, nonnulli Castanei coloris, & baliardas. *Caruleos* Becanus celeres facit. *παρωας* equos *πρωμα πυρρας*, Hesychius & Varinus vocant. *Heterophthalmi* oculos habent, aut non æquè magnos, aut alterum altero humiliorem. Lacuna malè monoculos vocat. Parthi eos fortè probabant, quod pavidi & fugæ aptissimi essent. *Αεργηεις* à genitiva quadam macula quam in armis & cocco referunt, Absyrtus dici putat, Sarmatæ eos ut probos adfciscunt: illos verò, qui aquilinam notam ponè ferunt circa coxas & caudam, (iidem hi cum superioribus nam *αἰε* aquila est) rejiciunt. *Αλφορύγχοι* denique, tardius senescere dicuntur.

CAPUT II.

De Asino.

Quum excipit Asinus, despectum quidem, sed non minus utile jumentum. Incredibili sanè lucro dominis fuisse memoratur, compertumque tradunt, fuisse asinam quæ omnium prædiorum fertilitatem superavit: siquidem in Celtiberia visum est, singulas asinas quadringentis millibus nummorum fuisse enixas, ut apud Plinium legimus. Non est ergo mirum à Q. Axio Senatore quadringentis nummis asinum emptum: & Heliogabalum eosdem tanquam magnifica dona P. R. distribuisse. *Nomen* apud Latinos sortitus est, non ab a & sinos, ut esset quasi sine sensu animal, ut Bartholomæus Anglicus nugatur: sed à sedendo, ut Isidorus scribit, quasi assedum dicas: vel potius ab Ebraico Ason, quod ipsum asinum significat. Græcis est ὄνος, ὅθεν τὸ ὄνησιν, quod nostra opera juvet; nisi melius à livido colore ita dicatur, à quo & asello pisci, nomen inditum arbitrantur. Dicitur Cyrenensibus βελός ab improbitate; Aristophani βέπιλλος, quasi bovis instar stupidus: Nicanro βρωμής ruditor; & à nimia vocis absurditate μεγάλωνος; Eustathio & Suidæ κάνθων, à clitellis, & κανθήλιος; Hesychio κιδός, quomodo & Doreseundem appellant. Aliis κωκυλός, λέπιδος, quod ei ilia albicent; μεμνέμων, μονιός Cyrillo, μυχλός, quod tamen vocabulum Phocenses, non nisi τῶ ὄππῃ ὀχέων περιπορεύειν tribuunt, qui & κήλων vocatur; ὀκρίδας, agrestis nempe, ὀγκιστής à ruditu, dicitur. *Descriptionem* si spectes, aures ipsi pro proportionem totius longissimæ & latæ; labia crassa: *caput* magnum: in collo & pedibus, nigræ quædam lineæ, quas Hesychius μύκλας vel μόκλας vocat: In *tergoris* exordio, crucis effigiem gerit, quo etiam loco quàm juxta renes, onera difficiliter portat, quod ossa sint minus robusta. *Pilus* corporis duriusculus & lanificio ineptus. *Ilia* alba. *Membrum genitale* præ cæteris quadrupedibus grande. Nicander κερώνιον, quæ propriè est ράβδος κεφαλότη, vocavit. *Dentes* priores mense trigesimo tum masculina amittit: secundos sexto: quod si non prius peperere quàm decidant postremi, sterilitas certa. *Cutis* ei durissima & solidissima ut vix fustim sentiat. *Cor* portione maximum ut omnibus timidis, aut propter metum maleficis, ut ait Plinius. *Sanguis*, crassissimus, pinguis, & nigerrimus. Quantum ad *locum*, Nomades asinis carere propter regionis frigus scribit: itaque in Septentrione paucos invenias. In Italia, Gallia, Germania, Græcia, haud pauci, ut in Differentiis dicemus, habentur. *Cibus* ipsi vilissimus. Nam & eo rure quod pascuo

caret contineri potest, exiguo & qualicunque pabulo contentus. Quippe vel foliis spinisque, vel perticis salignis alitur: vel objecto fasce farmentorum. Paleis verò quibus ferè omnes regiones abundant, gliscit. Ideò Tzetzes maximum urbis excidium indicaturus, vereri se, acutè dixit, ne asinus eam depascat. Delectatur & ferula, quæ aliis animalibus venenum est, & ficubus, quas cum devorasset, & verò puer ut vinum asello daretur postulasset, in tantum cachinnum Polemon, vel Chrysippus resolutus est, ut eodem perierit. At in Christiani Moguntini Episcopi, teste Krantzio, asinos, tantæ impensæ factæ, quantæ in potentissimi Principis familiam alendam impendi possent. Adjunt etiam potu aquæ pinguescere, & ex cibo eo magis proficere, quo plus biberint. *Moximè* libidine pruriunt, id & Ambraciotarum æneus asinus, quem Delphis dedicavere, postquam victoriam de Molossis, pugna nocturnâ, reportassent, ostendit. Segnes tamen esse & infœcundos, ob tantam veretri enormitatem, pro comperto habetur. Ideò Ægyptiis exofos Ælianus prodidit. De generatione ita Plinius: Partus à trigesimo mense ocysimus, sed à trimatu legitimus, totidem quot equæ & eisdem mensibus & simili modo. Parit duodecimo mense; singularim magna ex parte procreat prolem: eâ namque naturâ est, ut unum pariat, sed nonnunquam gemellos etiam edit, rarissimè tamen. A partu die septimo mari jungitur, eodemque die juncta, maximè recipit initum, sed postmodum etiam patitur. Solet hæc, nisi priusquam gnomonem amittat pepererit, nunquam postea initum recipere: sin antea pepererit, parere tota sua ætate potest. Gignit totâ vitâ, quæ ei est ad trigessimum annum. Prægnantes opere levant. Venter enim labore nationem reddit deteriore. Marem non disjungunt ab opere, quod remissione laboris fit deterior. Admittuntur antè solstitium, ut eodem tempore alternis annis pariant: duodecimo enim mense conceptum semen reddunt. *Hucusque Plinius.* Dolent eis à foetu mammæ; ideò sexto mense arcent partus, cum equæ anno propè toto præbeant. Lac gravidæ habent mense decimo; vel ut Plinius, prægnantes continuo lactescunt. Pullis ubi pingue pabulum, biduo à partu maternum lac gustasse lethale est. Genus mali vocatur *Colostratio*. Hana socer Esau primus equis asinos copulavit: sicque isti se gerunt, ut si asinas, quas equi inivere, supervenerint, semen, propter ejusdem sine dubio frigiditatem, pervertant. Quod facile implent, membri, ut Cardano visum, productio in causa; quâ ad intima uterique penetratur. Observatione dignum, quod tradit Plinius, ad mularum maximè partus, aurium referre in his & palpebrarum pilos dici. Quamvis enim unicolor

Columella
R. R. l.
7. c. 1.Krantzius
Sax. l. 6.

Generatio.

Ælian. H.
A. l. 10.
c. 28.
Plin. H. N.
l. 16. c. 20.Genes.
c. 36.

toto

Asinus *Esel*



Asinus *Esel*



Mulus *Maul Esel*



Inimicitie. toto corpore, totidem tamen colores quot ibi fuere, reddere. *Inimicitias* cum Ægitho, & Spino avibus, ex plantis cum cicuta, gerunt. Spinetus se scabendi causa atterens, nidos ægithi dissipat: quod adeo pavet, ut voce omnino rudentis audita, ova ejiciat, pulli ipsi metu cadant. Igitur advolans ulcera ejus rostro excavat. Spinus ideo eos odit, quod flores spinæ devorent, is in spinis degat. Cicutam si in Hetruria depascantur, profundissimo somno & torpore corripuntur, ut planè mortui videantur. Scaliger testatur, multos ex ejus esu oscitantes, deinde in anfractuosos gyros circumactos concidisse. Quæ de corvo, lupo, forice, & equo dicuntur, manifestam rationem habent.

Amicitie. *Amicitiam* verò cum scorpio, & vitis palmite colit. De illo ita Merula. Si percussus à Scorpio, superafino rectus desideat ad caudam, pro ipso dolorem sensiturum asinum: ejusque rei signum esse, quod pedendo moritur. Velfi is, quem Scorpio pupugerit, in aurem dicat asino, Scorpium me pupugit; non amplius doliturum dolore in asinum transeunte. Abrafo verò ab asino vitis palmite, vindemiam inde ferociorem provenisse, observatum est: idque cum multa secuti diligentia mortales, lætorem sibi proventum quotannis compararunt. Stygis aquam nonnisi ungula asini pati; & Empedoclem utribus ex coriis asinorum flatus Etæsiarum validos compescuisse, nescio an inter sympathiæ exempla recenseri debeat.

Vita. *Vitam* ad trigesimum produciunt annum, nisi nimis laboribus exhauriantur. Fœmina vivacior mare est. *Vox* ipsorum ruditus & oncatio, ut Scaliger voluit. Sed & *Βραυῶν*, & *πονδύρεα* de asinis prolata invenies. Soli inter animalia pilosa, non à pediculo tantum, sed etiam à reduvio immunes esse dicuntur. Laborant & catarrho & bulimo; & hoc maximè, si caricas & mala gestaverint. Illum *Malida* vocant, quod vitium in capite oritur, facitque ut per nares pituita multa ruffaque effluat, quæ si ad pulmonem descenderit, mori feruntur. Ælianus author est Maurusios asinos primum ut se in viam dederunt, incredibiliter incitata celeritate iter conficere, ut evolare non excurrere videantur. Deinde eos citò fessos de via, & pedes & spiritum deficere, ac pedum tarditate ad currendum constrictos insistere, & acerrimas lachrymas profundere. Claudicationis remedium vide apud Aldrovandum.

Natura. Quod ab aqua sibi, ut Plinius, prodidit cavent; ita omnino, ut pedes tingere metuant: quod mirum dictu sitiant, & si immutentur aquæ, ut bibant cogendi exonerandive sint: quod rictu labiisque latè ductis & dentibus deformiter denudatis irridere videantur: quod mingant ubi alii prius minxerunt, aut super finum: quod mensibus multo ex proportionem minus pur-

gentur: quod cum bibunt parcè admodum os mergant, propter aurium sine dubio umbram: quod denique tam exquisiti sint auditus, ut præter solos mures cæteris animalibus eo præstare dicantur, ad *Naturam* eorum pertinet. Singulari *stupiditatis* privilegio damnatos esse, omnes norunt, ita ut hujus vitii homines nomen asinorum meruerint, de quo prolixè Aldrovandus. Doceri tamen posse, aliquot exempla comprobant. Scribit quippe Cardanus ex Leone Africano, asinos ad tibiam saltare, & voce in aurem infusurrata spontè supinos concidere: clausis oculis inflari quasi venenum bibissent, nec minis interim, nec precibus, nec verberibus adduci posse ut surgant: Cæterum blanditiis adulationibusque ac spe potissimum vehendi formosas mulieres proposita, subito alacres exsurgere: ubi verò audierint vehendos esse anus, demissis auribus se claudos simulare. Interrogati etiam an formosæ juvenculæ illis placeant, capite annuere: demum etiam formosissimum in cœtū adstantium, deligere. Similia ferè de circulatoris Johannis à Grua asina, oculatus testis Gesnerus prodit. Asina, inquit, ter primum pro soni diversitate tripudium immutabat: tripudiabat autem anterioribus pedibus erectis summa cum alacritate: mox velut gaudio in maximum converso mœrorem, in terram se prosternebat, ac velut apoplectica immobilis jacebat, & si pedibus calcaretur, ut se moveret, adduci non poterat: dein jussa ut spectatores omnes salutaret, oculos caputque erga omnes humano velut more convertebat, flexisque anterioribus pedibus salutabat: & quod maximè mirum erat, cum adstantium omnium stupore, ad nutum heri, per ligneum circulum trajecto corpore saltabat, ad canis imitationem: postremò more canis sagacis, projectum in terram vel sudarium vel chirothecam colligebat, & domino referebat. Tantus in iisdem foetus sui amor est, ut per ignes etiam ad eos accedant; tantus erga genus suum, ut si viderint mori, animo deficiant: observatumque est, asinam impendio cavere, ne vel in conspectu hominum, vel in luce pariat. Ponderis magnitudini imparem se esse, ostendit, aures demittendo. Fuisse carnis asininæ in *Cibis* usum Galenus testatur: sed & historia Caroli V. ab Hispanis aliquando comestam. Novimus etiam in obsidione Veronæ Anno M. D. XVI. cum vix lentem & fabam in quotidiano usu haberent, in deliciis fuisse. In festo quoque Natalitiorum integer apud Persas assabatur, inter regias epulas censitus. Mæcenæ verò, referente Plinio, primus pullos asinarum epulari instituit, eo tempore onagris prælatos: post eum interuisse auctoritatem saporis. Pessimi esse saporis; & concoctu difficillimas, stomachumque lædere, ii qui vescuntur, testari

Ingenium.

Johannes Leo in de-script. Africæ.

Gesnerus Hist. Quadruped. de Asino.

Vfus in Cibis. Galen. l. 3. de Aliment. facult.

Plin. H. N. l. 8. c. 43.

Ufus in Medicina.

Galen. l. 6. de tuenda sanis.

Plin. H. N. l. 23. c. 5. 28. c. 12.

Plin. H. N. l. 11. c. 41.

Plin. H. N. l. 11. c. 41.

Plin. H. N. l. 28. c. 16.

Hartmann. in Praxi chymiatr.

Plin. H. N. l. 28. c. 16.

poterunt. Medici *Lac*, *Sanguinem*, *Carnem*, *Iecur*, *Renes*, *Lienem*, *penem*, *testes*, *ungulas*, *lichenem*, *urinam*, & *stercus*, in usum traxerunt. *Lac* Galeno tenuissimum; si ad jumentorum quæ apud nos mulgeri solent lac comparetur: crassum, sicum camelino & equino conferas. Nisi ita distinguas, contradicere sibi dicendus est: cum & Plinius tenuissimum lac camelis esse scribat, mox equabus, crassissimum asinæ, ut coaguli vice utantur. Optimum verò erit, si asina sana sit, bene nutrita, juvenis, nec longè à partu. Tabidis, à quibusdam Medicis ita exhibetur, ut ipsimet id exugant, ne quid à nativo tepore remittat. Galenus melle mixtum, juveni cuidam, qui ferè contabuerat, à balneo statim exhibuit. Idem stomachum exulceratum per se potum reficit: & ad tussim, extenuationem & sputum sanguinis commendatur. Si doleant ubera, lactis ejusdem potumulcentur, ut Plinius tradit; si verò addito melle fumatur, purgationes mulierum adjuvat. Capiti tamen infirmo, & vertigine laboranti non convenit. Privatim contra gypsum, & cerussam, & sulphur, & argentum vivum prodest. Gargarizatur quoque faucibus exulceratis utilissimè. Sunt inter exempla, qui lac asinum bibendo, podagrâ, chiragrâve liberati sunt. Alii verò feri asinini potu, eosdem cruciatus evasere. Conferre aliquid & candori in mulierum cute estimatur. Poppæa certè Domitii Neronis conjux, quingentas secum per omnia trahens factas, balnearum etiam folio totum corpus illo lacte macerabat, extendi quoque cutem credens. *Sanguine* fluxum sanguinis ex cerebro sedari, sunt qui dicant. Plinio verò, est genus febrium quod amphemerinum vocant, hoc liberari tradunt, si quis è vena auris asini, tres guttas sanguinis in duabus heminis aquæ hauserit. Eundem post aures captum, Hartmannus in mania vehementer commendat. Linteola munda, nulli usui ante exposita. in eo macerantur & exsiccantur. Ex his portio in haustu aquæ fontanæ maceratur, & aqua ebibitur. Idem de *Carne* Ælianus testatur. Tradit enim Bathylin Cretensem rabie periclitantem, ab hoc gravissimo malo asininae carnis imperato usu, restituisse. Phthisicis easdem merideri Plinius prodidit, hocque genere maxime in Achaja curari id malum: quod & apud Avicennam legitur. Sed & contra comitalem morbum bibendam dari, idem author est. *Iecur* etiam comitalibus esuprodest, sed jejunis edendum præcipitur. Alii admixtâ modicè panace, ori instillandum docent, *Lien* ad lienis vitium tam efficaciter datur, ut triduo sentiat utilitas. Idem contritus, & ex aqua impositus, mamillis lac provocat, si Sexto credimus. Inveteratas vulvas suffitu corrigit, ut Plinio placet. *Renes* triti & in vino mero dati, vesicæ medentur, & uri-

næ incontinentiam prohibent. Cinere *genitalis* spissari capillum putant, inquit Plinius, & à canitie vindicari, si rasus illinatur, plumboque tritis cum oleo. *testis* dexter in vino potus, vel brachio adalligatus, ad coitum stimulat. Uterque contra fascina valet. *Pellis* injecta impavidos infantes facit. Annulus ex *Vngula*, in qua nihil sit nigri, ab epileptico gestatus, prohibet ne concidat. Cinis per dies multos potus eosdem adjuvat, & oleo subactus strumas discutit. Tarentinus illis ad multos pisces capiendos pro esca utitur. *Lichen* combustus, tritus, & ex oleo vetere impositus, tam validus est in producendis capillis, ut si mulieri inde maxillam unxeris, barba ei nascatur. Ex aceto illitus lethargicos excitat. *Vrina* cum suo luto illita, & clavos abolet, & callis medetur, ut Marcellus prodidit. Savorola in narium foetore utilem esse scripsit. Dioscorides nephriticis mederi in potu. Ideò ab ea minimè sibi temperare antiqui. De *Stercore* ita Plinius. Fimum asinini pulli, quod primum edidit à partu, poleam vocant. Syri dant in aceto mulso contra lienis vitium. Idem caliacis & dysentericis confert: in sapa decoctum, colo magnopere prodest: datum fabæ magnitudine è vino, medetur morbo regio intra diem tertium. Eadem & ex equino pullo similiterque vis est. Idem ad sanguinem fluentem adhibetur. Tarentinus in Coriandri succo madefactum, & cum similagine in massas redactum, ad trachuros melanurosque capiendos summo perè commendat. De usu in oneribus ferendis, in mola, & bello ad aratrum &c. taceo. Hoc addi potest, tibias ex ossibus asininis fieri, & argutiores cæteris esse: ex corio cretato palimpsestos, ex pilis pannos apud Arabes; parari. *Differentias* & *Genera* aliquot sortiti sunt. Dantur *Mysii* à Mysiæ regione ita dicti, quibus perraro recta sunt ilia: *Varii*, qualem Turcarum Rex Ferdinandus Regi Neapolitano misisse, Pontanus author est. Miraculofo erat pilo, virgato corpore, diversicoloribus ac paribus lineis. *Parvi*, quales Illyria, Thracia, & Epirus proferunt. *Magni*, quales Antron Thesaliæ urbs producebat. *Veloces*, quales apud Euphratem Xenophon inventos fuisse ait, qui equos cursu faciliè superarent. In Ægypto verò eam esse asinorum tollitiorum tum patientiam tum velocitatem, Scaliger scribit, ut X L. M. passuum diei unius opera expediant absque ulla noxa.

Plin. H. N. l. 10. c. 19.

Plin. H. N. l. 26. c. 16. & 28. c. 15.

Plin. H. N. l. 28. c. 16.

Differentia.

Scalig. Exercit. 117.

CAPUT III.

De Onagro.

ONager, asini sylvestris nomen est. Græci *ὄναγον* dixere, quasi *ὄνον ἀγρον* seu *ἀγριον*.

De-

Onager Wald Esel



Lupus Marinus
Meer Wolff



Capra Sylvestris wild Geiß art



100. 101.

102. 103.



Niceph. H. *Describere* eum videtur Nicephorus Callistus agens de India, cum dicit. Hac eadem regio, & asinos feros, magnitudine ingentes fert, pelle mirificè præter morem versicolore, albo scilicet & nigro colore, admodum inter se varietatis. Et zonæ quædam à summa dorsi spina ad latera & ventrem demissæ, atque ibi divisæ, & conversionibus quibusdam inter se implicatæ, mirificam & novam efficiunt plicaturam & varietatem.

Oppian. Cyneg. l. 3. Oppianus argenteum colorem illi adscribit, quod Gesnerus de cinereo splendido sumit, eodem *ἡερόεντα* pertinere existimat. Quod totus albus non sit exinde patet, quod Oppianus addat, nigram lineam per mediam spinam decurrere, hinc atque hinc niveis pulchrè distinctam corollis. Pelles ipsorum *ὄζαι* dicuntur, teste Suida. *Degunt* in solitudinibus, locis inprimis petrosis & præaltis, in Africa, Lycaonia, Narsinga. In Lycia montem qui Cappadociam ab ea dividit transire negant. Garamantes eos maxime venantur, si Luciano credimus. In Psara Ægæi maris insula, species habetur, quæ aliò translata non vivit. Apud Scythas non haberi quidam volunt. At Strabo apud Mæotidis paludes incolas venationem eorum institui reliquit. *Aluntur* herbis, virentibus, inprimis, in quas si inciderint, præ gaudio rudiunt, nec ab iis, etiam si infidiis se peti viderint, avelluntur. Unde fortè Strozze segnes dicti. Oleribus maxime delectari, miraculum ab Hieronymo in vita Hilarionis ostendit. *Naturam & mores* quod concernit. Isidorus & Bartholomæus Anglicus æquinoctio verno, per singulas noctis & diei horas semel rugire, inde æquinoctium cognosci scribunt: quod potius Cynocephalo competit. Homine conspecto in iisdem stare vestigiis; mox rudentes immotis anterioribus pedibus, posterioribus calcitrare, Scaliger prodidit. Ubitam propè venator accessit, ut manu queat contingere, fugâ se subtrahit.

Plin. H. N. l. 8. c. 44. De eorum zelotypia ita Plinius & Solinus. In hoc genere singuli imperitant gregibus foeminarum. *Æmulos* libidinis suæ metuunt. Inde est quod gravidas suas servant, ut in editis maribus, si quâ facultas fuerit, generandi spem morfu detruncant; quod caventes foeminae, in secessibus partus occulunt, & furto parere gaudent. Sitis impatientes, ex sacris literis colligimus. Nonnulli pro mulorum procreatione, onagros prius manufectos eligunt. Manfuescit hoc animal facillimè, nec; cicuratum, ad pristinam solitudinem redit. Carnem Ongrorum amarâ *Ælianus* voluit; Galenus, bono habitu præditorum ac juvenum, cervinæ & bubulæ propinquam. Scaliger, dum calet, fætere; refrigeratam neque olere neque benè sapere. Plinius verò scribit Mæcenatem pullos asinorum epulari instituisse, multumque eo tempore fuisse onagris prælatos, post eum ta-

men, interiisse auctoritatem saporis. Medici *fella* super abscessuum vestigia utiliter illinunt, admiscuntque emplastris contra ignes sacros, si Avicennæ credimus. *Adeps* cum oleo costino ad lumborum & renum flatulentiam commendatur. *Caro* dorsi cum oleis articulis dolentibus utiliter applicatur. *Vrina*, teste Avicenna, calculum in vesica frangit. *Medulla* inuncta podagras curat, & dolorem extinguit. Fimus cum vitello ovi permixtus fronti illinitur, ut sanguis erumpens sistatur. Idem cum felle bublo inunctus, capillos crispat. Scaliger duo nobis *Genera* describere videtur, dum ait. In monte qui Nar-

Genera.
Scalig. l. c.

CAPUT IV.

De Mulo, & Zebra Indica.

MULI nomen quatuor animalibus commune est. Mula enim non solum ex equa & asino, sed ex asina & equo, itemque onagro & equa, Columella prodente, generatur. Ex asina & tauro Gratianopoli in Gallia, sub nomine Jumar, habentur. Qui ex equo & asina nascuntur, mares, *Hinnulos & hinnos* secundum Plinium antiqui vocabant: contraque mulas, quos asini & equæ generent. Varro tamen ex equa & mulis tales dici putat, si Nonio credimus. Fortè sunt Martialis pumilii. Hinnus enim (verba sunt Varronis) ex equo & asina procreatus, minor est quam mulus corpore, plerumque rubicundior, auribus ut equi, jubam & caudam similem asini habet. Cæterum Muli nomen, ex Græco tractum existimat Isidorus, ex eo scilicet, quod jugo pistorum fabactus, tardas molendo ducat in gyrum molas. Melius vel à *μύλον* labor, vel ab Ebraico Maal, quod prævaricationem significat, deduxeris. Laboriosum quippe est animal: & per quandam ordinis naturæ transgressionem, quod Græcis est *μολώειν*, nascitur. Apud Græcos plurima sortitum est nomina. Dicitur namque *ἡμίονος*, quod ex asino & equa originem ducat. *ἀσπράς*, à robore corporis; *ἀγονομόχθος* à sterilitate; *ἐπερόγονον ζῶον*, quod ex diverso semine nascatur; *θηρής, ζεύγος ἡμιονωνιθής, ὀλκας*, quod tamen mulæ duntaxat competit, ut *ἐρδός* mulo; *αἰδαίρος*, quod *ἐν ὄρει* laborare magis possit, quam cætera jumenta; *ἐρδός* *ἡ δὲ τὸ ὄρειν, ἐρμήπικρον ἔντα, ἢ ἐπεὶ ἔρειν τὸ ζῶον, αἶον ἄγονον.* Ὅτρεα denique *σύν* & *σπρ*, de quibus consulantur Lexicographi. Cum equam habeat matrem, asinum patrem, partim matri, partim etiam patri similis est; magis tamen patri quam matri, cujus quoque

Nomen.

Columella
R. R. lib. 6.
c. 36.

Plin. H. N.
l. 8. c. 44.

Varro R. R.
l. 2. c. 8.

Descriptio

que vocem refert. In Hinnio omnia contra se habent. *Auricula* ipsi asini instar longæ, easdemque procomii loco ad oculos defendendos; ut ait Xenophon, accepit; crux in humeris, *pedes* exigui, & *corpus* macilentum, reliqua sunt equi, nisi quod cervix erecta non sit. *Dentes* triginta sex uterque habet, καὶ τὰς περισφύας, seu agnatos & annexos, ut Ruellius vertit. Mutari eos ex Aristotele notum est. In quorundam corde os inventum esse tradidit Hierocles. *Felle* caret, ut solidipeda omnia. *Locum* si spectes, lædi calidis & obscuris ajunt, & quodammodo amentes reddi: gaudere verò stabulari sub dio, tectique, vel tantum illis sufficere, si caput solummodò operiatur: cætera ab aëre non offendi. Nulli sunt in Arabia Felice, Anglia, Scotia, Polonia, finitimisque regionibus. In Eleo agro ex imprecatione quadam gigni non potuisse, Herodotus prodidit. Carebant illis & Orientales Indi, ut refert Franciscus Lopo. In Scythia nec incipientem quidem hyemem ferre. Insula quædam, Diodoro Siculo, nutrit quidem aliquos, sed eos magna & sonora voce. Abundat eis Themisita, teste Strabone. Capadoces duo millia Persis quotannis solvebant. Persiam, Mesopotamiam, & Babyloniam iisdem refertam, vel exinde patet, quod Alexander M. Susi captis, ad tria millia abduci curaverit, qui & dossuales & jugales essent. *Vescuntur* frugibus & herbâ, potu maximè pinguescunt: ad maciem depellendam nihil Medicâ nobilius: ex frequentiore Hordei usu hinniunt. Vigent à dentium ortu, & ad multos annos vitam producant. Quendam octogesimum annum egisse cum templum Athenis ædificaretur, quidam authores produnt. An steriles sint, disputatur inter authores. Aristoteles ita de Mulo. Mulus mas septennis duntaxat generat, ut ajunt: fœmina improlis omnino est, quia perducere ad finem, quod conceperit, nequeat: sed mas generare interdum potest, quoniam & calidioris naturæ quam fœmina mas est, & nihil corporis per coitum confert ad generationem: quod autem facit, *ginnus* est, quod mulus oblæsus & pumilus est, ut in porcis *metachærum*. Idem de Mula apud Juvenalem invenies. Prodiderunt tamen non dissimulandi Authores M. Varro, & ante eum Dionysius & Mago, mularum fœtus regionibus Africae adeo non prodigiosos haberi, ut tam familiares sint incolis partus earum, quam sint nobis equarum. Causam sterilitatis in libris de Natura explicabimus. *Odorandi* sensu præcellere, atque ejus beneficio derelictos alicubi vel odore solo in semitam redire, proditum à quibusdam. Hinc fit ut facilius vim tabidam aëris concipiant, & peste inficiantur, quod & canibus accidit. De Morbis vide Aldrovandum. *Symphatia* ipsi cum

nantibus avibus, sive hæ anseres sive anates, singularis, eorundemque conspectu sanari dicuntur. Contra Rhododaphnes flores & folia homini saluberrima, venena ipsis sunt. Ipsi verò mulis nescio quid inest muribus exitiale. Si enim muli ungula sinistra domus suffiatur, fugantur. Semper cicures sunt. Fœminas vivaciores esse compertum quàm mares, easdemque ferius senescere. Eadem urinæ profluvio purgantur: mares olfactu urinæ prius senescunt. Volutioni indulgent, ut à lassitudine recreentur. A patre patientiam laboris, à matre celeritatem accipere. Ab illo & audaciam mutuârunt. Scio, inquit Varro, mulorum gregem dum pasceretur, eoque venisset lupus, ultro mulos circumfluxisse, & ungulis cædendo occidisse. Expavescunt tamen rerum insolitarum visu, & quidem ita ut in discrimen adferant. Calcitrant contumacissimè. Visus qui uno domino excepto, cæteros non admitteret. Pertinaciæ sunt infamis. Vidi, cum Romam Neapoli tenderem, quæ nulla ratione ut præiret cogi poterat. Ab aliis destituta, procubuit, nec quidem sine nostrum omnium risu, & insidentis sacerdotis indignatione De astutia exemplum apud Plutarchum in mulo 1 haletis habes: de beneficii memoria apud Plinium. Mulum, inquit, octuaginta annis vixisse, Atheniensium monumentis apparet: Eo gavisi cum templum in arce facerent, quod derelictus senecta, cadentia jumenta comitatu nifuque exhortaretur, decretum fecere, quo caveretur, ne frumentarii negotiatores ab incerniculis eum arcerent. Non calcitrare cum vinum biberint, quidam scripserunt. De veritate rei alibi agemus. Magnæ sunt contra venena efficaciæ. Infusus recenter occisi ventri, qui veneno infectus est, evadit, si tam diu manserit, donec calor animantis omnino evanuerit. Eò tutius evasurum, si pluribus usus fuerit, fuisseque Principes qui triginta & quadraginta impendio, mortem censerint, Maranta author est. Pulverem in quo semula volutaverit, corpori inspersam ardorem amoris mitigare à quibusdam apud Plinium proditum. Cor, testes, renes, caro, sordes aurium, sterilitatem inferre dicuntur. Cogunt concipere invitas, inquit Plinius, setæ ex cauda mulæ, si junctis evellantur inter se colligatæ in coitu. Stercus combustum, rufum, ac cribratum, vino dilutum, in fluxu uterino Hippocrates bibere jubet. Genera quod attinet, duplex genus Aristoteli fuit notum. *Sterile* nempe, de quo jam egimus, & *fœcundum*, de quo ipse ita. Sunt in Syria quos mulos appellant, genus diversum ab eo quod coitu equæ & asini procreatur, sed simile facie: quomodo asini sylvestres, similitudine quadam nomen urbanorum acceperunt. Et quidem, ut asini ipsi feri, sic muli præstant celeritate.

Locus.

Strabo
Geogr. l. 11.
& 12.

Cibus.

Generatio.

Aristot. l. 2.
de Generat.
c. ult.

Varro l. c.

Odoratus.

Sympathia
& Antipathia.Varro R. R.
l. 2. c. 8.Plutarch.
l. Utr. animal.
Plin. H. N.
l. 8. c. 44.
Aristot. H.
A. l. 6. c. 24.

vjs.

Plin. H. N.
l. 8. c. 45.Genera.
Aristot. H.
A. l. 6. c. 35.

Pro-

Zebra Indica
Indianisch Maulthier



Equus Indicus
Indianisch Pferd



Equus Hirsutus
Rauh Pferd





Elephas

Elephant





Elephas

Elephant





Elephas

Elephant



Procreant ejusmodi mulæ suo in genere, cujus rei argumento illæ sunt, quæ tempore Pharnacis patris Pharnabazis in terram Phrygiam venerunt, quæ adhuc extant: tres tamen ex novem, quot numero olim fuisse ajunt, servantur hoc tempore. Theophrastus vulgò parere in Cappadocia tradit, sed esse id animal ibi sui generis. Mulo per omnia similis est *Zebra*, nisi quod fecunda sit. Fimbriatis autem lineatisque pilis miro aspectu videri. Etenim à dorli spina ad ventrem usque, pictas habet lineas triplici colore, nigras nempe, candidas, ac fulvas, justâ proportionem dispositis fimbriis, ac tres ferè digitos latis. Sylvestris est gregalis, & pernici cursu incluta: possitque, cicurata, in equi locum succedere. Mulam fecundam Aristotelis quidam esse opinantur. Ita de ea Pigafeta. Nascitur quoque in hoc tractu, (Congo) ut & in aliis Barbariæ & Africæ locis, animal aliud *Zebra* dictum: quod cum mulæ quoad formam & staturam sit simile; mula tamen, (parit enim) non est, & colore non tantum à mula, sed etiam ab omnibus aliis animalibus differt. Tribus enim diversis coloribus, nigro, albo & spadiceo, qui per lineas tres digitos latas, corpus à dorso versus ventrem hemicycli in modum ambiunt, per totum corpus distinctum est, caudâ colore rubicundo & lucente. Pes & ungulæ ut mulæ, incessu alioqui levi & alacri similes equi, quem rursus velocitate multum superat, ita ut Lusitanorum proverbio ansam præbuerit, qui, cum celerem aliquem dicere volunt, *Zebra* velociorem dicunt. Parit quotannis, unde & maxima habetur copia; sed incolis, qui eâ uti nesciunt, est inutilis: equorum enim loco ipsis tam pace quam bello esse possent, naturâ eas equorum loco, quibus hoc regnum destituitur, subministrante. Incolæ verò ignari, cum equos non habeant, & boves jugo subdere nesciant, zebras insuper domare & frænare non valeant, variisque aliis animalibus uti non possint, hominum ad hæc omnia operâ uti coguntur. Atque ita ut omnia hominum superimponuntur humeris, ita quoque ipsi ab hominibus vel in lecticis, aut sedibus portatilibus à Sole coopertis circumferuntur; ad manus semper fervos aut alios ad id conductos habentes. Et si magnum aliquod iter brevi tempore est absolvendum multos tales quasi *ἀνθρώπων πόδες* circumducunt, ut prioribus defessis, alii atque deinceps alii possint substitui; qui etiam ita alternatim subinde mutati, tantæ sunt celeritatis ut equos currentes antevertant. Tantum Pigafeta.

CAPUT V.

De Elephanto.

Datur & Elephanti inter *μονόχηλα* locustæ. Et si enim ungula ejus in digitos vi-

deatur efformari, quia tamen indivisi hi, nescio quomodo à solidipedibus excludi possit. *Nomen* sortitus est, non tam à magnitudine, quòd formam montis præferat, ut Isidoro apud Vincentium Bellunensem placet: quam vel ab Ebræo Alaph discere, quòd docilitate reliqua animalia superet: vel ab Eleph bos, quia magnum est animal, & *βέ* augendi vocabulum: vel quasi *ἐλέφας*, ab *ἐλας* palus, & *βαίνω*, quòd ob gravitatem ibi faciat *πῆς μίξεις*: vel ab *ἐλεφαιρω* lædo: vel ab *ἐλίσσω* involvo, quod involutam habeat proboscidem: vel denique ab *ἐλφός*, albus, quod ebur de colore triumphet. Hesychio & Varrino *περσας* dicitur. Alii simpliciter *θηρία*, quod Plinio belluæ, vocant. Romani, qui elephantem primum Pyrrhi Regis bello videre, Lucas boves, appellarunt; seu à Lucania, ubi primò visi; seu à luce, quòd longè propter inauratos regios clypeos, quibus eorum turres erant ornatae, à longe relucere. Indis *Barrum*, à voce dici, Isidorus author est: alii tamen linguâ Sabina ita appellari volunt: unde & Ebur vocatum Servius putat. Magnitudo Elephantis diversa est, ut in Differentiis exponemus. Gillius mensus est Constantinopoli quendam, cui erant ab oculo ad extremum tergum pedes undecim, ab oculo ad extremam promuscidem octo. In proceritate alii ad duodecimum, alii ad decimum tertium, alii ad decimum quintum dodrantem, accedunt. Aloysius Cadamustus vidisse se scribit, plus habentem carnis, quàm tauri nostrates quinque. Nigri sunt omnes præter Æthiopicos: Narsingæ tamen Regem album habuisse, Indicarum navigationum scriptores prodidere. *Cutem* habent cancellatam, seu ut Cassiodorus loquitur, ulcerosis vallibus exaratam: in tantamque duritiem solidatur, ut putes esse osseam. Ideo Mauri eadem pro clypeo utuntur, & Peguani loco armorum gestant. Durior tamen in dorso quàm in ventre, ut Solinus verè dicat. Durissimum dorso tergus, ventres molles. Pilosane sit an glabra, nec Plinio quidem constat. Alibi enim, setarum nullum tegumentum, ne in cauda quidem præsidium abigendo tadio muscarum, esse dicit: alibi verò elephantorum corpora impenetrabiles setas habere (nisi fortè cetras sit legendum) scribit. Cardanus quoque non solum nudam ait, sed & cur talis esse debuit rationem reddit. At Cadamustus sese pilos qui nigricabant, & quasi duorum palmorum mensuram excedebant, evulsisse testatur. Gillius quoque author est, ad duorum palmorum magnitudinem accessisse. Vartomannus denique, caudam habere similem bubulis, trium fortè dodrantum longitudine, paucis in extremitate pilis prodit & invenitur in descriptione Guineæ istiusmodi caudis muscas ab idolis mulieres arcere.

C

Ipse

Aldrovand.
Hist. Quadrup. l. 1.
c. 8.

Purchas.
Navig. l. 7.
c. 13. f. 7.

Pigafeta in
descript.
reg. Congo.
80.

Martin. in
Lexico.

Descriptio.

Plin. H. N.
l. 8, c. 9.

Plin. H. N.
l. 11, c. 39.

Aldrovand.
di Hist.
Quadrup.
l. 4, c. 9.

Ipse denique Plinius, quasi sui oblitus, sic scribit. Indi mirè gaudent longitudine eorum, (smragdorum) solosque gemmarum esse prædicant, qui carere auro malint; ob id, perforatos elephantorum setis religant.

Plin. H. N.
l. 35. c. 5.

Caput quoque deforme habent: secundum tempora spiramentum quoddam, per quod mas pingue quoddam tempore congressus emittit, idque & foeminae tum patens, si Straboni credimus. *Aures* pro corporis ratione, secundum Oppianum, exiguae sunt; quaque versum gemini palmi magnitudine, subque illis locus, cui scalpro ictu mallei adacto interficiuntur. Livius Hasdrubalis inventum esse credidit. Apud Sambros Æthiopiae populos, auribus carere ex Solino & Plinio habemus. *Oculi* quoque magni, sed pro tanti corporis magnitudine exigui apparent; illique graviter se moventes. *Os* in pectore, ut Cadamustus prodidit; atque hoc, non proboscide fugunt, teste Æliano &

Strabo Geogr. l. 15.
Oppian.
Cyneg. l. 2.
v. 519.

Solin. Polyhist. c. 43.
Plin. H. N.
l. 6. c. 30.

Aristot. H.
A. l. 2. c. 6.

Aristot. H.
A. l. 2. c. 5.

Aristotele; qui & *linguam* eis esse scribit perquam exiguam, atque interius positam, quam sitin cæteris, ita ut vix eam videre possis. *Dentes* ipsis intus ad mandendum quatuor: præterque eos qui prominent, masculis reflexi, foeminis recti atque proni. Quam primum nascuntur, habent: sed grandes illos, non tam perspicuos. His cibos conficiunt, atque in farinae speciem molunt. Siti sunt in superiore mandibula, & quidem stupenda aliquando magnitudine. Vidit Vartomanus in Sumatra duos, qui appensi, libras trecentas & triginta sex pendebant. Vidit & Cadamustus occisum, cuius dentium amplitudo palmos ternos excedebat, eminebant ad duos palmos. De eorundem magnitudine ita Plinius. Magnitudo dentium videtur quidem in templis præcipua. Sed tamen in extremis Africae, qua confinis Æthiopiae est, postum vicem in domiciliis præbere, sepèsque in iis & pecorum stabulis pro palis, elephantorum dentibus fieri Polybius tradit, autore Gulussa regulo. Gillius sæpe ad longitudinem decem pedum augescere, memorat. Venetus verò mercator, unum aureis triginta sex emisit dicitur, longitudine dodrantum ipsius quatuordecem, crassitudine dodrantum quatuor; tanto pondere, ut humo tollere non potuerit. Sed & Sabellicum authorem habemus, fuisse Firmo, duos elephantinos dentes, tam enormi magnitudine, ut Aurelianus Firmi victor, eos pro miraculo Romam deportandos curaret, longitudinem horum duorum pedum fuisse dicunt. Dentes hos alii cornua dicunt; an rectè, Aldrovandus & Cardanus explicant, nos alibi dicemus; hoc duntaxat hic addere placet, mandibulam inferiorem, edendo solum moveri, superiorem semper quiescere. Quo loco alius animantibus nasus est,

Plin. H. N.
l. 8. c. 10.

Aristot. H.
A. l. 1. c. 11.

elephantem, angustam ac longam, adeò ut ad terram pertingat, in fine perforatam, cortilem, flexilem, lubricam, volubilem, serpentis in morem. Latinis dicitur *Proboscis*, *tuba*, *manus*, quod apud Plinium & Ciceronem invenies, manus nasuta, quod apud Cassiodorum, promuscis, quod apud Vitruvium. Græci vocant *περσοειδα*, *μυλῆρα*, *μυκασμὸν*, & *προνομαιαν*. Is ipsius usus quæ manus. Eâ namque cibos tam siccos quam humidos colligunt, capiunt & ad os admovent. Eadem spirant, bibunt, odorantur. Lucretius ideò *Angvimanos* vocavit. *Malleolos* posterioribus imis cruribus, teste Aristotele, possident: sed de *Crurum* flexu aliter alii tradunt. Alii enim crura sine nodis articulisque habere, ossa solida & inarticulata, ideò crura tibiasque flectere non posse, & si cadant, nec surgere, scribunt: alii, ut Plinius, in posterioribus articulos breves obtinuisse, & poplites intus hominis modo flectere, prodidere, quod & experientia docuit. *Pedes* ejusdem cum equinis sunt rotunditatis, sed ampliores, ut planta, quoque versum ad binos dodrantes accedat. Vartomannus rotunditatem orbi mensario assimilat. Ex callo nigerrimo & amplissimo constant. Digni in pedibus informes, numero quidem quinque, sed indivisi, ac leviter discreti, ungulisque non unguibus similes. *Mammæ* habent sub armis duas; nec in pectore, sed citra in alis occultas. *Genitale* equo simile, sed parvum, nec pro corporis magnitudine. Plinius averfa dicit, averfosque coire, foeminae inter femora. *Testes* non foris conspicui, sed intus circa renes conditi, quo circa initum celerius agunt. Ctesias nugatur, semen adeò indurari siccescens, ut electro simile efficiatur. *Ventres* ipsis quatuor Plinius tradit: Aristoteles verò ita sinuofum intestinum, ut quatuor ventres habere videatur; inque hoc etiam cibum reperiri. Galenus idem latissimum & equo simillimum facit; exta suillis proxima. *Iecur* quadruplo majus est bubulo, & reliqua pari ratione excepto liene: hic enim ex proportionem minor. *Pulmonem* Plinius bubulo quadruplo majorem facit. *Fel* in jecore adesse negat Aristoteles: incisa tamen parte, qua adhærere solet, humorem felleum plus minus effluere. Galenus etiam *χολήδοχον* vesiculam habere affirmat. Idem ex dissectione magnum os exemit; illud verò duos tantum ventriculos, non tres ut apud Aristotelem, habere observavit. De eodem ita Ælianus. Duplici tum corde tum sensu animi elephantus esse dicitur, & altero quidem ira incendi, altero mitigari & leniri, Maurorum sermonibus pervagatum. Duorum descriptionem apud Aldrovandum vide. Inveniuntur, in Africa, Asia, & vicinis huiusce insulis. Et in Africa quidem in saltu post Syrtis, solitudinibus Salæ Mauritaniae oppido vicinis,

dentem, angustam ac longam, adeò ut ad terram pertingat, in fine perforatam, cortilem, flexilem, lubricam, volubilem, serpentis in morem. Latinis dicitur *Proboscis*, *tuba*, *manus*, quod apud Plinium & Ciceronem invenies, manus nasuta, quod apud Cassiodorum, promuscis, quod apud Vitruvium. Græci vocant *περσοειδα*, *μυλῆρα*, *μυκασμὸν*, & *προνομαιαν*. Is ipsius usus quæ manus. Eâ namque cibos tam siccos quam humidos colligunt, capiunt & ad os admovent. Eadem spirant, bibunt, odorantur. Lucretius ideò *Angvimanos* vocavit. *Malleolos* posterioribus imis cruribus, teste Aristotele, possident: sed de *Crurum* flexu aliter alii tradunt. Alii enim crura sine nodis articulisque habere, ossa solida & inarticulata, ideò crura tibiasque flectere non posse, & si cadant, nec surgere, scribunt: alii, ut Plinius, in posterioribus articulos breves obtinuisse, & poplites intus hominis modo flectere, prodidere, quod & experientia docuit. *Pedes* ejusdem cum equinis sunt rotunditatis, sed ampliores, ut planta, quoque versum ad binos dodrantes accedat. Vartomannus rotunditatem orbi mensario assimilat. Ex callo nigerrimo & amplissimo constant. Digni in pedibus informes, numero quidem quinque, sed indivisi, ac leviter discreti, ungulisque non unguibus similes. *Mammæ* habent sub armis duas; nec in pectore, sed citra in alis occultas. *Genitale* equo simile, sed parvum, nec pro corporis magnitudine. Plinius averfa dicit, averfosque coire, foeminae inter femora. *Testes* non foris conspicui, sed intus circa renes conditi, quo circa initum celerius agunt. Ctesias nugatur, semen adeò indurari siccescens, ut electro simile efficiatur. *Ventres* ipsis quatuor Plinius tradit: Aristoteles verò ita sinuofum intestinum, ut quatuor ventres habere videatur; inque hoc etiam cibum reperiri. Galenus idem latissimum & equo simillimum facit; exta suillis proxima. *Iecur* quadruplo majus est bubulo, & reliqua pari ratione excepto liene: hic enim ex proportionem minor. *Pulmonem* Plinius bubulo quadruplo majorem facit. *Fel* in jecore adesse negat Aristoteles: incisa tamen parte, qua adhærere solet, humorem felleum plus minus effluere. Galenus etiam *χολήδοχον* vesiculam habere affirmat. Idem ex dissectione magnum os exemit; illud verò duos tantum ventriculos, non tres ut apud Aristotelem, habere observavit. De eodem ita Ælianus. Duplici tum corde tum sensu animi elephantus esse dicitur, & altero quidem ira incendi, altero mitigari & leniri, Maurorum sermonibus pervagatum. Duorum descriptionem apud Aldrovandum vide. Inveniuntur, in Africa, Asia, & vicinis huiusce insulis. Et in Africa quidem in saltu post Syrtis, solitudinibus Salæ Mauritaniae oppido vicinis,

Cicero l. 2.
de Nat.
Deor.
Cassiodor.
l. 10. Varr.
riorum.

Aristot. H.
A. l. 2. c. 1.

Plin. H. N.
l. 8. à c. 1.
ad 12.

Plin. H. N.
l. 8. c. 46.
Aristot. l. c.

Plin. H. N.
l. 11. c. 37.
Aristot. H.
A. l. 2. c. 17.

Ælian. H.
A. l. 4. c. 31.

Locus.

vicinis, Lybia, Getulia, proximis Atlanti monti saltibus &c. Symbari inter Arabiæ montes & Nilum, ipsorum venatibus vivunt. Sunt & in Æthiopia Ophiophagorum eorundem venatus à Ptolomæo Philadelpho Ægyptiorum Rege instituti. Quantum ad Asiam, Rex Parthalis, prodente Plinio, DCC. aluit, Audatæ mille, Palibrotorum IX. M. Chrysæi, Parafangæ, Afangæ, CCC. armabant. In Taprobana, Onesicrito Alexandri M. præfecto prodente, majores & bellicosiores quàm in India habebantur. In Zeilana hodie maximos & summi ingenii esse, Johannes Metellus prodidit. Siamensis Rex XII. M. habere dicitur, è quibus quatuor millia semper ad subitos casus armata sunt. Sub imperio magni Mogul L. M. habentur. In Mosambique quoque insula, armenta eorum offendit Vartomannus, & in Benomotapa Johannes de Baros. At insulam quoque Zanzibar multos mercatores eboris emendi causa venisse M. Paulus Venetus prodidit. Roscidis autem & palustribus locis maximè delectantur, amnesque amant, in calidioribus inprimis regionibus. Frigoris sunt impatientissimi. *Victum* Elephantorum quod spectat, vescuntur herbis palustribus, arborum foliis, truncis, fructibus Musæ, & ficus Indicæ radicibus. Devorant aliquando & terram & lapides. Eam tamen edisse, iis tabificum est, inquit Plinius, nisi prius mandant. Cicures hordeo vescuntur, ejusdemque novem interdum Macedonicos modios absumunt. Antuerpiæ ostentatus, quatuor modios pomorum in diem absumsit. Lusitani melonibus vehementer delectari scribunt. Potus ipsis aqua, sed nonnisi turbida, vinum ex oryza & aliis frumentis factitium, nec non nostras. Antuerpiensis ille, unâ vice plures quàm sedecem libras bibebat, idque toties iterabat, ut mensuram potus ab Aristotele proditam, facile æquaturus videretur. Sitis tamen sunt patientissimi, & sine potione octo dies peragunt. De *Coitus* tempore & modo diversa ab authoribus produntur. Plinius marem coire quinquennem, decennem foeminam, ex Aristotele prodit. Aristoteles modo vigesimum annum utrique assignat, modo foeminæ duodecimum; cum celerrimè, decimum quintum, cum lentissimè congregiuntur. Aversè coire apud Solinum ex Plinio invenies, cui & Horatius de Canida succinit: foeminam in coitu sedere; marem supervenire Albertus M. seu ut Aristoteles, clunibus submissis insistere pedibus ac inniti, marem supervenientem comprimere. In aqua autem præcipuè iniri desiderant: indeque tam foeminæ quàm mari commoditas accedere creditur, quoniam is & coiturus per aquam facilius tollitur, & post congressum facilius descendit. Nunquam autem nisi in abdito coeunt, & mas-

coitum triennio interposito repetit, eandem præterea nunquam patitur. Biennio coire quinis, nec amplius in anno diebus Solinus ex Plinio scribit: nec prius ad gregarium numerum reverti, quàm vivis aquis abluantur. Tempore verò coitus, maximè efferantur, & stabula Indorum sternunt. Quamdiu uterum gerunt, in dubio quoque. Alii annum & sex menses, alii triennium, quidam decennium statuunt. Aristoteles biennium assignat; Strabo menses ut minimum sexdecem, ut plurimum octodecem, cui Diodorus Sículus & Ælianus accedunt. Sunt qui octavo à coitu anno parere pronunciant. Pariunt enitentes posterioribus cruribus & subsidentes cum dolore. Partus annotante Æliano, in caput procedit in lucem. Unicum edere, apud Aristotelem & Diodorum Siculum legimus: quaternos uno partu, apud Cadamustum & Scaligerum. Magnitudo fætus instar porci integræ ætatis secundum Ælianium, vituli trimestris secundum Plinium. Statim ac natus est, cernit & ambulat, & ore fugit, non promiscide. Lactant usque ad annum octavum. *Inimicitias* gerunt cum *Rhinocerate*, *Antipathia*, *Leonibus*, *Tigridibus*, *arietibus*, *porcis*, *serpentibus* & *Draconibus*, quibusdam coloribus & igne. De *Rhinocerate* ita Plinius. In ludis Pompeii Magni visus est Rhinoceros. Alter hic genitus hostis elephanto, cornu ad saxa limato, præparat se pugnae, in dimicatione alvum maximè petens, quam scit esse molliorem. Longitudo ei par, crura longè breviora. Apud Hesperios Æthiopas leones elephantorum pullos aggrediuntur, quos cum vulneraverint, matribus supervenientibus fugiunt. Tigridem in caput Elephanti insilire, facileque eundem suffocare, Arrianus author est. Si feritatem effertur, ad arietis conspectum statim mansuescit. Grunnitum porci exhorre apud Ælianium, Strabonem, & Senecam invenies. De Draconum & Elephantorum pugna ita Plinius. India fert elephantes, belantesque cum eis perpetua discordia dracones tantæ magnitudinis, ut & ipsos circumflexu facili ambient, nexuque nodi præstringant. Commoritur ea dimicatio: victusque corruens complexum elidit pondere. Mira animalium pro se cuique præcipua solertia est, ut iis (draconibus) una scandendi in tantum altitudinem difficultas. Draco itaque ad pabula speculatus, excelsa se arbore injicit. Scit ille imparem sibi luctatum contra nexus: itaque arborum aut rupium attritum quærit. Cavent hoc Dracones, ob idque gressus alligant cauda. Resolvunt illi nodos manu. At hi in ipsa nare caput condunt, pariterque spiritus præcludunt, & mollissimas lancinant partes. Idem obvii deprehensi erigunt se in adversos,

*Ætas.**Philostr.*
l. 2. c. 6.*Morbi.**Natura &
Ingenium.**Polyb.*
Hist. l. 5.
Livius Hist.
l. 21.

oculosque maximè petunt. Ita fit, ut plarumque cæci ac fame ac mœroris tabe confecti reperiantur. Inter colores puniceum inprimis & candidum refugiunt, cujus causa alibi explicabitur. Terræ igne, Elephantorum Hannibalis exemplo docuit Livius, qui per ignem in Capuana obsidione exacti sunt. In tantum autem consternantur, ut nulla ratione, ut gradum rovovent, adduci possint. De *Ætate* haud eadem traduntur. Alii enim ducentos, alii trecentos, quidam centum & viginti annos vivere ajunt. Oneficitus apud Strabonem ad trecentimum annum vivere, raros ad quingentesimum prodiit: circiter ducentimum robustissimos esse. Philostratus quendam ex illis qui contra Alexandrum M. pugnaverant, quinquaginta supra trecentos post Alexandrum annos superfuisset tradit, ut de Elephanto Jubæ, Ptolomæi Philadelphi, & Seleuci Nicanoris taceam. A sexagesimo juventam incipere, apud Plinium ex Aristotele habemus: ex quantitate dentium ætatem futuram cognosci, apud Cadamustum. Frigoris impatientes sunt: maximum hoc malum, inflationemque & profluvium alvi, nec alia morborum genera sentiunt. Huic potionem aquæ calidæ, & cibo fani melle imbuti succurritur. *Ælianus* tamen oculorum affectionum quarundam mentionem facit. Vulnere captorum primò aquâ tepidâ eluuntur: mox, si luculenter sunt alta, butyro inunguntur, postea, suillæ carnis recentis & sanguine madentis admotu, inflammatio lenitur. Quotannis etiam in furorem agi reperio, tuncque nulli obvio parcere. Indicium instantis, oleosa materia, quæ ex illorum auribus effluit. Medela ab objurgatione. Rationibus rectores demonstrant, vilis & degeneris esse animi, ob amorem ita in furias agi. Catarrho laborare, eumque in lapidem aliquando abivisse, cujus & iconem exhibemus, proditum. Gradatim ambulans, propter corporis gravitatem. Neminem tamen ajunt tantæ esse pernicitatis, quem suo incessu non comprehendat. Poplites intus flectit, hominis modo, ut Plinius loquitur. Et quia articulos crurum non tam sublimes habet, ut aliæ animantes, sed humiliores terram versus, ideo insidendi insuetis, nativæ commovet. Quod tamen de provectioribus intelligi debet. Siquidem, Vartomanno & Gyllio attestantibus, ex adolescentium molli gradu, sessor tantopere delectatur, ac si mula gradaria veheretur. *Naturam & ingenium* singulare multa testantur, ut non mirum dixisse Plinium, omnium quadrupedum subtilitatem animi præcipuam perhiberi illis. Ab aquis sibi metuerè superius diximus. Ideo difficulter ab Hannibale, Polybio & Livio testibus, perducti sunt: & apud Plinium, Puteolis aversis vestigiis, earundem metu, è navi abivisse,

legimus. Attamen L. Cælius Metellus junctis doliis per mare Siculum eos transmisit, cum naves deessent: & aliquando interdum flumina transmittunt. Fœmina mare multò est robustior, easque in hoc genere planè viriles, Vartomannus testatur. Aristoteles tamen timidiore assayerat. Fagos, oleastros, & palmas dentibus subvertere Oppianus author est: ædificia evertere Aristoteles. Ab uno arboris truncum prostratum tantæ vastitatis, ut vix à viginti quatuor movere potuerit, Vartomannus prodidit, & addit, à tribus maximam Liburnicam in siccum pertractam. *Pugnant* inter se vehementer, ut tradit Aristoteles, & alter alterum dente ferit. Victus vocem fugit victoris, terram ac verbenas porrigens. Herbam victori à victo porrigi, vel proverbio constat, quod tamen vix cum Vossio concessero. *Injuriam* ulcisci apud Acostram habes. Nucis putamine à milite in fronte quidam petitus, servatum, in eundem in platea deambulanti, aliquot post diebus conjecit. Singulari & rectores amore prosequuntur, injuriarum quoque ipsis illatarum memores, ut optimè Seneca scripsit, Elephantorum feritatem usque in servile obsequium demereri cibum. Sanè à quibusdam aurigas suos, qui in certamine ceciderant, ex prælio, exemptos, alios ab aliis servatos, Strabo author est. Cassiodorus verò scribit, cum magistri compendia sua putet alimentum, motu corporis à diversis postulare, quod ei porrigat. Quod si, inquit, aliquis præbere contemserit postulata, vesicæ collectaculo patefacto, tantam dicitur alluvionem egerere, ut in ejus penatibus quidam fluvius videatur intrasse, contemptum vindicans de favore. Quidam Cochini, militem magistro suo de via cedere renuentem, aliquoties flumine misit, si Christophoro Acostræ credimus. Plutarchus denique refert, Poro Indorum Rege vulneribus confecto, elephantum sensim ac leniter multa spicula promuscide retraxisse, & ipsum jam malè affectum, non prius tamen procubuisse, quàm sentiret Regem ex sanguinem delabitum demum, ne corrueret, paulatim se demisisse, ut Rex commodius se ad solum inclinare posset. *Timere* naturaliter hominem, Plinius scripsit. Elephas, inquit, vestigio hominis animadverso priusquam hominem intremiscere insidiarum metu, sustinere ac olfactu circumspicere, iras proflare, nec calcare, sed erutum proximo tradere, illum sequenti, nuncio simili usque ad extremum, & tunc agmen circumagi & reverti, aciemque dirigi. Adeo omnium odori durare visus illud majore ex parte, ne nudorum quidem pedum. *Amicos* homini Cicero innuit, dum dicit, opinionem ejusmodi esse, quandam illi bellæ cum genere humano societatem. Innuit & Philostratus, dum scribit,

Oppian.
Ixeur. l. 2.
v. 513.*Vartomann.*
l. 4. c. 10.*Strabo Geog.*
l. 15.
Cassiodorus.
l. 10. V.
rior.*Plutarch.*
de solert.
animal.*Plin. H. N.*
l. 8. c. 10.*Cicero l. 3.*
de Nat.
Deor.
Philostratus.
de vita Apollonii
ubi

ubi semel ad hominem adfuecit, ab eo omnia pati, ex eoque morum similitudinem in se transferre, neque aliter quam parvos canes, ex hominis manu gaudere cibum sumere, atque ad se accedentem promuscide complecti, eumque caput intra fauces immittere faciliè tam diu pati, quoad homini libitum fuerit. Quæ de cuiusdam elephantis erga infantem amore produntur, apud Athenæum & Ælianum vide. Traditur quoque unus amasse quandam in Ægypto corollas vendentem; ac ne quis vulgariter electam putet, mirè tum gratam Aristophani celeberrimo in arte Grammatica. *Docilitatis*, esse singularis multa sunt argumento.

Plin. H. N.

Plin. H. N.
l. 8. c. 3.Seneca
Epist. 86.
Sueton. in
Nerone &
Galba.
Plutarch. l.
de solertia
Animal.

Plinius enim per auras arma jacere non auferentibus ventis, inter se gladiatorios congressus edere, aut lasciviente pyrrhiche colludere, scribit. Ubi, ut idem ait, mirum maximè, adversis quidem funibus subire; sed regredi magis utique pronis. Sic se rem habere, præter Plinium, Seneca & Suetonius, ne de Xiphilino dicam, innuunt. Romæ quidam gyros facere explicatu difficiles doctus, increpatus, noctu sua sponte se ad lunam exercere deprehensus est. Ille quem Emanuel Lusitanæ Rex Leoni X. Pontifici dono miserat, eundem de fenestra prospectantem ter genibus flexis, & demisso corporis habitu, venerabundus salutavit, Oforio prodente. Augerius similiter Busbequius in epistolis Turcicis scribit, visum sibi elephantum juvenem, qui ad cantum tripudiantium more alternos moveret pedes. Eundem & pilâ luisse quam palmæ vice feriret proboscide. Linguas, intelligere Zeilanenses, apud Metellum habemus; quendam literarum ductus Græcarum didicisse, solitumque perscribere ejus linguæ verbis. Ipse ego hæc scripsi, & spolia Celtica dicavi, apud Plinium. Humano more convivatos aliquando apud Ælianum invenies: neque ex iis visus est quispiam vorax, neque majoris partis capax. Cum esset bibendum, unicuique crater exhibebatur, & hi quidem promuscidibus portionem haurientes, moderatè bibebant: deinde circumstantes leviter & festivè adspergebant. Mimi magistrive officium exhibere, & aliis salientibus choreasque ducentibus præcinere, Arrianus se vidisse jactat. Inter cætera solertiæ documenta, est & hoc, quod cum profundas & superatu difficiles fossas transeunt, major stans medius tanquam pons omnes transmittit: alii ingerentes fossæ farmenta, eundem servant. Sed & pabuli confueti quantitatem agnoscere, Plutarchus prodidit, permiscamque eidem farinam artificiosissimè secernere posse Ælianus. At quod Acoſta de quodam lebetem utrum pertusus esset, aquæ hausta probante, scribit, stupendum est. Solem & Lunam novam venerari; homini erranti viam monstrare;

Acoſta
Hist. Arom.
c. 7.Ælian. H.
A. l. 8. c. 17.

humana adulteria & homicidia observare, ac deregere; sed & patrium intelligere sermonem, loqui, vel scribere, inter fabulosa repono. De *Uſu* elephantum, in bello, spectaculis, triumphis, & aliis, alibi dicitur. In *Cibis* fuisse quibusdam certum. Unde & Elephantophagorum nomen, qui circa Drabam, in montibus Afachæis, & contra Merœn habitabant. Adiabaras, seu Magabaras authores vocant. Quin & Plinius, Trogodytas solo elephantorum venatu ali tradit. Caro ponderosa, frigida & abominabilis Rhafi. Ælianus præter promuscidem, labrum, & cornuum medullam, nihil esculentum in iis esse ait. Æthiopes, teste Gyllio, posteriores partes appetunt. Renes tamen maximè in deliciis, & regum epulis, si Vartomannus vera prodidit. *Medicinam* quod spectat, Ælianus adipem contra omnia genera ferarum remedio esse, reliquit, eoque inunctum, etiam nudum inter ferocissimas illæsum versari posse fabulatur. Proboscide tactu, capitis dolor levatur; efficacius, si & sternutat. Dextra ejusdem pars, cum Lemnia rubrica adalligata, impetus libidinum stimulat. Jecur, comitialibus morbis prodest. Fimo, si illinatur, pediculi fugantur. *Eboris*, cuius nomine Plinius illam præcipuè partem dignatur, quæ circa os est, quodque alibi elephantis, & dentis indici appellationem sortitum est, singularis est & natura & usus. Gaudet humido & siccitate offenditur, cariemque sentit. Emolliri posse Democritus ostendit; emolliturque potionis genere, quod zythum vocatur, ut apud Plutarchum extat. Emollitum, conformatur, & in varia tornatur. Parabantur quippe ex eo mensæ, lecti, capuli cultroꝝ, enses, vagina, pharetræ, sceptræ, sella curules, portæ, & alia, de quibus Aldrovandum consule. Politur ut ligna, ac potissimum squatina, ut testatur Plinius: nitor verò, hebetatur mensibus muliebribus. Vis ipsi adstringens, quæ tamen gustu non percipitur. Conceptum juvare, & ventriculo humido prodesse, Practici prodiderunt. Ramentis cum melle illitis, nubecula in facie tolluntur. Scobe, paronychia sanantur. Contra lumbricos cum cornu cervi miscetur. Si uratur, ut decet, Spodium vocatur, pro quo tamen aliorum animalium ossa obtruduntur. Frequentior hujus quam eboris usus. Preparationem vide apud Aldrovandum loco citato. *Differentiæ*, & *Genera*, à locis imprimis sumuntur, seu Philostratum, Ælianum, & Plinium spectes, seu recentiores. Sunt enim aliipalustres, alii montani, alii campestres, alii sylvestres, alii Lybici, alii Indici. Solinus Prasiorum, & Taxilarum meminit. *Palustribus* dentes sunt lividi, rari, tractuque difficiles, & in plærisque partibus foramina; in aliis verò quasi grandinis grana tumores quidam Insurgunt, & arti minimè obtem-

Vſus.

Plin. H. N.
l. 8. c. 8.Ælian. H.
A. l. 10.
c. 12.

Ebur.

Plutarch.
l. An ad in-
felicet. &c.Aldrovand.
Hist. Qua-
drup. l. 1.
c. 10.

Differentiæ.

temperant. Dementes levesque esse, Philostratus addit. *Montani* perversi sunt, & infidiosi, & nisi alicujus rei indigeant, erga homines minimè fidi. Dentes habent minores, sufficienter albos, & in quibus nihil est difficile reperire. *Campestris* benigni habentur, mansueti, & imitationis amatores. Dentes habent omnium maximos, albißimos, & sectu faciles, ut nullo labore in quamcunque manus voluerit partem deducantur. *Sylvæstris*, in regno Senegæ, ad fluvium inprimis Gambram invenies. Ibi enim gregatim, ut apud nos apri, incedunt. *Lybici*, seu Mauri Indici sunt minores, & nec vocem, nec odorem horum ferre possunt, ut apud Polybium habes; imò nec contueri quidem eos audent, ut apud Solinum legitur. *Indici*, sunt quidem maximi, non ejusdem tamen omnes magnitudinis. Ideò Solinus duo eorum genera tradit; nobiliores, indicari magnitudine, minores nothos dici. *Prasii* appellantur qui maximi sunt, quales fortè jam Madagascar, teste Scaligero, producit. *Taxilas* vocant, qui secundi ab his magnitudine existimantur. Illos & in Sumatra invenies, animi robore, & virtutis indole iis, qui in continenti sunt præstantes. Ideò magnis navibus in continentem transportati, Calingarum Regi vendebantur; ut Ælianus prodidit.

CAPUT VI De Monocerote, & Asinis Cornutis.

MONOCEROTIS vocabulum, quod Latinis unius cornu animal sonat, pluribus animalibus competit: strictè tamen soli illi, quod *ὄντι τὸ πρῶτον κέρας*, à solo cornu dictum est, & ideo Unicornis, & Unicornu. Brachmanorum Dialecto *καρτέζων*, vocatur. An in rerum natura sit vel fuerit, alibi, post Baccium, & Bartholinum, magni patris magnum filium, disquiretur; nunc breviter fide authorum, qui de eo scripsere, de eodem agemus. *Descriptionem* itaque quòd attinet, Strabo, ex Onesicrito equos unicornè toto fere corpore referre scribit. Philès caudà aprum, Leonem rictu præferre ait. Plinius, reliquo corpore equo similem; capiti cervo, pedibus elephanto, caudà apro, facit; & uno cornu nigro, medià fronte cubitorum duum eminente, instrui. Plinium Solinus sequitur. Isidorus cum Rhinocerote confundit, & cornu ita acutum & validum esse, ut quicquid impetierit, aut ventilet, aut perforet, addit. M. Paulus Venetus, Magno Cham Tartariæ à servitiis, in regno Lambri conspici ait, Elephante minores, depressum caput gerentes aprino simile, spinosà linguà, quà obvia petunt, nigricantibusque oculis, Rhinocerotis formam ad unguem æmulantur. Ludovicus de Varthema Bononiensis de Monocerotibus à se visis,

ita scribit. Ex altera templi Meccani parte claustra sunt, quibus bini Monocerotes vivi includuntur, qui pro resingulari, ut sunt, monstrantur. Eorum hæc forma erat. Major equinum pullum xxx. mensium imitatur, unumque in fronte cornu præfert, trium circiter ulnarum. Alter Monoceros, unius anni similis, cornu quatuor palmarum habet. Color feræ, ut equi sagmati obscurior, capite cervino, collo brevi, rarisque circa illud pilis, & brevi juba ab altero tantum latere dependente. Crus subtile habet, gracile hinnuli instar: Pes anteriori parte parum fissus, ungula verò caprina, pedesque dextrum latus pilosum. Enim verò feritatem præ se fert, & naturam solitudinis amantem. Quæ Garzias ab Horto habet, non appono. Reperiri dicuntur in Arabiæ solitudinibus, ibique à mercatoribus visos, Thomas Bartholinus accepit. Garzias suos inter promontorium Bonæ Spei, & illud quod vulgò de Currentes nuncupatur, inveniri scribit. Paulus Venetus suos in regno Bosma & Lambri locat. Æneas Sylvius, in extremis Asiæ partibus, in quadam provincia nomine Macino, inter montes Indiæ & Catajum, ubi vulgò creditur habitasse Sericos. Aloysius Cadamustus in novo orbe. Cornu in pluribus exhibetur locis. Decantatissima sunt, S. Dionysianum in Gallia, Venetum, Hispanicum, Ultrajectense, Helvetorum, Danicum, Mercatorum Venetorum, & Gedaniensis Empirici. S. *Dionysianum*, inter prima melioris notæ reponit Baccius; quia rudiori forma, non politum, ad nigrorem vergens instar cervini, quam proximè ad veterum unicornu accedere videtur. In assignanda longitudine variant authores. Renodæus hominis proceritatem æquare tradit, ea fide qua & nobis patuit: Baccius & Marinus ad sex cubitos extendunt: Gölmitzius ad sex & femis pedes metitur: Bellonius semissem complens ad septimum auget. Nec de pondere consentiunt. Cardano libras decem & septem pendere visum, cum tertia parte. Gölmitzius ad vigesimum quintum pondus ascendit. Ego sublatum, ad decem & octo libras, cum Bellonio extenderem. *Venetæ* unicornua inter vera censet Baccius, inter diversa ab antiquorum unicornibus Andreas Marinus, quod antiquorum unicornibus longiora sint, nec strias habeant Monocerotis Æliani, adeoque subtilia, ut pocula inde nulla conficiantur. Colore sunt cornu cervini politum, & pallidi non nigri. Feruntur occupato Byzantio in Venetorum Rempublicam transcripta, cum XII. pectoralibus satellitum Imperatorianorum. *Hispanicum*, cujus frustulum Philippus IV. Francisco Barberino Cardinali eminentissimo, & in peregrinos Heroas humanissimo, donavit, nihil singulare habet. *Ultrajectense*, lon-

Polybium
Hist. l. 5.

Scalig. Exercit. 204.

Ælian. H.
Al. 16.
c. 15.

Bartholin.
de Unicornu cap. 24.
Garzias H.
Arom. l. 1.
c. 14.

Baccius. l. 2.
c. ult.

Renod. l. 3.
Pharin.
c. 21.

Strabo Geogr. l. 15.

Philes in Jambis.

Plin. H. N. l. 8. c. 21.

M. Paulus Venetus l. 3. c. 15.

Vartom. l. 1. c. 18.

longitudine Parisiensi par est, sufficienti amplitudine. Gyri frequentiores ad extremum apicem circumducti, recto tractu obliterantur. Crustæ color cineritio similis, medullâ candidiore. In magno precio habetur, & pro vero venditur, ut infinitam auri vim, repetundarum damnata Colonia Aprippina, contra licitaretur. *Helvetiorum*, ad oram fluvii Arulæ propè Brugiam, anno M. D. XX. inventum est. Interiori facie est album, flavescens exteriori, sine striis, duorum cubitorum longum, sed, ut moschus, odore præstans, præsertim igni vicinum. *Danicum*, in castello Friderici Burgi asservatur, longitudine septem pedes Romanos excedens, si partem alveo excipiamus inclusam, cujus mensuram pedis unius cum mensuris duabus Bartholinus deprehendit. Ambitus septem minimum digitos complectitur, æquali gyrorum flexu in acumen definens. Color ex candido mixtus & cinericio, quem per intervalla, nigriores striæ, lineæque obscuriores distinguunt. *Venectorum mercatorum* unicornu ex Germania allatum est, coloris splendore & varietate veri cornu speciem promittens, eoque magis, quod abrasæ particulæ, non dentium instar in ramenta, quæ fricari possunt, concidant; sed inde quicquiliarum squamæ eadem planè visciditate & lentore resultent, quo secta quævis animalium cornua. De *Gedanensi* nihil occurrit; Empiricus Constantinopoli redux, magno illud non ita pridem venditabat. De reliquis quæ huc spectant, ita *Ælianus*. Dicunt omnium maximè animalium absonam vocem & cententam emittere; & ad alias quidem bestias ad se accedentes mansuescere, cum gregalibus verò suis pugnare. Neque modo mares naturali inter se quadam contentione dissidere, sed contra etiam foeminas certare, pugnamque usque ad mortem victi ingravescere. Nam & reliqui corporis robore maximo præditus est, & cornu inprimis inexpugnabili armatur. Desertissimas regiones persequitur, simul & solitarius errat. *Coitus* tempore ad foeminam mansuetè mansuecit, & pariter pascuntur. Cum hoc tempus transierit, & ventrem ferre foemina coeperit, rursus efferatur, & solus vagatur. Prætorum Regi illius pullos etiamnum teneros ajunt deportari, eosdemque festis & panegyricis diebus ad pugnam committi, ad robur ostendendum. Nam integræ ætatis & perfectæ, nullum unquam meminit captum fuisse. Tantum *Ælianus*. Alii addunt, adeò animal hoc puellas virgines venerari, ut si sinus venienti aperiant, in illum, ferociâ depositâ, caput ponat, sicque soporatum velut inerme capiatur. De *usu* inter omnes notum, ad venena maximè commendari. Eo verò præsentē sudare, & in humore ebullire, sicque verum dignosci, nonnullorum est sententia. Aloysius Mundella ad-

versus morsum canis rabidi, aliorumque animalium maleficorum, nec non vermes eorumque symptomata commendat. Antiqui Indorum Reges, ad quorum notitiam primum hoc cornu pervenit, pocula ex eo sibi fabricabant, ut dum ex iis bibebant contra venena, ebrietatem, spasmodum, epilepsiam, & alios malignos morbos munirentur. Narra-
Jordan. l. de peste.
rat Jordanus Judæum quendam Venetiis, in mensa cornu circum delineasse, postmodum scorpion & araneum injecisse, qui nunquam transilire potuerunt ambitum cornu circumscriptum: deinde palmæ altitudine quovis raptantes bestias, umbræ aut vi emanante, intra quadrantis horæ spacium ambas necasse. Non est ergo mirum tanti esse pretii, ut Germani mercatores teste Baccio, pro uno X C. M. coronatorum poscerent; & Pontifex Romanus, erecta in Vaticano pharmacopœa, frustum XII M. aureorum à mercatoribus Epidauriis redemerit, quo non semel Augustinus Ricchus Pontificius tunc temporis Archiater, felicissimè, modo scrupuli, modo decem granorum pondere, ex vino, vel aliquâ cordiali aquâ utebatur. Et hæc de Unicornu nunc sufficiant, pluribus alibi agemus. Quantum ad *Asinos Cornutos*, tribus in locis eos celebrari in venio, in India nempe, Scythia, & Africa. De *Afris* Herodotum authorem habemus. De *Scythis* apud *Ælianus* habetur, & addit, Cornua aquam fluminis Stygis continere, quæ transmittit vasa omnia etiam ex ferro, missaque ab Alexandro Delphos ut Pythiæ dedicarentur. De *Indicis* ita idem *Ælianus*. Sylvestres asinos equis magnitudine non inferiores apud Indos nasci accepi, eosque reliquo corpore albos, capite verò purpureo, oculisque cyaneis esse: cornuque in fronte gerere sesqui cubiti longitudine: cujus superius puniceum, inferius autem album, medium verò planè nigrum sit: atque non omnes quidem Indos, sed potentiores, quum tanquam armillis quibusdam brachia, sic cornua auro ornarunt, ex his ipsis bibere solere. Ex hoc cornu bibentem ab insani-
Herodot. l. 4.
Ælian. H. A. l. 10. c. 40.
Ælian. H. A. l. 4. c. 52.
bilibus morbis tutum fieri, neque eum ipsum convulsionibus corripi, neque sacro morbo tentari, neque venenis ullis ferunt. Quin etiam si quid prius pestilens biberit, tum id evomere, tumque ad sanitatem redire. Quum autem cæteri asini, quibus cunque in terris sint, tam domestici, quam sylvestres, tum cætera solipeda animalia, talos non habeant, neque fel in jecore, ut fertur: asinos Indicos rorigeros. Ctesias inquit, talis primum usque nigris præditos esse: eosdemque si quis confregerit, interiora quoque nigra deprehensurum esse: neque felle eos carere: neque modò corporis velocitate longè multumque cæteros asinos superare, sed & velocitate eadem multò equis & elephantis præstare. Quum autem in viam se de-

Bartholin.
de unicor.
c. 27.

Ælian. H.
A. l. 16.
c. 20.

Albert. H.
A. l. 22.

derunt, tardius primò ingrediuntur, deinde paulatim tantum confirmantur ad contendendum iter, eos quidem ut assequi nemo possit. Postea autem quàm foeminæ pepererunt, patres circa pullos à partu recentes, summâ custodiâ versantur, eorumque commorationes locis Indiæ desertissimis sunt. Quum à venatoribus Indis invaduntur, pullos suos adhuc ætate infirmos, à tergo suo pascentes habent, atque pro eis pugnant: contra equites audent venire, eosque cornibus ferire. Tanto sanè hi robore existunt, nihil eis ut obsistere queat, quin statim concedat, vel, si non cesserit, frangatur, aut aliter atteratur, & evadat inutile, & perdatur. Equorum etiam incurfu latera discerpunt ac lacerant, ut viscera effun-

dantur: ex quo fit, ut ad eos equites appropinquare valdè metuant; appropinquatio enim capitalem ipsis pariter & equis multam miserabiliter infert. Pergraviter calcibus pugnant. Eorum morsus eatenus acerbiores existunt, ut quicquid comprehendunt, funditus diripiant. Ex his qui sunt confirmata ætate, vivos non ceperis, jaculis & sagittis perimuntur. Carnes eorum, quòd amarissimæ sint, haudquaquam esculentæ. Eadem ferè Philostratus scribit. Icon quem adjicimus, feræ quidem est corpore auribusque asininis, binis armatæ cornibus, quorum alterum è narium, alterum ex oculorum regione exit: sed quia nec solipes, est, nec unicornis, Asinus Indicus cornutus esse nequit.

Philostr. in
vita Apol-
lonii. l. 9.



Taurus Castratus Bos
Verschnittener Ochs





Kuh und Kalb





Bos Domesticus





HISTORIÆ NATURALIS

D E

QUADRUPEDIBUS

LIBER II.

De Quadrupedibus biscalcis.

TITULUS PRIMUS
De Biscalcis terrestribus.

CAPUT I

De Ruminantibus Cornigeris
in genere.

AËtenus Solipedum historiam persecuti sumus: sequuntur *Biscalci*: Græcis διχῆλη & διχῆλη quæ ungulam dividere in facris legimus, quod multifida, quamvis pedes in digitos scissos habeant, facere non dicuntur. Duo talium invenio genera, *Terrestre* nempe & *Aquaticum*. Ex terrestribus alia *ruminant*, alia *non*. Ex illis quæ ruminant, quædam sunt *Cornigera*, quædam *non cornuta*. Illa in genere & in specie considerabimus. *Ruminantia* autem illa vocamus, quæ pabulum semel deglutitum, mox ad os regurgitans, revolvunt. Unde Ruminatio actum, Apulejus rumigare, Quintilianus & Plinius, remandere, Græci *μηνυκάζειν μηνυκῶν ὡς τὸ μηνύειν* quod est revolvere, dixerunt. Latinorum quidam à loco ad quem sursum ad os repellitur, id est, à rumine, quod, ut ait Festus, locus est in ventre quo cibus demittitur, & unde redditur deduxerunt. At Servius à ruma, quæ rumis, & frumen aliis, quam ait eminentiorem colli partem esse, ad quam demissus cibus, à talibus animantibus revocatur: Mercurialis verò ab erumnis, quod Arnobius scribat, erumnas esse prima in gurgulionibus capita. *Necessariam* autem hisce animantibus ruminatio nem esse, tum exinde colligas, quod durior pabulo vescantur; tum ex eo, quod superioris mandibulæ dentibus careant; & inferiores minimè habeant ferratos. Inde factum, ut dentium defectum *ventrium multitudine* natura pensaret. Sunt enim talibus quatuor, *κοιλία* nempe, *κερύφαλλον*, *ἐχίνον*, seu venter, reticulum, omasum, abomasum. Gula ab ore incipiens ad pulmonem septemque transversum deorsum tendit: hinc se ad *ventrem* applicat *majorem*, qui parte interiore asper interceptusque est, ac

propè gulæ commissuram, sinum sibi adnexum habet, quem ex argumento *reticulum* appellant. Est enim ventri similis extrinsecus, intus reticulis mulierum implexis, magnitudine multò quam venter major. Hunc excipit *omasum* parte interiore asperum, cancellatum, crustatum, magnitudine reticuli. *Abomasum* venter ab eo alius jungitur, magnitudine amplior omaso, formâ oblongior, cancellis intus & crustis multis, magnis, & levibus innormatus, mox intestinum consequitur. In prima alvi cavitate rudis adhuc esca cernitur, quin & festuæ & vix lacerati furculi. In secundo amplius conficitur cibus, & magis adhuc in tertio elaboratur, ut in novissimo tandem concoctio absolvetur, ubi in cremorem lacteum abit. Nec tamen sola illa quæ superiore dentium ordine carent, ruminant. Ruminat namque inter pisces Scarus, quod obtusos dentes habeat; inter animalia, mus vulgaris, & Ponticus, lepus & cuniculus, ut in Levitico habetur. Modum & viam ruminationis si inquiras, cibum remansum ex uno ventre in alium mitti, quousque à postremo in intestina labatur, respondet Aristoteles. Galenus ait, primò ex ventriculo revomi in os: deinde ab ore in reticulum; inde in omasum, tandem in abomasum mitti. Post lactationem ruminare incipiunt, & septenis mensibus, cicures intellige, ruminant. Gregales levius minusque tempus, quia foris pascuntur. Hyeme tamen magis, quàm cæteris anni temporibus; videnturque non minus ruminando quàm edendo delectari. Quietem tum poscere, vel exinde liquet, quod in mandris plarumque id muneris obeant, jacentia. *Lac* eorum solum coire, ipsaque coagulum in omaso habere, & lacte abundare, ab Aristotele proditum. Causas omnium alibi exponemus. *Cornua* ruminantibus Camelum si excipias data sunt, defensionis & offensionis gratiâ. Nutrimentum quod ad superiores dentes quibus carent, abire debebat, in cornua abit, suntque multiplicis differentie. Nec alibi major lascivia naturæ ludit animalium armis. Spar sit hæc, inquit Plinius, in ramos, ut cervorum: aliis simplicia tribuit, ut in eodem genere subulonibus ex argumento dictis;

Aristot. H. A. l. 9. c. ult.

Galen. l. de adminstr. anatom. c. 3.

Plin. H. N. l. 10. c. 73.

Aristot. H. A. l. 3. c. 21. Item de partib. l. 3. c. 15.

Plin. H. N. l. 11. c. 37.

D

ali-

Aldrovand. de Biscalcis l. 1. c. 1.

Festus de verbor. significat. Varro L. L. l. 2.

Arnob. l. 7. contragentes.

Aristot. H. A. l. 2. c. ult.

aliorum finxit in palmas, digitosque emisit ex eis, unde platycerotas appellant. Dedit ramosa capreis, sed parva, nec fecit decudua: convoluta in anfractum arietum generi, ceu castus daret, infesta tauris. In hoc quidem genere & foeminis tribuit: in multis tantum maribus. Rupicapris in dorsum adunca; Damis in adversum. Erecta autem rugarumque ambitu contorta, & in leve fastigium exacuta, ut lyras diceret, Strepficeroti, quem audacem Africa appellat. Mobilia eadem, ut aures, Phrygiae armentis. Troglodytarum in terram directa, quae de causa, obliqua cervice pascuntur. Aliis singula, & haec medio capite aut naribus: Jam quod aliis ad incursum robusta, aliis ad ictum: Aliis adunca, aliis adjectum plurimis modis, supina, conversa, convexa. Omnia in mucronem migrantia. Haec Plinius, qui differentias à colore omisit. At is quoque variat. Nonnullis est simplex, albus, nigricans, cinereus, flavescens: aliis varius, ut in singulis speciebus ostendetur. Habent & proprias quasdam corporis partes cornigera, ut talum & sebum: habent & communes sed situ differentes, ut uterus, lien, mammae. Lien plerisque rotundus: *Intestina* ampliora: *Mammae* eaeque binae inter femora. *Uterus*, acetabula habet dum partum gerunt. *Talo* quoque permulta instructa sunt, eundemque cruribus posterioribus continent. Sed de his in speciebus plura.

CAPUT II.

De Ruminantibus Cornigeris
in specie.

ARTICULUS I.

De Bove domestico.

Aldrovand.
Hist. Quadrup.
l. 2. c. 1.

Veget. in
prologo l.
2. Veterinaria.

ET tantum de animalibus quadrupedibus bisculcis ruminantibus & cornigeris in genere. Species si attendas, sunt inter ea, *Bos*, tam domesticus quam sylvestris, *Ovis*, *Capra* & *Hircus*, tam domesticus quam sylvestris, *Cervus*, *Tarandus*, *Alce*, *Rhinoceros*. A Bove autem merito incipimus, animal, quae sibi omnia ferè quae ad victum nos & reliqua reposcimus, vendicat. Cuncta certè legumina frumentaque, ut verbis Vegetii utar, bobus meritò aratrisque debentur. Vinearum ipsarum usus periret, nisi eorum adminiculis carpenta sudarent. Quid de diversorum munerum comparatione referamus, dum inter mobilia, & quicquid gravius est, absque vehiculis penè reddatur immobile? Reliqua omnia animalia, ipsaeque cohortales aves, ex eorum capiunt labore substantiam. Unde enim equis hordeum, unde cibum canibus, unde porcis pabulum dominorum solertia subministraret, ni pa-

rentur boum labore frumenta? Et ne longum faciam bobus debent alimenta, quicquid alii potest. Apud alios genus mularum, apud alios camelorum, apud paucos elephantorum, etsi exiguus usus est, nulla potest ratio esse sine bobus. Non est itaque mirum tali olim boves in precio, ut Germani junctos uxori ducendae dotis nomine mitterent, quo venire se laborum periculorumque sociam his incipientis matrimonii auspiciis admoneretur: Athenienses nullum longo tempore, cujus opera aratro vel curru utebantur, immolarent: Pythagoras, ne quis istiusmodi operosa animalia interimeret, institueret: Phryges, qui bovem aratorem interfecisset morte mulctarent: Imperator Valens lege caveret, ne quis per Orientem vitulinam vesceretur: & Constantinus, ob civilia debita boves aratorios pigri capere vetaret. Quin & virtutis premium boves dati; & Decius Mus tribunus militum, cum Romanum exercitum ab hostibus Sabinis circumventum, circuitione montis conservasset, auream coronam, & centum boves accepit; Lelius post expugnatam urbem, triginta. Taceo tributum nomine à Bohemis Carolo Magno quotannis centum & triginta boves missos: furto subreptos belli causam, prodente Homero, & Pausania fuisse: & Batavos, qui ex caseo & butyro, quae in extrema loca exportantur, in singulos annos ducenties sestertium, id est, decies centena Caroleorum millia, prae ter ea quae in quotidianum alimentum cedunt, cogere, ut Adrianus Junius prodidit. Diversa pro aetate & sexu nomina sortitur. Praecipua sunt, *Bos*, *Taurus*, *Vacca*, *Iuvenus*, *Iunx*, & *Vitulus*. *Bovis* nomen propriè castrato impositum est: taurum tamen quoque & vaccam significat; ut & apud Græcos βῆς nomen est genericum, & teste Tzetze aliquando vitulum significat. *Taurus* est bos antequam castratur, dux & maritus vaccarum. Oppianus tamen hoc nomine tanquam digniore, totum bubulum pecus complectitur. Dictus est Ethymologo quasi τῶν βοῶν, à cauda extensione, καὶ τῆς τριῶν τῶν βοῶν; vel quasi γαῦρ, id est, superbus: vel à Syriaco Tor & Taur, ut Scaligero placet. *Vacca* foemina tauri est, & apud Græcos à bove mare per articulum distinguitur. Florentinus βεῖηλειαν aut δαίμαλιν reddit, quod nomen omni animali in juvena Phocion tribuit, juvencae alii. *Iuveni* & vituli nomen non distinguunt satis authores, nec Varro sibi constat; quin & Poetae juvencos & juvencas vocant boves & vaccas, nec non vitulos, quibus nondum erupere cornua: cum tamen Isidoro juvenus dicatur, quod incipiat hominum usus in excolenda terra juvare, quod ex Varrone habet; juvenci nomen bovem nobis indicabit, qui jam non amplius vitulus. *Iunx* eadem videtur quae juvenca.

Ideo

Tacit. de morib. German. Rhodig. Antiq. lect. l. 19. c. 27.

Elia. H. A. l. 12. c. 34.

Dubrav. in Hist. Bohemica.

Pausan. in Messeniensis.

Nomen.

Ideo Cornutus ad Persium, junices teneræ ætatis boves, quæ nondum ad summam ætatem pervenerunt, esse dixit. *Vitulus* & *vitula*, primæ ætatis nomen est. Isidorus à viridi ætate, alii à vitulando, id est, lasciviendo, alii à vita derivant. Apud Græcos varia obtinuit nomina. Dicitur namque *πέπιλος*, *μύχ*, *μύσκιος*, *πέρης*, *πέρης*, *έρμης*, *μογίλαι*, *λώς*, *πέρως* & *πέρων*, *κωρόν*, *ρως*, *πέλλης*, *κνώδαλ*, quorum tamen quinque posteriora tauro & bovi potius competunt. *πέπιλοι* dicuntur vituli apud Athenæum, *ἀπὸ τῆς κεραιῶν*, *ὅταν αὐτὰς κεραιὰς ἔχοντες*, id est, à cornibus patulis seu exilibus, ut Cælius Rhodiginus interpretatur; patulis potius, planis, & in latitudinem extensis, ut alii. *μύχ* quod utrique sexui commune est, dicitur; vel quod *μῶ* vocem edat: aut *ὡς τὸ ὄσμαιναι τῇ μητρὶ*; aut *ὡς τὸ μῶ τὸ ζῆλον*, *καὶ διὰ τὴν χάριν ἣν ἔχει πρὸς τὰς μητέρας*: id est, aut quod matrem olfasciant; aut quod *μῶ* voce quærant; aut propter affectionem, quam habent versus matrem. *μύσκιος* Græci nostri temporis nominant. *πέρης* Hefychio est *νεογνὸς βῆς*, à quo *πέρης* apud Henricum Stephanum est vitulus & vitula, *ὡς τὴν πορείαν* ab itinere, ita ut sit *μύχ* *βῆς*, ut Suidæ verbis utar, *ἡ ἀρχαὶ ἀνὴρ νῦν τῆς καὶ νομὸν πορείας*. *έρμης* Hefychio & Varino *νεὰς βῆς*. *Μογίλαι* itidem. *ήν* Græci vocant, *τὴν ἐνταυσιῶν καὶ μόνον ἐνὸς βῆς*, bovem anniculam, Reliqua bovi vel tauro magis competere dixi. *πέρως* namque Varino & Hefychio est taurus. *κίλιξ* bos aut agnus qui alterum cornu perversum habet. *κωρόν* bos cui cornua sunt lunata, ut *κέρων* taurus *έρθικερος* iisdem. *ρως* apud Tzetzen taurorum Scythicorum genus est. *πέλλης* vocatur bos coloris nigri. *κνώδαλα* quoque Æschylus boves vocat. In Descriptione singularia duntaxat adscribam. Notissimum namque animal est; de cornuum verò Differentiis post agemus. *Pilum* itaque hoc animal gerit, qui quotannis, teste Aristotele decidit, tenuiorem & densiorem quàm suum: in dorso tamen & cervice densior est, & peculiari nomine *κῆλας* appellatur, quod ex ipso *ἀναερωτῶμεθα*, id est, fervefacto, *ἡ κῆλα* seu gluten fiat, seu ut Varinus, quod ex eo *κῆλας* id est, claviculi, quibus remittuntur & intruduntur in cithara fides, parentur. Quæ in collo conspicitur reduplicatio, *μύκλος* appellatur, ut idem ait. *Labiorum* prominentiam habet crassam: crassam item & obtusam supernam maxillam, ideò breves herbas decerpere non potest. *Frontem* imagine V figurari Cælius notavit: Democritus & Ælianus exectos latiore tauris habere observarunt. Inter utrumque cornu maxima ossium est durities, injuriis valde resistens & fractu contumax. *Linguam* avulsam per totam diem palpitare, Cardanus scripsit. *Pelles* illæ quæ ex gutture

dependent, palear seu palearia dicuntur. Varino forte *λωγάλιον*, nam *τῶ βόων ὑπὸ πνυγῆ-
χην χάλασμα*, explicat. *Dentes* sunt continui, & bis mutantur. Mutant autem bimi, ut ait Plinius. Superiori dentium ordine *ca-*
rent: id est, primoribus quatuor, ideò, ut diximus, ruminant. *Penis* tentigo tanta, ut si ininiturus à loco aberret, vaccam vulneret. *Vaccæ Mammæ* habent inter femora, binas, ut habet Aristoteles; quatuor, ut Plinius, singulis papillis, quas habet quatuor, teste etiam Aristotele, mammam, ut apparet, tribuens. *Podicem* hiare innuit Horatius. *Cauda* tenor longus est, pili breves. Plinius caulem vocat. *Caro* sicca est & atrabiliaria. *Nervi* duri & robusti; tauris tamen duriores. *Sanguis*, fibris refertus, ideò omnium celerrimè coit & durefcit. *Articulum femoris*, laxum magis bos habet quàm alia animalia: ob id magis quàm alia pedem trahit, maximè cum macilentus est & senex. *Lapillum* feruntur in capite gestare, eumque si necem expectent, expuere. Augustinus in jecore quoque & renibus habere scribit. In corde *Os* gerere, Plinius author est, ex Aristotele sine dubio. *Lienis* figura oblonga est; ipse
nigrior quàm in sue præsertim ubi consue-
runt. *Renēs*, humanis, teste Plinio, similes, velut è multis renibus compositi. *Tali* à cameli talis differunt, quod paulò majores sunt. In secundo juvenicarum ventre, nigricantem pilæ rotunditate tophum reperire, nullo pondere, Plinius author est. Aldrovandus duas in musæo habuit; unam colore ruffo, alteram atro, quod ille ex ruffi coloris bove, hæc ex nigro esset eruta; cum sit earum ortus ex pilis, quos in ipsa ruminatione lambendo, ut fit nonnunquam, exteriores corporis partes deglutiendo colligunt, admistaque pituita paulatim in ovalem figuram ferre cogunt. De *Loco* non est quod multis agamus. *Cibum* si spectes, omnivori quidem sunt boves: maximè tamen gramine Cytiso, ervo, medicâ herbâ, loto, carice, falice, quercu, oleâ, arundine, alno nigra, vite, hordeo, olyra, arinca, milio, panico, cicera, lupino, glandibus, nucleis dactylorum, olearum, & visco, delectantur. De gramine omnibus notum est, cui hyeme fœnum succedit. In Narbonensi provincia in fonte Orge, quoddam nascitur in tantum bobus expeditum, ut id meris totis capitibus quærant. Idem in Ligeri amne, quæ per velutarios fluit faciunt, & in Sebusianorum piscinis. In eorundem quoque lacunis, stagnis, & pigris aquis, gramen nascitur longissimis foliis, subrubris, innatantibus aquæ, quorum etiam tam avidi sunt boves, ut dum ea persequuntur, ad ventrem usque se immergant, & toto capite sub aquam dejecto ea depascantur: quo pabulo eximie saginantur; vaccæ autem plus lactis, quàm quæ in vicina præbent. Ex cytiso copiosum & dulce lac

Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

Plin. H. N.
l. 8. c. 45.

Aristot. H.
A. l. 2. c. 15.

Plin. H. N.
l. 18. c. 22.

Dale-
champ
ad l. c.

Plin. H. N.
l. 13. c. 24.

provenit: sed dum floret incommodus est, quod tantisper urat & extinguat. Ervum commendatur, sed non mense Martio satum, quod cerebrofos reddat. Plinius non solum mense Majo satum, noxium bobus dici asserit: sed & autumnio gravedinosum. Madefactum, pluribus diebus mitescere. Ideo Democritus tale, ne boves fiant debiles, singulis mensibus in potu exhibet. Singulis boum jugis, quini modii sufficiunt. Ex medica omne emaciatum jumentum pinguefit, agrotantique pecori remedio est, ut Theophrastus prodidit. Ideo sylvestris in plerisque Hispaniæ locis, præsertim Valentino, diligenter, teste Dalechampio, feritur. Parcius tamen dandum, quod Aristoteles, lactis copiam extinguere, quod universum pabulum in sanguinem, adipem & carnes, faceffat. *Lotus* alimentum plurimum optimumque præbet, quia subdulcis est, & semel sata herba restibili, per aliquot annos fecunditate germinat. *Ulm* Attinæ inprimis frondes apud Romanos olim in precio. Si eâ assidue pecus alueris, & postea generis alterius frondem dare institueris, fastidium bobus afferet. *Salicis* fit apud Virgilium mentio; nec Lucretius ejus oblitus est. *Ficulnea* folia bubus probè dari posse, si sit eorum copia, scribit Columella. Idem quernam ceu meliorem & oleagineam præfert, sed ejus generis quæ spinas non habet. *Alni* nigra folia lactis copiam generant. *Hordeum*, & reliqua ex frumentis de paleis intellige. *Milium* tamen in Italia boum pabulum feri, Porta scribit. *Cicera* ervi loco fresa datur in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola divisa est, paulum aquâ maceratur, dum lentescat. *Lupini* modii singuli bovem unum satiare validumque præstare, apud Plinium legimus. Maceratus in aqua fluviatili & marina triduo, dulcescit, & ita siccatus ad usum reconditur. *Glandes* Cato post fementem colligi præcipit, & in aquam conjici, ut inde semodius patrata fementi, verno modius bobus singulis detur. De iisdem Plinius. Bobus glandem circa brumam aspergi convenit, in singula juga modios 24. Largior valetudinem infestat: & quocunque tempore detur, si minus triginta diebus continuis data sit, narrant vernâ scabie poenitere. *Nucleos dactylorum* in aquâ maceratos apud Babylonios bobus ovibusque in pabulum exhiberi; Strabo author est: visco ali, indeque pinguescere, Theophrastus. Aluntur & *pisce*, apud Pæonas, qui Prasiadem paludem accolunt. Nec *cicuta* abstinent, seu viridi, seu arida: nec à ranunculis læduntur. De *Potu* non est quod multa dicam. Aquâ eâque clarâ delectantur. Vegetius tamen nec sordida quidem lædi testatur. De ratione cibandi consule Aldrovandum, & agriculturæ scriptores. De *etate* ita breviter Plinius. Vita foemina

XV. annis longissima, maribus XX, robur in quimatu. Cognoscitur, inquit, Crescentensis, quando mutant dentes. Mutant enim anteriores anno evoluto, & decem vel octo mensibus: deinde post sex menses paulatim amittunt proximòs, donec intra triennium omnes mutaverint. Quo quidem tempore optimè habiti sunt, & in vigore ad decem usque vel quindecim annos perseverant. In statu dentes habent pulchros; longos, & æquales: qui per senectutem eis imminuuntur, nigrescunt, & corroduntur. Gesnerus ait, Helvetios ex circulis quibusdam qui circa vaccarum cornua nascuntur superne ferè, de ætate judicare: illos autem in quimatu ferme ternos esse; postea plures. Esse etiam, qui quoties sata fuerit, toties singulos adnasci circulos putent. Circa Generationem, libido, coitus, & partus occurrunt. Illam si spectes, coitus tantum tempore cum foeminis pascuntur: bis de die annosiores, sapius juniores & quidem eandem ineunt: & tanto motu genitalem nervum admovent, ut semen sine motu emittant. Exectum vaccam implevisse Aristoteles tradit: Columellæ verò judicio, unus mas quindecim vaccis abundè sufficit. Varro tamen multo plures tribuit, inquiens, habere se tauros totidem, quot Atticus, ad matricès septuaginta, duos, unum anniculum, alterum bimum. A gravidis abstinet, & sponte, à conceptu, divortio quasi facto secubat; ac ut in Epiro maximè videre est, trium plerumque mensium spacio non apparet, sed seorsim à vaccarum consortio convictuque pascitur. Haud minus famosa vaccarum salacitas. Testatur Aristoteles, libidine adeò accendi, ut bubulci eas tenere & capere nequeant, indiciumque suæ libidinis indicare, genitalis speciem prominentiorem. Crebrius mingere, more equarum: Tauros etiam supervenire, & sequi sedulo, & assistere. Turgere ad coitum plus minores quàm majores. Mugitum dum prurire edere, Ælianus prodidit, à triginta etiam stadiis distitam. Libidinem augent, falsa bovis caro juglandis magnitudine ori indita: Orobanche comesta, & alia, quæ Columella præcipit. *Coitus* laboriosior est quàm equis, tuncque potissimum tempus, cum foemina à mensibus purgatur, quæ sua sponte marem patitur. *Concepisse* cognoscitur, si Aristoteli credimus, cum menses cessarunt, spacio temporis trimestri, bimestri, quadrimestri, semestri. Ferunt ventrem menses decem: decimo pariunt, teste Varrone: quicquid antea genitum est, vitale esse Plinius negat; suntque authores, qui ipso complente mensem decimum mense parere ajunt. Viruli in utero situs icone exprimitur: ut & secundinâ uteri interna qua fetus contineri solet, cum suis cotyledonibus, externaque ostenditur. Quamvis autem singulos pariant, raroque

Ælianus.
Aristot. H.
A.1.6.c.21.
Crescent.
l.9.c.64.

Generatio.

Aristot. H.
A.1.5.c.2.

Varro R.R.
l.2.c.5.

Aristot. H.
A.1.6.c.18.

Ælianus. H.
A.1.10.c.27.

Columella
R.R.1.6.
c.24.

(Membrana lateri interna &c. n. 8. Membrana factum continens.
m.7.)

Columella
R.R.1.5.c.6.

Virgil. Georg. 3.
Lucret. l.2.

Columella
R.R.1.6.
c.3.

Colum. R.
l.2.c.11.

Theophr.
l.2.de caus.
plant.c.23.

Potus.

binos : ætate tamen Ptolomæi junioris, vac-
ca quædam, teste Diogeniano, eodem par-
tu sex edidit vitulos: mira quæ est harum ani-
mantium in Hispaniola fecunditas. Plæ-
rumque binos pariunt, undecimò mense
taurum admittunt. Eriam si verò geminos
ferant, negant tamen boves gravidas, præ-
terquàm dextro vulvæ sinu ferre. Marem
an foeminam conceperit, ex defultu post
congressum hariolantur. Si namque dextra
parte defiluit, marem feminasse dicunt, si læ-
va, foeminam. *Amicitiam* colunt cum api-
bus, inimicitias cum crabronibus, tabanis,
muscis, ricinis, urfis, sue, corvo, plantarum
aliquot, & coloribus quibusdam gerunt.
De apibus innuit Plinius dum scribit, cir-
cumliniri alveos apum fimo bubulo utilis-
simum. Cognatum hoc iis innascentes be-
stias necat, araneos, papiliones, teredines,
apesque ipsas excitat: & alibi: In totum re-
parari ventribus bubulis, recentibus cum
fimo obrutis. Virgilius juvencorum corpore
exanimato, sicut equorum vespas, papilio-
nes, teredines: apesque ipsas excitat. Cra-
brorum aculeo icti, ceu immanissimo quo-
dam dolore affecti, ad cursum incitantur.
Musca adeò eos vexant, ut in Leucade pa-
negyri muscis bovem immolare, consuetu-
do fuerit, quæ illius distenta cruore con-
festim evanescere credebantur. A ricino di-
vexati minus pinguescunt, & ad labores
sunt lentiores. Ursi tauros ex ore cornibus-
que eorum pedibus omnibus suspensi, pon-
dere fatigant. Nec alteri animalium in ma-
lesicio stultitia solertior. Suis fimo bobus
noxius est. Corvi ad volantes oculos eorum
lacerant. Sevo, suumne an aliud ignoro, si
lingua tauri perungatur, morituros citius
quàm comesturos, nisi sale & aceto abster-
gatur, quidam venditant. Quantum ad
plantas, si nares tauri oleo rosaceo illinan-
tur, vertiginosus evadit. Laser naribus in-
ditum eundem inflammat. Nigro hellebo-
ro necantur. Chamæleontis succo juvenas
necari angina modo, Plinius scribit. Capri-
ficus carnes teneras reddit. Folia fraxini ju-
mentis mortifera, cæteris ruminantium in-
nocua, si Plinium sequimur, quod de taxo
verum est. Circa Scytharum & Medorum di-
ctam Thraciæ regionem, locum esse ajunt,
viginti ferè stadiorum spacio, qui hordeum
producit, quo homines quidem vescuntur,
equi verò & boves, cæteraque animalia ab-
stinent. Tragus quandam herbam inter vi-
tia frugum describit, cujus folia ab initio
planè milium referunt, longis, asperis ari-
stis, armatam, quæ lapparum instar vestibus
hæreant, in arvis milio & hordeo consitis
frequentem, bubus valde noxiam, ab iisque
evitari. Aconiti carulei species à bubus,
teste Gesnero, non attingitur. De bona her-
ba, Caltha Alpina, Personata, vide Gesne-
rum & Tragum. Personata, Germanicè

blaffen, cum rore madida à bobus depasci-
tur, adeò eos inflat, ut aliquando rumpantur,
nisi cursu agitati, incallescant, & per al-
vum rejiciant. Excoloribus, rubro & qui
ad illum accedunt, irritantur. Admirandum
verò est, boves deinde non araturos, qui
aliquem ad supplicium devexerint: vel si a-
rent, terram non esse laturam fructum. Ge-
ponici verò tradunt, quod oporteat obser-
vare feminantem, ne semina boum cornibus
incidant: hæc enim *νεγροβόλα* intractabilia,
nominari, & sterilia esse. Plinius ait, in in-
cendiis si fimi aliquid egeratur è stabulis,
facilius extrahi, nec recurrere boves oves-
que ferri, quod quis etiam non miretur. De
Motu & Voce pauçula sufficient. Ille lentus
est, ne dicam, piger. Unde bove leporem
venari dicimus. *Vox* pro ætate & sexu va-
riat. Vitulis graviores esse quàm adultis, bu-
bus foeminis quàm maribus Aristoteles &
Plinius asserunt: è contrario mutari, si ca-
strentur. Propriè autem horum animantium
est boare, & ut Varro bovare, ut Pacuvius
boire. Vulgaris autem boum vox *μύκημα*,
μύκησις, & *μυκηδμὸς* ἀπὸ τῆς *μυκάδου* dicitur.
In *Cibus* nobis boves multa præbent, carnes
nempe, cerebrum, linguam, cor, jecur, lie-
nem, renes, omasum, intestina, pedes &
medullam, præterque ista, lac, ex quo caseus
& butyrum paratur. *Carnis* præcipuus usus
est: & quamvis Ægyptii vaccinâ abstine-
rent, taurinâ vescerentur: Romani tamen,
ne amplius taurina caro venderetur prohi-
buerunt, quod ex ejus esu, pestilentia in
gravidis mulieres regnante. Tarquinio Su-
perbo incidisset. Apposita est apud Home-
rum Heroibus, quod & Athenæus notavit.
Lysandro in Joniam proficiscenti bos & pla-
centa dono missa sunt. In regno Senega non
aliâ carne incolæ vescuntur. Prometheus,
teste Plinio, primus bovem occidit. Veteres
in conviviis lautis integros assos apposuif-
se Aristophanes testatur. Turcæ quoque in
Asia minore seu Natolia, cum puer aliquis,
cujus parentes in re mediocriter lauta sunt,
circumciditur, integrum bovem, immisso
in ejus alvum integro vervece, qui gallinam,
cui ovum insertum sit, etiam in alvo conti-
neat, crassa fude infigere solent, & luculen-
to igne assare, qui à pueri sanguine junctis
absumatur. Qualitatem bubulæ si spectes
Celsus ex domesticis plurimi alimenti & sto-
macho aptissimi decit, interque ea quæ mi-
nimè corrumpuntur. Hippocrates validam
esse testatur, sistereque, sed difficulter con-
coqui. Galeno minimè quidem est humida
pituitosa ac lenta, nocet tamen admodum
ob duritiem & in alterando difficultatem: &
quamvis alimentum corpori suggerat, non
mediocre, neque dissipatu facile: sangui-
nem tamen generat crassiorem. Quod si quis
temperamento naturali melancholicus ma-
gis fuerit, affectu aliquo melancholico pre-
hende-

Seneca de Ira.

Vox.

Vfus in Ci- bis.

Athen. Di- pnos. l. 1.

Plin. H. N. l. 7 c. 36.

Bellon. obs. l. 1. c. 60.

Hippocr. de rat. vict. l. 2.

hendetur, si largius eâ vescatur. Lien etiam à tali succo quibusdam intumuit, quam mox cachexia subsecuta est. Pejoris verò boves sunt succi vere primo & medio dum teneriores herbas pascuntur, & graciles: melioris, cum herbae densescunt, & ad semen producendum festinant. Sale condita, & fumo indurata, Belgæ, Scoti, Angli & alii Septentrionales vescuntur. Medio potissimum Octobri & Novembri sale maceratur: ubi suspensa est, accensis, à quibusdam, juniperi ramis mox extinctis, sufficitur. Nonnulli carnis colorem commendari putant, & rubescere magis, si aridis urticæ fascibus suffiatur. Parcius verò & ista attingenda est: quippe parum aut nihil alit, vivitque diutissimè in stomacho, ac difficillimè perficitur, confecta, pessimum succum præbet. Censetur mediæ ætatis, & quæ laboribus fracta non est, utilior: vetulorum tamen saginæ promptior, viditque Brujerinus, quos Averni miserant, tam insigni obesitate graves, ut non nisi plauistro impositos, qui emerant, aliò transferre possent. Morbosos mactare, lege, præcipuis in urbibus cautum est: deprehenso, mulcta gravi mulctantur. Scilicet, vitiata caro vitiatos humores spiritusque generat, ipsa etiam per se fat gravis. Vitulina, tanquam temperata, optimi succi, grata gustui, facilis concoctionis & bonum generans sanguinem, ab omnibus laudatur, & multi hædinâ laudabiliorem sentiunt. Sed Crescentiensis, quindecim à partu diebus elapsis, occidendos esse monet: alii vix ante trigessimum ætatis diem matribus eripiunt: in multis Galliæ tractibus, teste Brujerino, mensem unum, aliquando eo minus natos, nonnunquam sesquimenses, laniis traduntur. Romæ sæpe integro anno lactare permittuntur, & ab herbis & alio pabulo depellunt, Cupediæque exinde lautissimæ, & Francisco I. Galliarum Regi in usu. Donatus Antonius Ferrus illorum carnes maximè laudat, qui à partu tribus aut quatuor mensibus remoti sunt, atque annum unum non diu transiere. Quantum ad juvenecos, commodiores quidem sunt adultioribus, sed inferiores vitulinis. Lugdunensibus anniculæ, semestres, bimæ aut trimæ juvencæ placent. Brujerinus quæ venerem expertæ non sunt, laudabiliores existimat. De partibus jam videbimus. Vituli caput elixari, & calidum edi, notum. Cerebrum capiti exemptum seorsim modicè in aqua coctum, mox tunicis liberatum, in vino coquitur, & aromatibus aspergitur. De Maxilla, Cratinus teste Athenæo, ubi de foro cupediarum agit, mentionem facit in Plutis. Ob bovinam maxillam pugnans. Lingua in Germania & Belgio in precio habetur. Sacris non erat olim adhibita, quod sacerdotes sub specie religionis eam sibi reservarent. Quidam condimentis farctam in

veru assant. Vbera, elixari solent, & mox additâ pinguedine, aut butyro, frigi in sartagine, aromatibusque aspersa inferri, Ventres inter cibos olim ab antiquis celebratos. Omasum inter gulæ cupedias olim, saltem apud Romanos, ex his Plinii verbis innotescit: Hoc animal tantæ apud priores curæ, ut sit inter exempla damnatus à populo Romano, qui concubino procaci rure omasum se edisse negante, occiderat bovem, actusque in exilium tanquam colono suo interempto. Lactes magnatum mensas cohonestant, & ab antiquis celebrantur. Τῶν χορδῶν enim, ut Dalechampius exponit lactium, ut Natalis Comes intestinorum, meminit Epicharmus. Sed ἀκροκάλια iisdem in usu. Nec Pedes rejiciuntur. Diogenes Cynicus quod crudum devorasset, mortuus est. Vsus in Medicina quod spectat, Caro bubula tumorem sanat, & calida imposita panos & apostemata discutit, si Plinio fides est. Vaccinam veretro impositam ulcera ejus & epiphoras mirè sanare, Marcellus Empiricus prodidit. Ius carnis bubulæ ventris fluxus biliosos, teste Simeone Sethi, compescit: vaccinæ ulcera oris & rimas sanat, vituli, inter coeliacorum & dysentericorum auxilia recensetur. Caro vitulina, recens cum aceto cocta, madidaque alis imposita, foetorem hirci fererrimum tollit: si cum aristolochia inasata à mulieribus edatur, circa conceptum, ut mares pariant, facit. Sorbitionem ex pedibus Brudi Lusitani, apud Aldrovandum vide. Iecur bovis ustum potumque ventris & sanguinis profluvium prohibet, ut Haly prodidit. Ex vituli masculi & tantundem foliorum salviæ minutatim pariter concisis, collectus stillatitius liquor, contra durum in transversum in imo ventre supra pudenda tumorem prodest. Splenis bovis extractum in mensum suppressione opitulatur. Superstitiosa sunt & magica quæ Plinius prodidit. Omasi quoque jure poto, venena expurgari putant: privatim verò acconita & cicutas. A recentibus adhuc & calidis vituli extis minutatim concisis, liquor cum æqualibus partibus salviæ & melissophylli extrahitur, quo membra frigida, tabida, & resoluta, perfricantur. Genitale in aceto maceratum & illitum, splendidam, teste Sexto, reddit faciem. Tauri rubri aridum tritum & aurei pondere propinatum, fastidium coitus adfert: recentiores venerem in viris excitare, affirmant. Medulla, vituli inprimis, inter emollientia censetur. Vaccineam cum farina tenui subactam, & instar excocti panis in cibo datam, mirè dysenteriam sanare Marcellus Empiricus scribit, maxime si & caseus bubulus recens manducetur. Taurina ficior est, & in vino trita potataque torminosos emendat. Liquata & cum quarta parte myrrhæ rubentis & olei laurini tantò

Brujer. l. 13.
c. 8.

Plin. H. N.
l. 8. c. 45.

Vsus in Me-
dicina.

Hartmann.
in Chyma-
tria.

Plin. H. N.
l. 28. c. 13.

Gefner. in
Bove.

tanto mista, nervorum contracturas solvit, si ea pedes manusque diluculò & vesperi inungantur. Plinius bubulam ex dextro crure priore tritam cum fuligine, pilis ac palpebrarum vitiis angulorumque occurrere ait. Quantum ad *sebum*, de taurini preparatione ita Plinius. Quæ ratio adipis, eadem in his quæ ruminant sevi est, aliis modis non minoris potentia. Perficitur omne, exemtis venis, aquâ marinâ vel falsâ lotum, mox in pila tustum, aspersum marinâ. Crebrò postea coquitur, donec odor omnis aboleatur. Mox assiduo sale ad candorem reducitur. A renibus autem, omne laudatissimum est. Si verò vetus revocetur ad curam, liquefieri prius jubent, mox frigidâ aquâ lavari sæpius, dein liquefacere affuso vino quàm odoratissimo. Eodemque modo ac sæpius coquunt, donec virus evanescat. Quomodo odoramentis imbui debeat, Dioscorides docuit. Suillo est multò calidius & ficius, leonino temperatius, ad scirrhus & phlegmonas accommodum. Cum resina & creta Cimolia omnem duritiem discutit: Æsculapius cum cera imponi jubet, & fortè melius cum ad Galeni tetrapharmacum accedat. Vincit maculas in facie, cum semine cunilæ, ac cinere cornu cervino, si canicula exoriente comburatur: Cum arborum resinis & melle panos & similia sanat: cum adipe ursina & cera permixtum, pari pondere, parotidas miro remedio comprimit: vitilignes cum strychno & ruta, nec non verrucas, strumas, & similia emendat. *Vitulinus* adeps ex foemine sublati, cum aquæ cotylis tribus, decoctus, & sorbitionis more sumptus, coeliaco prodest. Cum sale tritus phthiriasi, & capitis ulceribus utilissimus est. Cum nitro modico permixtus, & ceroti instar testiculis impositus, tumores omnes & dolores perfanare dicitur. Eundem contra venena quæ exulceratione enecant, valere Plinius alicubi scripsit. De eodem ita Marcellus. *Sebum vituli cum adipe anserino impositum, rimas scissurasque oris optime jungit.* Rigores cervicum bubulo sevo optime perfriantur, nam continuo mollescunt, & dolor omnis abscedit. Efficax est vitiis sedis. Clavos sanat cum thuris polline: lepras, furunculos, lichenes, & psoras sal emendat cum passâ uva exemta ejus ligno, & sevo bubulo atque origano ac fermento, vel pane. In furunculis illinitur sebum bubulum, cum sale, similiter & caprinum. Sole adusta sevo bubulo cum rosaceo aptissime curantur &c. De Felle hæc habentur. Ulcera capitis, teste Marcello, subito sanari, si cum stercore asinini succo, & scillæ contusæ pauxillo, fel taurinum misceatur: vel cum nitro, vino, & oleo quantum satis mistum, adhibeatur. Cum terra Cimolia, & nitro, lepras furfuresque exterere, Dioscorides testis est. Phagedænis & fistulis immitti cum

succo porri aut lacte mulierum, Plinius. Idem cum lana umbilico illitum, lumbricos egerit: cum melle anginis inungitur: sedis vitia ad cicatricem perducit: occlusas hæmorrhoides aperit: in lana collectum, & alvo suppositum ventrem solvit: cum butyro, medullâ cervinâ, & oleo laurino perfricta genua sanat: Contra genitalium & scroti dolores, cum melle utiliter inungitur: prærygia digitorum aquâ calidâ dissolutum levat. Mulierum purgationes lana succida appositum juvat. *Bubulum*, melli admixtum, teste Rhafi, ferrum infixum vel spinam extrahit. Idem ad crassitudinem mellis subactum, & illitum, permixto alumine & myrrha, ea quæ veretris serpunt, mira celeritate perfanare dicitur. De eodem ita Plinius. Panos & apostemata in quacunque parte fel bubulum discutit, ut sanguis etiam & caro bovis calida imposita. Cum oleo cicino, & rosaceo æquis portionibus, aurium dolori & vitiis medetur: tinitum eorundem, cum gossypio impositum, dispellit. Sunt qui regium morbum pelli credant fascia lintea, in bubulo felle calido tinctâ, & corpori sub costis incincta: quod triduo faciendum ajunt, ita ut quotidie renovetur medicamentum. Hippocrates, si mulier non concepit, mensibus apparentibus, tertiâ aut quarta die alumen tritum unguento dilutum, lanâ exceptum apponere, & per tres dies appositum haberi: Tertiâ verò die, fel bovis radi, & ramentum oleo dilutum, linteo exceptum apponi & tres dies appositum haberi, post cum viro concumbere, jubet. Mirum denique est quod Prosper Alpinus scribit, nonnullas mulieres in Ægypto, ut pinguescant, in balneis accipere novem diebus, fellis vaccini chirat, in aqua vaccina dissoluti. De *Felle vitulino* scito, lendes cum aceto calefacto tollere: cicatrices oculorum extenuare, cum melle imprimis myrrha & croco tritum; auriculæ insertum cum felle vitulino & aceto, & exuviis serpentis, maximæ utilitatis esse: Cimices fugantur, si amurcæ coctæ mixtum cum oleo, eis insperferis. *Lapis* in felle bovis, figurâ annuli, Philosophis Alcheron, tritus & naribus attractus, aciem oculorum promovet, & prohibet, ne quis humor descendens in oculis colligatur: comitialibus prodest, si magnitudine lentis inde capiatur cum succo betæ, & hauriatur naribus. Est & *Corio* & *Glutini* suus in Medicina usus. Combusto illo sanantur teste Plinio, perniones, ex veteri imprimis calceamento: cum melle phagedænas in ulcerum genere abrodit: veteris verò soleæ crematæ cinis attritus calceamentorum sanat. *Glutinum* ex coriis boum excoquitur, taurorumque præcipuum. Præstantissimum sit ex auribus taurorum, & genitalibus. Nec quicquam efficacius prodest ambustis. Sed adulteratur nihil æquè, qui-

Alpin. de
Medicina
Ægypt. l. 3.
c. 3.

quibusvis pellibus inveteratis, calceamentisque etiam decoctis. Rhodiaceum olim fidelissimum, eoque pictores & medici utebantur. Hodie præstantius, colore fere spadiceo, quam maximè durum, & vitri instar fragile, Germanicum cognominatur, & duplo carius vulgari, quod subnigrum est, venditur. Dioscorides xylocollan, quod in lignis ferruminandis ejus sit usus; alii taurocollan vocant. Inventionem ejus Dædalo teste Plinio debemus, quo tenaci nexu hærent simul, quæ conjungi aptius non poterant. Scabiem abolet in aceto. liquefactum additâ calce, si profunda non fuerit. Aceto remissum, adjecto sulphure, leni igne decoctum, ita ut ad mellis crassitudinem perducatur, furculoque ficulneo dum coquitur agitatum, ac bis per diem impositum, impetiginas agrias, id est feras, sanat. Liquefactum, & tertio die solutum, recentes plagas ferro illatas, ad cicatricem perducit. Cum aceto & melle mixtum, lentes tollit. Medetur & dentibus aquâ decoctum illitumque, & mox paulò detractum ut confestim colluantur vino, in quo decocti sunt cortices mali punici dulcis. Bibitur etiam cum tribus obolis, cum calida aqua, in vetere sanguinis excretionem. Coeliaci quoque ventris inflationi cum eadem feliciter imponitur. *Cornu* mucro exustus, duorum cochlearium pondere, addito melle, in pillulis devoratus, Phthificis prodest, si Plinio credimus. Combustum & in pulverem tenuissimum redactum, duorum cochlearium pondere, cum aquæ calidæ cyathis tribus, & paululo aceti, splenetico jejuno per triduum, bibendum rectè datur. Habet & *Vngula* suum usum. Elixæ & cum sinapi comestæ, veneno resistunt. Ustæ & à mulieribus quibus lac defecit, in jusculo, vino, vel alio liquore potæ, idem restituunt. Carbonibus impositæ mures suffitu enecant, vel aliò abigunt. Scobs tali cum melle pota, lumbricos educit, cum aceto mulso splenem minuit: vino excepta, & dentibus mobilibus apposita, eos confirmat. Frivolum, non tamen omittendum, inquit Plinius, propter desideria mulierum, Talum candidi juveni, quadraginta diebus noctibusque, donec resolvatur in liquorem decoctum, & linteolo illitum, candorem cutisque erugationem præstare. *Coxæ* uruntur bibunturque, ut Rhasis scribit, ut sanguinem fluentem & menses cohibeant. *Membrana* è partu madida faciei ulcera sanat. *Lapis* qui in capite invenitur, ex eadem aqua quam bos bibit, potus, dolorem capitis efficaciter tollit. *Lac*, utpote crassum & pingue, minus per alvum secedit: Plinius tamen eo maxime alvum solvi scribit: ideoque per ver purgandi causa bibi, quod tum omnibus herbis & multum pascantur, Dioscorides addit. Venena, illa imprimis quæ rosiones & unctiones adferunt, expurgat: privatim verò

contra dorycnium, colchicum, cicutam, & leporem marinum facit. Calefactum & gargarizatum tonsillarum dolores & tumores citò sedat. Tepidum incoctum subinde sumptum exulceratum quoque stomachum sanat. Cyathi unius mensura, cum pari sevi cervini remissi dosi, & pice præcoqua, quam viscosam vocant, rubricaque Scythica, quæ pissasphaltus dicitur, periclitanti phthifico mirè subvenit. Vaccæ nigræ, ut Hippocrates prodit, cum sesamo trito ad quadraginta dies, ex partu sanguinem vomenti bibendum, donec probè habeat. Idem decoctum, secundum Marcellum & Dioscoridem, exulceratos alvi fluores & tenesimum mitigat & tollit, recens mulctum, aut ad ignem decoctum, assidueque agitatum, donec ad tertias sit reductum. In dysentericis addi mellis exiguum præcipiunt, ut Plinius notavit: & si tormina sunt, cornus cervi cinerem, aut fel taurinum cumino mixtum, & cucurbitæ carnes umbilico imponere. Nec hoc tantum Aëtij, Galeni, & Plinii præceptum. Nostri enim temporis Medici idem faciunt, & in eo stomoma sive ferri aciem optimam novies candefactam extingunt, idque calidum ægro vel per clysterem exhibent. Propinabatur olim ab Hippocrate & alii liquorii immistum. Is namque, cum vulnerato intestino respiratio prodit infernè in conspicua juxta vulnus, & evacuantur pectora, lac & vinum pari aquæ mensurâ admixtâ, dari jubet. Sed & Gesnerus testatur, aliquos adversus quartanas remedium prædicare, si ex ulno & lacte confusis, liquor in balneo Mariæ extractus per aliquot dies bibatur. *Butyrum* etfi gentium duntaxat barbararum laudatissimum cibum, quique divites à plebe discerneret Plinius dicat, magnarum tamen & hoc apud Galenum, Dioscoridem, & alios virtutum. Vitalis de Furno Cardinalis & medicus eximius, sic de eo scripsit. *Butyrum naturaliter calidum est*, & humidum, cum dominio caliditatis, viscosum, & unctuosum. Idem sapè comestum, stomachum humectat, ventrem solvit, pectus lenit; ulcera pectoris & intestinorum sanat: maxime si ibi fuerit apostema; quia propria ejus vis maturare, humores & superfluitates omnes pectoris dissipare & mundificare, maxime si cum melle & saccharo comedatur. Butyrum repugnat venenis, membra humectat, asperitatem oculorum ejus litura mollicat & emendat, apostema dissolvit & maturat; vulnera pectoris, pulmonis, intestinorum morsus mitigat, nervos contractos emollit & laxat. Contra venena interna singulare est remedium, si is qui venenum potavit, in lacte calido solutum bibat abunde: nam suâ pinguedine meatus obstruit, ne

vene-

venenum subito ad cor surrepat. Recens autem est laudabile, vetustum minus &c. Tantum Cardinalis. *Caseus* dysentericis & coeliacis prodest. Hippocrates eodem in tertia tabis specie utitur. Donatus ab Alto mari casei Siculi glandem melle illitam, pueri ascaridibus laboranti contulisse scribit. *Serum* calidum an frigidum sit, alibi disputabimus: certum est crassitiem humorum extenuare, abstergere, & alvum subducere. Ideo veteres ad alvi subductionem frequentissime usi sunt, in iis inprimis, quos sine acrimonia purgare volebant, quales sunt, atrabile laborantes, comitiales, lepræ, elephantiasæ, & toto corpore papularum eruptiones. Ante omnia orthopnoicis prodesse, cum nasturtio, apud Plinium habemus. *Vrina* bovis castrati, succino usto & in ea extincto castigata, impotentiam tollit. Hippocrates eadem uterum muliebrem purgat, ut conceptus sequatur. Tauri urina lepras ac furfures tollit: capitis manantia ulcera sanat: & aurium dolores cum myrrha instillata, lenit. Denique, si major sit gravitas aurium, ut Plinius inquit, urina capri vel tauri, vel fullonia (id est humana) vetus calefacta prodest, vapore per lagenæ collum subeunte: admiscet & aceti tertiam, & aliquid urinæ vituli, qui nondum herbam degustaverit. De *Sanguine bubulo* scribitur, cum aceto & modicè sumptum, contra sanguinis rejectionem facere: canum rabiem recentem sanare; & abscessus, si cum sevo ad ignem emplastrum fiat, concoquere. *Taurinus*, teste Dioscoride, duritias, cum polenta illitus mollit: apostemata, in quacunque parte, aridus discutit: serpentes necat: & illitus maculas omnes de facie tollit: Pestiferum potu esse, quod celerrimè coeat ac dure scat, Midas Phrygiæ Rex, Psammenitus Ægyptiorum, Themistocles & alii, qui hausto periëre, exemplo esse possunt. Excipitur à Plinio Ægyra, urbs sine dubio Achajæ, ab Homero Hyperesia dicta. Ibi enim sacerdos Terræ, vaticinatura, sanguinem tauri bibit, priusquam descendat in specus. Symptomata, quæ ab illius haustu afficiunt, sunt, spirandi difficultas & strangulatus, faucium tonsillarumque præclusio, linguæ rubor, dentium infectio, & alia. Occurrere ei solent, amarantho, brassica, Caprifico, Calamintho, lasere, nitro, pipere, petroleo, foncho nigro, rubo, & thymo. De *Fimo* non est quòd multa adjiciam. *Taurinus*, tumores & duritias solvit. *Bubulus* & ad chiradas & ad tumores omnes scirrhusos, ex aceto in cataplasmatibus formam compositus, imponebatur. Cum melanthio carbonibus impositus, si naribus hauriatur, hemicranie medetur. Ad coli dolorem recens, expressum, & cum vino dilutum, vehementer laudatur. Ex eodem tuso & cribrato, sterilius purgatorium paratur. *Vitu-*

lini vires non multum à bubulo discedunt. Marcellus statim subveniri scribit, si recens articulis laborantibus illinatur. Præbent verò & ad alia, quædam partes *usum*; ne de agricultura, frumentorum excussione, vecturâ, gestatione, bello, vel spectaculis quiquam dicam. Ex cornibus, præter pocula, Gutti, Cucurbitulæ, Lucernæ, litui, buccinæ, & arcus fiebant: ex corio, scuta, lorica, galeæ, parma, tentoria, navigia, scalæ, balthea, nummi, bursæ, utres, folles, scuticæ, calcei & cætera formantur. Esitata Pyrræi in Græcia, Rupellæ in Gallia obfidiones testantur. Ex extremitatibus gluten fit. Ex *nervis*, flagella fiunt fractu contumacissima, & quàm maximè flexibilia. *Dentibus* politur charta. Cleanthes philosophus, *ossibus* bubulis & testis fictilibus perscribebat, quæ à Zenone audiverat, cum pecunia non suppeteret ad chartas emendas. Ex iisdem pulvis contra catarrhum & podagram paratur. *Sanguis* malthis faciendis, quòd quam cæterorum animalium crassior sit, & citò coeat, dureturque, perquam commodus est. Vituli verò cum carnibus valdè concisis in vase fictili per decem dies detentus, inescationis piscium aptissima materia. Ex *sevo* laudatissimæ candelæ, juvenæ inprimis & circa trimatum. *Felle* bubulo semina macerari Apulejus jubet, antequam spargantur, adversus mures agrestes. Nec accedent ad arborem formicæ, si radici, vaccinum illinatur. Eodem & amurcâ Lycium adulteratur: & aureus ducitur color. Setis bubulis veteres ad scopas vestiarias, utebantur: & pictores suos exinde habebant penicillos. Trogodytæ senio confecti, Diodoro teste, gutture bovis cauda adstricto finiebant vitam. *Fimo* Chineses pisces alunt, ut pingues evadant. In hoc vaccarum fimo casæ adversus pulices inunguntur, ut Linschotanus prodidit. *Vngulis* bestiolæ à vitibus arcentur. *Differentiæ* boum plurimæ dantur, à magnitudine, cornium varietate, variarum partium à naturali constitutione deflexu, loco, & aliis. Aden insulæ, quæ fortè Madoce & Ocellis veteribus, vaccæ camelum magnitudine æquant, nivis instar candidæ, sine cornibus, auribus proceris, ac pendulis, si Francisco Alvarezio credimus. Ægyptios boves Græcis majores Aristoteles pronunciavit. Æthiopici in Prete Gani regnis tantorum cornuum ut ex iis vasa quæ quinque sexve metretas singula capiunt, formentur. Africanæ sunt tam parvæ vaccæ, ut vitulorum nostratium magnitudinem vix æquent: sed multi roboris & laboris patientissimæ. Idem de Alpini seu potius Altini (Altinum urbs olim in littore Venetiæ florentissima juxta Aquilejam) Plinius reliquit. Anglici boves cornibus & miro carniis sapore superbiunt. Americani

Galen. l. 3.
de aliment.
facult. c. 15.

Dioscor.
M. M. l. 2.
c. 26.

Plin. H. N.
l. 11. c. 38.

Plin. H. N.
l. 20. c. 13.
& l. 29.
c. 13.

Differentiæ.

Alvarez. de
Æthiop.
c. 119.

in partibus septentrionalibus, carent palea-
ribus & gibbosi conspiciuntur. In Dariena,
teste Lopezio, ungulis sunt minimè bifidis,
mulis non absimiles, magnis auribus, pro-
muscide elephantis, colore cinereo, carne
delicatâ. Ex Hispania in Hispaniolam de-
vectæ vaccæ, in tantam fecunditatem ex-
crevere, ut una vacca proleteria, in viginti
sex annis, octingentos foetus ediderit, dum
ex filiis filii rursus procreantur. Aoniorum
bouvum variis coloribus distinctorum perpe-
tuæ indivisæque sunt ungulæ, & unum ex
ore egrediens cornu, quod Ælianus prodidit.
In Arabia vidit Vartomannus Sultano
donatas vaccas, quibus erant cornua cervi-
nis similia, colore nigro: quibusdam & uni-
cornu in fronte. Apud Arachatas, boves
sunt sylvestres, teste Aristotele, colore atro,
riçtule leviter adunco, cornua resimantiora ge-
rentes. Armeniis duplex cornu, sic erratis
flexionibus si Æliano fides, tanquam hede-
ra retorqueretur, & si mucrone petitur, ob
corneam duritiem, ferrum retunditur. In
Bengala provincia, M. Paulo Veneto au-
thore, crassitudine elephantos æquant. In
Hollandia vere, plæræque quæ maculosæ,
plurimum lactis habent. Aliquibus partibus
diebus æstivis, quatuor & quadraginta lactis
hæminas singulæ in mulctralia refundunt. In
Nosocomio Amstelodamensi, quod Lepro-
forum domus dicitur, viginti duæ tenentur
vaccæ, ex quibus aureos circiter quingentos
in lacte & caseis, præter quod in usum quo-
tidianum cedit, quotannis confici, à fide
dignis se audivisse Pontanus prodit. Non est
ergo mirum, ex caseo & butyro ibidem, quæ
in exera loca exportantur, in singulas an-
nos ducentis sestertium, id est, decies cen-
tena Caroleorum millia cogi, quod apud
Hadrianum Junium legimus. In Scotia bo-
ves sunt sylvestres colore candidissimo, ju-
ba densa ac demissa, truculenti & feri, adeo-
que ab humano genere abhorrentes, ut ab
iis quæ homines vel manibus contrectarint,
vel halitu perflaverint, permultos dies ab-
stineant, dolo capti, moriantur. Carnes car-
tilaginosas habent. In agro Camandvano,
(verba sunt Scaligeri,) boves ajunt esse ma-
ximos, brevibus tamen cornibus & hebeti-
bus. Nulla macula candor vitatur. Came-
li gibbus eis & robur par. Onera suscepturi,
camelorum more ad agafonis jussu genua
flectunt. Haud scio, an eosdem intelligat
Plinius dum scribit: Carici boves, in parte
Asiæ foedi visu, tubere super arnos à cer-
vicibus eminente, luxatis cornibus, excel-
lentes in opere narrantur: cæteri nigri co-
loris candidive, ad laborem damnantur. Cy-
prii boves stercore humano pascuntur. In
urbe Diu, citante Majolo, boves sunt ex-
igui, prægrandibus & rectis cornibus, sed
præter oneris ferendi industriam, & sub fre-
no currere & equitare dociles, equorum

Aristot. H.
A. 1. 2. c. 1.

Pontanus
Amstelod.
1. 2. c. 23.

Scalig. Ex-
ercit, 206. 6.

Plin. H. N.
1. 8. c. 45.

gradariorum more. Epiroticæ vaccæ, scri-
bente Aristotele, amphoras singulas singulæ
implent lacte. Erigitur qui mulget, aut pau-
lulum se inclinat: quoniam sedendo ubera
contingere nequit. De bobus ibidem, quos
incolæ Pyrrhicos vocant, ita Plinius: In
nostro orbe Epiroticis laus magna, à Pyrrhi,
(ut ferunt) jam inde regis cura. Id consecu-
tus est, non ante quadrimatum ad partus
vocando. Prægrandes itaque fuere: & ho-
dieque reliquæ stirpium durant. At nunc
anniculæ ad fecunditatem poscuntur: to-
lerantius tamen bimæ. In Eubæa boves ferè
omnes albos Odoardus Barbosa affirmat;
quam & argyrobæon Eubæam Poët dixere.
In Galata Africæ monte boves Italicis octi-
mestribus vix pares, cum senuerint, Leo-
nius testatur. In regione *Garamantum* aut vi-
cinia quadam, præposterè pascuntur, si He-
rodoto fides. Nam si rejecta (vel potius re-
cta) ad pastum ora dirigant, officiunt pro-
na in humum cornua & obnixa. *Helvetii* à
teneritudine carnis, cum alibi, tum maxi-
mè juxta Zofingam oppidum agri Bernensis
commendantur. In *India* sunt unicornes &
tricornes, solidis ungulis, nec bifides. Iis-
dem Plinius altitudinem camelorum tradi-
ait, cornua in latitudinem quaternorum pe-
dum. Allatum ab inde Ptolomæo II. cornu,
quod tres amphoras capiebat. Ibidem pares
equis currunt. De iis fortè Plinius dum ita
scribit: Atrocissimos habet (scilicet India)
tauros sylvestres, majores agrestibus, velo-
citate ante omnes, colore fulvos, oculis cœ-
ruleis, pilo in contrarium verso, riçtu ad au-
res dehiscente, juxta cornua mobilia, ter-
gori duritia filicis omne respuens vulnus.
Feras omnes venantur: ipsi non aliter quàm
foveis capri feritate semper intèreunt. An
sint illi, quorum caudas tenuies admodum &
tenuis pili, tantique pretii, ut singulæ qua-
tuor vel quinque ducatis æstimentur, San-
giaci & Bassæ Damasci adhibent, ignoro.
Legimus etiam dari in India bovem, & in-
digete voce Ignaragnam nuncupari, dici-
que habitare juxta castrum S. Spiritus, aliis-
que quibusdam locis ubi frigus remissius est.
Animal esse immensæ molis, vescique her-
bis duntaxat, quæ rubri sint coloris. Corpo-
ris mole nostrates boves superare, pellem
habere similem elephantò, bina juxta pectus
brachia, sub quibus mammæ lateant, qui-
bus foetus suos enutrit. Capite atque ore bo-
ves nostrates referre. Carne esse suavissi-
ma, Indisque præcipuè expetita. Ex pin-
guedine liquamen parari butyro simile, quo
in condiendis cibis utuntur. Ossâ ejus duricia
eborivix cedere. *Vmbri* præcipue circa Clitu-
mnum amnem sunt quoque celeberrimi. Plin-
ius scribit, eam oram gignere omnium Ita-
liæ maximos, in quibus plurimi sint albi. *Sa-
binis* quoque spectati sunt: & legimus apud
Livium, bovem olim in Sabinis cuidam pa-
tri-

Arist. H. A.
1. 3. c. 21.

Plin. H. N.
1. 8. c. 45.

Ælian. H.
N. 1. 12.
c. 36.

Herodot.
1. 4.

Ælian. H.
A. 1. 3. c. 34.

Plin. H. N.
1. 8. c. 21.

Bellon. obs.
1. 2. c. 92.

trifamilias miranda magnitudine ac specie esse natum, cui monumentum miraculo fuerint Romæ in vestibulo templi Dianæ, fixa per multas ætates cornua. *Leutricorum* boum cornua atque aures ex una stirpe cognata, atque simul contexta esse testatur Aristoteles, ut citat Ælianus. In *Cathaje* provincia quadam sunt albi & nigri, equina canda, sed pilosiore, ad pedes usque protensa: pilos habent subtilissimos in modum plumæ volatilis, magno pretio, quos equites in cacumine lancearum suspendentes, egregiæ nobilitatis insigne ducunt. Cornua ab occipite in spinam tanta longitudine extenduntur, ut elevato capite cornibus attingant caudam. Sunt autem grandia cornua, ut incolæ amphorarum loco eis utantur. Apud *Mysios* nulla boves habent cornua, teste Æliano. Apud *Nigros*, nullæ vaccæ ruffæ, omnibus color niger vel albus, vel ex utroque mixtus. In Nomadibus qui ad Mæoticas paludes hyemant, & dies æstivos in camporum æquoribus vivunt, ex bobus pars sine cornibus nascitur, pars ferrulâ abscinditur. Tauri *Pæonii*, ut scribit Pausanias, hirto sunt corpore, cum omni ex parte tum præcipuè pectoribus & mentis. Theopompus verò referente Mizaldo apud *Pæonias* tradit boves tam magna gestare cornua, ut tribus vel quatuor vini sextariis vix adimplerentur; ex iisque reges ac proceres pocula conficere labris ebore aut argento obductis. *Hungaria* tam eorundem abundans, ut Sigismundus Baro Herbersteinus reliquerit, per solam viam Viennensem uno anno plusquam octoginta millia boum in Germaniam acta esse. Regio Comandu ab ejusdem urbe appellata in Persia, boves habet maximos & in universum candidos, cornua brevía & minimè acuta in capite gestantes, camelino gibbo dorso eorum imminente, teste Paulo Veneto. Unde tam robusti, inquit, redduntur, ut ad magna onera gestanda facillè assuefiant. Habentur tales & in Quivira. Tauri ibi (inquit Nieremburgius) quoddam genus sylvestre, fulva specie, humili corpore, incurvo dorso, frequentibus jubis, & laciniis promissis, eduli carne, salubri, nec injucunda. Cauda vescuntur incolæ, epotato cruore: pellibus proteguntur. *Phanicum* vaccæ ejus sunt magnitudinis, ut Phœnicum libri apud Ælianum habent, ut vel procerissimi pastores cum mulgent stent, minus proceri scabellum ascendere cogantur. In *Phrygia*, prodeunte Aristotele, boves cornua ut aures movent, quod & de Erythræis Ælianus prodidit. In *Norvegia* Islandia, Gothia, Feronia, sunt quidam sylvestres, nec homini nec aliis quadrupedibus parentes, quibus cornua vulgaribus minora, sub mento barba prolixa dependet. Venatores inter arbores se abscondunt: ipsi verò ab iis vulnerati vel in-

juriam ulciscuntur, vel seipfos inferunt. Facit & Vacca marina Olaus Magnus mentionem, atque de ea sic scribit. Vacca marina monstrum est magnum, robustum, iracundum, & injuriosum, edens partum sibi similem, sed non supra geminum, unum tamen sapius, quem plurimum diligens, secum sollicitè ducit, quocunque tandem se per mare transmittit, aut in terra gressus dirigit, decem mensibus impragnatur. Demum hoc animal aliquando CXXX. annis, per caudæ ipsius amputationem vixisse probatum est. In aquilonaribus quibusdam novi orbis provinciis, exertos elephantum modo dentes habent, si Carterio apud Rhamsium credendum. In *Cariæ* Scotiæ provincia supra Gallovidiam boves sunt, quorum caro tenera suavisque esui est, cæterum pingue nunquam concrevit, olei liquidi modo ferè semper fluens. Varro denique tradit, boves juxta Toronam, paucis ante partum diebus, lacte carere: reliquo tempore habere perpetuo. Ventrem ferè decem menses. De bobus Tartaricis in Ergimul, qui sunt elephantum proceritate pilo perenni, levi, ac prorsus albo aut profus nigro, qui in humeris more leonum prælongus est, non minus pedes tres, mira mollicie, perinde ac sericum, superius dictum. Ut & de gibbosis, quales Tartaricos Scaliger, Syriacos, qui palearia non habent. Plinius esse ait. Et tantum de Differentiis promiscuè. Huc pertinet animal, quod in Congo *Empalanga* vocitant, figurâ & magnitudine bovem referens, nisi quod & caput & cervicem gerat erectam cervorum more, cornua quoque habeat in capite recta & longa, nodosa in summitate, interius parum inflexa: quod quamvis etiam sit sylvestre, nemini tamen est molestum; neque adeo etiam est ferum, quia facili negotio aratro, si adestet incolarum aliquod ingenium, accommodari posset. Quantum ad Monstra, visus est Mediolani & Saturæ vitulus biceps: visus in Thuringiæ vico Sextipes, illeque gemino capite & uno podice: visus & septipes, massam carnis è latere dependentem gestans. Visus oculis, naribus & auribus humanis: biceps duplici facie: quodammodo bicorporeus: duobus tantum posterioribus pedibus & agnâ facie. Visus Basileæ Rauracorum an. 1551. bos quinque pedibus, qualem nos olim Londini in Angliâ vidimus, alibi alius cervice cornu gerens: & cruribus brevibus instar nani. Monstrum bicorporeum erectum quinque auribus, ut & caput vituli hic etiam expressum habebis.

Ælian. H.
A.l.2.c.51.

Paulus Veget.
lib.1.c.22.

Nieremb.
H.E.1.9.
c.51.

Ælian. H.
A.l.16.c.33.

Nieremb.
H.E.1.9.
c.19.

ARTICULUS II.

De Bobus feris.

PUNCTUM I.

De Vro.

BOves feri, Græcis ἀγροί qui ab agrestibus ἀγρεύλοις in eo differunt, quod hi quanquam mansueti sint & ex mansuetis orti, liberi tamen solutique in montium, sylvarum & agrorum pascuis relinquuntur; illi verò non tam natura loci quàm naturâ propriâ & genio ferè sint, sunt *Urus*, *Bison*, *Bonafus*, *Bubalus Africanus*, *Buffelus*, & *Bos Strepsiceros*. Uri nomen Gallicum Macrobius facit, Gesnerus & Aldrovandus Germanicum potius. Ur enim vel sylvestrem, vel magnum, vastum, & maximarum virium Germanis antiquis significabat. Servius tamen Græcum esse vult, & ab ἀγῶν id est, montibus deducit. Polonis saltem in Masovia & Samogitia *Tur* vocatur, quem Gesnerus veterum Tarandum esse judicat. Lithuanis *Zumbronem* dici, Scaliger se invenisse tradit. An Rhezès Iphicratis sit, alibi disquiretur. D. Hieronymus *Bubalum* appellat, quod & Martialis, & imperitum Romanorum vulgus, teste Plinio, faciebat. Cromerus *misfontem* appellat. In *Descriptione* discrepant aliquantulum authores, nisi forte diversa eorum sint genera. Cæsar & Plinius nullam villorum mentionem faciunt: Erasmus Stella, tempora villosa, & mentum barbatum, ipsis adscribit; quod & apud Albertum Magnum invenies, qui urum cum bonafo confundit. De cætero magnitudine sunt paulò infra elephantos, ut Cæsar prodidit, specie & colore & figura tauri. Albertus longitudine aliquando quindecim cubitorum facit. Magnitudinis illius hoc etiam est argumentum, quod in capite inter cornua tres homines confidere possunt. Hispidum habet & villosum corium, & sub mento palearia. *Cornua* densa, nigra, brevia; *Oculi* versus exteriorem canthum rubicundi. *Caput* crassum. *Facies* lata. *Color* ferè niger, sed maximè in temporibus, mento, collo. In facie, lateribus, cruribus, cauda, ad puniceum vergit. Reperitur in sylva Hercynia, Podolia, Samogitia, Mazovia, & Hungaria. Adfuescere ad homines; & mansuescere, ne parvuli quidem excepti, possunt. Excellentium est virium & velocitatis. Cornibus equum cum sessore correptum, in sublime identidem jactat; & arbores mediocri crassitudine evertit. Caro ejus condita in deliciis est magnatibus. Cornibus Barbari Septentrionales potant, unasque binas capitis unius cornua implent. Alii præfixa his pila cuspidant. Apud nos addit Plinius, in laminas secta translucent: atque etiam lumen la-

tius inclusum fundunt, multasque ad delicias conferuntur, nunc tincta, nunc sublitera, nunc quæ ceroftrata picturæ genere dicuntur. Fortè & taurus ille sylvestris, qui Macedoniam vastabat, ad pedem Orbeli montis Macedonia à Philippo Rege confossus, cujus pellem & cornua ὀρνυαῖα vel πωσαρανιδονάδωρα id est, quatuordecim palmarum, in vestibulo templi Herculis consecravit, urus erat. De capiendi ratione, vide Aldrovandum.

Aldrov. de Bifulcis l. 1. c. 2.

PUNCTUM II.

De Bisonte.

Bisontis vocabulum ab Germanico Visent dictum est. Oppiani codices βίσων habent, à Bistonìa fortè Thraciæ sylva, sed malè. Dion βίσωνες vocat. Plinius & ex eo Solinus, boves feris similes esse dicit, fetos, colla jubis horridos. Oppianus, jubam circa armos terribilem in crassâ cervice quaterere ait, nec non circa maxillas aut mentum. Cornuum mucronibus esse hamatis & aduncis, non inter se reflexis, sed sursum versus surgentibus, ut Gyllius vertit. Seu ut Gesnerus, non esse patula vel extensa, ut in cæteris bubus, nec è regione in diversum ad latera abire vel extendi, (epicarsion enim transversum est) sed rectâ surgere, ita tamen ut ὑπὸ sint, id est, dorsum versus inclinent, & circa finem hami instar tum recurva tum acuta sint, unde κύντρα ab acumine vocantur. Surrio jubati sunt & villosi circa collum, & in armos barba à mento propendente, pilis moschum redolentibus, capite brevi, oculis grandioribus, & torvis, quasi ardentibus, fronte lata, cornibus plerumque adeò diductis & porrectis, ut in iustres benè corpulenti homines insidere queant. In tergo extat gibbus elatior priore, & posteriore corporis parte humiliore. Cornu Gesnerus apud aurifabrum argento includendum vidit, nigredine splendens, duos dodrantes longum, aduncum instar unguium in rapacium avium genere. *Linguam* Oppianus asperam habere ait, ut cum lingit, sanguinem eliciat. De usu in Medicina hoc duntaxat habet Plinius. *Uros & bisontes Græci in experimentis non habuerunt, quanquam bove fero refertis Indiæ sylvis: portione tamen eadem efficaciora omnia* (quam ex domesticis scilicet bubus) *ex his credi par est, videlicet quoad medendi vim.* Hujus generis fuerint Tauri Floridæ novi orbis insulæ, quos *Butrones* barbari suâ linguâ nuncupant, prodente Ambrosio Pareo. Cornua gerunt pedalia, gibbum in dorso, Camelino similem. Pilo sunt prolixo & fulvo, cauda leonina. Nunquam cicurantur. Ex pellibus fiunt tegmina, quibus barbari adversus hyemis vehementiam utuntur. Cornibus verò quibus alexi-

Aldrov. Histor. Bifulcis l. 1. c. 3. Plin. l. c.

Oppian. l. 2. de venatione.

Hieron. l. 3. Com. in Amos. c. 3. P. in. H. N. l. 8. c. 15. Solin. Polyhist. c. 25.

Albert. H. A. l. 22.

Plin. H. N. l. c.



Monoceros Unicornu
Einhorn




Capricornq Marinq
Meer Steinbock



Monoceros Unicornu
Einhorn

Ouzger Aldro Wald Esel



Monoceros seu Unicornu Tubatus
Einhorn mit mahnen



Monoceros seu Unicornu aliud
Einhorn mit mahnen ein andr art






Capreolus capreolus



Capra montanus





Bos Stier
Junger Ochs




Vitulus

Kalb



Taurus
Ochs



Bison Wilder Ochs Wisent



Bubalus Indicus



Vacca Indica





Bifons Magnus




Bifon Lubatus




*Locobartus
Bifon*








Bubalus Africanus




Taurus





Bounafuf alius



Urus Iubatus Gewohnter Auer Ochs



Catoblepa Uras
Lijbicus





Bubalus Buffel




Alus Bubalq Taurus Syluester



Urus Auer Ochs







Bubali Iuvenci Iunge Buffel





alexiteriam vim inesse sibi persuadent, adversus venena se muniunt. Huc pertinet & *Bison Scoticus*. Candidissimum esse ajunt, in formam leonis jubam ferre, cætera mansuetis simillimum, verum adeo ferum & indomitum, humanique consortii hostem, ut quas herbas aut frutices humana contrectatas manu senserit, plurimos deinceps fugiat: captum autem arte quadam, mox præmoestitia mori. Cum verò se peti senserit, in obvium quemcunque magno impetu irruere.

PUNCTUM III.

De Bonafus.

Bonafus, Aristoteli βόνας, & βάλιν, & Pæonibus μόνας, sive ut alii scribunt μόνες incerta origine dicitur. Augustinus Niphus ab Alberto Magno qui Bonafum & Urum confundit deceptus, vaccam Indicam à recentioribus vocari scribit. Ita verò eum Aristoteles describit. Bonafus nascitur in Pæoniæ monte Mestapio, qui separat Pæoniam à Media regione. Vocant eum Pæones Monapum. Tauri est magnitudine: sed bove crassior. Neque enim longus est. Ejus corium distentum capit quantum est septem convivis. Cæterum species bovis est, nisi quòd habet jubam ad summos usque armos, sicut equus, verum pilus ejus mollior quàm equinus, & demissior: color pili flavus. Longus etiam crinis ad oculos usque pertinens. Color ejus inter cinereum & rufum: non qualis equarum quas Paroas vocant: sed squallidior atque subtus lanaceus. Atri aut gulvi vehementer, nulli sunt. Vocem similem bovi habet. Cornua autem curva & adverso inter se flexu curva, atque inutilia ad pugnam: magnitudine palmi aut non multo longiora: crassitudine singulis, quanta capi possit, non multò minus semisextario. Nigredo autem pulchra & nitida cornu est. Antix verò ad oculos usque pertinent, ita ut in latus potius, quàm antrorsum propendere videantur. Superioribus caret dentibus, sicut bos & alia cornigera omnia. Ciura autem hirta, & est bifidus. Caudam habet minorem quàm pro sua magnitudine: majorem tamen bubulâ. Spargit pulverem & terram fodit, tauri more. Corium est adversus ictum validum. Carne est suavi: idcirco eum venantur. Percussus fugit: delassatus subsistit. Tuetur sese calcibus, & stercore, quod ab sese quaternis passibus (pessimè Plinius trium jugerum longitudine posuit) ejaculatur. Cujus usus perfacilis est. Sæpè verò etiam comburit, adeo ut deglabrentur canes. Perturbato verò atque perterrefacto potest hoc efficere stercus: pacato non comburit. Feræ facies ac natura talis est. Imminente autem tempore pariendi, universi

in montibus pariunt: ac priusquam sobolem edant, circum locum alvum exonerant: tanquam ponentes munimentum. Emittere hæc fera largam quandam copiam excrementi hujus. Huc usque Aristoteles, ex quo sine dubio, quæ de hoc animali, apud Plinium, Solinum & Ælianum habentur, desumpta sunt. An cornua, vertebra, omoplate, & costa, prout eas Caimus ad Gesnerum describit, hujus animalis fuerint, incertum est. Cornuum longitudo pedum duorum erat, palmorum trium & digiti semissis: in ambitu ubi capiti jangebantur, pedis unius & palmi semissis. Spacium frontis inter cornua palmorum Romanorum trium cum semisse. Vertebra erat tantæ magnitudinis, ut nisi longitudine trium pedum Romanorum, & duorum palmorum cum semisse circumdari potuerit. Costa longitudinis sex pedum erat. De omoplate taceo. Iconem Capitis & ossium, apposui.

PUNCTUM IV.

De Bubalo veterum.

Bubali nomen confusum quidem non solum hodie sed & Plinii ævo fuisse videtur: nec peculiare aliquod apud Græcos nomen habet; & multi diversos sylvestres boves, præsertim in illis regionibus, ad quas aliunde adducuntur, bubalos appellant: quidam bubali, inter capreas relato, commune nomen esse volunt: nos tamen ab isto distinguimus: eumque sylvestrem bovem intelligimus, quem Aristoteles timidum esse, & sanguinem fibris carentem habere scribit, & qui cum Bove Africano idem est: De eo ita Scaliger, Bubalin, cujus sanguis & instrumentum pugnx cornua ab Aristotele descripta sunt, Plinius ait esse vitulo similiorem (cervove): Quid igitur ea sit? An Gazella? non sanè. Quare quod ex Africanis historiis percipere potui, tibi libenter impertitum curabimus. Africanorum boum parvitas tanta est, ut nostratium vitulorum vix æquent magnitudinem. Multi tamen roboris, ac doloris patientissimi sunt. Dant autem & Lant, & Elant invenio appellatum. Facie bubula est, sed ut minor, ita multò agilior & expeditior. Ejusmodi fertur esse celeritate, ut cursu feras omnes antevertat. Corium adeo firmum, ut cuius telorum ferreo generi sit impenetrabile. Sclopi tamen globulo pervium. Pilus eis albet. Æstate capiuntur, quod araneorum fervore ungulæ moveantur ac vacillent. Tantum Scaliger, Bellonius alium Bovem Africanum ita describit: Jam ætate, inquit, grandis erat, corpore minor cervo, sed habitiore & majore quàm caprea, tam quadrato & benè formato corpore, ut oculis gratus esset ejus aspectus. Nam ejus pilus flavus, adeo splendens &

Aldrov. Hist. de Quadrup. l. 2. c. 5.

Arist. H. A. l. 3. c. 6.

Scalig. Exercit. 206. f. 5.

Bellon. observ. l. 2. c. 50.

Aldrov. de Bifulcis l. 1. c. 4.

Aristot. H. A. l. 4. c. 71. ed. Scalig.

Plin. H. N. l. 8. c. 15.

lævis erat, ut expolitus videretur. Alvum magis rugis ruffam ad flavum colorem tendentem habet quàm dorsum, quod ad fuscum accedit. Bubuli pedes, brevique & firma illi sunt crura: Collum crassum & breve, exiguis præditum pælaribus: Caput bubulo simile: cujus vertici insident cornua nigra, & admodum incurva, ut Gazellæ, lunæque crescentis in modum inflexa, quibus haud multum se tueri potest, cum in sese sint recurva. Bubulis auribus præditus est, armos sublevatos & plenos habet: caudam ut Camelopardalis usque ad poplites promissam, nigris pilis fultam, duplo quàm equini crassioribus. Bovis mugitum habet, sed non adeò sonorum. Diverfus est ab hoc ille, cujus iconem Horatius Fontana ad Aldrovandum misit. Capite enimerat colloque longè procerioribus atque exilioribus: cornibus item retro inflexis, & ut in rupicapra incurvis. Aures pro capitis proportionem habebat majusculas, juxta colli initium: faciem cervinam, aut capreolum potius quàm bovem referentem. Quare à quibusdam inter Africanos capreolos referebatur. Totum animal excepto rostro & cornibus quæ nigricabant, flavescebat. Pilo erat longiusculo.

PUNCTUM V.

De Buffelo, & Strepsicerote.

Aldr. Hist.
Quadrup.
l. 2. c. 6.

Buffelum seu Bubalum vulgarem diversum à Bubalo Aristotelis esse, vel ex collatione historiarum utriusque patebit. Videtur autem eum inter boves sylvestres nullo expresso nomine reposuisse, dum scribit apud Arachotos (Indiæ civitatem) boves sylvestres esse, qui differunt ab urbanis, quantum inter suos urbanos & sylvestres interest: colore atro, corpore robusto, rictu leviter adunco, cornua gerunt refupinatiora. Fueritque fortè etiam iste noster buffelus, bos ille sylvestris niger, ex quo si sanguine ricini lumbi perungantur, mulieri tædium veneris fieri dicit Osthænes apud Plinium. *Descriptio* nostri sic habet. Animal est bovi simile, sed majus altiusque corpore valde crasso, cute durissima, membris macilentis. *Pilos* habet nigros, paucos, & parvos, in cauda ferè nullos. *Frons* est aspera, crispa, & intricata pilis. *Caput* ut plurimum prohum ad terram, parvum pro proportionem totius corporis. *Cornua* longa intorta & nigra. Albertus aliquando interius juxta collum pendere versus internam pectoris partem ait, aliquando erecta esse: *Collum* est crassum longumque. Inferior *dorsi* pars caudam versus declivis. *Cauda* ipsa brevis, parva, & nullis ferè pilis. *Crura* crassa, robusta, & reliqui corporis respectu breviora. Frequentissime in Asia, Græcia, Ægypto, insula Borneo, Siam, Italiæ urbibus reperiuntur. Circa Fundi quam plurimos vidimus. In aquis morari gaudet. Mugitus eis terribilis. Lac buffela habet, & tempore coitus, & in

principio partus, ut Niphus annotavit. Intuitu mansuetudinem præ se ferunt: irritati, (irritantur rubro colore) indomiti evadunt. Persequendo recta fertur, neque declinat. Crescentiensis tradit, ubi irascitur aquam ingredi, & se mergere ad os usque ut sanguis æstuans restinguatur. In hoc genere vacca alterius generis vaccæ vitulum non admittit, sed odore agnitum rejicit: sin autem vitulus vaccino stercore illinatur, decepta odore, lactat & pro suo educat. Laboris est patiens. Ferreus aut æneus circulus per nares ei trajicitur, cui alligato fune, vel habena, ducitur ac regitur. Tradunt si nimium sit onus decumbere, nec vel verberibus posse ad surgendum cogi, nisi levato prius onere. Carnes ipsorum Romæ venales prostant, & Iudæis sapore suo blandiuntur: verum tanto lentore præditæ sunt, ut in parietem adactæ tenacissime adhæreant. Casei, quos Pistoriensis ager copiosè subministrat, Marzolinorum nomine, figurâ ferè ovali, bubulis longè præferuntur, utpotè palato gratiores. Ex ungulis vel cornibus annuli fiunt, qui si in digitis vel manuum vel pedum subinde gestentur, mirificè adversus spasmos laudantur. Sunt qui iisdem quaterna fila ex totidem metallis, auro, argento, ære, & ferro fabricata innectunt, sic efficaciora futura credentes. Ex corio fiunt vestes ac præcipuè thoraces. In Narfinga equorum ornamenta eo teguntur. Siamenses ex cornibus arcus conficiunt. *Bos Strepsicerotus* à turbinata cornuum constitutione ita dicitur. Facie capreolo potius quàm bovi similis est. Cauda tamen bubulam habet, quamvis breviusculam. Totum animal colore cervo ferè simile.

Aldr. Hist.
Quadrup.
l. 2. c. 7.

ARTICULUS III.

De Ove.

A Bovis historia ad Ovis descriptionem transimus, Ægyptiis olim sacræ, & apud Athenienses tanti æstimii, ut & actio contra eum institui juberetur, qui vivum excoriat, ut Plutarchus testatur; & antiquâ lege statutum esset, ne quis ex grege centum capita habente, pecudem intonsam aut quæ non peperisset, jugularet; quod apud Athenæum habemus; qui etiam addit, suo tempore in Palladis sacrificiis, neque agnam mactatam, nec caseum gustatum fuisse. Adde, apud Romanos, olim non nisi ovium boumque impendio mulctam dictam, prodente id Agellio: ibidem homicidii noxium, poenam arietis damno fuisse, ut in legibus Regum, scribente Servio, extat; oves denique olim apud Persas, & Medos inter tributa numeratas fuisse. Cappadoces enim Persis L. M. Medi duplum pendebant. Et ne longius abeamus, scribit Ambrosius Nolanus, à Stabiis quotannis magnum & album agnum, cum cornibus auratis, Nolam ad Præfulem tributi honorisque nomine mitti. Nil interim de eo dicam, quod agnina caro

Plut. de esu.
carn.

Athen. Di.
pen. 19.

Agell. l. 11.
c. 1.

Aries

Wieder



Vervex Hamel

Agnus Lam



Ovis Peregrina



Vervex aliud



Vervex alius Peregrinus



Ovis Arabica





caro iis qui gryphos enodabant, nec non poetis, præmium erat. Unde *Ἀγρωδοί* dicebantur, qui agni præmia caneant. Inter Nomina Ovis apud Latinos est, Ovis, Aries, Agnus, Adasia, Minæ, Apicæ, Lanata, Bidentis, Pecus. Ovis nomen est foemellæ. Festus tamen ab antiquis masculino genere, cum de mulcta scil. agebatur, usurpatum scribit. Ab isto vocabulo est *Oviaria* ovium multitudo, à qua & oviarium pecus dicitur. *Aries* vocabulum est maris: *Agnus* illius quæ nondum annua excessit. *Adasia* vocatur, teste Festo, vetula recentis partus: *Matrices*, quæ agnos nutriunt Palladio, quas Florentinus *πυάδες* dixit, pascales, quæ passim pascuntur. *Minæ* quæ ventre sunt glabro. *Apicæ* quæ non amplo sunt corpore, nec multam lanam circa totum corpus habent. *Lanata*, epithetum ovis est, sed sæpè pro ove ponitur. *Bidentes* sunt oves duos dentes longiores cæteris habentes, quales in hostia esse debebant. Dicuntur & *Ambidentes*, & *Duidentes*: quamvis & apud Festum ambidens & bidens, quæ superioribus & inferioribus est dentibus, vocetur. *Pecorum* nomen iis quidem animalibus accommodari solet, quæ sunt aut ad vescendum apta; aut usui hominum accommodata: Plinius tamen pecudem sapiissime pro ove ponit. Apud Græcos haud pauciora & Ovis & Aries habent nomina. Dicitur namque illa, *ἀμνία*, *ἄμν*, *βάρα* Laconibus; *βηκίαις* apud Hippocratem interpretatur Varinus *περβαίαις*. Ethymologus *βότα* exponit *περβαίαις*. *γῶτα* Hefychio & Suidæ ovis est; *διδός* bidens, *δικυμα* oves quæ gemellos peperere: *ἐγγυλον* ovis lac habens, *ὄστρον* est ovis mollis lanæ, *ιερεῖον* ovis immolanda, *μετῶσαι* oves agnos sub uberibus habentes, seu *πὰ ὑπὲρ τὰς πλάγας περβαίαις*, *μεσσηλικές* mediæ ætatis inter agnos, & jam majores natu oves. *Κὰρ κάρν*, *καρὸς*, *εἰς*, *ὄξ*, *πῶν*, *ρήνες*, nomina sunt ovis simplicia. Aries vocatur *ἄρχα*, *κρὸς*, *δενείος*, *δεδμῖον*, *ἐθελίς*, quod nomen exfecto sed verveci propriè competit, *ἡλ* gregis dux, *μοσχίας*, *ὄκρ*, *ῖας*, quod tamen nonnisi de sylvestri accipitur, *ὡς τὸ τὰς ἀκρῖας βάλλειν*, quod per vertices montium eat. Ad vervecum differentiam, qui arietes non castrati, Nefrendes dicuntur illi, qui castrati non sunt. *Ἄρς*, *ἀμνός*, *ἔρσας*, *καθῆ*, *κίλλιξ*, *ὄρ*, *περβαίον*, *περήγες*, *σικίται*, *τρεωνόν*, *φάγλον*, agnorum sunt apud Græcos nomina. *Descriptioni*, non est quod immoremur. Notissimum namque animal est. Memorabilissima tamen apponemus, quorum & authores mentionem fecere. *Caput* itaque ipsi infirmissimum natura tribuit. *Cerebrum* *αὐχμηρόν* hoc est, ut Theodorus vertit, squalidiusculum, seu minus pingue. *Cornua* tenuiora foeminis plærumque, multis nulla, agnis aliquando ab ipso partu connata, arietum generi in anfractum, ceu castus, convoluta, aliquando plura quàm bina.

Cardanus verveces quatuor cornibus insignes se vidisse scribit. Hic tricornis & sexicornis iconem exhibemus. Evirati cornuum situm mutant, eaque è contrario gerunt. *Oculi* habent in latera despicientes, maximè inter se distantes, fuscis aut subnigris, & patulos. *Labra*, in suo genere, tenuia, contra ac in bobus. *Dentes*, continuos, quorum ovipauciores quàm arietis. Petrus Crescentiensis scribit mutari post annum unum & dimidium, nempe duos anteriores, & postea per sex menses duos proximos, deinde cæteros, ita ut tribus annis vel ad summum quatuor ejiciantur omnes. Junioribus esse dentes inæquales, in statu æquales, ætate provecis discalceatos, hoc est, à carne denudari, minui, & corrumpi. *Ventres* ipsis, ut in ruminantibus plures. Apertos agni exhibemus, ubi, A. ventriculum, B. Reticulum, C. Omasum, D. Abomasum denotare scito. *Testes* ad crura deciduos. *Mammae* foeminae binæ, totidemque papillæ. *Fel* apud Chalcidem Euboicam parte quadam nullum, in Nexo adeò copiosum, ut exuperantia prodigii loco habeatur. *Ælianus* hic duplex esse ait, in Ponto etiam nullum. Addit, in regionibus perfrigidis, cum nive & hyeme vehementi anni tempus infestum est, fellis expertes esse, intraque ovilia compulsum, novo pabulo non uti: ineunte vere, cum ad pastiones proficiscitur, felle impleri, quod ipsum Scythicis ovibus usu maximè evenire solet. In Scepsi regione *Lienem* habent minimum; ubique rotundum. *Renes* æquabiles, & densius circa ipsos sebum, si pingui undique obducantur, intereunt, idque pubertate pabuli, ut in Sicilia, agro Leontino. Unde sero diei agere oves ad pascua, pastores loci illius solent, quo minus capiant pabuli. Bellunenensis testatur in arietibus castratis, in Syria, adipem inter cutem & carnem abundare, ut in porcis. *Pedibus* anterioribus ac posterioribus, concretio quædam inhæret, parte quâ terram calcant, (verba sunt Lemnii) vermiculi subrotundâ formâ, lanuginosa intus, ac crinitâ congerie, qualis est in rosarum spongiolis, ac calicibus, quibus semen includitur, molli tenuique lanugine implicitum: Eximi autem tale quiddam sæpius ex decoctis ejus pecudis pedibus teredini, qui vermicoloso ac carioso ligno inesse solet, aut nucibus avellanis planè adsimile. Opiliones autem pastoresque ovium eâ sunt opinione imbuti, nullum hoc animante in cursu fore velocius, nisi tale quiddam articulis quibus fulciuntur, subesset. Caulis *caudæ* villosus est. *Pellem* à Borea penetrari Hesiodus negat, quod tamen pilis seu lanæ potiustribuendum est. *Locum* si spectes, nullibi ferè non inveniuntur: in quibusdam tamen majore copiâ, minore in quibusdam. Quomodo verò ratione locorum differant, in Differentiis dicemus. Quantum

Aristot. de generat. animal. l. 5. c. 1. Arist. H. A. l. 2. c. 3.

(Ventres agni aperti. T. b. n. 3.)

Aristot. de partib. l. 4. c. 2. Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Ælian. H. A. l. 17. c. 26.

Lemnii de Naturæ miracul. l. 3. c. 5.

Locus.

Nomen.

Description.

Cibus.

tum ad *Cibum*, sunt animalia *ποφάγα*, seu herbivora, quamvis & frondibus pascantur.

Columella
R. R. l. 7.
c. 2, 3.

Ex herbis sunt jucundissimæ, quæ aratro proscissis arvis nascuntur; deinde quæ pratis uligine carentibus. Fastidium præbito fale occurritur, quod velut ad pabuli condimentum per æstatem canalibus ligneis impositum, cum è pastu redierint, lambunt. Hyeme frondibus ulmeis, fraxineis, & betulinis, & fœno autumnali, quod Cordum vocatur, commodissimè vescuntur: Cytiso quoque & sativa vicia, & si necessitas urget, ex leguminibus paleis. Vinacea & furfures alicubi modicè obijciuntur. Quæ in locis maritimis aut saluginosis compascunt, largiore lacte, & caseo gratiore abundant, multoque fœcundiores evadunt, & teneriores ac suaviores carnes proferunt; quales oves præpingues in Ostiensi agro, eique finitimo Portuensi, decimo ab urbe lapide, qui Tiberi fluvio interfluente, multis hinc inde paludibus, atque etiam salinis sunt circumfusi, sese reperisse & gustasse tradit Gomefius.

Gomef. l. 1.
de Sale.

Unde & Aristoteles author est, oves quæ salisculam aquam bibunt, maturius coire, & à partu fale fruenter, ubera magis distenta lacte demittere. Albertus etiam scribit, in quibusdam terris marinis, in quibus sicca & falsa habentur pascua, oves per 20. annos vivere, atque etiam parere. In Scotia vescuntur per inculta loca cytiso. In India & maximè Præstiorum regione herbis liquida pluviam rorantibus. In Ponto amarissimo absinthio pinguescunt, quod Alexander Mynidius Æliano autore prodidit. De Laserpitio ita Plinius. Laserpitio vesci solita pecora, primoque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in modum jucunda, & alibi. Si quando incidit pecus in spem nascentis, hoc deprehenditur signo, ove, cum comederit dormiente protinus, capram sternutante.

Plin. H. N.
l. 19. c. 3.Strabo
Geog. l. 15.

Apud Iudæos nuclei palmarum illis apponebantur, qui etiam fabris ferrariis apud Babylonios pro carbonibus erant. Delectantur etiam, coluthea, aphace, herba lanaria, gemmis vitium, adiantho, galli cristâ, thymo, ericâ, apud Brabantos inprimis, hœdera, apiastro, ut Theocritus prodidit, Eryngio denique. Apud Ichthyophagos, & circa Calamos vicum Indiæ, si Philostrato fides, in provincia Aden, si Paulo Veneto, piscibus aluntur. In Lydia & Macedonia ex iisdem pinguescunt. Quantum ad *Potum*. Albertus turbulenta & multâ aquâ pinguescere ait. Plutarchus aquam imbris ubi statim à vento immittitur, laudat. Vitalis de Furno, æstate septentrionalem frigidam, hyeme meridionalem tepidam deprædicat. Varro aquæ mutationem huic pecori nocere, saltem eo tempore, quo fit admixtura, scribit.

Plutarch.
qu. 2.Varro R.
R. l. 2. c. 2.
Coitus &
Pavrus.
Arist. H. A.
l. 5. c. 14.

Oves aniculæ coeunt & uterum ferunt, teste Aristotele, præstantiorem proles quam senescentes mares & fœminæ procreant.

At Columella vult fœminam bimam submitti, & usque ad quinquennium fœturæ necessariam esse, septimo deficere. Florentinus in tertio anno matrices probat. Aristot. autem ad octavum usque parere ait, imò, si benè curentur, vel in undecimum, quod & apud Palladium invenies. Notandum verò etiam, arieti naturale esse agnas fastidire, senectam ovium consecrari, ut ait Plinius, additque, & ipsum senectâ meliorem esse, illisque utiliore. Coitus verò omnibus ab Aristoteli occasu, quod est à tertio Idus Majas, ad Aquilæ occasum, id est, ad decimum tertium Calend. Augusti, ut Plinius prodidit; idque ideo, quod quæ postea concipiunt, fiunt vagrantes & imbecillæ. Columellæ tamen primum admixturæ tempus verum Parilibus, si sit ovis matura, si verò fœta, circa Julium mensem. Ferunt quinque mensibus, & pariunt, maximâ ex parte singulos, sed aliquando etiam binos, ternos, & quaternos. Alicubi pariunt geminos, tum pabuli beneficio, tum si pater aut mater vim eam geminandi per naturam obtineant. Sunt & loca, ubi bis terve pariunt, ut in Differentiis dicemus. Terno sapius aut quaterno coitu implentur, & aliquando toti gregi unus aries sufficit. Pariunt nonnunquam & monstra. Albertus, Cinirum vocari scribit, qui ex ove & hirco nascitur. Apud Helvetios, teste Gesnero, nascuntur capræ posteriore parte, anteriore oves vel arietes, sed vivere non possunt, & paulò post moriuntur. Albertus *Musmonem* ex capra & ariete nasci, refert. Apud Columellam verò refertur, ex ovibus & arietum ferorum coitu fœtum conceptum paternum colorem retulisse, eumque similiter durasse per sobolem & nepotes: lanam verò, in primo quidem fœtu hirtam: sed in nepotibus & deinceps molliorem fuisse. Ejus autem coloris fœtus erit, cujus venæ linguæ in prægnante sunt. Mares aut fœminæ vi tum aquarum tum admixturarum generantur. Aristot. verò docet, astringinos flatus captandos esse, si fœminæ generari debent: septentrionales, si mares. Idem efficies, præeunte Plinio, si arieti lævum vel dextrum testem ligaveris. Quod de aqua ex Aristotele dictum, probat Pausanias, dum ait, ex Charadro fluvio bibentia pecora ut plurimum mares parere. Ut verò coitum arietum, fale, vel genitalium fale & nitro perfrictione excitant: sic & conceptio à quibusdam, pinguedine nempe nimia, impeditur. Ex congressu de anni felicitate præsagium fumitur. Nam si majores natu tempestivè libidine incitantur, annum esse felicem gregi pastores confirmant: si minores, infelicem. Post ordinarium coeundi tempus concepti, Cordi antiquis vocantur. Inter Oves & Capras occulta quædam amicitia viget, idèò simul libenter pascuntur. Ex arietinis cornibus tufis & defossis, aspara-

Plin. H. N.
l. 8. c. 48.Arist. H. A.
l. 5. c. 14.Columella
R. R. l. 7.
c. 3.Sympatbia
& Antipatbia.

ragos nasci, quidam scripsere, negat Dioscorides. Si eadem sepeliantur ad radicem fici arboris, fructus ejus citius maturefcere, scribit Albertus Magnus. Quæ de vesper-tilione produntur, inter magicæ vanitatis specimina reponit Plinius. Inimicitias creduntur fovere, cum lupo, urso, tigri, elephanto, lupo imprimis, corvo, aquila, serpentibus, apibus, eruca. Stirpes verò iisdem noxiæ sunt, Aconitum, Nerion, Evonymus, Sabina Sanguinaria, Polygonum, Numularia, Calamogrostis, Anagallis, Ervum, Glans, Duvæ & Thapsia. Quæ de lupi intestinis, tympano, & aliis dicuntur, alibi examinabimus. Sanguinariam si comederint, toto ventre diftrahuntur, & spumam quandam tenuem tetri odoris exspuunt. Calamogrostis comesta sitim, maciem, & tabem invellit, & sanguinem in ventriculum elicit. Duvam (herba est apud Gallos, sic iisdem vernaculè dicta) si gustaverint, innascuntur in jecore parva quædam animalia nigra, quæ similiter Duvæ vocantur. Ervum noxium est, quod mense Martio feritur. Si glandem copiosius comederint, abortum faciunt. In Attica Thapsiæ radicem nontangunt, peregrinæ depascunt, & aut alvus solvitur, aut intereunt. Tonitru consternatis, si aliqua non concurrerit, abortit. In Thracia verò, ut Bellonius prodidit, binas Turcæ putant esse stellas, Julio & Augusto noctu apparentes, sibi planè verticales, quarum splendorem si oves caput artollentes conspiciant, intereant. Ideò tum sub teëtis habentur. Vitam ad denos annos, sed magnâ ex parte pauciores vivunt. Facit tamen & loci diversitas ad longævitatē. Albertus namque in quibusdam locis siccis & marinis ad viginti annos vivere scribit. Aristoteles, duces pecoris ad quindenos. Oves Æthiopicæ ad duodecem & tredecem annos vitam agunt. Vox ipsis propria balare, Græcis βληχάδην. Homerus tamen μηκῶδρας dixit agnos, & apud Claudianum, agnos grundisse, leges. Peculiarem in coitu habere, Aristoteles author est. Quantum ad Naturam, Ingenium & Mores ovium, adeò sunt stolidæ & amentes, & homo περὶ γὰρ ὠδῆς & ἀμνοκῶν, pro stolido & fatuo nominetur, & in proverbium abiverit, nullam ovium utilitatem esse, si pastor absit. Mansuetæ sunt eadem, & cum cætera animalia in partu vel à partu sævire soleant, hæc, teste Aristotele, non sæviunt. Quamvis autem quacunque occasione perhorrescere Quintus Calaber innuere videatur: agnos tamen audaces Horatius dixit. Præter pastorem & canem itineris ducem arietem habent, quem tamen pastor primò instituit, videreque è stabulo egressas militari quasi ordine incedere, præsertim si à pastore, cujus vel sibi-tilum intelligunt, depositæ fuerint. Arietes pugnacissimos esse, simul ac ipsi cornua

increfcere incipiunt, notum. Non modò sui generis similes, sed & alias, hominem adeò ipsum, incessunt. Sævitia repellitur, si, mensuræ pedalis, aculeis confixam tabulam, adversam fronti cornibus religaveris, vel cornua secundum auriculas quâ curvantur inflexu terebrâ perforaveris; vel etiam castraveris. Eosdem per sex menses hybernales sinistro incubare lateri, ab æquinoctio verno supra dextrum latus, quomodo scilicet sol ab eodem tempore dextrum hemisphærium, reliquo ambit sinistram, quod Macrobius & Ælianus prodidere, experientia falsum est. De cætero, amat hoc pecus frigidos fontes: radicitus herbas carpit, & arbores destruit: lac per octo menses habet: antecedente hyeme copiosius avidiusque pabulum ventri ingerit, quasi de viatico pro futura indigentia sollicitum, frigoris est impatiens, quamvis vestitissimum: illæ tamen minus perhorrescunt, quibus cauda amplior. Eum sequi solere, qui vellere aures ipsarum obturaverit, Mizaldus prodidit. Agrestes cum consenuerunt, à propriis foetibus aluntur. Agnos odore posteriorum noscere, apud Albertum legimus. Cubant difficiliter quàm capræ. Foemina urinam crassiorē reddunt quàm mares. Menses ipsis & capris tempore coeundi indicari, idemque post coitum etiam fieri ad tempus, mox desistere, donec parturiant: tum denudò indicari: itaque pastores proximum esse partum intelligere: à partu autem purgationem sequi abundè; primum leviter cruentam, postea valdè, Aristoteles author est. Agnina veteribus despiciatū fuisse, quidam, & inter eos Turnebus, credunt: Plautus tamen coram fuisse Romæ, tradit: & Horatius in deliciis reponit; ut exta agnina jam memoratus Comicus: Athenis quondam interdictum fuisse ne quis intonsum agnum in cibo sumeret, Athenæus author est. Modicè verò est calida, cum superflua humiditate, quæ quò agnus juniór, copiosior. Ideò etsi robustis utilis, infirmis tamen ventriculo, quòd viscoso humore adhæreat noxia: quanquam Crescentiensis anniculos commendat. Columella autumnalem verno præfert. Capita inter delictiores cujusdam convivii cibos numerantur. Agnus Syringatus, Terpianus, Pasticus, diversi apparatus sunt nomina. Arietina caro minus est humida, & si benè concoquatur, sanguinem laudabilem generat, maximè castratorum. Donatus Antonius Ferrus, vervecinam omni ætati, regioni & tempori si sit juvenis, bimula, mediocriter pinguis, & in optimo aëre sicco, optimisque herbis educata, convenire ait; talesque esse asserit verveces, qui in sublimi Trivicano monte nutriuntur: secus

Bellon. obser-
v. l. 3. c. 51.

Ætas.

Vox.

Arist. H. A.
l. 4. c. 4.
Naturæ,
Ingenium,
Mores.Vfus in
Cibo.

autem esse, qui humidis aluntur in locis, & propterea in Campania nullo ferè precio haberi. Bellonius longè sapidiores esse iudicat, si integri, quod pastoribus in Thracia supra Nessum fluvium fuetum, assentur. Athen. l. 4. Testes apud Athenarum inter delicatiores cibos censentur. Medullam inter venena, cui phasiani caro obsistat, reposuit Arnol-
 dus: at Homerus, Aftyanaëta ea vesci fuisse solitum, author est. *Ovilla* saporis est ingrati, nimis humidi, & mali succi. Quia æstate minus quam verno tempore convenit, idè in quibusdam locis, magistratus post Divi Jacobi festum, id est, vicessimum quintum Julii, mactari prohibet. Pedes non exempto vermiculo, ut sup. monuimus, nauseam stomacho inferunt. *Armus* elixus & refrigeratus sæpè editur. Ex *pulmone* minutal fit. Ex *jecore* apud Helvetios Tigurinos, Gesnero referente, tomi quadrati, qui omento circumvoluti, & herbis odoratis aliquando, verubus ligneis transfixi, in craticula assantur. Sunt qui integrum diligenter cum medulla panis contundunt, & per linteum vel cilicium transmittunt, deinde aromatibus ad saporem coloremque commendandum, modicè inspersis, fervefaciunt, & turdos in iure carniū elixos, ac modicè butyro frixos imponunt. *Lac* est tanto melius quanto recentius, idem de Caseo sentiendum. Improbatur etiam nimis falsus. *Medicinam* quod spectat, agni morsui venenato, calentes, post cucurbitulas impositi, venenum extrahere Ætius prodidit: ius in quartanis utilissimum esse Brunus: *Cerebrum* mania conferre, ex quodam manuscripto Gesnerus. Decoctum *pedum* doloribus vesicæ Plinius. *Testiculos* arietis tritos & cum aqua poros, comitialibus. *Pulmones* arietum excrecentes in ulceribus carnes ad æqualitatem reducunt: assus præsumptus ebrietatem arcet: Livores & fugillationes minutatim concisus & impositus statim sanat, & nigras cicatrices ad candorem perducit. Est ejusdem & in purgatione uterorū usus. *Iecur*, oculis cruore suffusus, eximiè prodest, si pariens infletur, idem meracius præbendum in cibo, suadet Hippocrates. *Lien* tostus & in vino tritus potusque ileo resistit, si Plinio credimus, qui alibi hoc superstitiosum recenset. Pecudis lien recens, mágicis præceptis super dolentem lienem extenditur, dicente eo qui medeatur, lieni se remedium facere. Postea jubent eum in parte dormitorii ejus tectove includi, & obsignari annulo, terque novies carmen dici. *Vesicam* ovillam ustam bibendam jubet præbere Galenus his, qui se in somno permingunt, idemque remedium Mizaldus repetit. *Fel* pecudis cum melle aures purgare prodidit Plinius. Eodem tolluntur porrigines, cum terrâ Cimolia illito capite, ut inarescat. Cum suo sevo lenit podagras. *Lac* laudatur contra omnia vene-

Bellon. ob-
serv. l. 1.
c. 60.

Athen. l. 4.

Homer. I-
liade 10.

Usus in Me-
dicina.

na, præterquam buprestin & aconitum. Contra quartanas quidam, referente Plinio, tres cyathos ante accessionem, cum fimi hirundinum drachma unâ, fumi jubent. Sextario si quis adjiciat Cnici purgati denarios quatuor, & decoctum ita bibat, molliet ventrem. Alvi exulcerati fluores & tenesmi, eodem ignitis calculis decocto sisti, Dioscorides tradit. *Serum* ventrem movet, & bilem expurgat. De *Butyro* hæc apud Plinium reperiuntur. Reduvias & quæ in digitis nascuntur pterygia, tollunt canini capitis cinis, aut vulva decocta in oleo, superillito butyro ovillo, cum melle. *Casus* vetus dysentericos recreat, & in cibo sumptus, vel rasus & cum vino potus, cæliaco medetur. *Cornu* arietis ustum & cum oleo contritum, atque inde derasum, à quibusdam ad crispandum capillum adhibetur. *Ungula* cinis cum melle muris aranei morsum sanat. *Coagulum* contra pastinacam & omnium marinorum ictus vel morsus, drachmæ pondere ex vino fumi, scripsit Plinius. Infantibus etiam, qui lacte concreto vexantur, præsidio est, ex aqua potum: aut si vitium coagulato lacte acciderit, discutitur coagulo ex aceto dato. Sistit itidem sanguinem ex naribus subditum vel infusum, si alia non prosint. De *sevo* notandum est, aliquando simpliciter, aliquando ex renibus, vel omento privatim nominari. Quidam innominatus, eo ad ignem liquato linteum intingi, & parti adustæ imponi jubet, atque ita curari asserit. Pernionibus cum alumine, teste Plinio, imponitur. Vetus cum cinere è mulierum capillis, furunculis medetur. Ex omento, præcipuè à renibus, admixto cinere pumicis, & sale cæteris verendorum vitis medetur. *Medulla* agni ad ignem liquefacta, cum oleo nucum & saccharo albo & epota, calculum vesicæ dissolvere dicitur, si Alberto credimus. *Urinam* ovis rubræ aut nigræ, idem, hydropi perutilem esse scribit, sed præcipuè, si cum melle fuerit mixta. Quantum ad *stercus* & *fimum*. Medicus quidam in Myfia, teste Galeno, ovium utebatur stercore ad acrochordonas, & myrmecias, & thymos, & furunculos duos, quos clavos nominant, aceto videlicet diluens; quin & ulcerum ambusta ad cicatricem illo ducebat, nempe, stercus hoc cerato rosaceo commiscens. Fimus ex aceto illitus apud Dioscoridem, epinyctidas, clavos, pensiles verrucas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cerato exceptus. Galenus ex oleo tritum, instar cataplasmatidis imponi jubet, ad vulnera recentia gladio aut ligno illata. Magna vis & in cinere fimi, inquit Plinius, ad carcinomata, addito nitro, aut cinere ex ossibus feminum agninatorum, præcipuè in his ulceribus quæ cicatricem non trahunt. Fimo quoque ipso ovium, sub testa calefacto & subactò, tumor vulnere sedatur. Ad dolorem coli-

Plin. H. N.
l. 29. c. 2.

colicum hoc est Marcelli. Stercus ovis montanæ mense Septembri, deficiente luna pridie inclusæ, manè excipies, & sole durabis, atque in pulverem rediges, & habebis in vase vitreo sive stanneo, cum usus exegerit. Cochleare plenum, colico ex aqua calida, si febricitaverit, sin minus, cum vino per triduum dabis. *Vellera* pura aut per se imposita, cæcis doloribus, aut accepto sulfure mederi, testatur Plinius, tantumque pollere, ut medicamentis quoque superponantur. Pugnacis arietis è medio cornuum lanas suffitas, Nicolaus Mirepsus imponi jubet, loco dolenti in hemicrania, doloremque sedari promittit. Cinis crematarum ex Dioscoridis sententia, crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more uruntur. Quidam detonsam eam, alii evulsam decisis summis partibus siccant, carpuntque, & in fictili crudo componunt, ac melle perfundunt utrumque. Alii hastulis tædo subjectis & subinde interstratis, oleo aspersam accendunt, cineremque in labellis aquâ additâ, confricant manibus, & confidere patiuntur, idque sapius mutant aquam donec linguam adstringat leviter, nec mordeat, tum cinerem reponunt. Vis ejus septica est, efficacissimeque genas purgat. Lana succida, quæ colligitur ex ovibus tonsis inter æquinoctium vernum & solstitium, quo tempore sudare cœperunt, laudatissima quæ de collo demitur. Subveniunt tales lanæ teste Dioscoride, inter initia vulneribus percussis, desquamatis, lividis, ossibus fractis, aceto, oleo, aut vino imbutæ: siquidem facile succos combibunt, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem (sic Oesypum vocant) emolliunt. Canis rabiosi moribus inculcata post diem septimum solvitur, teste Plinio, reduviasque sanat ex aqua frigida, ex oleo calido humidis apposita medetur, ut ait Marcellus. Refert Herodotus, Pænos pastores in filiis quadrimis, venas verticis lana succida inungere, nonnullos venas temporum, ne unquam scilicet pituita è capita defluens, officiat. Quod si pueris inurendis spasmus contingat, urina hirci aspersa eos liberari. Si talum aut ungulam bovis vomer læserit, picem duram & axungiam cum sulfure & lana succida involutam, candente ferro super vulnus inuri jubet Columella. Plinius sanguinem è naribus lanâ succidâ, ait sisti, cum oleo rosaceo, & alio modo auribus sapius obturatis indita: sed & alibi silit, si articulos extremitatum præligaveris. *Oesypo* seu sordibus lanis inhærentibus, Galenus concoquendi vim tribuit, cum aliqua digerente facultate. Dioscorides cum *Ætio*, excalescere, ulcera explere, & emollire ait. Apud Plinium, vulvæ inflammationibus &

fedis rhagadiis, & condylomatis, cum butyro & meliloto, medetur. Secundum eundem vulneribus medetur cum hordei cinere & ærugine æquis partibus, ad carcinomata quoque ac serpentina valet. Erodit & ulcerum margines carnesque excrescentes, ad æqualitatem redigit. Igni sacro medetur cum pompholyge & rosaceo. Somnos allicit cum myrrhæ momento, in vini cyathis duobus dilutum. Maculas in facie cum melle Corsico, quod asperrimum habetur, extenuat. Quomodo & colligatur & paretur, vide apud Aldrovandum. Sylvius denique, nescio quo authore, cutim pedum & rostrorum bovis & ovis lento igne diu coqui tradit, donec veluti coagulum remittat, idque exemptum, siccatumque, in aëre perflatili ad hernias commendari. Et tantum quidem de usu in Medicina. Dantur & in externis quidam. Lana enim vestitus est materia: sed & pelles humani corporis sunt operimentum. Bedevini ex Arabum genere Vitriaco teste, plarumque iis vestiuntur. Zeno etiam Citicus apud Laërtium, Cratem Thebanum ovis pellem pallio suo insuisse scribit. Vultanus quoque Vigarniensis in Anglia Episcopus vestitu ex pellibus ovinis usus est, quod non lynces Dei, sed agnus in templis cantaretur. In tragœdiis etiam earum usus, unde qui gestabant *ἀφ' ὀφείας* dicebantur. Cavendum tamen est, ne ovium quæ peste periere pelles adhibeantur. Pauci enim ex talibus, non phthiria sin modò, sed & facrum ignem gignunt. Mirum verò quod scribit *Ælianus*; ex ovis à lupo demorsâ lana vestis, pruritus in corpore ejus excitat quicquid vestietur. Ex eadem lana cingula fiebant, quibus novæ nuptæ apud Romanos præcingebantur. Pescia, in Saliari carmine capucia ex pellibus agninis fuere. Mollostans vocat Festus pelles ovillas quibus galæ tegebantur. Earundem pellium usus loco chartæ fuit. Ventre Diophanes ad necanda animalcula noxia utitur. Ex testiculis arietinis crumenas olim factas, Cicero ad Herennium innuere videtur. Suffiscus etiam folliculus est testium arietinorum Festo, quo pro marsupio utebantur. Intestina minora ad fides & arcuum nervos adhibentur. Mense Majo caseum coagulabimus syncero lacte, coagulis agni vel hædi. Urina nitri factitii materia est. Ossa manubriis cultellorum inserviunt. Stercus agris utile. Candelam ex syncero arietis sevo, scriniis tenui linteolo insertam, vestiariam supellectilem à tineis inoffensam custodire, Mizaldus tradit. *Differentias* à pilo seu lana, & loco sumemus, easque promiscuè trademus. Aristoteles Scythicas pilo molli esse ait, Sauromaticas duro. Horatius Tarentinas pellitas cognominat, quod mollioris sint velleris. Colonicæ dicebantur, hirsutæ, quod quæ agris colebantur. Cujus iconem hic damus. Eadem &

Visus in externis.

Laërt. l. 6.

Ælian. H. A. l. 1. c. 8.

Differentia.

Montanæ dicuntur, unde ἐρεσὸν ὑπόθρον ex squallida & non pectinata lana. Sunt & feræ oves, non quidem multò nostris domesticis, ut Gillius ex Oppiano tradit, majores, sed certè ad currendum velociores, & ad pugnandum fortiores, tum retortis cornibus, tum infestis, & robustis frontibus armatæ. Sæpè in sylvis apros impetuosos ad terram abjiciunt, interdum impetu facto inter se pugnant. Julius Capitolinus testatur, suo tempore extitisse Gordiani sylvam memorabilem, in quâ picta tum continerentur, tum alia diversa animalia, tum oves feræ centum. In Adimain Lybiæ solitudinibus, animal est formâ arietinâ, aselli magnitudine, aurium oblongarum & pendularum, lanam curtam gerens, & fessoris patiens, tametsi non ad eum usum, sed ad lac habeatur. Contra quam nostratibus fœminis cornua, maribus nulla. In desertis Lybiæ frequenter reperiuntur, alioquin rari, licet plerumque in agris Numidiæ videantur, quod prodigii loco habent. In Ægypto lana ovium, pilo propior quam lanæ, teste Plinio, ex qua vestis detrita usutingeritur, rursusque ævo durat. Ibidem oves majores quàm in Græcia; Circa Damiatem, verveces rotundis & tam amplis caudis spectantur, ut vix eas sustineant. Leo Africanus se, quæ pondere libras quinquaginta, aliquando centum viginti æquarent, vidisse scribit. In Æthiopia non habent lanam, sed camelorum pilis hirsutæ sunt, quod Diodorus Siculus, Ælianus & Strabo prodiderè. Johannes Bohemus verò parvas esse addit, & incolas caudâ hujus pecudis pudenda sua obtegere. In Nubia arietes cornuti nascuntur, nec modò mares, sed & fœminæ cornua gerunt, cui miraculo æquandum est, quod ibidem oves, teste Plinio, quarto nonnisi die bibant. Tuneti etiam prout in Ægypto reperiuntur, adeò crassas caudas habentes, ut se loco dimovere non possent: verum qui eorum curam gerunt, caudam exiguis vehiculis alligantes, gradum promovere faciunt. In Anglia præter rorem cœlestem nullum bibunt potum, & de industria à fontibus arcentur, quod experientia docuerit, bibere ipsis exitiale. In Arabia quædam tricubitales trahunt caudas prodente Herodoto, quædam cubitum latas ut apud Ælianium legimus. Tales vel his similes in Arabia Petrea & Felice inveniuntur. Cauda aliquando vigintisex, aliquando quadraginta quatuor libras pendit. Ibidem arietes sunt usque in terram criniti. Hic, qui sub nomine Indici datur, sed revera Arabs, cornibus omninò caret, lanam habet promissam, cauda terram contingit. Arietis species est aries Moromorus, ut eum Nierenbergicus vocat, Rafus est, & stupiditatis quodam gestu solet consistere, & ferene attendere obvios, aliquando territatus aufugit cum sarcinâ. Aries verò Gui-

neensis seu Angolenfis ita à Marcgravio describitur. Magnitudine arietis nostratis. Caput habet crassum arietinum, occipitio tamen magis prominente quam in nostratibus: aures pendulas: caudam usque ad suffragines pendulam: scrotum magnum, & penem in medio ventre: cornua parva deorsum usque ad oculos incurvata & quasi torta: ad collum inferius, jubam habent pendulam longis pilis constantem, in reliquo corpore breves pilos hircinos: nullam lanam. Caput & aures sunt nigrae; caudæ quoque dimidia pars ab exortu, reliqua pars alba: ad occipitium pili sunt albi; crura anteriora usque ad genua alba, inferior medietas nigra; posteriora crura tota nigra & circa anum corpus & dorsum album; in lateribus autem nigras habet maculas. Crura & pedes habet, altos hircinos, duabus ungulis nigris. Variant tamen hæ oves colore uti nostrates; & quædam species caudam habet tibiam humanam crassam ad suffraginem usque pendulam & pinguem; caret illa species juba illa ad inferius collum. Lanam quoque non habet, sed pilos caprinos. Grandiores sunt nostratibus & ingluvie pendula instar bovis. In Asia rubram quædam habent lanam. Regio Camandu, si M. Paulo Veneto credimus, non minores asinis alit, illasque pulcherrimas & pingues, quarum cauda octoginta libras aliquando pendat. Canusinis lana est ruffa, seu fulva. In Chio sunt parvæ staturæ inopiâ pabuli, sed caseum ex iis laudatissimum fieri, Ælianus author est. In Clazomeniorum agris, teste Hermolao, pecora procreari ajunt, aliis locis leucophæa, aliis pulla, aliis coracino colore. Coraxinorum lanitium omnium pulcherrimum, teste Strabone; Ideò admissarii arietes talento emuntur. Apud Cretensis in Ida monte, sunt, oves pastoribus Striphoceri dictæ, cornibus erectis, ut unicornu, in ambitu canaliculatis, & cochleæ in modum contortis. Arietem nostratem magnitudine non superant. In Erythræa insula, quæ fortè Gades, ovium lac, serum propter pinguedinem non habet; quin & intra triginta dies suffocantur, nisi aliquid sanguinis detractum fuerit. In quadam Scotiæ regione, si Hectori Boëtio fides, flavæ habentur oves, dentium aurei planè coloris; carnes habentes croceas, & lanas. In Gortynide, Oppianus, referente Æliano, tradit oves esse ruffas & quadricornes. In Gothlandia, si nos Olaus M. non fallit, arietes sunt, quibus quaterna vel octona cornua crescunt, à quibus tantum ferociæ mutuuntur, ut sibi & aliis animalibus nisi ferrâ demantur, incommodent. Lanam habent mollem & longam. Hirta ex Hebridibus una fert oves vel maximos hircos altitudine superantes, cornua bubulis crassitudine æquâ, sed longitudine aliquantum etiam

Scalig. Ex.
217. n. 8.
Johan. Leo
Africa l. 7.

Diodor. Sicul. Biblio-
thec. l. 4.
Ælian. H.
A. l. 17.
c. 10.
Strabo l. 7.

Bellon. obs.
l. 2. c. 60.
Herodot.
l. 2.
Ælian. H.
A. l. 10. c. 4.

Nierenb.
H. E. l. 9.
c. 52.

Marcgr.
Hist. Brasil.
l. 4. c. 10.

Strabo. l. 3.

Oppian. de
venat. l. 2.

Olaus l. 17.
c. 1.

Boët. in de-
script. Sco-
tiæ.

etiam superantia, præter caudas in terram usque prominentes. In Hispania, tempore Marinei, tanta erat ovium copia, ut multos se ibi nosse scribat pastores, quorum unusquisque ovium XXX. M. possedisset. In eadem agnos melius quam alibi nutrire Julius Alexandrinus author est. Apud Illyrios ferunt pecora bis anno parere, & quidem plarumque geminos, multa verò etiam ternos, & quaternos, quandoque quinos. Lactis quoque sesquicongium ab eis emulgeri. Indorum oves, apud Ælianum, ad maximorum asinorum magnitudinem accedunt, quatuor factus cum plarumque pariunt, tres cum minimum. Caudæ longitudo ad pedes usque pertingit, quæ etiam matricibus, tum ut facilius ineantur, tum ut ex adipe earum oleum exprimatur, absconduntur. Arietum quodque diffecantur, & adipe exinto, iterum consuuntur, & quidem tam exactè, ut ne vestigium quidem cicatricis appareat. Quorum icones arietum hic damus, unuserat sine cornibus & cauda, loco ejus nescio quid habens extuberans, & sub mento veluti palearia, totus candicabat, præter caput & extremas ungulas, quæ erant nigra. Alter erat insigniter mutonatus, reflexis & convolutis cornibus, quæ, ut & totum caput, coloris erat cornei: rorstrum autem, pedes, & testes caudæque pars inferior candicabant, cætera ruffus. Istriæ seu potius Liburniæ ovium lana, pilo propior quam lanæ, ut ait Plinius. In Italia genus quoddam ovium esse, Gesnerus ex amici relatione scribit, quod naturâ, quaterna aut sena cornua aliquando gerat, sed imbecilles easdem, & lanâ inuili. Laodiceæ in Asia breves oves, villo summam nobilitatem habent, teste Plinio. Inter Lusitanæ fertilitatem, quam Athenæus ex Polybio describit, agnis trium vel quatuor obulorum precium esse consuevisse ait; fuem, quæ ad centum librarum pondus accedat, quinque drachmis in coenam emi, ovem duabus. In Lybia citò apparent cornua in capitibus arietum. In Macedonia qui candida sibi nasci pecora volunt, ad Aliacmonem ducere: qui nigra aut fusca ad Axium, Theophrastus tradit. In Madagascar reperiuntur oves caudis maximi ponderis. In Magnesiâ & Mesopotamia bis pariunt. Milesiæ tertium bonitatis locum obtinent. Apud Moscos, in desertis campis circa Borysthenem Tanain & Rha, ovise est sylvestris, quam ipsi Seigios vocant, narrante Barone Herbersteinio magnitudine capreolæ, brevioribus tamen pedibus, cornibus in altum porrectis, & quibusdam circulis notatis (ex quibus Mosci manubria cultellorum transparentia faciunt) velocissimi cursus, & altissimorum saltuum. Nabathæi, referente Strabone oves habent albas. In Naxo duplici sunt felle. Apud Panchæam plurimum ab aliis molli-

tie differunt. In Perù oves ad asellorum magnitudinem crescunt, longis cruribus, crasso corpore, capite longo, collo & effigie quasi cameli, carne optimâ, agnorum maximè. Castratos aratum duci, & dorso ferrè ligna: non clamare, colore esse albo, nigro, & cinereo. Quinquaginta onerum pondo sustinent, & tergo sublatum, ad aliquot passuum millia vehunt: vesci tamen si urgeantur, sedentes, ore converso ringentes, foedo odore conspurcant, si onustæ sint; tum humi se acclinant, nec inde ullâ verberum vehementia, nisi penitus clitellis exonerentur, propelli possunt. Lanæ tenuitate, longitudine & copiâ nostras superant. Frumento vescuntur, sed adeò pauci sunt & cibi & potus, ut triduo imò quadriduo abstineant. Mathiolus nobis eius exactam descriptionem dedit, dum ait: Refert hoc animal partim camelum, partim cervum, adeò ut rectè quidem Græco idiomate *ελαφοκάμηλον* appellari posse crediderim. Longitudo totius corporis à cervice ad caudam sex pedum est: altitudo verò à dorso ad pedis plantam, quatuor tantum, & colli longitudo à scapulis ad cervicem, duum. *Capite, collo, ore*, superioris præsertim labii scissurâ, ac genitali Camelum ferè refert. At *caput* oblongius est: aures habet cervinas, oculos bubulos. Anterioribus *dentibus* in superiori mandibulâ caret, sed molares utrimque habet, ut bisulca ferè omnia, & ut illa etiam ruminat. *Dorso* est sensim prominente, quod per injuriâ a pictore neglectum est. *Scapulis* propè collum depressis, *lateribus* tumidis, *ventre* lato, *clunibus* altioribus: & *cauda* brevi spithamæ ferè longitudine: quibus omnibus cervum ferè refert, quemadmodum etiam *cruribus*, præsertim posterioribus. *Pedes* illi bisulci sunt, diducta anteriori parte divisura. *Ungues* habet acuminatos, qui circa pedis ambitum in cutem crassam abeunt. Nam pedis planta non ungue, sed cute ut in multifidis & in ipso Camelo contegitur. *Retromingit* ut camelus, & *testes* substrictos habet. *Pectore* est amplo, sub quo ubi thorax ventri connectitur, extuberat globus; ut in Camelo, vomicæ similis, è quo nescio quid excrementi sensim manare videtur. *Color* colli, cervicis, pectoris & anteriorum crurum est illi albus, reliqui vero corporis subruber, vel ex nigro rufescens. Rorstro tamen est nigro & anterioribus cruribus à genu albicantibus. Cicur ac mansuetum est animal, sed frigoris impatiens, ut alia quæ ad nos è calidis regionibus afferuntur. Neminem offendit: sed miro admodum ingenio a billata se vindicat injuria. Nam ubi aliquis illud vexet, vel circa clunes opprimat, non calcibus aut morsibus se defendit, sed vomitu vel cibi vel humoris in vexantem retrosum cum impetu ejaculato, ad protensam colli longitudinem. Salacissi-

mum hoc esse animal, id mihi conjecturam facit, quod cum sui generis fœmellis sit destitutum, magnâ cum prurigne capris se commisceat, non tamen erectis, ut aliâs capræ hirco ascendente solent, sed humi ventre accubantibus, ita cogente animali anterioribus cruribus. Itaque superascendens coit, non autem, ut falso de retromingentibus animalibus affirmat Aristoteles, averis clunibus. Adeo venere vernali autumnali-que tempore stimulat hoc animal, ut illud viderim humile quoddam præsepium avenâ refertum conscendisse, genitaleque illi magno cum murmure tamdiu confricasse, quousque semen redderet, plurimis una hora replicatis vicibus. Non tamen concipere capræ hujusce animalis femine referre, tum, quod, ut puto, vi coactæ illi prostiterint continuo balantes; tum quod cum hoc animali earum non conveniat species. Indicam ovem appellabat hoc animal, qui illud ad nos advexit, atqui à nostris ovibus quantum distet, turpse judicare poteris. Hactenus Mathiolus. Ab his plurimum differunt, oves illæ Chilenfes, quarum iconem istam Belgæ attulerunt. Satis omnia quadrant, inquit *de Laëtius*, quoad corporis compositionem; præterquam quod postici pedes ungulas bifulcas habeant, priores autem in quatuor divisos ungues, & quod prolixis admodum villis lanæ vestiatur, quam inprimis commendant. Cæterum natura bene convenit cum præcedentibus, ita ut haud dubium sit unius generis animal esse, tantum ratione coeli sub quo degit variare: nisi forte inter utrumque sit distinctio illa, quam observavimus in descriptione Ind. Occidentalis; ut omnino existimo. Sputum ejaculatur in vexantes; & scribit P. Alonso d' Ovaglie in Historica Relatione Regni Chill, vulgo credi in parte corporis humani quam sputum illud contigerit, scabiem generari. Pollentia juxta Alpes, oves habet cani velleris, apud Martialem extat. Apud Rhætos, arietes sex vel septem annorum ad priora cornua alia veluti adnata, parva, bina, vel terna producant, illaque non ante quintum aut sextum annum adnascuntur, primis robore & crassitie proficientibus. Sauromaticæ duro sunt pilo. Syriæ cubitales ovium caudæ, plurimumque in ea parte lanitii. Circa Tarnasari urbem Indiæ, oves conspici, cornua damis haud ab similia habentes, nostris longè majores, Aristoteles author est. Vifi & Monstrosi agni, quorum etiam hic Icones damus. Unus erat capite fuillo; alter duobus capitibus & quinque pedibus. Tertius pedibus equinis & capite simiæ. Quartus triceps. Quintus, dorso duplici conjuncto, pedibus octo.

Martial. l. 1.
x4. Epigr.
x57.

ARTICULUS IV.

De Capra & Hirco domesticis.

IN historia hac, de Capræ primo, mox ^{Aldrovand. de Bifulcis c. 9.} Hirci, tandem Hædi nomine, in principio agendum est. Capras à carpendis virgultis dictos esse scribit, Varro, Cicero, & Nonnius. Festus tanquam crepas vult dici, quod cruribus crepent. Martinius à καπῖω voro, quod sit animal πικιλόφαρον, deducit. Pro ætate & sexu variant nomina. Græcis dicitur αἴξ ab αἰσίν ruere, & cum impetu ferri. Dicuntur verò αἴγες tam ἐρεμφοί recens natæ capræ, quàm χιμάροι, quæ sunt anniculæ, vel mediæ ætatis, & adultæ quæ τεάγροι, licet hoc nomen maribus duntaxat competere videatur. Synonima occurrunt plurima. Modernis Græcis vocatur γίδα, Tyrrhenis κάπρας, Cretensibus καρανώ. Hefychius μήκλας, & αἰγίνας vertit capras; κεραίδες sunt capræ fœmellæ quæ cornua ut plurimum habent. κηλάδες capræ in fronte signum habentes instar calli. μυαάδες, quæ mulgentur: ὄννης agreitis: χιμάρα hyeme nata. Grammatici tamen χίμαρον, pro omni caprario genere, omni ætate & utroque sexu inter pretantur. Sed & μυία & μηκάδες capræ sunt. *Hircus*, qui Sabinis fircus, vel ab hirsuto, quod ab Ebræo חרס adurere, quod animal sit libidinosum, dicitur. Græcis est τεάγρον, vel à τεάγην & τεαγέην edere, quod vorax sit: vel ὡς τὸ τεαγὺ δέρμα ἔχειν, à pellis asperitate: vel ὡς τὸ τεέχειν, currendo. *Capri* nomen obtinuit, qui castratus est: Ægyptiis Mendes. *Hædi* est id quod ex capra & hirco nascitur. Ab Ebracio potius חרס quàm quasi fœdus dicitur. Martialis fætum quæzulæ rudem capellæ appellat. Hefychio & Ethymologo dicitur ἐριφον, Varino ad tres vel quatuor menses, postea χίμαρον dici, donec pariat & mulgeatur. Rhodiis audit κάρανον, aliàs etiam κερύφαλλον, aut κρήδεμνον. Δισκαλαμάσσειες in quadam lege dicuntur, quod frugum calamos depascere. Bifulcas esse capras, & cornigeras, haud uno loco Aristoteli proditum. Colorem mutant, & interdum variè generantur. *Pilus* differt sexu. Crassus est hircis, mollis & tenuior capris. Et quia hoc genus apprimè hirsutum est, ideò Festus, densorum pilorum homines hircipilos vocavit. *Cornua* omnibus esse negat Plinius; verum in his quibus sunt, indicia annorum per incrementa esse affirmat. Sunt autem ea longa & acuta. In Delo insula, prodente Varino, visum est hirci bicubitale cum dodrante, ponderis librarum viginti sex. *Oculus*, quos in angulorum angustias contrudit, habet aliquando dissimiles; In tenebris splendere lucemque jaculari Plinius prodidit. *Naso* sunt simæ. ^{Plin. H. N. l. 28. c. 11.} *Den-tes* capræ superiores non sunt præter primos geminos, ut idem ait, & pauciores alii quàm hircis, quod prodidit Aristoteles.

De-

Dependet mento omnium *villus*, qui aruncus, spirillus, Græcis *ῥεγγυ*, secundem quosdam *κρύγι* dicitur. Noneolas vocari tradit Festus papillas quæ ex faucibus caprarum dependent, Varro mammillas nuncupat, lacinias Plinius, verruculas alii. Binas in feminibus mammas habent: pedes macilentos. Per aures & nares spirare, præter Alcæonem vel potius Archelaum, Ægypti sapientes quoque credidere. Philes lignum addit, quod naso obstrueto nihil offendantur. Oppianus id de sylvestribus credidisse videtur, dum eis meatum quendam à medo inter cornua loco ad pulmones pervenire, cui cerâ infusâ suffocentur, scribit. Bartholomæus quoque Eustathius, huic sententiæ accedere videtur, dum se aliquid simile in homine invenisse prodit. Aristoteles tamen in contrarium nititur. *Tecur* extractum diu moveri ajunt. *Ventres* sunt plures. *Lien* rotundus. *Aspera arteria* talis qualis in homine. Quantum ad *Locum*, in aquilonaribus terris abundant. In Creta magna ipsarum copia, quod lupis careat. Ithacem Telemachus apud Homerum *αἰγίβοτον* vocat. In Rhetia Helvetica præstantes caseoli capri ni fiunt, præcipuè iis in locis, qui circa thermas Fabarianas montani fiunt. Reperiuntur quoque in Achaja, Africa, Nubia, Sardinia, Cephalonia, Mileto, Damasco, India, novo orbe, Hispania, Corsica & cæteris locis, de quibus in Differentiis agemus. Terram pascendis aptam, Græci *αἰγίβοτον*, *αἰγινόμον* & *αἰγίβοσκον* vocant. *Cibum* & *potum* si attendas, *πιπιλο φάγοι* sunt. Inprimis verò frutetis, arbuto, alaterno, cytiso agresti, iligneis & quernis frondibus, maximè gaudent. Ex glande, si circâ satietatem data est, abortum facere, Columella author est. In deliciis quoque habent oleam, ideò Minervæ inimicæ; vitis tenellos palmites, ideò Libero patri immolabantur; ficus & farinam, teste Æliano, fraxinum, tamariscum, barbam hircinam, & rosam caninam. Fabæ largius datæ, copiam lactis efficiunt: ut & pentaphyllon, si prius quam bibant, quinque dierum spacio ipsis vorandum detur. Ejusdem rei gratia, & dictamnium ventribus alligatur. Vorant alicubi scamnoneam, veratrum, clematidem, & teste Lucretiæ, cicutam. De Ladano libet Plinii verbis uti. Arabia, inquit, Ladano gloriatur, fortè casuque hoc, & injuria fieri odoris, plures tradidere. Capras maleficum alias frondibus animal, odoratorum verò fruticum appetentius, tanquam intelligant pretia, carpere germinum caules prædulci liquore turgentes; destillantemque ab his (casus mistura) succum, improbo barbarum villo abstergere. Hunc glomerari pulvere, incoqui sole. Et ideò in ladano caprarum pilos esse. Recentiores tradunt sylvas Arabum pastu caprarum refringi, atque ita succum

villis inhærescere. Verum autem ladanum Cypri insulæ esse, similiterque & ibi fieri tradunt, & cespum hircorum barbis genibusque inhærens, sed edera flore derosso, pastibus matutinis cum est rorulenta Cyprus. Deinde nebula sole discussa, pulverem madentibus villis adhærescere, atque ita ladanum depecti, &c. Vulgatissimum porro pabulum gramen est, aculeatis inprimis foliis, capriola Ruellio, quod præ cæteris grata sit. Salsedine delectari, nec tortoribus ignotum. Dracula Transalpinæ Hungariæ præfectus, sæpenumero captivis Turcis pedes excoiatis contuso sale perfricuit mox capras adhibuit, quæ linctu cruciatum augerent. In *potu*, aquæ stagnantes & mortuæ, quæque diu in vasis steteret, improbantur. Albertus, cum movetur, post meridiem, plus aquæ potaturas dicit. Prodigiosum, quod in Zacintho Antigonus notat, nempe, quo tempore spirant Etesia, capras hiantes stare versus boream, eoque contentos, aquam non requirere, neque bibere. *Capra* sunt admodum veneræ, teste Plinio. Ideo mense septimo & adhuc lactantes incipiunt coire: idemque tradit, animam ipsis quàm ovibus ardentior, calidioresque concubitus. Anniculæ etiam coeunt, & terno aut quaterno concubitu implentur: quod si à coitu imber accesserit, abortum infert. Quinque mensibus uterum ferunt. Pariunt maxima ex parte singulos, sed aliquando & binos, & ternos, & quaternos. Si clementia aeris & pabuli accesserit his pariunt. Fertilitas ad octo annos durat. Aristoteles tamen tota vita coire asserit, & gemellos parere, si pater aut mater vim eam geminandi à natura obtineat. In trimatu sunt inutiles. Pinguedine sterilesunt; Commodissimum tempus coeundi hybernium solstitium. Unde Plinius. Concipiunt Novembri mense, ut Martio pariant turgescuntibus virgultis. Quidam ad denas capras singulos adhibent hircos, alii ad quindecim: nonnulli ad viginti. Quomodo educari debeant, ad Oeconomicam pertinet. Vehementiorem coitum si excitare volueris, genitalia, delibutis multo sale & nitro manibus perfrica: vel eadem pipere, aut urticæ fructu perunge. Seminalem humorem capris ante coitum & partum destillare, Aristoteles author est. Idem, ubera illarum quæ coitum non patiuntur, à pastoribus montis Oetæ urtica vehementer perfricari, ut dolorum infligant, prodidit. Inde primò cruentus humor elicitur, mox purulentus, postremò lac non minus quàm ex iis quæ venerem passæ sunt. Idem de mulieribus tam viduis quàm virginibus Albertus scribit. *Amicitiam* colunt, cum ovibus, tigris, sargo, pulegio, & eryngio. De ovibus non est quòd quicquam dicatur. Tigri, si hædus porrigatur, abstinet cibo per biddum;

Aristot. H.
A. l. 1. c. 11.

Locus.

Isidor. l. 14.
c. 6.

Cibus &
potus.

Generatio.
Plin. H. N.
l. 8. c. 5.

Varro R. R.
l. 2. c. 3.

Arist. H. A.
l. 5. c. 14.
& l. 6. c. 19.

Plin. H. N.
l. 12. c. 17.

Aristot. H.
A. l. 6. c. 18.
Aristot. H.
A. l. 3. c. 20.

Sympathia
& Antipathia.

duum: tertio die efuriens aliud poscit, nisi porrigatur, caveam convellit, hædo verò, tanquam contubernali suo parcit, quod Plutarchus prodidit. Sargus piscis umbra quoque ipsarum delectatur, & stantes in littore, attingere gestit, ad saliendo per naturam inhabilis. Pulegium à capris gustatum, si Plinio fides, balatum concitat, indeque Græci quidam literas mutantes blechon vocavere. Si verò eryngii caulem capella morsu defectum ore sustulerit, totus statim subsistit grex, relictoque pascendi studio, novo veluti spectaculo attonitus, non prius mirari rem desinit, quam pastor caulem illum abstulerit. *Inimicitia* ipsis cum lupo, pardali, elephanto, caprimulgo ave, saliva humana, melle, evonymo, vite, & conyza. Lupus capras devorat. Pardalis easdem invadit. Elephas exhorret. Caprimulgas avis ubera fugit. Unde uber emoritur, caprisque cæcitas, quas ita mulsere, oboritur. Humanam salivam vitare, Ælianus reliquit. Hausto melle debilitantur, si Alberto fides. Evonymi folium & fructus capras interimit gustatus, nisi purgantur: purgantur autem anocho, quod quid sit, vide Aldrovandum. Aquam si biberint in qua folia rhododendri maduere, pereunt. Iisdem & Sabina venenum. Oleam si lambendo linguâ contigerit, primo germinata sterilefcit. Pulmo assus ebrietatem prohibet. Conyzam edentes moriuntur siti eneætæ. Egolethrum herba in Lycia, eisdem exitium. Inde nomen fortira. *Vox* ipsis est apud Græcos *μηράδω*, id est mutire, ut Hespianus vertit. Unde Homero *μηράδες* vocantur. Apud Latinos, & balare, quod commune cum ovibus & fremere. Inde *φειμάσσαν* de hircu. Varinus *ἐν* hircinæ vocis imitationem esse asserit. Mobiles sunt & celeres. Unde Varro in Soracti Fiscelio capras feras, è saxo, pedes plusquam sexagenas salire scribit. Frigores potius quam æstus sunt impatientes: fætæ inprimis, quæ gelicidio hyemis conceptum fecere. Amant potius dumeta quàm prata, & campestem situm: asperisque etiam montosis ac sylvestribus optimè pascuntur. Ita autem inhaerent rupibus, ut infra eas intuentibus videantur pendere. Unde caprarum & hircorum grex, *αἰπόλιον*, quasi *αἰπόλιον*, sublimium conversatio dicitur: ipsæ verò *πέτρα αἰγίλιπες*. Proximè etiam ripas vago passu lasciviant, comam fluviū tondentes. De *Carnium* caprarum qualitate non convenit inter authores. Hippocrati sunt cruditatis, flatulentia & ructuum generatrices. Minus tamen æstivo tempore, quo melius pabulum habent noxiæ. Autumno deterrimas Galenus fecit; hyeme, meliorem sanguinis consequi habitum, & naturalem intemperiem à temperatura temporis contractum corrigere. At Athenæus, si conficiatur, etsi olida sit, plu-

rimum alere, plurimumque corpori robur addere, reliquit: Clitomachumque Carthaginensem novæ Academiæ sectatorem solitum ferri dicere, quendam athletam Thebanum, omnes suæ ætatis viros superasse, quod caprinis carnibus vesceretur, tenacibus illis, & concoctu difficillimis, quarum esu olidus è corpore sudor, manaret. Militarem cibum esse, Homerus in Achille legatos Agamemnonis excipiente, ostendit. *Lact*, inter cætera lactis genera moderatè se habet; etsi minus quàm humanum temperatum. Est tamen & in eo, si ætatem, passionem, anni tempus, & spaciū quo à partu edito distant, discrimen. Sine melle periculosè sumi, author Galenus, quod in ventriculo coaguletur. Minus idem alvum tentat, nisi scammonio & aliis vescantur. In quibusdam Orientis locis, tertio mense ab lactari infensos, eodem ali solent. Lactis naturam *Cæsus* sequitur. At *hircorum* carotum ad coquendum, tum ad bonum succum generandum, deterrima est: libidinifque inprimis tempore vitatur & fætet. Apud Antiphanem tamen *καὶ ὁ ὕλησάπας* in convivio apponitur. Testes quoque & jecora damnantur. De *Hædina* non est una authorum sententia. Sanctis in V. T. olim in deliciis: Ascræus Poëta *ἄρχυμον καὶ ὀπτεπλον* vocat. Platina post Galenum, domesticorum animalium laudabilissimam esse, quod parum recrementi haberet, facile concoqueretur, benè aleret, sanguinem calido & frigido temperatum generaret, scripsit. At Brujer. de re cibaria l. 14. c. 17. rinus eas vituperat, quod capræ febre nunquam carerant: nec possit sanum temperamentum à matre morbida fæsus fortiri. Jul. Alex. Salubr. l. 11. c. 7. asserit; sed naturalem quæ in adultis est siccitatem, teneritudinem ætatis emendare, & ad temperamentum quoddam ducere: simul lactentes, minimè quidem ætatis ratione, verum alimenti beneficio, de nativa caliditate aliquid remittere, & humectiores tenerioresque fieri. Olim etiam apud Ethnicos, in conviviis circumferebantur, lasere & aliis conditæ. Sanguis in cibum formatus, sanguiculus, teste Plinio, dicitur. Formabatur & in cibum: Unde *μέλας ξωμός* apud Lacones: & Pollux *αἰμαλίαν*, obsonii genus exponit. Jecinora & pulmones quomodo coqui debeant, vide apud Apicium. Magni & in Medicina usus. Ideo Plinius, millia remediorum ex capra demonstrari dixit. Democritus etiam effectus ejus augeat, qui singularis natus sit. Carnes caprinæ comitialibus in rogo hominis tostæ exhibentur, ut volunt apud Plinium Magi. Hircorum in aqua decoctis panos & apostemata discutunt. Jure caprino cantharides expugnantur. Drusus Tribunus plebis *caprinum sanguinem* bibisse dicitur, cum pallore & invidiâ veneni sibi dati insimulare Q. Cepionem

Plin. H. N.
l. 20. c. 14.

Plin. H. N.
l. 9. c. 3.
Theophr.
de anima-
lib. quæ in-
vident.

Plin. H. N.
l. 10. c. 40.
Ælian. H.
A. l. 7. c. 26.

Aldrovand.
de Bisulcis
p. 270.

Natura
mores, in-
genium.

Varro R. R.
l. 2. c. 3.

Columella
R. R. l. 7. c. 6.

Usus in Ci-
bis.

Galen. de
alim. facult.
l. 3. c. 1.

Athen. Di-
pnof. l. 9.

Galen. de
boni & ma-
li succi ci-
bis c. 6.

Ludovic.
Roman.
l. 5. c. 20.

Brujer. de
re cibaria
l. 14. c. 17.

Jul. Alex.
Salubr.
l. 11. c. 7.

Usus in Me-
dicina.
Plin. H. N.
l. 23. c. 10.

Plin. H. N.
l. 23. c. 9.

nen inimicum vellet. Eodem maculas contractas ablui Marcellus scribit. Tormina intestinorum & alvi fluores sistere in farta-gine frixum, apud Galenum, & Dioscori-dem habemus. *Hircinus* abscessus calidos citò maturat: in cerato quodam podagri-co apud Ætium admiscetur: lusciosos sanat: herbis diureticis nutriti, aridus & tritus inque vino cum petroselino sumptus, calculosis vehementer prodest. Quomodo & quando colligi debeat, apud Aldrovandum vide. Medicamentum hoc manus Dei vocatur. Paria ibidem ex Marcello, Fuchsio, & aliis invenies. Adamantem eo solvi & emolliiri magni authores, inter quos Scaliger & Joubertus prodidere. Si in sanguine eodem & succo senecionis vitrum efferbuerit, aut maceratum fuerit, reddetur tam molle, quàm est cera vel argilla, ut quidvis ex eo fingi possit: pristinae naturae restitues, si aquae immerferis. Hoc est Geberi, Alberti, & ingeniosi cujusdam Bituricensis vitrarii secretum, quod ille moriturus Antonio Mizaldo, ut ipse memorat, ultrò donavit. Idem cum aceto mistus sanguinis vomitui & excreationi prodest. *Serum* commodè illis, qui mordicatione patiuntur, aut in recto intestino, aut in colo, injicitur, quod ob crassitiem citius concresecat, ut Galenus docuit. Secundum Avicennam magis resolvit quàm cætera, cum melanthio, sulfure, & iride, lentiginesque & maculas tollit. Cum adipe anserino, Plinio teste, ac medulla cervina, resinaque & calce, labiorum fissuris efficax est. Cervix boum si intumuit, comperimus, inquit Columella, aureum esse medicamentum, ex pice liquida, & bubula medulla, & hircino sevo, & vetere oleo, æquis ponderibus compositum atque incoctum. Cum calce strumas discutit, teste Plinio & Marcello; cum cera, ulcera serpentia sistit; additâ pice & sulfure percurat; manantia item verendorum cum melle rubique succo. Per se datus adeps, teste Dioscoride, cantharidum venenum obtundit. Magi ut citat Plinius, commendant comitialibus cum felle taurino pari pondere decoctum, & in folliculos fellis reconditum, ita ne terram attingat bibendum sub limine ex aqua. Marcellus ptisanam cum eodem coctam torminosi in declinatione convenire vult; & apud Dioscori-dem habemus, caprinum adipem decoctum cum polenta, rhoë, & caseo, dysentericis dari, & cum succo ptisanæ infundi. Plinius denique in forbitione aliquâ intestinorum vitus magnoperè prodesse asserit, ita uti protinus frigida aqua hauriatur. Idem remedium hydropicis. Sextus Empiricus commendat. Canarii, ut refert Cadamustus, sevo hircino conjuncto quorundam herbarum succo carnem in-

ungunt, ut cutis facta inde densior algerem ferat facilius. Nudi enim incedunt. Adhibetur & podagricis cum fimo caprae & croco, sinapive, cum caulibus hederæ tritis, vel flore cucumeris sylvestris. Idem, pomatum ingreditur, ad fissuras labiorum commodissimum. *Medulla* post cervinam & vitulinam laudatur. *Tecur* assum cæliacis convenit; magisque quàm hirci, cum vino austero decoctum potumque, vel ex oleo myrriheo umbilico impositum. Idem ad nyctalopias facit, & illos qui comitali morbo sunt obnoxii deprehendit, convulsionemque iisdem infert. *Quin* & ad canis rabidi morsum laudatur, quo imposito, ne tentari quidem aquæ metu affirmant. Hippocrates, si pariens inflata fuerit, hep-
par ovillum aut caprinum calido cinere obrutum, edendum præcipit meracius ad dies quatuor, & vinum bibi vetus. Ex *felle* multa quoque apud Plinium inprimis sunt remedia. Veneficiis ex mustela rusticâ factis, contrarium est: cum cinere aluminis, scabiem abolet: ad porriginem cum cretâ cimoliâ & aceto facit, ita uti capilli paululum inarescant. Idem lentigines tollit admixto caseo & vivo sulfure, spongiæque cinere, ut mellis sit crassitudo: Strumas etiam discutit, si sæpius incipientes ea tangantur. Superciliis impositum pilos abolet, nihil de angina & aurium vitis dicam. Invenitur denique apud Dydimum, non fore in lecto cimices, si fel hirci aut tauri, aceto acridiluat, indeque lectus aut parietes illinantur. De *Liene* hoc habemus. Calidum, id est, ut è pecude exemptus est, & super lienem hominis impositum, mirè intra paucos dies dolorem auferre, si postea ad fumum suspendatur, ut illic areseat. *Caput* cum pilis suis decoctum, & contritum incisa intestina solidat. *Cerebrum* Magi per annulum trajectum aureum, priusquam lac detur infantibus instillant contra comitiales, cæterosque infantium morbos. Æsculapius cum melle carbunculos sanare vult. Sextui verò aquam, quæ è caprae palato effunditur, & quicquid comedit, si misceatur cum melle & sale: ex eo caput & corpus si serò fricetur, pediculos extinguere promittit, aitque idem remedium esse ad ventris dolorem. *Corii* cinis ex oleo illitus perniones mirè abolet: ramenta cum pumice trita, acetoque permixta, exanthematis profunt. Sistitur nimia in fœmina ex naribus hæmorrhagia, si mammillæ ejus correctio caprino vinciantur. *Pili* ulsi fluxus omnes sanant: combusti adjecta pice & aceto, naribusque inserti, sanguinem subito reprimunt. Accensi serpentes fugant. *Cornu* combustum & mixta farina impositum, furfures scabiemque in capite emendat. In flamma ustulati, crustæ cum aceto scillitico tritæ, com-

Hippocrat.
de natura
muliebri.

Mizald.
Memorab.
cent. 8. a-
phorif. 18.

Columella
R. R. l. 6.
c. 14.

Dioscorid.
M. M. l. 2.
c. 94.

Cadamus-
tus
Navig. c. 8.

modè igni sacro adhibentur. Capiti infirmi suppositum, vigilias in somnum convertit. Alarum fætorem, rasum vel exustum, & cum felle hirci, myrrhaque mistum, tollit, si eo perfricentur. Comitalem morbum deprehendit. Nidore suo lethargicos excitat, & ustum ad albedinem dentes detergit. *Ungulas* ad serpentes prohibendos Palladius uri jubet: si cinis earundem ex aceto illinatur, alopecias sanat. Est & *Lac Caprinum* in multis contra morbos remediis. Scio, inquit Plinius, Damocratem in valetudine Confidiæ M. Servillii consularis filiae, omnem curationem austeram recusantis, diu efficaciter usum lacte caprarum, quæ lentisco pascebat. Vis ei imprimis alexiteria. Haustus cum uva taminia, contra ictus serpentum juvat. Quod primum mulgetur, leviores facere in quartanis accessiones, sive esum sive potum, Sextus Empiricus author est. Magorum verò quidam fimi hirundinum drachmam unam è lactis caprini vel ovilli vel passi, cyathis tribus adversus quartanas ante accessiones dare solent. Eodem perunctæ gingivæ faciles dentitiones faciunt. Potum cum sale & melle alvum solvit. Schistum, datur comitialibus, paralyticis, melancholicis, leprosis, elephantiacis, &c. Fervens adjecto polentæ quantum satis, ut pulciculæ instar fiat, dysenterico bibendum datur. Sanantur eodem & *Lienes*, post bidui inedia, tertiâ die hederâ pastis capris, per triduum potio sine alio cibo. *Casens* recens moribus animalium imponitur: ficcus ex aceto & melle purgat ulcera: mollis cum melle subactus & impositus, pannoque aut linteo desuper tectus, fugillationes livoresque celeriter abstergit. Recens coagulatus super oculos positus, dolores citò lenit, si mulier cibos adversans utero doleat, & febris ipsam ac rigor corripiat, Hippocrates pepli albi quintam, dimidiæ choenicis partem, & feminis urticæ tantundem, & casei caprini rasi dimidiam choenicem, simul cum vino vetere miscet, & sorbenda propinat. Et alibi, si quid in utero computruerit, vel si sanguis aut pus exeant, caseum caprinum assatum vel rasum, vel simpliciter cum æquali parte polentæ miscet, & in vino jejuno propinat. Quantum ad *Coagulum*, Hædi contra pastinacam & marinorum morsus, drachmæ pondere ex vino sumebatur. In profluvio sanguinis bibebatur, & contra concretum lac assimebatur. Idem tertia parte ex aceto potum, sanguinis excretionem reficit: magnitudine fabæ, in vino myrtheo remissum, & jejuno cæliaco datum, efficaciter prodest. Hippocrates quoque hædi coagulum adversus alvi profluvium laudat. *Urinam* quod concernit, ea cum aceto scyllitico hausta, contra ictus serpentum valet: apostemata, in quacun-

Plin. H. N.
l. 24. c. 7.

Hippocrat.
de morbis
muliebr.

que parte discutit: opisthotonon, auribus infusa levat. Panni pastorales in filiis quadrimis, ut refert Herodotus, venas verticis lanâ succidâ inurunt; nonnulli venas temporum, ne, scilicet, unquam pituita defluens ex capite officiat. Quod si pueris inurendis spasmus contingat, urinâ hirci aspersâ eos liberant. Dioscorides, eandem ad aquam quæ cutim subit, cum nardi spica, quotidie, binis cyathis, cum aqua bibi scribit, urinamque per alvum extrahi. Sextus, mulieri menstrua provocare, si bibatur, credit. Omnium creberrimus usus *Fimi*, Græci *αργέλης* propriè nominant, digerentis & acris facultatis adeò, ut induratis scirrhorum in modum tumoribus, congruat, non tantum lienis, sed & aliarum partium. Ustusque tenuioris quidem substantiæ, verum haud manifestè redditur acrior. Datus aliquando ex aceto ad viperarum morsus, ex vino ad auruginem, cum thure ad profluvium muliebre. Inquietos infantes, fimo isto alligato panno, cohiberi tradit Plinius, maximè puellas. Luxatis cum melle illinitur. Ex aceto decoctus, strumas discutit. Ex eodem subfervefactus, & illitus, ulcera, quæ serpunt, sanat. Cum melle paratus & appositus cancriferos, & carbunculo ventris laborantes, sanat, & eosdem discutit. Ambusta sine cicatrice sanat. Tritus & cum aceto scyllitico mistus, fronti quæ applicitus, hemicraniam tollit. Cum eodem subactus ad crassitudinem mellis articulo- rum contractiones relaxat, & tremulis prodest. Cum farina hordei & aceto impositus, maximè in duris & rusticorum corporibus, remedium est ischiadicis. Pillulæ inter remedia mentium & secundinarum pellendarum apud Hippocratem. Hisce adjicere libet, quod ipsemet hircus pestilentia tempore domi alatur, quasi ædium vastitas, viroso vapore, quem hircus exspirat repleta, aditu auram venenatam repellat. Præter hæc, *Vfus variis.* sunt ex caprillis villis cilicia: ex pellibus indumenta, calcei, stragulae, utres, lagenæ, rates, folles, vela, charta denique & scutica: cornua hircina Pyrrhus cristæ loco capiti imposuit. Locrenses, quos Ozolos vocant, *καγέας καὶ κώδια* id est, ovium & hircorum pelles gestabant, & plerumque inter caprarum greges versabantur. Sardos quoque & Getulos caprarum pellibus amictiri consuevisse, author est Varro. In Cypro etiam Zambellotum è pilis caprarum conficitur, & Josephus Barbarus testatur, in Armenia minore propè Betolin & Isan fluvios, vel ideò magnam caprarum copiam ali, & quotannis tonderi. Asserit & Bellonius, selectiores Turcarum pannos, undulatos, ex pilis caprarum Ancyræ Cappadociæ metropoli confici: sed & rapetes, ex iisdem constare. De chartis quod dixi, illæ, Pergami Troadis primum inventæ fuere,

Herodot.
l. 4.

Galen.
simpl. l. 1. ro.
c. 22.

Varro R. R.
l. 2. c. 3.

Bellon. ob-
serv. l. 3.
c. 13.

fuere, & exinde nomen fortitæ sunt. De *Differentiis* pauca occurrunt. Ægyptiæ fæ-
tus quinos pariunt, quod fecundissimas Nili aquas bibant. In Phrygia hirci sunt quadricornes, referente Scaligero, pilo admodum prolixo, æquante candorem nivis, quem vellunt ad texturam, non autem tondent. Ægyptii apud Plutarchum, affirmant, capras suas, quoties cum sole, eodem planè loco Syrius oritur, in ortum omnes converfas, eò respicere, atque hoc syderis hujus revolutionum argumentum certissimum esse. In *Aquilonaribus* terris, si Olao Magno credimus, hirci sunt magno corpore, crassissimis cruribus, plenâ & brevi cervice, auribus flexis, & depressis, capite parvo, spisso, longo, ac nitido collo; cornibus altis & latis. Ferè omnes colore sunt albo. Hyeme pascuntur pinorum corticibus, musco, & populæis virgibus. Pelles maximis navigiis, quæstus & lucris causa, in Germaniam exportantur. *Cassia* capra, ut Ælianus exponit, & albissimæ sunt & cornibus mutilæ, & ad maximorum equorum magnitudinem accedunt. Eorum villi adeò molles, ut cum Milesiis lanis comparentur, ex iisque Caspiorum sacerdotes, & ditissimi, vestes confectas gerant. In *Cephalenia* caprae non bibunt quotidie, sed adversum sibi ventum ore hiantes excipiunt. Ideò Theophrastus sex mensibus non bibere dixit. In Cilicia, referente Plinio, circaque Syrtes, villosi conspiciuntur. *Damascono*, supra palmum longas habent aurículas, ubera multiplicia, suntque admodum fecunda: Circumducuntur quadraginta vel quinquaginta ab eis quibus lac est venale, & ubi lac emere volueris, in superius devehuntur cænaculum, etiam si triplex foret contignatio, ubi coram in vasa stannea, lac emulgent. *Narbonenses* aurículas latiores suis habere, Gesnerus audivit, ut quæ ad dodrantem longitudinis accedant. *Illyrica*, si Alexandro Myndio credimus, ungulas quidem habent, sed non bifidas. Aliquando ternos, quaternos aut quinos fetus edunt, & lactis sesquicongium. Idem *Indicis* propè urbem Tarnassuri, & Africanis ad promontorium capitis viridis contingit. Hircum ad Amboinam lacte suo parvos alentem hædos, se vidisse, Franciscus Xaverius Jesuita, corruptæ illius de Christo & Petro historiæ, quam Persicè conscripsit author, testatur. Ubre enim quod propè genitalia unicum habebat, tantum lactis reddebat quotidie, quantum scutella capere potest. *Mambrina* capra in regione Damiata, fert equitantem, sellam, frenum, & cætera quibus equi instrui solent: aurículas usque ad terram demissas habet, cornua deorsum revoluta sub ore. Pharos insula Ægæi maris, gignit capras cervis colore similes, magnitudine majores.

Est autem eis cornu longum ad duodecem palmos, rectum, & quod unum solum habet porrectum supitem, si Surio credimus. In Sardinia scribit Nymphodorus, pelles caprarum tam mirificæ vi esse, ut hyberno tempore calefaciant, æstivo refrigerent. Eadem fortè sunt, quæ Musmones. In eadem hirci quidam celeritate omnes bestias superant. Ex Monstris, tricornis capræ imaginem hic exhibemus.

ARTICULUS V.

De Capris sylvestribus in genere.

DE Capris sylvestribus in genere & in specie agendum est. Illarum plurima ^{Aldrovand. Hist. bisulc. c. 10.} apud Græcos occurrunt nomina. *Αἰξ ἄγριος*, nempe, *αἰγόνερος*, *δὲρξ*, *δορκός*, *δορκάλις*, *δορκάδιον*, *πρῶξ*, *πῶξ*, *βέβαλος*, *ἰξάλος*, *νεβρός*, *κεμάς*, *κάλος*, *τραγίλαφος*. *Αἰξ ἄγριος*, capra fera Latinis est. Solinus tamen sagittas dictamno herbâ extrahendi morem, qui ab Aristotele, Theophrasto, Cicerone, Virgilio, *αἰξ ἄγριος* simpliciter ita dictis tribuitur, ad illas adstringere videtur, quæ Cretam & Idam montem potissimum incolunt. Et, si Virgilio esset, fera capra quæ Aristoteli *αἰξ ἄγριος*, manifestissima inter utrumque contradictio esset. Cum hic feras capras in Africa esse neget, ille haberi ostendat. Ideò per capras feras Virgilii, capreas exponit Servius, & Aldrovando videtur, ubi pro specie sumenda est, illam intelligi debere, quæ domesticæ est similior. Sanè Varro, capras quas alimus, à capris feris ortas dicit, ipsoque capræ feræ nomine, privatim uti videtur. Varino *αἰξ ἄγριος*, *αἰγάρως*, & Hesychio dicitur: quam tamen vocem Oppianus peculiari speciei, illi scilicet, quæ ^{Oppian. Cyneget. l. 2. v. 343.} Tridentinis & circumvicinis populis Camozza vocatur, tribuit. *Αἰγόνερος*, capricornus est Latinis, quam vocem barbari, teste Scaligero, capræ sylvestri imposuere, & soli Suidæ, genus est animalis. *Δέρξ* & *δορκός* solo nomine differunt, etsi quidam apud Hermolaum animal diversum esse opinentur. Alibi pro eo *ζέρξ* legitur, interpretes Strabonis Damam, Nicandri, Capream vertit. Damas etiam traducunt apud Oppianum Gillius & Bodinus *ὄρκος*, qui *ὄρκος* Hesychio. Dioscorides tamen à Dorcade manifestè distinguit. Cornarius rupicapram intelligit, quæ cornua in dorsum adunca habet. *Dorcadis* nomine Plinius ita utitur, tanquam ei nullum apud Latinos vocabulum respondeat, sentitque capream, capreolum & dorcadem, tria animalia, unum duntaxat animal denotare. Aldrovando ea vox nomine generis usurpari posse videtur. Aliis, ut Ethymologo & Varino,

cervinus pullus esse creditur, sed malè. Cordus à dorco sexu differre existimat. Scaliger per dorcadem capreolum, per dorcum capream intelligit. Ut ut sit, *ὡς δὲ τὸ ὄξυς δέρεται*, venit, quod acutius videat. Asserunt namque hi, (Origenis apud Aldrovandum verba sunt) quibus medicinæ peritia est, inesse huic animali intra viscera humorem quendam, qui caliginem oculorum depellat, & obtusiores quoque visus exacuat. Ideò Ethymologo *ὡν ὁξυδερκὲς ἢ δόρυμαλον* dicitur. Invenitur & *δორκων* in Canticis Canticorum; quæ tamen vox, auctore Myrtilo apud Athenæum, parum usitata est. Videtur omnem capram sylvestrem significare. *Δορκαλίδες* apud Oppianum brevem habent caudam. Gillius cervos transtulit, sed perperam. Ab istis namque apud eundem distinguitur. *Πέρκεις* Varino sunt *ἐκρονα, ἐλάφαν, ἢ δορκάδων εἶδος*. At Aristoteles, dum dicit, fel nec cervum, nec *πεύκας* habere; & sanguinem ubi effluerit concrefcere omnium, præterquam *ἐλάφης ἢ πεύκης*; ab invicem distinguit. Gaza Damam vertit. Nomen à celeritate, *δορὸν ἢ περὶ ζέειν*, Grammatici sumunt. *Πρώξ* à quibusdam & lepus & dorcas exponitur, cervus item & *νεβρός* quæ omnia animalia sunt timidissima. Sed & *πρώξ* idem est quod *πρώξ* timidus, seu pavidus, quo sensu Homerus *πρώξ λαγῶν*, dixit. *Κεμῆς* apud Hesychium exponitur, vel hinnulus, vel cervus, vel dorcas. Ex caprearum genere esse, negat Scaliger. Sunt, inquit, in cervis, ut in bobus junix & juvenus. *Æliano* specie à cervo differunt. *Turbinis*, inquit, *instar celeritatis fertur, flavis pilis spectatur. Cauda est albissima, tum ex albeni ejus oculi cyaneo colore tincti videntur, aures per altis pilis refertæ, neque modò in terra pedum celeritatem ostendit, sed etiam cum in fluvii confluentem inciderit, Ungulis pedum remigans, fluctus perumpit, & verò in lacubus natare gaudet, unde sibi pastum comparat. Virides juncos & Cyperum depascitur.* *Νεβρόν* hinnulum interpretantur, Cordus, Marcellus, & alii. Aldrovandus peculiarem quandam capræ speciem hoc nomine indigitari, apud Dioscoridem, scribit. Nam Varinus & Ethymologus *πεύκας* quoque dici produnt. Marius Grapaldus damam reddidit: Solinus etiam Damam esse ostendit, dum scribit. *Nebrodi damarum copia nomen dedit, quem dama & hinnuli gregatim pervagantur, inde Nebrodes dicti.* *Κάλ* ex Scythicæ & Sarmaticæ gentis capris sylvestribus censetur. Magnitudine est inter cervum & arietem, albicante corpore, eximia super hos levitatis ad cursum: naribus potans trahit ad caput. Hinc postmodum complures dies servans adeò, ut per carentes aquis agros facile pabulum carpat. *Capræ* vox apud Latinos, sæpè pro omni capra sumi videtur. *Rupicapra*, etsi in sylvestribus species est Plinio;

ratio tamen nominis postulat, ut generis etiam vicem subeat, quandoquidem per summas versari rupes, non illi tantum cui cornua in dorsum adunca, convenit. Delectantur in universum excelsis montibus, & tam in sublimi habitant, ut vix humanis obtutibus pateant. Quod si aliquando ferarum vel hominum adversitatem persensere, de altissimis saxorum cacuminibus sese præcipitantes, in suis se cornibus illæsas suscipiunt. Plurima inter mares discordia propter foeminas, tempore libidinis. Domesticis, omnium consensu, saporis alimentique bonitate, constitutionis tenuitate, concoctionis facilitate, excrementorumque paucitate præferuntur. Sicciores tamen paulò carnes habent. Ideò inventum Arabum oleo eas incoquere, ut inde humescant. Diocles tamen, Archidamus & Galenus, quod in oleo coquitur siccum evadere, & glutinis vinculo amisso, solutile fieri censent, *ψάδρον* nempe & *καύρον*. *Usus in Medicina* quod spectat, Capræ in cibo sumptæ dysentericis profunt. *Iecur* seu inassatum, seu tritum celiacis opitulatur: Vapor in aqua calidâ falsa cocti, oculis exceptus, nyctalopas juvat. Combustum & aspersum sanguinem sistit, maximè si contritum naribus indatur. Sanguis cum palma marina teste Plinio pilos detrahit: secundum Marcellum, abscessus maturat. *Fel* theriaca est moribus venenosis. Idem contra suffusiones incipientes, oculorum caligines, genarum & palpebrarum scabrias, facit: Cum rosaceo aut succo porri tritum, & tepidum naribus instillatum, tinnitum tollit. Cum melle Attico faucium dolores levat, & veretri exulcerationem sanat. *Fimus* aridus, tritus & cribratus, ex vino odorifero cyathi mensurâ sumptus, auruginem tollit, si Galeno credimus.

ARTICULUS VI.

De Capris sylvestribus in specie.

PUNCTUM I.

De Rupicapra & Dama.

CAprarum sylvestrium species sunt, *Rupicapra*, *Dama*, *Ibex*, *Bubalis*, *Pygargus*, *Capra strepsiceros*, *Dama vulgaris*, *Capra Moschi*, *Capra Bezoardica*, *Subak Scytharum*, *Oryx*, & *Capra auribus demissis*. *Rupicapra* Dioscoridi Dorcos, Oppiano *αἰγασπ* seu *αἰγας* Varroni Caprea, nisi fallor, dicitur. Magnitudo ei quæ capræ villaticæ, paulò tantum altior, & corporis forma feris altis similior. Bellonius minorem damâ facit. *Colore* est inter fuscum & rufum, qui æstate magis ad rufum, hyeme magis ad fuscum vergit. At Scaliger æstate pilo fulvo, hyeme cin-

Ælian. H.
A. l. 14.
c. 34.

Strabo. Ge.
ogr. l. 7.

Aldrovand.
Hist. Bifalc.
c. 11.

Scalig. Exercit. 207.

ne-

nereo esse dixit. Gesnerus partim albam partim nigram, distinctis coloribus vidit, sed & alba tota interdum, quamvis rarissime, conspicitur. *Oculos* habet rubros, *aures* arietinis longiores, colore gilvo, atramque lineam utrinque recta à cornuum radice supra oculos ad extremum os ductam, & in labra superiora definentem. *Frontem* veluti stella insignit. *Cauda* superior pars pilosa, nigra, & rotunda, ut dorcadis longa. *Cornua* ei nigricant, novem aut decem digitos longa, multis nodosis circulis exasperata, minoribus paulatim, in unco nullis, quin levis & acutus est hami instar. Paralella ferè, id est, æquis undique intervallis furgunt; solida, ab initio tantum pollicis circiter mensurà cava, & teretia magis quàm domesticis. Ajunt, inquit loco citato Scaliger, mucronibus cornuum, id quod capras quoque facere videmus, tergum scabere. Ex ea scalpturitione, quæ perniciēs evenit, operæ pretium est cognoscere. Creditum est tanta illas illo in pruritu perfundi voluptate, ut extremum cornus fastigium, in corium eo usque adigatur, unde retrahi nequeat. Quo circa ex altissimis ruere locis, atque afflictiari, aut à venatoribus fortè deprehensas, proculve observatas capi, aut fame interire. Rupes montium colunt, non summas tamen, ut ibex, neque tam altè & longè saliant: descendunt aliquando ad inferiora Alpium juga. Conveniunt sæpe circa petras quasdam arenosas, & inde arenam, ut capræ sal, lingunt, quo linguæ inertem pituitam defricent, & appetitum excitent. Cum in venatione urgentur, altius semper ascendunt, donec nullus ad eas canibus pateat accessus: deinde cum venatores per saxa manibus pedibusque sequi vident, de saxo in saxum transiliunt, ac montium cacumina petunt, donec nulla scandendi reliqua sit facultas. Illic se cornibus retinent, & quasi suspendunt. Sic vel bombardis feriuntur, vel in præceps pelluntur, vel fame pereunt. Mox à Divi Jacobidie frigidiores montium cli-vos petunt, ut paulatim frigori assuescant. Capræ, aliquando cicurantur. Ex pellibus fiunt chirotecæ equitantibus. Ubi errabundæ quærunt novas sedes, aut pascua perspectâ proximâ rupe, projecto pede, sæpe periclitantur ejus fidem, nempe, mobilis ne sit, an lubrica. Illud festivum, addit Scaliger, In aula patris Bonifacii, vidimus cicures assilire ad aulae pendentia, in quibus similes essent intextæ fessæ. Quantum ad *Usum*, caro est ficior, & melancholici humoris parens, odoris sylvatici. Venatores ex recenti sanguine scaturientem, tanquam insigne vertiginis remedium sorbent. Apud Plinium legimus, sevi cyatho, & lactis pari mensurâ deploratum phthysicum convaluisse. Iconem duplicem hic exhibemus, Rupicapræ nempe, & Caprimontani. *Dama* du-

plex est, Una veterum, de qua hic; altera vulgaris sive recentiorum, Græcis *πλατυερως* dicta, quam Gaza fortè intelligit, cum *πέννα* apud Aristotelem damam vertit. Plinius caprarum sylvestrium generibus, quæ transmarini situs mittunt, annumerat. Forte Dioscoridî & Nicandro, de coagulo agentibus *νεβρός* appellatur: Grapaldus etiam *νεβρόν* damam reddidit. Animal est capræ magnitudine & colore dorcadis. Ovidius fulvo tergore damas vertit. Famosa est in primis earum timiditas. Ideo rarò mansuescere Plinius tradit. Cornibus tanquam unco prominentes rupes apprehendunt, neque aliter inaccessas montium verrucas superant.

PUNCTUM II.

De Ibice.

Dioscorides in capite de coagulo, hujus capræ non meminit, & vix fortè aliquis est ex veteribus, qui meminerit, Homero excepto, qui *Ἰχάλον αἶσα* vocat. Esse verò eam quam Germani *Steinbock* vocant, omnes docti uno ore testantur. Plinius totam historiam brevissimè complexus est, dum inquit. Ex caprarum sylvestrium genere sunt etiam ibices in Alpibus, pernicitatis mirandæ, quanquam onerato capite vastis cornibus, gladiatorumque vaginis, in hæc se librant, ut tormento aliquo rotati in petras, potissimumque è monte aliquo in alium transilire quærentes, atque recessu pernicius quò libuerint, exultant. Egregium est animal & corpulentum, specie ferè cervinâ, minus tamen: cruribus quidem gracilibus, & capite parvo cervum exprimit. Color *pellis* fuscus est. Senectute canescunt, & secundum dorsi longitudinem nigram lineam excurrentem habent. *Oculi* splendidi & pulchri. *Ungule* bisulcæ & acutæ. Fœmina in hoc genere mare minor est minusque fusca, major caprâ villatica, rupicapræ non adeo dissimilis. Mares prolixam nigricantem barbam gestant, quod nulli, ut Bellonius tradit, alteri animali cervinis pilis prædito accidit, præterquam fortè hippelapho. Magni ponderis cornua ei reclinantur ad dorsum, aspera & nodosa, eoque magis quo grandior ætas processerit. Augentur enim quotannis, donec jam vetulis tandem, nodi circiter viginti increverint. Bina cornua ultimi incrementi ad pondus sexdecem aut octodecem librarum accedunt. Bellonius quaternos cubitos longa vidit. Tot autem transversos nodos seu radios habent, quot annis animal natum est. De pernicitate aliquid ex Plinio diximus. Nulla certe montium rupes tam alta, edita aut præceps est, quam non saltibus aliquot superet, si modò aspera sit, & spacia tanta promineant, quanta salientis ungulas excipere possit. Bello-

Aldrovand.
Hist. bisulc.
c. 13.

Plin. H. N.
l. 8. c. 53.

Bollon.obl.
l. 1. c. 13.

Ælian. H.
A. l. 14.
c. 16.

nus ex scopulo uno in alium sex etiam passuum intervallo distantem, desilire solere scripsit. Dum cadit ex alto, totum corpus inter cornua à collisione protegit, & ictus lapidum magnorum, cornibus excipit. De Venatione Aldrovandum consule. Duo earum genera Bellonius dari prodit, in Creta: id se ex earum cornibus inde & Cypro delatis didicisse, addens. Deprensæ libero capacisque cursu loco, in venatorem irruunt, eosque de rupe dejiciunt. Cum impetendi locus non est, despondent animum & facile cedunt. Ejusdem generis est illa fera Lybica, quam Ælianus ita describit. Capræ feræ ad fummos Lybicum montium vertices commorantur: ad boum magnitudinem accedunt: ipsarum armi & crura luxuriosus pilis fluunt: tibiis parvis, frontibus rotundis, oculis raris & concavis, non valde projectis sunt: Cornibus post primum exortum utriusque ab alteris longè diversis, & aberrantibus & incurvis. Non enim simpliciter ac aliarum caprarum recta existunt, sed eatenus retorquentur, ut ad armos pertingant. Ex capris longè maxime ad saliendum habilitate sunt. Nam ex cacumine, in aliud longè distans cacumen transfiliunt: & tametsi sæpe earum quæpiam, dum ex uno vertice in alterum saltatæ contendit, ob nimiam intervallorum distantiam, per prærupta saxa præceps agitur, nihil tamen læditur. Sic est adversus saxorum duritiem, membrorum resistente firmitate, ut nec cornua frangat, nec caput diminuat. In summis montibus plurimas solertia quadam captandi caprarii generis, nimirum, vel jaculis, vel retibus, vel laqueis, à doctissima arti venaticæ instructi comprehendunt. Jam in patentium camporum æquoribus, quilibet vel tardus pedibus eas quod ibidem non valeant capere possit. Earum pellis & cornua aliquot commoditates habent. Nam in frigidis tempestatibus ad frigor vim, atque hyemen excipiendam, pastoribus & fabris materiariis pelles mirifice profunt. Cornua ad hauriendum de præterfluentium rivorum confluentibus, aut è fontibus potionem, ad depellendam sitim, non minori usui habentur, quàm vel calices ipsi. Tanta enim capacitate sunt, ut in bibendo respirare sit necesse. Ab homine expoliendi benè perito cornu politum, tres mensuras capere potest. Habet in Medicina usum. Coagulum eadem cum leporino vires habet, ut tradit Serapio. Sanguis, ad calculum in vino apiato apud Gesnerum commendatur. Ischiadicis & arthriticis unicem remedium, sic Marcellus Empiricus componit. Fimum ibi cum lunâ decimâ septimâ colliges, quanquam & alia vetere lunâ collectum, fires urgebit, simili efficaciâ proficit, dummodo medicamentum decimâ septimâ lunâ componatur. Ex eo ergo fimo

quantum unius manus pugno pleno, arboris comprehendere, dummodò impar sit numerus pillularum, in mortarium mittes, atque adjicies piperis grana viginti quinque diligentissime trita: tunc addes mellis optimi heminam, & vini veterrimi optimi sextarios duos, & contritis prius pillulis universa miscebis, & repones in vasculo vitreo. Sed ut major sit medicaminis efficacia, luna decima septima id facere debebis, & cum daturus fueris remedium, à die Jovis incipe, & per dies septem continuos dato, ita ut qui remediandus est, stans, in scabello contra Orientem bibat. Hæc Marcellus, quæ merè sunt nugatia.

PUNCTUM III.

De Bubalo sive Bubalide, & Pygargo.

DE Bubalide hæc Aldrovandus habet. Aldrovand. Hist. Bisulc. c. 14. Arbitrabar, inquit, alias, bubalum specie differre à Bubalide, deceptus nimirum &c. Vide Aldrov. pag. 303. usque ad finem, quam bobus esse ibi etiam judicabam. Quantum ad *Naturam*, domesticam sedem mirifice amplectitur. In alienum deductus locum, & ad pascua demissus, veterem repetit. In metu, occulto capite, latere se putat, ut struthiocamelus. Belluas feroces pugnacesque fugit. Sanguis aliquantulo magis spissatur quàm leporis & cervi: quippe, qui proximè ovillo, aut paulò minus consistat. Placet & de *Pygargo* Aldrovandi verbis agere. *Pygargon*, (verba ejus sunt) Plinius, in præcitatis verbis &c. p. 304. a. usque ad finem frequenter sylvestris & deserta. Aldrovand. Hist. Bisulc. c. 15.

PUNCTUM IV.

De Caprea Plinii, Capra Strepsicerote, & Dama vulgari.


Caprea Plinii, Capreolus noster est, quem Aldrov. H. Bisulc. c. 16. Germani *Reh* vocant. Cervis est colore non dissimilis, sed mole corporis longè inferior, qui vix capram æquat. Mas cornua in capite gerit senis plerumque ramis distincta. Fuit qui decem & septem haberet cornua, cujus icon Aldrovando à Duce Bavaricæ missus erat. Plinius de iis ita: Dedit ramosa capreis, sed parva, & fecit decidua. Visu est acuto, voce exili, dentes non mutat. Virgilius maculis distinctum ostendit. Servius sparfos albo exponit, qui habent adhuc maculas à prima ætate venientes. Accessu enim temporis, inquit, mutant colorem, & eorum macula gratiæ minoris esse incipiunt. Multæ in regionibus Helvetiorum Alpibus capiuntur. Humiliora tamen loca amant quàm Ibeus vel rupicapra. Fœmina si maritus capiatur, alium

Virgil. Eclog. 2.

Cerva Hinde



Colopus



Rupicapra Gams





Ibex Steinbock



Capra Ljbrica



Flirus



1870



Capra Geis

Capra Canis



Capra Hispanica



Capra Mambrina


Capra Mambrina






Hircus Bock

Rupicapra



*Caper Mamon
dictus Bubalq
Cerus Aldr*

Dama Veterum



Hircus Cotilardicus

Culcr





Ibex Sylvestris Sardinus



Musimona



Trais Uel Ibex



PLATE 10



Capreolus Rehe



*Capreolus
Marinus*



Capra





Capra Strephiceros



Eale



Alicorn





Gazella



Cervo Carnelq




Capreolus Moschi
Bisem thier





Capreolus
Rubeus

Cervus



Hippelaphus mas

Rosß Hirsch



*Cervus
Burgundicq*





Alce Elená



*Cervus
Mirabilis*



*Orix Cervi
Species alijs Alce*





alium quærit, eumque secum ad pristinae habitationis locum adducit. Foemina verò captâ, maritus aliò discedit, & aliam sequitur conjugem. Cornibus vel uti nesciunt, vel non audent. Cum perdicibus amicitiam colunt, & in iisdem locis pascuntur. Flantem ventum petere currendo Bellifarius ait, ut refrigerari spiritus cursu laborantes possint. Parem illis & apris alimenti bonitatem Julius Alexandrinus posuit, nisi quod illius caro sit concoqui facilior, & citius fugiens. Huc pertinent Capreæ Brasilienses, quæ duplices *Cagua cuete* nempe, & *Cagua-cuapara*. Illæ sunt nostris capreis ferè similes. *Caput* septem digitos circiter longum, *oculis* magnis, & nigris: *naribus* longis & patentibus; *ore* nigro, *cute* splendente, *auribus* quatuor digitos longis, duos & semislatis, *venis* conspicuis; *collo* rotundo & magis glabro pilis, quam in reliquo corpore: estque longitudo colli circiter quinque digitorum & semis. Corporis longitudo à colli exortu ad initium caudæ duorum pedum. *Cauda* brevis ut capreis esse solet. *Crura* quatuor, priora pedem, posteriora sesquipedem longa: *pes* quilibet duas habet ungulas nigras; & supra has duas minores supra se invicem positas. Pilis vestitur glabris, qui in toto corpore, cruribus & pedibus rufescunt, in collo & capite fusci, sub gutture & inferiori collo albi. *Cauda* quoque inferius est alba. *Aures* interius albescunt, exterius sunt fusci & ferè carent pilis. *Os* inferius longius paulò quam superius. Ruminat cibum. Mansuescit facile. Quando unius aut duorum mensium ætatem habet totum corpus maculis albis elegantur est variegatum quæ successu temporis evanescent. *Cugvacu-apara* Brasiliensibus, caprea est cum cornibus, paulò major superiore, at ejusdem coloris. Cornua tria brachia seu digitos habent, nimirum infernum brachium quod longum, & apicem bifidum. Thyrsus seu scapus pollicem humanum est crassus, & octo vel novem digitos Rhyndandicos longus. De *Capra strepsicerote* ita Aldrovandus. Plinius inter sylvestres capreas, quas transmarini situs mittunt, Strepsicerotes &c. pag. 305. usque ad finem. Cretensis imaginem ex Bellonio. *Dama vulgaris*, describente Bellonio, corpore quidem cervum refert, & capreolo major est, sed colore differt. *Dama* minus caput habet cervo. Cornua etiam illi omni anno decidua ut cervo, quæ antroorsum protensa habet præter aliorum consuetudinem. Gilyam habet dorso spinam, atramque lineam, secundum dorso longitudinem excurrentem, Cauda longa est ad proplites usque dependens, uti vitulo. Sæpe accidit ut ejus latera candidis maculis aspersa sint, quæ vetustate pereunt. Accidit etiam sæpe numero, ut foemina omnino albæ sint, sic ut capræ existimari possint, nisi pilum ad-

modum brevem haberent. Ostenduntur ejus cornua ingentis magnitudinis variis in locis, qualia sunt, ea quæ in gradibus & ascensu Ambrosianæ arcis conspiciuntur. Caro cum capreolis ferè in qualitatibus convenit, sanguinem tamen ad atram bilem tendentem aliquo modo efficit. Aliquando vervecis in morem pinguis est. Fimus cum oleo myrtino præparatus, capillos augere dicitur.

PUNCTUM V.

De Capra moschi.

DE Capra Moschi ex veteribus soli Arabes scripsere. Recentiores Græci, ut Aëtius & Paulus Aegineta, si quid habent, ex iisdem sumere. Sive autem hanc feram, dorcadem capreamve, aut gazellam Indicam, peregrinam aut orientalem appelles, aut dorcadem moschi, vel simpliciter, animam moschi, parium, inquit Gesnerus, interst. Aldrovandus Capram moschi vocat. Isidorus & Albertus, forte à moscho, qui vulgo muscus, musquelibet. Volaterrano est mus muscus, quem ex Arabia & Æthiopia venire tradit. A Divo Hieronymo ad Demetriadem, peregrini muris pellicula inter odoramenta quibus delicatiores distillant, numeratur. Alii moschum significari arbitrantur: Hermolaus animal ex quo Zibethum: Gesnerus folliculum animalis moschi, in quo hoc odoramentum colligitur. In descriptione variant authores, etsi non desint, qui ex authopsia delineent. Conveniunt tamen quod ex caprarum sive gazellarum genere esse statuant &c. Vide p. 307. a. usque, alioqui recta sunt. Ferunt odoratis pasci, ac potissimum nardo; unde etiam moscho, id est, sanguini circa umbilicum collecto, odor concilietur. Propter insignium velocitatem raro vivæ capiuntur. Morsu in persequentes sævire, Alexander Benedictus prodidit, qui etiam mansuescere exemptis dentibus longioribus, addit. In provincia Thebet eas canibus venantur. In China, etiam Persia, Africa, & Ægypto reperiri, quidam prodidere. Cæterum odoramentum illud quod hæc gazella fert, barbaris *muscus* Latinis *moschus* dicitur. Appellationis inde fortè sumpta ratio, quod plantarum musci, quarundam præcipue arborum, ut cedri & populi albæ, ad varia odoramenta & conspicienda unguenta, apud antiquos usus esset. Alcitarus muscum Arabem vocavit. Græcis dicitur *μόσχον*, vel quod illi, *μόσχος*, *μοσχίδα* & *μοσχίμα*, novos tenerioresque in plantis stolones vocent; quorum similitudine in animalibus, quæ moschum ferunt, novi, odoramento illo pleni nascuntur folliculi: vel quod animalia illa, mediâ inter capream & vitulam naturâ & magnitudine, fulvoque vitularum colore

Bellon. obs.
ser. l. c. 54.Aldrov.
Hist. B.
sulc. c. 19.Mareg.
Hist. Bras.
l. 6. c. 10.Aldro. H.
Bif. c. 17.

lore videntur, quas Græci etiam *μύχες* & *μύχαιρα* appellant: vel quòd moschi folliculus, à vasculis caparum semen in summo caule servantibus, quæ Græcis *μύχα*, figurà non longè absit: vel denique, ut Ethymologo placet, quòd è medio, umbilico scilicet animalis, fundatur, quod Græcis est, *ἐν μέσῳ χείμαυρ*. Taceo posse derivari, vel à verbo *μῶ*, quòd ab omnibus requiratur: vel ab *ἔλῳ* oleo, præposita *μ* litera; vel à privatione fœtoris *καὶ ἐρησιν τὸ δυσωδίας*, *ἔλει* enim & benè & malè olere significat. De *ortu* ipsius non omnes eodem modo referunt. Simeon Sethi, (utor Aldrovandi verbis) moschum omnem fundi asserit, &c. Vide pag. 307. b. usque, sic Fuchsius. In *Electione* haud etiam consona scribunt authores. Plateario omnino niger non probatur; laudatur, qui ad spicæ nardi colorem accedit. Brasavolo odoratissimus est subniger, ex Cathaja allatus. Sunt qui Tumbascinum propter pabuli copiam anteponunt, qui in folliculo maturefcit, præstantior eo, qui in aère suspenditur. Testis enim Brasavolus, immaturum, etsi animali adhærentem, grave olere. Abensinnæ, moschus melior Antebius vel Asciltios, deinde Jurgius, postea Indus marinus. Elluchasim in Tacuinis folliculos continentes moschum Cubit esse scribit, subtili ex vesicula & moscho: Gergeri esse folliculos his contrarios, qui moschus minus est subtilis, & minus aromaticus: Moschus Charum medio inter hos loco: Salimindi verò deterior. De probatione ita Aldrovandus. An moschus legitimus &c. Vide p. 308. b. usque, adulterati notam esse. Adulteratur multis modis; præcipuè niger, & ad subrufum colorem tendens, admixto pauco sanguine hircino modicè assio, ita ut tres vel quatuor partes, ex istis contritis, ad unam moschi admisceantur. Sed panis assus friabilem reddit; sanguis hircinus cum frangitur, lucidus est & clarus interius. Saraceni sæpe cum folliculis vendunt, quos adulterato inferfere. Alexander Benedictus jecore hœdino arefacto, & avis cujusdam fimo vitari scribit. Radice Angelicæ à quibusdam, prodeunte Gesnerò augetur; qui etiam factitium describit. Odorem, si aliquid aromaticum addideris, amittet. At si in vase vitreo denso & cerâ oblito asserves, retinebit. Recuperabit amissum, si in olla aperta in cloaca suspenderis. Quantum *ad Usum*, in assignatione temperamenti, authores variant. Averroës calefacere & siccare in fine secundi scribit, Sethi in tertio. Tenuissimarum esse partium apud omnes in confesso. Mercurialis naribus appositum sanguinem prolicere tradit; & ne idem assumtus faciat, metuit, quod vasa aperire videatur. De cætero, in restauratione virium, tremore, syncope, flatibus, caputpurgii, pilis odoriferis, suffumigiis, sinegmate, tragematis oris, & unguen-

tis moscatis, vehementer adhibetur. Quibusdam tamen mulieribus uteri suffocationem adfert; quod Venetis & Septentrionalioribus si Olao Magno credimus, contingere solet.

Olaus Magnus. l. 16. c. 13. 14.

PUNCTUM VI.

De Capra sive Hirco Bezoartico, vel potius Pazahartico, & aliis.

Diversi diversa circa descriptionem Capræ Bezoartica proferunt. Bellunensis negare illam videtur, dum lapidem Bezoar nuncupatum, in suis erui venis, ex Thiphasi Arabe prodit. Arabes in cervis eum nasci credidere. Monardes testimonio eorum, qui ex illa regione, ubi Bezoarticum animal reperitur, rediere, constare ait, cervi esse magnitudine, ejusdemque quodammodo forma &c. Vide Aldrovand. pag. 311. b. usque. in Arabia ex capris quibusdam hunc lapidem extraxisse. At Bontius capræ istæ non valdè absimiles sunt capris Europæis, nisi quòd habeant erecta ac longiora cornua, ac quædam ex iis versicolore sint pelle, ut tygrides, pulchro aspectu, quales duas, inquit, hic in arce Batavia quotidie videmus. Prout magnum aut parvum lapidem gerunt, eò molestius vel citius incedunt, quòd astutissimis Armeniis & Persis benè notum est. Idem addit, herba quædam croco ac hermodactylis persimili vesci, ex ejusque esu lapides in ventriculis concrefcere. Inde factum, Teixeira prodente, ut cum insula quædam, inter continentem Chormandel & Ceylon insulam, à Lusitanis Ille de vaccas vocata, horribili inundatione submersa esset, ut capræ servatæ necessariò aliò transferri debuerint; herbâ illa destitutæ, nullos protulerint lapides; insula verò salfugine liberata, reductæ, eosdem produxerint iterum. Tam verò capris his molesti sunt, quàm hominibus calculi vesicæ & renum. Unde colligere licet, vana illa esse, quæ seu Monardes, qui in intestinis, seu Fragofus, qui in renibus, seu Moses Ægyptius, qui in vesicula fellea nasci produnt, scripsere, de quibus Aldrovandus si placet, consule. Nam istius lapidis quidam Pafan esse volunt; alii Balsaar: at Bontius Pazaher, id est, contra venena, quasi Antidotum, vocari tradit. Nascitur præcipuè in Persia, in loco quodam Stabandon dicto, trium dierum itinere supra Larâm, ubi Reges Persarum vigiles locare solent, ut omnes lapides qui certum pondus excedunt, sibi vindicent. De *formarum diversitate*, ita Aldrovandus. Observandum itidem magnam esse horum nativorum lapidum diversitatem, &c. Vide Aldrovand. pag. 312. b. usque. alii tamen pretiosiores

Aldrovand. Hist. Bisulc. c. 21.

Bontius Med. Indor. p. 46.

Aldrovand. Hist. Bisulc. c. 20.

77us.

atque

atque efficaciores habentur. Confici ex maffa quadam adulterinos, Monardes ex relatione Guidonis de Lavaretis prodit: genuinos, qui ex laminis seu corticibus se invicem amplectentibus constant, illisque adeo splendentibus; ut politæ videantur; intus pulverem habere. Garcias paleam vocat. At Bontius genuinum esse credit; qui, si pauca calce fricetur, colorem puniceum ostendit; si in pelvim aquâ repletam coniectus, & ibidem per duas aut tres horas relictus, idem prout antehac pondus retinet; adulterinum, qui calce fricatus rimam ducit, aut aquâ exemptus, pondus vel remittit, vel auget. De *Viribus*, plurima à Serapione, Monardè, & Garzia ab Horro scribuntur; nempe, nudæ parti corporis applicatum, facere, ne à veneno offendaris: pulverem moribus animantium inspersum, eosdem sanare; ipsis feris injectum, torpidas reddere: viperas, injectum cum aliquo liquore, enecare. Omnem denique in venenis sopiendis & febribus malignis expugnandis inanem curam, nisi & hunc adhibueris: recitatque Monardes aliquot eorum exempla, qui ipsius beneficio ex faucibus Orci erepti sunt. Iuvat & melancholicos, quartanarios, syncopticos, epilepticos, vertiginosos, calculosos, lumbricis laborantes, & alios. Sed magis mulieribus quàm viris prodesse observatum. Sunt in India, qui se ejus usu rejuvenescere posse, somniant. De quibus Monardem in peculiari tractatu consule. At Bontius, non tantas in eo vires, se mille experimentis invenisse scribit. Corollarii loco ex eodem addo, lapides Pa-zahar in ventriculis simior natos, qui teretes sunt, & longitudinem digiti aliquando excedunt, inter præstantissimos haberi. Ad Hircum Pazararticum referri potest *Vicuna*, & *Taruga*, de quibus ita Nierem bergius. Sunt apud Peruanos quadam perniciosissima animalia quæ *Vicunas* vocant. Quidam putavere, ab Aristotele & Plinio capras dici, sed ignotas præcis Vicunas censeo cum Acosta. Cornutum illi animal sic vocarunt, vicuna cornu exermis, cætera licet similis silvestri capræ, cujus & fortasse genus est. Nec obest inopia cornuum; namque & canes cornuti alicubi feruntur, cum communes excornes sint. Gaudet montanis & rupibus, frigus & deserta amat, gelu & nive videtur recreari, societate & grege delectatur. Ad obvios quoque fugax. In fuga præmittit sobolem, cujus parca est. Capitur celebri venatione. Coeunt usque ad tria millia barbarorum, circumdant montem, sic paulatim cogunt in unam sedem feras, aliquando plusquam trecentas; dimittunt ad prolem feminas. Aliter capiuntur cum ad conveniens intervallum accedunt, coniectis ad pedem funibus plumbo innexo extremitati quibus impeditur cursus. Tondent illas ad stragula.

Lana earum subtilis & delicata instar sericorum. Pertinacis coloris est, quippe nativi, nulla tincturâ opus habet; In æstu recreat, juvat renum inflammationes: quamobrem culcitras ex eâ inferciunt. Dicitur mitigare etiam podagra. Caro haud jucunda, nihilominus Indis edulis. De salubritate Josephus Acosta narrat, acerrimum dolorem oculorum pænè subito placasse sibi imposito frustulo carnis recenter occisæ *Vicunæ*. Generant in viscere bezoar, secundum post Orientalem. Proximum *Vicunæ* genus *Taruga*, perniciosior, grandior, torridior colore, mollib. & decidentibus auribus: non gaudet societate & grege, rupes sola peragrat. Repertus in his Bezaar major virtute & mole.

PUNCTUM VII.

De Subak Scytharum, & Capra auribus demissis.

DE *Subak Scytharum* ita Aldrovandus. Aldrov. In Scythia latissimis &c. Vide pag. 313. H. Bisul. c. 23. usque ad finem. *Capras auribus demissis*, Aristoteli debemus. Mensurâ hæc palmari, & dodrantali, & nonnullæ ita demissæ, ut spectent ad terram. Fortè ex his ista, cujus Aristot. H. A. l. 8. c. 23. Icon hic ponitur, & quam *Capram Indicam*, & *Mambrinam Syriacam* vocant. Lanâ pilis facieque & cornibus ovem potius quàm capram referre videtur. Color albus est.

PUNCTUM VIII.

De Oryge.

TRia animantium genera *Orygis* nomine apud Græcos celebrantur. Unum aquaticum, duo terrestria. Illius apud Strabonem mentio, ubi de Turdetania agit, quod, teste Hermolao, quidam, Orcas marinas esse opinantur. Horum, duo esse genera, ex Plinio & Oppiano colligere licet. De Oppiani *Oryge* in sequentibus agemus. Hic Græcis *ὄρυξ* & *ὀρύξιν*, seu *ὀρύξιν*, fodere dicitur; quod ad ortum, ut posthac dicemus, accedente lunâ, prioribus pedibus terram effodere dicatur. Plinius, si *Formam* spectes unicornem & bisulcum facit, & quidem ex Aristotele. Ex caprarum sylvestrium eodem genere. Contrario pilo vestiri, & ad caput verso, quod & tauro Æthiopico, competit. Eundem perpetuò sitientia Africa generare, & natura loci potu carentem, & mirabili modo ad remedia sitientium, apud eundem legimus. Namque Getuli latrones, eo durant auxilio, repertis in corpore ipsorum saluberrimi liquoris haustu vesicis. Albertus magnitudine hirci esse, barbatum sub mento, in eremo versari, & faciliè laqueo decipi scribit. Herodotus magnitudine bovi comparat. Nec nos quicquam certi de ipsius forma habemus. Cornua in omnium ferè musæis ostenduntur atria, in extremo mucronata,

nata, pro ætate animantium, longitudine, crassitie, & numero nodorum variantia. Icones duorum hic damus. An ejus sint, an Afini Indici, ne Aldrovandus quidem definire audeat. At quia Æthiopes qui Sili vocantur, iis tanquam armis contra Struthiophagos utuntur; & hæc durissima sint, mucronata, longa & cava, videntur ejusdem esse. Ægyptii multa de eo commenti sunt. Syrii nempe ortum sentire, atque etiam clamore edito significare: contueri stellam, ac veluti numen adesse sentiat, procumbere adorandum: seu singulari quadam sympathiâ, seu, quod apud Albertum legitur, imbrem & frigus præteriisse, frigoris nimium impatiens, percipiat. Quomodo se erga Lunam & Solem gerat, Aldrovandi verbis exponam. Idem, inquit, Ægyptii impurum, ut inquit Orus &c. Aldrov. p. 315. b. D. usque ingratus & impius in eam Oryx videri debeat. Addunt, ad ortum solis conversum alvum dejicere; & perpetuam sitim perferre. Meminit Orygis Columella & Martialis: sed vix ejusdem credo. Hic eum sævum vocat: Ille inter ea quæ ad cultrum in leporeis reponuntur, enumerat. *Oppiani Orygem* ita Aldrovandus, interprete Gyllo, describit. Oryx, inquit, in sylvis versatur feris infestissimus: colore est lacteo &c. Aldrov. p. 316. a. D. usque. Hactenus Oppianus. Diversum à superiori esse, vel exinde non malè colligas, quod ille inter capras, quæ timidæ referatur: hic verò, ferox sit. De cornu quidem nihil adjecit; at adjecisset, si unum habuisse scivisset. Ælianus quadricornes in India reperiri scribit. Ambrosius Paræus, cujusdam feræ, in quadam maris rubri insulâ Cademotha Arabibus dicta, incolis Pyrrasoupi dictæ, ex Cosmographia Theveti meminit. Magnitudine est mulo par, capite non absimili, urfinis veluti pilis vestita, sed haud adeò obscuris, verum ad flavum inclinantibus, bifulcis, ut cervus, pedibus. Duo procera sed minimè arborea capite gestat cornua, unicornium cornibus affinia. Indigenæ, bestiarum aut piscis venenati morsu læsi, aquâ, in qua aliquot dies ejusmodi cornua infusa fuere, hausta, statim convalescunt.

ARTICULUS VII.

De Cervo.

Cervi nomen, à cornibus quæ gerit, (ea Græcis κέρατα) apud Latinos sumtum est. Apud Græcos plurima obtinuit hoc animal nomina. Dicitur namque ἐλαφ, vel quasi ἐλαφρός, id est, levis, vel quasi ἐλοφ, ἄλξ τὸ ἐλκεν καὶ ἀναίρειν ἄλξ τὸ μυκίαντων ὄφεις; ἢ δὲ τὸ ἐλκύνειν ὄφεις, ἢ δὲ τὸ ἐλ, nimirum quod circa lacus & aquas libenter versetur; aut quod cornu ejus suffitum serpentes fuget; aut quod ipse cervus cornu ad saxum attrito nidorem excitet, quo serpen-

tes cavernis pellit. Dicitur & λάφ, αἰετός, κέρ, βέρ, βέρ, βέρ, Laconibus imprimis, κνήκ, Nicandro, νεβρολί, πέχαις, σερρός, ταχίνης, Varinus πὰς ἐλάφης πὰς πρῶτον πηλίκας, cervas primum parientes, Procas vocat, Φυράκας, Πάκας. Hinnulus cervi, dicitur, ἐλός, λάδας, ναυθός, νεβρός, κέρ, quasi κέρ, quod in spelunca adhuc jacet, κέρ, & κέρ. Animal est bifulcum, forcipem pro ungue habens; pilo molli, & si Junio credendum, intus cavo, ideo commodè natat. Colorem ipsi Pollux tribuit, Πήξανθον, qui sit Πήξανθον λουκίς, γάμμασι, scemina præcipuè, & hinnulus. Euripides βαλίαν vocat, seu spadiceæ coloris, Euripidi παθίναι, à colore δ' παθίνης, seu phaniceo dicuntur. Dantur tamen & albi: qualis erat Sertorii cerva, quam esse fatidicam Hispaniæ gentibus persuasit. Cornua ipsi inter reliqua animalia maxima: Cervæ nulla; repertæ tamen cornigeræ, quos Maximilianus Cæsar observavit, & Scaliger vidit. Anniculis nondum cornua nascuntur, nisi quoad indicium, sit initium quoddam protuberans, quod breve hirtumque est. Bimis primum cornua oriuntur simplicia, & recta ad subulorum similitudinem, quamobrem πηχάλιας, subulones, eos per id temporis vocant. Trimis bifida exeunt, quadrimis trifida, atque deinceps ad hunc modum procedit numerus, usque ad annum sextum. Constat tamen in multo plures ramos illud distribui. Habuit Guilhelmus Baveriæ Dux bina, quorum utrumque, unum & viginti ramos fundebat. Albertus testatur eadem in Germania ad undecimum dividi. Vidit Æmilianus in penu Ferrariæ Ducis, cervum interfectum, magnitudine equo paulo inferiorem; cujus cornua adeò erant ramis referta, ut ne illis Germanicis cederent. Sed & Antverpiæ in pharmacopolio visâ, quorum singula ramos circiter quindecim ostentabant, Gesnerus prodidit. Differunt verò hæc cervorum cornua ab aliis, quod cum omnibus sint cava & in mucrone demum concreta, cervis tantum solida sint; & cum cæterorum ossibus adherant, cervorum tantum cutibus enascuntur. Nec ullum animal præter cervum eadem mutat. Fiunt adeò solida & dura, ut soliditate ad lapidum naturam accedant. Inveteratum perquam leve redolitur, præsertim si sub dio fuerit, ita ut nunc humeat, nunc siccescat. Gesnerus observavit in consummati cornibus mucrones, sive ramulos supremos, qui bini alioqui aut terni subinde spectantur, septenos, & in eodem loco stipitis latitudinem sex digitorum; inferius autem fuisse alios binos ramos & adminicula. Observavit item inter cranium cervi & cornua, ossicula sive tubera gemina ossæ protuberantia, lævia, duos circiter digitos longa, eò breviora quò cervus natu major est.

Aldrov. Hist. Bifulc. c. 25.

Ælian. H. A. l. 14. c. 14. Paræus Tomo 1. l. 5. c. 5.

Plin. H. N. l. 8. c. 32.

Æmilian. de Ruminantibus.

Aistot. H. A. l. 2. c. 1. 3. c. 1. Plin. H. N. l. 11. c. 3.

Aldrovand. Hist. Bifulc. c. 27. Nomen.

est. Horum singulis singula, ait, adnasci cornua, per symphyfin quandam & quasi coarticulationem. Addit denique, subulonis cervi cornua se vidisse, dodrantis circiter longitudine: *furcarii* verò vulgo dicti, qui trimus est, duorum & amplius dodrantum. Quæ hic expressimus, lævia erant, albicantia, & minimè rugosa. Singulis annis stato veris tempore ea amittere, Aristoteles prodidit; qui etiam tradit, caput fuisse, cujus cornibus viridis hederæ innata fuisset; quod & apud Plinium habetur. Castratis defluere Oppianus author est. Et hæc de Cornibus. Quantum ad alias partes, *Facies* ipsis est carnosæ, *nasus* simus, *collum* oblongum, *nares* apud Oppianum quaternæ, totidemque meatus. Musculi temporales & exiles & debiles; *aures* scissæ ac velut divisæ, sed præcipitanter, quales peculiariter iis Aristoteles adscripsit, qui circa Arginusam in Elapso monte versantur. *Dentes* habent quatuor utrinque, tum infra, ut annotat Albertus, quibus molit cibum, & insuper duos alios magnos, qui mari quam fœminæ majores sunt; vergunt autem omnes deorsum, ut repandi videantur. Vermes continent omnes suo in capite vivos, qui nasci solent, proden- te Aristotele sub lingua, in concavo, circiter vertebra quæ cervici caput innectitur, vermibus qui in cervicem enasci solent, haud minores, continuos, numero viginti. At fue- re qui plures videre, & quidem discretos: fuere & alii, qui nullos. Dicunt itidem in- tra oculi os vespas enasci & provolare. *San- guis*, aquæ similis est, & nullas continet fi- bras, si Aristoteli & Plutarcho credimus: Baldus Angelus Abbatiæ, coagulatum se observasse scribit, idemque aliorum obser- vatione constare. *Oculos* habet magnos. *Cor* irem proportionem magnum, quantum omni- bus timidis esse solet. *De lapide* in oculi can- tho varii varia. Agricola lapidem Belza- hart: Bellunenſis Bezaar. Scaliger lapidem esse negat. Ante centesimum, inquit, an- num in cervo nulla est. Post eam ætatem accrescit ad oculi canthum; ipsis ossibus atque in os protuberans concreſcit, eâ du- ritie quâ cornu superet. Quâ parte promi- net, rotunda est, insigni nitore, coloris ful- vi, non sine vestigiis atriorum venularum. Tanta levitate ut penè tactum effugiat. Ita enim sese subtrahit, ut seipsam prope- modum movere videatur, &c. Scribonius, oculi fordes vocat. *Ossa* in corde omnibus propè cervis reperiuntur: annosioribus ta- men majora, minora junioribus, crucis in- terdum formâ, decussatim mutuò interse- cta, inquit Iordanus. Vidi, inquit idem, exectos propè columbini ovi magnitudine, laminis conflatos, & quod jucundum fuit as- pectu, postquam comminutus fuit, reper- tum est os in meditullio, simile cæteris ossi- bus corde prognatis, circa, quod putami-

na hæc sese aggregando amplificaverant, & in hanc molem atque duritiem calore cordis extorrente lapillum prodixerant. Gesnerus à medio Augusti duntaxat ad idu usque Septembris inveniri scribit. Reno- dæus in junioribus, non os, sed cartilagi- nem esse. Nervum seu cartilaginem ner- veam Brasavolus vocat. Andernacus, sinis- tro detecto sinu, maximeque arteriæ totâ basi apertâ, si radices illius & membranarum sequaris, inveniri tradit. Nam arteriæ aor- tæ, venæque arteriosæ & membranarum ea- rundem radix, ex ossæ illa cartilagine cordis procedit. *Cauda* ipsi exigua est, vituli mari- ni modo. *Crura* perquam gracilia. *Ventres* plures. *Genitale* nervosum more Cameli. *Intestinum* tam tenue imbecilleque, ut etiam leviter percusseris, possit rumpi cute adhuc integrâ. *Fellæ* vacare ajunt, sed intestinum adeo amarum, ut ne à canibus quidam attin- gatur, nisi cervus præpinguis sit. A chaini in cauda id gerere creduntur; esseque quod ibi contineri ajunt, colore quidem simile felli, sed non ita ut fel humidum, sed lieni parte anteriore simile. *Cervæ* cervo minor est: ani- mal aliàs aspectu egregium, mutilum cor- nibus, visu acuto, miræ velocitatis. Qua- terna habet ubera, ut vacca. Galenus de fæ- tus tunicis agens, ac de venis & arteriis, quæ ex utero in ipsum inferuntur, asserit, quod in omnibus animalibus, quæ suapte natura ad saliendum sunt proclivia, ut cervis & capris, vasorum productiones matricibus sunt connexæ, non per tenues modò membranas, sed cum eis etiam per carnes viscosas, velut pinguedinem quandam, specimen esse mira- bilis providentiæ. *Dorsum* dum pingue esse Oppianus dicit, de utroque sine dubio sexu intelligit. In Africanon reperiri Aristoteles & Plinius prodidit, contradicente Virgilio & recentioribus. In Apulia sæpè exercitus speciem præbent, & Ferdinandum Regem Neapolitanum eo deceptum, nec non Jaco- bum Caldoræ solertissimum suæ ætatis Im- peratorem, prodidere scriptores. In Ca- thaïæ provincia Bargu & copiosi sunt, & sæ- pè tam cicures, ut eis insideant. In Batavia, referente Hadriano Junio, toto illo collum arenariorum tractu, cum interjectis conval- libus, qui Egimondam usque ab Hagienſi nemore in longum porrigitur, magna eorun- dem copia. In Britannia palmatorum Ca- pitolinus meminit: albos & nigros dari qui- dam affirmant. In regione Chicorariorum in orbe novo, teste Petro Hispalensi, adeo cicures sunt, ut perinde ac apud nos capræ, alantur. Cretensem agrum cervo egere So- linus scribit, Cydoniatarum regionem si exceperis. At Varinus Achæinarum cervarum meminit, quæ & *αχαινας* dicuntur, ab Achæa insulæ illius civitate. Bellonius quo- que non paucos ibi reperiri reliquit, quod insula noxiis animalibus careat. In Cyprum

Arist. H. A. l. 4. c. 5.

Oppin. Cyneg.

Arist. H. A. l. 6. c. 10.

Aristot. H. A. l. 2. c. 15. Plin. H. N. l. 13. c. 17.

Aristot. H. A. l. 3. c. 6.

Plin. l. c.

Scalig. Ex- ercit. 112.

Jordan. de phænomo- nis pestis tr. 3.

Aristot. H. A. l. 2. c. 1.

Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Aristot. H. A. l. 6. c. 29.

Locus. Plin. H. N. l. 8. c. 33.

Pontan. l. 2. de bello Neapoli- tano. Junius Ba- tav. l. 1. c. 64.

Ælian. H.
A. l. 5.
c. 56.
Arist. H. A.
l. 6. c. 29.

Martyr.
Decad. O.
cean. 7. c. 2.

Generatio.

Aristot.
H. A. l. 6.
c. 29.

è Syria ideò transire, quòd pastionum quæ illic amplissimæ dicuntur, desiderio teneantur, apud Ælianum habemus. In monte Asiæ Elapho apud Arginussum scissis sunt auribus, quod & Helleponti cervis, modò citatus author adscribit. M. Aurelius Imperator, cicules ibi nasci, addidit. Apud Scotos grandes sunt, & tam frequentes, ut solemni plærumque venatione, nunc quingenti, nunc octingenti, nunc mille prosternantur. Sunt ex his nonnunquam qui adipem decem pollices latam habent. Dantur & numerosi, in Hebridum insularum monte, cuià Cervo nomen est. Xapita nov. orbis regio, referente Petro Martyre, cervorum armenta habet, ut nos boum. Domi pariunt, domi nutriunt, soluti per nemora pastum quærendo, luce durante vagantur, ad vesperam pullos domi relictos revisunt, & intra cortès claudi se, ac natis suis depastis mulgeri sinunt. In Gallia quoque circa Fontem bellaqueum sunt numerosi: In Florida sunt partim domestici, quales fortè in Xapato; partim sylvestres, quorum quidam bovem adæquant, quidam minores sunt. In multis Germaniæ locis cicules in fossis circa moenia aluntur. In Helvetia minus hodie abundant, quòd sylvæ propter frequentiam incolarum, indies minuantur. In Hercynia, colore nigricantes reperiri, à quibusdam accepit Gesnerus. In Dikilapporum denique regione, sunt eorundam greges, & Norvegis Rhen dicuntur, nostratibus cervis aliquantò majores. Lappi vice jumentorum utuntur. Vehiculo, inquit Sigismundus Herbersteinus, in scaphæ piscatoriæ formam factò, cervos jungunt, in quo homo, nè cervorum citato cursu excidat, pedibus alligatur; lorum, quo cervorum cursum moderatur sinistra, dexterà vero manu baculum tenet, quo vehiculi, si fortè in aliquam partem plus æquo vergeret, casum sustineat. Atque eo vehendi genere viginti millaria se unà die confecisse, cervumque tandem dimisisse, eumque ad Dominum suum stabulaque consueta rediisse, dicebat. Tanta amoris libidine flagrant, ut totà die ad venèrem ferantur. Ad mensem ita agitari, mox defævientes alterum paulò minus mensem absumere, Budæus prodidit. Certant tum pro fœminis, & victori, ut domino, obedit victus, sequiturque ut herum, si Alberto fides. Impletis fœminis, separari per seipsos mares, & propter libidinis graveolentiam, quemque solitarium scrobes fodere, more hircorum foetere, facies quoque nigrescere aspergine, & ita degere, quo usque imber accedat, tum pascua repetere, Aristoteles author est. Coire incipit mense Augusto & Septembris ab Arcturo, implenturque paucis diebus & multæ. Cerva plærumque subfidens coit, quòd marem ob contentissimum

impetum sustinere nequeat: aliquando tamen more ovium sustinet, & socias declinat, cum turgente jam venere, coitum appetit. Oppianus magnà celeritate currentes fœminas iniri reliquit: mares verò duobus pedibus quantum possunt, cursimque sequentes coitum absolvere. Transeunt in coitu ad alias iidem, redeuntque ad priores. Plinius, cicules non concipere, nisi ab infantia fuerint educatæ ait. Ferunt uterum octo menses: pariunt magnà ex parte unum. Incrementum hinnulorum velox. Cerva cum parit, pituitoso humore purgatur, aliàs nunquam. Dum lactat, sese dimittere Pollux prodidit, Gesnerus refellit. De longævitate cervorum quædam apud authores occurrunt. Hesiodus in versibus qui tamen in operibus non extant, cornici novem nostras ætates tribuit, quadruplum ejus cervis. Sic ferè 3600. annos viveret. Plinius, post centum annos aliquos captos cum torquibus aureis quos Alander Magnus addiderat, adopertis jam cute, in magnà obesitate. Tempore Caroli Gallorum Regis, qui tempore schismatis inter Clementem & Urbanum V I. vixit, captus est ad Sylvanectum cervus, in cujus torque latinis literis scriptum erat, Hoc me Cæsar donavit. De Cajo Julio Cæsare etsi id capi vix possit: potest tamen ad Carolovingorum aliquem referri. Theophrastus etsi octogenario major obiverit, conquæstus nihilominus est de naturâ, quòd cervis longiorem quàm homini vitam dederit. Taceo sacram Dominæ cervam apud Pausaniam, quæ tempore Agapenonis hinnulus erat: nec non Diomedis cervum, qui tempore Agathoclis, post aliquot nempe secula, captus est. Cæsaris Augusti cerva, cum inscriptione torquis, *Noli me tangere, quia Cæsaris sum*, innumeris propemodum lustris ab ipsius imperio, deprehensa fuisse dicitur. Quidam ætatem ex ramorum multitudine colligunt, quod Aristoteli non placet. Author Philomelæ eos glocitare scripsit, Virgilius graviter rudere. Mutant vocem pro sexu. Brevis fœminis, maribus productior. *Amicitia* ipsis cum attagene: at cum aquilâ, vulture, serpente, canibus, tigride, belluis, ariete, vulpium gannitu, cactò, aspalatho, rubris pennis, hostilitatem gerunt. Attagenes sæpissimè dorso ipsorum insident, & pilos vellicant. Aquila insidens cornibus multum pulverem volutatu collectum excutit in cervi oculos, pennis ora verberans, donec præcipitet in rupes. Cum serpente ipsis pugna. Investigant cavernas, nariumque spiritu extrahunt renitentes. Ideò singulare abigendis serpentibus; odor adusto cornu cervino. In Libycis sinibus ab iisdem jacentes impeti, apud Oppianum legimus. Cactum si cervus calcet & saucietur, ossa ejus nullum sonum edere possunt. Aspalatho tactus emoritur. In-

Plin. H.
l. 10. c. 6

Arist. l. c.

Ætas.

Vox.

Sympathia
& Antipathia.

Plin. H. N.
l. 10. c. 3.

Plin. H. N.
l. 8. c. 32.

Ingenium

In Genium.

genium sequentia ostendunt. Gaudent *ταῖς ὄρεσιν*, seu locis incultis, sylvosis, & nemorosis, ubi solum bonum & pingue est. Sylvas quoque, vinea & loca aprica amant. Mas relictis pascuis ad sylvam se celeriter recipit, sed eandem non ingreditur: foemina densiora ejus loca sequitur. Meliora quandoque pascua nacti, semper tamen ad pristina ubi educati sunt, redire solent. Eminens, uno minore cervo comitatus incedit, quem *armigerum* venatores vocant. Pascuntur tota penè die: & sub meridiem ubi sol maximè fervet, in umbra delitescunt. Adeò sunt timidi, ut in proverbium abiverint: & Cantharion Arcas ab oraculo cervus sit dictus. Saltu valere, vel locus non procul Francosurto, à cervino saltu nomen mutuatus ostendit. Duo ibi lapides erecti, prodente Gesnero, cernuntur, interstitium pedum hominis mediocris quasi sexaginta. Tanto enim spacio saluisse illic cervum, idque etiam supra plaustrum oneratum, cum venatores instarent. Requiescunt in fuga, dum qui insequitur, appropinquet, & tum iterum fugiunt. Ubi animus despondere, relictis sylvarum opacis, in campestria se conjiciunt, & interdum ad vicos & villas propius accedunt. Secundo vento plerumque feruntur. De *solertia* in eludendis canibus, ita Budæus: Solere cervos ajunt, simul ut senserint rem sibi esse cum affecis infestis, simul & sagacibus, primum alios aliosque fugæ lapsos, & gyros conglomerare; deinde si porro urgeantur, stabula cervarum popularium, cervorumque diversoria petere; ibique inter turbam promiscuam, quasi intra nebulas erroris canini sese condere, interdum gregarios aliquot inde abigere, atque ad aliquantum spaci permixtum vestigia facere, ad negotium canibus exhibendum. Cum autem aliquantisper hac ratione contechnati sunt, ab illorum comitatu subito se subducentes, per tramitem devium longiusculè abscedunt, deinde interfistunt, ut interim canes vestigia cervulorum aut cervarum excipientes, diversi ab eis auferantur. Cumque hæc stropharum commenta canum experientissimorum odorandi vis vicerit, ad alia denuo se vertunt subsidia; cujusmodi sunt, per sua quadantenus vestigia recurrere: deinde spiras fugæ intorquere multipliciter & variè, & quàm fieri potest perplexissimè, tum raptim longius procurrere. &c. Visus quidam in armentum bubulum irrumpere, in bovemque primoribus cruribus insiliens armisque complexus ad longiusculum spacium velut equo vectus; postremis pedibus terram stringere, ut odorem sui, quoad fieri posset incertum, canibus relinqueret. Visus, referente eodem Budæo, qui in arborem in denso & opaco sitam insiliverit, in eademque sublimis, ramis fruticis ipso saltu diva-

ricatis steterit, sic interceptus, ut inde desilire non posset. Contra noxia gramina cinaram edunt: contra phalangiorum morsum, cancos. Sollicitè etiam cavent; ne quando in vulnera recentia folis radius incumbens, carnem priusquam cicatrice obducatur, putrefaciat. Dictamnium herbam extrahendis sagittis monstrare percussit eo telo, pastuque ejus herbæ ejecto; quod Dioscorides & Tullius capris adscribunt. Maria tranant, gregatim nantes, porrecto ordine, & capita imponentes, præcedentium clunibus, vicibusque ad terga redeunt. Hoc maximè notatur à Cilicia Cyprum trajicientibus, nec vident terras, sed in odore earum natant. Infirmos ponunt in ultimo; nec citius solvunt, quàm secundos ventos senserint. Pinguescunt æstate, & ideò latent, quòd se suæ corpulentia pondere facilius capi posse sentiant. Sed & cum cornua deponere occultantur interdiu, idque in opacis locis, ut muscarum tædio vacent; pascunturque per id tempus noctu, donec recipiant cornua; quæ ubi concreverint, soli exponunt, ut excoquantur & siccescant. Ubi verò attritu arborum, cum ea scalpunt, nihil indolere sentiunt, in patentia prorumpunt. Defodere, postquam deposuere eadem, fama est. Verum alii, alterutrum duntaxat defodere, scribunt. Dextrum cornu negant inveniri, inquit Plinius, ceu medicamento aliquo præditum, idque mirabilius fatendum est, cum & in vivariis mutant omnibus annis: defodique ab iis putant. Aristoteles id de sinistro prodidit, quamvis in Epiro dextrum obrui scribat. Abjecta in vivariis negligi, nec humo obrui, observatum est: quin & in sylvis in aperto jacentia sæpè reperiuntur. Serpentes abundè saturati, ne veneni virus noceat, ad flumen contendunt, & ore summè tenus corpora demergunt, nec citius bibunt, quàm vi frigoris cogente haustum venenum per oculos desudando elachrymaverint. Vincentius Belluacensis esu serpentum caligini oculorum mederi scribit. Capti, non solum cicurantur, sed etiam vocati ad hominem accedunt. Frena & juga ferre, apud Calpurnium legimus. Certè septem cervorum bigas in pompa Ptolomæi fuisse, author est Athenæus: Heliogabalus verò junctis quaternis, in publicum processit. Taceo Mithridati Regi Ponti pro corporis custode fuisse; & Sertorio Romano Hispanor. Duci cervam albam in comitatu, quam ille Dianæ numen fingeat. Assuefactum à Ptolomæo quandam ut sermonem Græcum intelligeret, Ælianus refert. In pariendo semitas minus cavent, humanis vestigiis tritas, quàm quæ secretæ & feris opportunæ. Sefeli ante partum purgantur, ut faciliori utantur utero: postquam peperere, involucrium primùm exedunt, mox herbam quandam degustant, sic ad prolem redeunt. Non

Æl. H. A.
l. 1. c. 8.Plin. H. N.
l. 8. c. 32.Ælian. H.
A. l. 5. c. 56.Arist. H. A.
l. 9. c. 5.Aristot. l. 6.
& l. 10.Ælian. H.
A. l. 7. c. 46.Æl. H. A.
l. 11. c. 25.

qualibet autem partus suos educare, Solinus author est; teneros studiosè occultare, & absconditos inter profunda fruticum, vel herbarum, pedum verbere castigare ad latendum; cum maturuerit ad fugam robur, exercitio docere cursus, & asluefacere salire per abrupta. Mulcentur fistulâ pastoralis & cantu, interdum ita, ut interim pascua negligant. Quantum ad sensum, si erectas auriculas teneant, acerrimè sentiunt; sin demissas, faciliè opprimuntur. Visu valere vel id argumento est, quòd *μεγαλωπιδες* Oppianus vocat. De *Ufu in Cibus* in diversa abeunt authores. Isidorus tradit, carnes habere teneras, & faciles concoctu propter motus frequentiam: si verò castrentur, antequam cornua crescant, magis temperatas fieri. Galenus duras facit, difficiles concoctu & melancholicas; alibi, asinorum carni similes. Simeon Sethi, bilem atram gignere profitetur, cavendasque æstate, quòd tum propter serpentum esum venenatæ sint: si frequentius fumantur, corpus tremulum facere: per hyemem tutius sumi. Julio Alexandrino præstat caro hinnuli, quanquam & vetustioribus laus, neque tamen vetulis; ætatis longitudo in causa, ut vel in trimatu commendari possint. Consistendi ætas, ut longissima, sic deterior eadem, crescente semper siccitate & carnis duritia. Tempore libidinis eam vitiari, & hircorum instar foetere, apud Aristotelem legimus. Avicenna quartanas ejus esu induci putat. At Plinius, quasdam se foeminas principes scire testatur, omnibus matutinis carnem eam degustare solitas, & longo ævo caruisse febribus, quòd ita demum existimant ratum, si vulnere uno interierint. Alii, diuturnitatem cervinæ esu sibi pollicebantur, quòd vivacissimum animal esset. *Hepar* pravum esse Vincentius Bellunensis scribit. *Cornua* recentior enata, in delicatiorum etiam unum venere. Bruyerinus, elixari & postea in fistula frigi scribit. In *Medicina*, *pili*, *pellis*, *medulla*, *serum*, *cerebrum*, *pulmo*, *genitale*, *cor*, *ossa*, *coagulum*, *urina*, *lachryma*, *cornu imprimis*, locum habent. *Pilis* vulvæ suffiuntur; suffitus contra abortum facit. *Pellis* ramenta defecta pumice, & ex aceto trita, igni sacro illinuntur. Si eadem cum pedibus dextris portæ infigatur, ingressum animalis venenosi prohibet. Eadem ad involuntarium urinæ exitum, in stratis remedium. *Medulla*, leniendo dolori est præstantissima: serpentes inuncta fugat: perfusis aquâ aliove liquore fervido, peculiare est remedium: in aqua, potui data, intestinorum tormina sedat: dysentericos dolores per clysterem injecta, sopit: uterorum duritiem in pellis intrusa emollit. De ejusdem in menstruâ aperiendis usu, ita post Agricolam Mizaldus. Si medullæ cervinæ drachmas duas vel tres pro corporis & ætatis mo-

dulo, includantur in linteolo mundo & raro, postea pudendo muliebri inferantur, filo extra pendente ut retrahi possint, modò tunc se offerat opportunum ac statum purgationis tempus, & præparatum fuerit corpus, præscriptaque vitæ ratio. *Serum*, podagricos dolores lenit: ad lentigines faciei adhibetur: combustum & cum ostrea tosta commixtum, perniones sanat: uteris exulceratis, recens ac viridis subditur. *Cerebrum*, in coxarum & laterum dolore, restituendisque fracturis laudat Rhasis. *Pulmo*, clavos, rimas, & calli vitia tollit, si Plinio credimus: impositus & sæpè renovatus, ex calceamento læsos pedes, affirmante Marcello, per sanat. Sunt qui phthifico profuisse scripserunt, siccatum in fumo, tritumque in vino. Cinis in olla siccili exusti, multis ad suspirium & dyspnæam profuit. *Genitale* siccatum & tritum cum vino contra viperarum morsus exhibetur: tauro cum vino illitum, ad coitum eundem excitat; aridum, contra difficultatem mingendi aut colicam valet, si aqua in qua ablutum fuerit bibatur. Magi, ut author est Plinius, partum contineri promittunt, si mulieri candida à pectore hyænæ caro, & pili septem, & genitale cervi, illigentur dorcadis pelli, & collo suspendantur. *Ossa* ad ventris profluvium Galenus inungijubet. Sextus verò, patellam cervinam, si tecum habeas, negat surgere inguina, & quæ ante surrexerunt, eadem tacta redire. *Cor* cum pelle & cornu combustum, vulnera, iisdem cum oleo inunctum, sanat. Os de corde, inter antidota habetur. Lapis qui in corde aut vulva reperitur, contra abortum facit. *Coagulum* hinnuli in utero occisi, præcipuum est contra serpentium morsus remedium. Utiliter quoque bibendum, morso à cane rabido datur. *Quin* contra cicutæ & fungorum esum facit. *Urina*, splenis dolorem sanat, ventriculoque & intestinis inflatis prodest. *Lachryma*, inter sudorifera censetur, tantosque ciet, ut penè totum corpus solvi credas, in vini momento exhibitum. Quâ parte prominet, rotunda est, insigni nitore coloris fulvi, non sine vestigiis atriorum venarum, tantâ levitate, ut penè tactum effugiat: ita enim sese subtrahit, ut propemodum seipsam movere videatur. *Cornu* maximus usus est. Ex typhis sanguine adhuc madentibus, aqua rhizotica, contra malignas febres destillatur. Uritur aperto igne & philosophicè, & non tantum ad sudores & adversus venena commendatur; sed & contra varios morbos. Floridæ insulæ incolæ infantium labiis perforatis ea imponunt, sic à veneno illæfos fore sibi persuadent. Andernacus collyrium ex eodem, cum thure, plumbo usto, opio &c. & aqua pluviali, conficit. Idem, aceto incoctum vel tritum, porri-

Ælian. H.
A. l. 12.
c. 46.

Ufu in Cibus.

Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3. c.
6. & 8.

Jul. Alex.
l. 11. c. 11.

Arist. H. A.
l. 6. c. 29.

Ufu in Medicina.

Galen. in
Euporistis

Galen.
simpl. 17.
l. 5.

Mizald.
cent. 6. a-
phor. 96.

Hippocra-
tes de
morb. mu-
lier.

Galen. Eu-
por. l. 2.
c. 42.

Heurni.
Method.
ad praxin.
l. 2. p. 245.

porrigini & impetiginibus inungitur: cum lenticula & sevo cervino, lentigines de facie tollit: accensum, nidore suo morbum comitalem pròdit: adversus scrophulas tritum cum spongiis, in quibus lapides reperiuntur, æquali mensura ex vino aut aqua quotidie bibitur: ad polypum cum sandarachanaribus inflatur: ad dentium albedinem in cinerem in olla nova redactum, cum mastiche, & sale ammoniaco miscetur: crudum inque aceto fervefactum, maxillarum, à dentitione dolorem adimit: adustum & cum vino tritum, deinde circumlitum, vacillantes dentes confirmat. Hæmoptoicis cum tragacantho medetur: dysenteriam seu uisum, seu in galredam redactum, sanat: ad vomitum, cum sulphuris vivi pusillo, in ovo forbili exhibetur. Sextus combustum ex oxymelle splenem siccare affirmat. Ad colicam ex iisdem teneris remedium Marcellus habet, cujus descriptionem apud Aldrovandum vide. Contra lumbricos Galenus cum ebore propinat. Sunt qui cretam, semen sanctum, vitellum assum, admiscunt, & cum melle placentam parant. Ad profluvium denique muliebre, & præfocationes uterinas adhibetur. In *Differentiis* nihil ferè occurrit, præter ea quæ apud Nierembergium leguntur. Cervinum, inquit iste, non simplex, Novæ Hispaniæ genus. *Macame* vocant. Quidam rubei, quidam albi toti. Hos cervorum Reges dicunt Indi, & *yztac macame* appellant. Alii nostratibus aut iisdem, aut valde similes forma, magnitudine, ingenio: *Aculhuame* nuncupant. His minores *Quauhiltamacame* in magnam generositatem degenerant à cervinâ timiditate: efferoiunt vulnerati, adoriuntur venatores, sæpè occidunt. Ejusdem molis & moris sunt *Thalhuicamacame*, sed impares animo. Minimi sunt *tamamacame*, fortasse potius caprarum genus. In Duarhe, Xapidâ, & aliis novi orbis plagis, cervorum erant armenta, quemadmodum nobis boum, (prout superius diximus.) domi pariunt, nutriunt. Soluti, per nemora pastum quærendo luce durante vagantur, ad vesperam pullos domi retentos revifunt, intra cortes claudi se ac natis depastis mulgeri patiuntur, nullum aliud lac, aut ex alio lacte caseus. In aliquibus Occidentis regionibus vexati cæsi que à venatoribus, quærent herbam *Atochielt*, (sic vocant Barbari, & species pulegii est) hac recreantur restauratione virium, novam pernicitatem acquirunt: majoris illis usus est, quam dictamni virtus. In Virginiâ cervi longiore caudâ sunt præditi quam nostrates, & cornuum extrema in dorsum recurva habent. Cervorum Americanorum quoddam genus Leriis vocat *Seouaf-seu*, qui differunt à nostris, quòd multò sint humiliores, minora gestent cornua, & æquè pilos demittant atque nostrates capræ. In

plagis novi Mexici caudam habent valde pilosam, alii prolixam, non aliter ac mulæ, cujus æquant aut superant molem. Maximi roboris sunt. Dux quidam Hispanus duos injunxit mansuetos rhedæ suæ vehendæ. De *Cervopaltrato*, ita Aldrovandus. Diximus ex Julio Capitolino, Gordiani sylvam memorabilem pictam in domo rostrata Cn. Pompeii, inter alias picturas, cervos continuasse C C. palmatos: hosque Gesnero primum visos, eosdem cum dorcadibus platycerotis. Cæterum cum postmodum Joannes Cajus medicus Britannus hæc illi cornua ex Britannia misisset, mutatâ sententiâ, doctissimo illi medico, qui cervum palmatum revera esse judicabat, quod & mihi vedetur, assensit. Nam cum cornua hæc aut æquent, aut etiam superent, & longitudine & crassitudine cervinum, consonum est, corpus animalis, cervi potius quàm platycerotis simile esse. In Persia circa Schamachiam, Karabach, & Moragè, specie Damæ, subfulvos, cornua retrorsum incurva, absque nodis habentes, quos Turcæ Tzeiran, Persæ, Ahu inveniunt, Olearius author est.

Aldrov.
Hist. Bif.
sulc. c. 28.

Olaer. Itiner.
Orient.
p. 312.

ARTICULUS VIII.

De Tragelapho, & Tarando.

Tragelaphus inde nomen sortitus esse videtur, quod hirco & cervo sit similis. Volaterranus & Gesnerus Hippelaphum Aristoteli dici volunt, seu à similitudine ita dicatur; jubam enim habet, seu à magnitudine ut hippofelinum; major enim & crassior cervo est. Germani *Brandthirsch* vocant, seu, quòd sit nigrioris coloris quàm cervus, ut Agricola placet; seu quòd loca in quibus carbones fiant frequentet, & herbis ibidem nascentibus pascatur, ut Fabricio visum. Major est & robustior cervo. Villos nigros in gutture; longos in armis gerit. Ideò à cervo, barbâ tantum & armor. villo distare scripsit Plinius. Suprema pars dorso cinerea est, ventris subnigra; villi circa genitalia nigerrimi. Cæteris à cervo non differt. Non alibi quàm juxta Phasin amnem nasci prodidit Plinius, sed falsò. Nam & apud Arachosios inveniuntur Tragelaphi: & in Torantinis Königsteinianisque Misniæ saltibus Bohemiæ vicinis capiuntur. In Anglia quoque cervi nigricantes reperiuntur, ab his fortè non diversi. *Tarandus* Barbaris Pyrandrus & Pyradus, Hefychio fortè *ἑρῶν*, Septentrionalibus *Rehenschier*, dicitur. Magnitudo ei quæ bovi, caput majus cervino nec absimile, villus albus magnitudine Urforum. Tergori tanta duritia, ut thoraces ex eo faciant. Pectus habet torosum, ungulas bifidas, concavas, & mobiles. In cursu enim eas explicat. Ipse ad celeritatem expeditissimus, ita ut & summas nives calcet

Aldr. H.
Bifal. c. 29.

Plin. H. N.
l. 8. c. 32.

Aldrov.
H. Bifal.
c. 30.

calcet non impressis altè vestigiis, & pernicitate insidiantia in vallibus animalia effugiat. Cornua gestat præalta, quæ statim à fronte ramis duobus latis mucronantur quasi in digitos. In medio ramulus veluti internodium interjectus; inde rursus in ramos latos, digitorum expansorum specie mucronatos exeunt. Cornua sunt alba, venulisque longis distincta. Differunt ab alces cornibus altitudine, à cervi latitudine, ab utrisque colore, & ramorum multitudine. Currendo ea in tergum demittit: nam stanti, frontem penè rami inferiores tegunt. His inferioribus, concreta frigoribus flumina ad potum capiendum rumpere fertur. Sylvarum fructibus & arborum musco vescitur. Latibula struit in montibus Septentrionalibus, & in Mosibergum, aliosque Norvegiæ montes intensioribus frigoribus procedit. Capitur ab hominibus ad usus domesticos. Nam ad conficienda itinera domatur à cursoribus, ad opera rustica ab Agricolis. Caro ejus è ferinis illorum locorum optima & delicatissima. Natura animal esse gregale; & mille tarandorum armenta, in vastis septentrionis sylvis aliquando conspici ferunt. Foemellæ ramis carent. Reperiuntur in Norvegia Suecia, Laponia, & Polonia. Augustam Vindelicorum bini cum sellis, phaleris, & phrenis, erant aliquando adducti. De coloris in ipso mutatione, ita *Solinus*. Hunc tarandum, affirmant, habitum metu vertere, & cum delitescat, fieri similem cuicunque rei proximaverit, sive illa saxo alba sit, seu fruteto virens, sive quam aliam præferat qualitatem. Faciunt hoc idem in mari polypi, in terra Chamæleontes. Sed & Polypus, & Chamæleon glabra sunt, & pronius est cutis lævitate speculi modo proximantia æmulari. In hoc novum est, ac singulare, hirsutiam pili, colorum vices facere. Cæterum quis ille Plinii & Solini Tarandus sit, nec Gesnerus quidem rectè nosse visus est. Nam modò cum Turone, modò cum Rangifero, de quo in sequentibus eundem facit. Icon quam hic damus, verissima esse creditur.

Solin. Polyhist. c. 33.

ARTICULUS IX.

De Rangifero.

Aldrovand. Hist. Bifal. c. 31.

IN Descriptione Rangiferi, quem *Reen* vocant, non conveniunt authores. Albertus speciem cervi repræsentare dicit, sed majorem esse corpore, colore insignem, & ad fugam celeberrimum. Tres, secundum eundem, cornuum ordines in capite gerit, ita ut in singulis bina sint cornua, & caput ejus virgulis compositum videatur. Ex his duo cæteris majora, in loco cornuum cervi, quæ ad perfectam magnitudinem augentur, ad eò ut quinque cubitorum mensuram ali-

quando attingant, & ramis viginti quinque conspiciantur. Duo etiam in medio capitis, ut damarum habentur, mutilis & brevibus ramis mucronata. Denique alia in fronte antrorsum versâ, ossibus similiora, quibus in pugna potissimum utitur. Olaus Magnus tricornem esse scribit, de genere cervorum, sed longè proceriorem, velociorem, longiorem. Rangiferum duplici ratione dici, tum quòd in capite alta cornua, velut quercinarum arborum ramos ferat: tum quòd instrumenta cornibus pectorique, quibus hyemalia plaustra trahit, imposita, ranga & loga patrio sermone vocentur. Cornuum verò duo cæteris majora, eo loco habere quo cervus: aliud in medio capitis, ramusculis circumstantibus cæteris brevioribus situm, quo contra infestas bestias pugnat. Jubatum gerere collum, & ungulas rotundas. Johannes Agricola tridentem duntaxat in fastigio cornuum habere, & in saltibus Poloniæ reperiri, prodidit. Julius Cæsar bovem cervi figuram facit, cujus à media fronte inter aures, unum cornu existat excelsius, magisque directum his, quæ nobis nota sunt cornibus. Ab ejus summo, addit, sicut palmæ ramique late diffunduntur. Descriptio Damiani à Goës, alci potius quàm Rangifero competit. Apollonium Menabenum Medicum si sequimur, sunt ex genere cervorum, altitudine & crassitudine afello pares, tibiæ gracilitate superant. Caput habent instar vituli, collum jubatum velut equus: Cornua frondosa, lævia, gracilia, oblonga, ad tergum porrecta. Cætera, habitata ratione & servata magnitudinis proportionè, cervos communes imitantur. Taceo Julium Cæsarem Scaligerum, qui rangifero ab Olao Magno tributa alci adscribit. Ut verò sit, distinctum ab Alce, vel inde colligere licet, quòd Olaus Magnus rerum septentrionalium peritissimus, diversis locis de iisdem agat. Inveniuntur in Lapponia, Suecia, Norvegia, & vicinis Arctico locis. *Cibus* ei muscus montanus, candidus, præsertim hyeme nivibus in superficie soli coopertus: quas licet densas naturæ instinctu perforat, cibum quæsiturus. Æstate verò foliis ac frondibus arborum, stando eundoque melius quàm se inclinando floribus ac herbis, propter cornua nimis antrorsum incurvata vescitur; idque laterali & obliqua capitis inclinatione. Educti in transmarinas terras non diu supersunt, ut in Holsatia & Prussia compertum. Huc à Gustavo Rege Ann. 1533. missi, & sylvestri libertate donati, an sobolem reliquerint, nunquam comperiri potuit. Quia verò & sylvestres sunt & domestici; horum lac, pelles, nervi, ossa, caro, ungulæ, pili, usibus humanis inserviunt. *Lac* nutrimentum est domesticum; serum, potus. *Pellis* tegendis & corporibus & lectis, & equorum sellis inservit. Quia valida

Cæsar. l. 6 de bello Gallico.



Pigargus
Weiß Zars.



Tragelaphus

Pigargi Species

Hippelaphus Femina







Taurus

Peonius

Tab. xxx




Alces



Alce. Elend geschlecht






Alces americanus



Dama Cervus

Damhirsch



Caprea Rehe-Kalb



Alce Mas



Antelope



Antelope






Rangifer Reinthier



Cervus Palmatus

Tarandus Tarandthier

*Reinethiers
geschlecht*



valida & tenax, ad culeos & diverforum opificum folles adhibetur. *Nervi* loco lini consuendis vestibus deputantur. *Ossa* & cornua ad arcus parandos sumuntur. *Carnes* vento & fumo siccatae ad plures annos durant. *Ungulae* spasmaticis prosunt. *Pilis* pro farciendis sellis & pulvinaribus utuntur.

ARTICULUS X.

De Alce.

SEd & de fera *Alce* mirè authores discrepant. Pausanias specie inter cervum & camelum facit; nasci apud Celtas, explorari, investigarique ab hominibus non posse, hominum odore à longe percepto, in foveas & profundissimos specus sese abdere. Secundum Cæsarem, sunt in Hercynia sylva, earumque consimilis capris figura & varietas pellium, sed magnitudine paulò antecedunt, mutilæque sunt cornibus, & crura sine nodis articulisque habent, neque quietis causâ procumbunt: neque si quo afflictâ casu conciderunt, erigere sese aut sublevare possunt, &c. Plinius jumento similem facit, ni proceritas aurium & cervicis distinguat. Haud illi dissimilem, notam in Scandinavia insula, nec unquam visam in hoc orbe, multis tamen narratam Machlin, sed nullo suffraginum flexu: ideoque non cubantem, sed acclivem arbori in somno, eaque incisâ ad insidias capi, aliâs velocitatis memoratæ. Labrum ei superius prægrande, ob id retrogredi in pascendo, ne in priora tendens involveretur. Idem apud Solinum legimus. Dodoneus huc Strabonem verba trahit, qui dicit, Alpes, peculiaris formæ belluam, ut memoriæ prodidit Polybius, gignere, habitu quidem ad cervi staturam, collo duntaxat excepto & villis, in quibus capro per quam similis est, gerereque sub mento carnis globum ad palmæ magnitudinem, capillosum, crassitudinem pro equini pulli cauda habentem. Cardanus alcem à Julio Cæsare descriptam putat: aliis creditam, magnum animal appellat. Scaliger licet duas alces esse dicat, hoc tamen animal bifontem nuncupat. Olaus hanc feram alcem ubique vocat, & onagrum. Erasmus Stella medium quasi genus inter equos & cervos alcem ponit, easdemque cornua quotannis amittere. Levinus Lemnius caprarum esse generis credit. Michovius crura absque articulis prælonga habere, ut bifontes, ait. Germanis dicitur *Eslen* / seu miseria; tum quod singulis diebus morbo comitiali laboret, nec citius ab eo levetur, quam dextri posterioris pedis ungulam auriculæ sinistrae immiserit; tum quod levissimo etiam vulnere accepto, expiret. Cæterum magnum animal ita describit Cardanus. *Sub boreali polo animal nascitur cervo simile, cruribus anterioribus*

*longioribus, carneam habens promuscidem; brevem tamen. Habet cornua peculiari quadam forma prædita, & nulli ferè animali similia. Nam crassa ab imo, ubi ascendunt, latiora palmo sunt. Menabenus verò hanc partium exteriorum descriptionem dedit. Habet hoc animal crassitiem, altitudinem & proceritatem mediocris & pinguis equi. Humeri depressiores & humiliores sunt partibus posterioribus. Capite aliquantulum pronum incedit. A summo capite usque ad humeros, & maximè in cervice est huic magna pilorum prolixitas & sylva, ita ut collum & barbam hirci repræsentet. In aliis corporis partibus pilorum longitudine non differt ab equo, sed densitate superatur, crassitie verò superat. Color præterea vergit ad cinericiam albedinem; pro vicissitudine tamen anni temporum, pili varias habent in colore mutationes. Caput est oblongum & gracile, si conferatur cum toto corpore. Labra magna, prominentia & crassa, & maximè superius, quod *promuscidem* Cardanus vocavit. Os longum. Dentes non admodum magni, nec longi. Aures longæ lataeque. Fœmineus sexus cornibus caret, at masculinum genus multifida, & ramosa cornua producit, sed non tam longa & frondosa ut cervi vulgaris. Latiuscula sunt crassitie ferè duorum digitorum transversorum. Si unius cornu figuram spectas, triangularem ferè formam deprehendes, & magnæ avis alam extensam dices: si pondus, duodecim ferè librarum majorum erit. Cornua, addit idem, mutat hoc animal statutis quibusdam temporibus, ut cervi solent. Unum aliquamdiu fuit apud me, quod ut matura poma solent, spontè deciderat. Id stirpe manifestè dignoscitur; duo alia parva habeo, duorum aut trium fortè ab ortu mensium, paulò ante animalis mortem abscissa, quæ molli quadam lanugine, sanguine etiam imbuta erant. Est præterea obeso & grandi ventre ut vaccæ sunt. Cauda mirum in modum brevis, ungulæ bifidæ, ut bobus. Et hæc omnia Dodoneus ad alcem refert, quæ alibi, De o volente, examinabimus. De Pelle scribit Gesnerus, densam & solidam esse, ut validos etiam ictus punctim cæsimque factos avertat, & ferrei thoracis instar hodiè expetatur. Ad thoraces ab alutariis, piscium adipe præparatur, ut imbrem arceat. A cervina cui similis est, inspirata discernitur. Transmittit enim spiritum ut ab opposita manu percipiatur, quod sit meatibus plena, & concavos pilos habeat. Gesnerus tamen in ungula integra, quam cum ima parte tibiæ pilosa se vidisse affirmat, nullam in pilis cavitatem reperit. Possunt tamen meatus qui in vivis erant, in mortuis collabi, præsertim longo post tempore.*

Gesnerus
in Alce.

Cornua, idem, libras circiter duodecim appendere tradit, esseque longitudine ferè duorum pedum, non ramosa ut cervorum, mucronibus tamen aliquot divisa, dodrantem lata, armi potius quam cornu figurà, & advehi ex Lithuania. Cornu verò Magnæ feræ nomine ad Aldrovandum missum, septem tantum libras duodecim unciarum appendit, ea juxta caput crassitudine ut vix manu comprehendi possit, quinque ornatum mucronibus hinc inde binis, mox ab uno latere, alio, & ab altero, etiam alterius ostendens rudimentum, latitudo inter primos ramos trium ferè dodrantum. Tota ferè tibia simul cum unguibus libras pendebat tres cum dimidia. Icon quæ hic exhibetur Aldrovandi est. Ad *Naturam* ipsius spectat, quod animal hoc à venatoribus agitatatum ad aquas confugiat, & aquam ore haustam, fervidam in canes evomat: quòd rarò solum conspiciatur, sed terrà nivibus oblecta multa progrediantur simul: Unum procedit properando, ut occasio postulat: alia singula sequuntur eundem tenorem & modum fervando, & primi vestigia calcando, ita ut si quis rei incius ipsa insequatur unius tantum vestigia se cernere existimet: quòd sitis laborisque adeò sit patientissimum, ut diem noctemque immensa spacia privarum cibo, conficere possit: quòd pulli capti adeò successivè mansuescant, ut naturali urgente siti maxima cerevisiæ vasa à discumbentibus propinata ebibant: quòd tantam vim in ungula gerant, ut tactum ictu lupum illicò interimat, & elabente cane, opposita arbor elidatur, quasi fungus adefset. De *Uso* in cibis, hoc dixisse sufficiat, carnibus ubique vesci regionis incolas, & recentibus, & sale conditis: crassi tamen & melancholici fucciapparere. In *Medicousu*, *cornua*, *nervi*, & *ungula*, laudantur. *Cornua* olim inter adstringentia duntaxat habebantur: post inter antepileptica relata sunt, modò inter festum assumptionis B. Mariæ virginis & nativitatis ejusdem abscinderentur. Alii, die Ægidii festo demi debere opinantur. *Nervi* ad spasmus in Suecia adhibentur. Modus adhibendi, zonam ex eo facere, & membro læso circumligare. *Unguis* seu ungula, Epilepsiæ & hysteriæ affectioni convenit. Conditiones ad efficaciam requisitæ, ab Olao Magno ponuntur. Ungula exterior, inquit ille, dextri lateris posterioris pedis onagri, (sic alcem vocat) masculi, qui non genuit; abscissâ à vivo pede securi, vel alio instrumento avulsa, post medium mēsis Augusti, spasmus aut morbum caducum patienti adhibita, continuo fanat. Applicatur rectè, si vel sinistra manus annulari, adponatur: vel annulus ex eodem factus, eidem indatur: vel pars unguis sinistrae palmæ imponatur, manusque in pugnum complicetur: vel ejusdem por-

tiuncula in aurem sinistram missa, & aliquandiu veluti scalpendo moveatur. Suffocata mulieri, rasura cum zedoaria, anaticis partibus felicissimè exhibetur. Formulas ex ea antepilepticas in authoribus vide.

ARTICULUS XI.

De Rhinocerote.

Rhinoceroti nomen à cornu, quod in nare pullulat, nomen datum est. Quidam apud Diaconum, *bovem Egyptium* appellant: alii ex Pausania, *Athiopicum quadrupedem* seu taurum, sed falsò. In Ægyptum non potuit nisi fortuito casu inferri. Pausanias verò in Æthiopia taurum esse dicit, qui ob similitudinem cornu ab ignaris Rhinoceros appelletur. Nullum animal est, cujus *descriptio*, inquit Aldrovandi continuator, magis sit in lubrico. Et certè Plinius breviter se expedit. *Unum ei in nare cornu, longitudinem cum elephante parem, crura multò breviora, colorem buxum.* Tantundem & Agatharchides apud Photium protulit. Nicolaus de Comitibus Venerus, Rhinocerotem suillo capite, bovinâ caudâ, elephantino colore, cornu bipedalis longitudinis gerentem, nobis fingit, in provincia Mangi. Ælianus, qui Græcorum permultis & Romanorum visum & benè notum describere frigidum esse putat, in summa nare cornu gerere ait, mucronis acuti, robore nec ferro quidem concedens: pellem tantæ firmitatis, ut agrè jaculo penetrari queat. De *Cornu* maxima est discrepantia. Tertullianus unum tantum assignat: Martialis verò duobus depræliari scribit. Utrumque hoc, secundum eundem in capite; secundum alios in humero dextro alterum & brevius esse. Nummus Domitiani utrumque in naribus ponit. Alii majus cornu in naso, minus in fronte, aliquo supra spacio, collocant. Sed nec de *forma* ejusdem conveniunt. Alii rectum instar tubæ, lineâ nigrâ transcurren- te ponunt: alii sine lineâ. Artemidorus apud Strabonem, qui Rhinoceros longitudine parum ab elephantis excedere, magnitudine tauri, formâ apro proximâ esse ait, recurvum & omni ossè durius facit. Diodorus simum, Agatharchidas & Solinus repandum vocant. Addit Artemidorus, belluam duo cingula tanquam Draconum volumina dorso usque ad uterum circumeuntia habere, alterum jubam versum, alterum ad lumbum, hæcque de ea à se dici, quòd sibi visa esset. At Bontius, quem in Capra Pazaartica citavimus, quique Rhinocerotem vel centies non tantum cavæ inclusum, sed & in sylvis vagantem vidit, ita nobis eum describit. Cute è nigra est cinericia, instar Elephantinæ, rugosa admodum, cum profundis plicaturis circa latera ac in dorso: crassam admodum habet pellem,

Natura.

Ufus.

Diacon.
l. 16.
Pausan. in
Bæoticis.Plin. H. N.
l. 7. c. 20.Photius
Biblioth.
Cod. 250.Ælian. H.
A. l. 17.
c. 44.Tertull. l. 3.
contra Pra-
xeam.
Rer. Indi-
car. relat.
l. 3. c. 7.Strabo Ge-
ogr. l. 16.Diodor. Si-
cul. Biblio-
thec. l. 4.
Solin. Po-
lyhist. c. 63.Bontius
Medic. In-
dor. p. 16.

RHINOCEROS Hornose Rhinocer



Dromedary



Dromedary




Camelus

Kamel






Camelus Bactriatus seu Dromedarius



Camelus



Camelq





Dromedarius



Camelus



CAPUT III.

De Ruminantibus non Cornigeris.

ARTICULUS I.

De Camelo.

HAëtius de ruminantibus Cornigeris Aldrovand. Hist. Bif. c. 34.
 actum est, sequuntur, non ruminantia,
Camelus nempe, & *Camelopardalis*. *Camelus*
 vel ab Ebraico Gamal, quod Camolum si-
 gnificat; vel à κάμνω laboro, quod sit animal
 ad labores dossuarios aptissimum: vel ab
 χαμηλὸν humile & breve, quod quando one-
 rantur, ut humiliores fiant, accumbant: vel
 quasi κάμνῃς curvus, quod media femo-
 ra curvet, utpote juxta crurum altitudinem
 concisum ac decurtatum, ut Artemidorus
 ex Eveni sententia derivat, dicitur. Biful-
 cum est animal, sed ita, ut à posteriore parte
 ad secundam usque digitorum flexionem
pes bipartiat: at anterior leviter biparti-
 tus sit, ad primos usque eorundem nodos:
 fissurarum verò intervalla expleat quid,
 quale & anseribus. Peculiaris ipsis in dorso
gibber, quo cætera animalia carent. Ha-
 bent & infernè alterum superiori simile: quo
 reliquum fulcitur corpus, ubi genua sum-
 mittit. Papillæ ei quaternæ, quot & vaccis.
Cauda, asininæ similis. *Genitale* ponè idque
 tam nervosum, ut ex eo confici possit, quo
 arcus fidissimè intenduntur. In unoquoque
 crure genu unum: neque plures plicaturæ,
 ut Herodorus innuit: verum tot videntur,
 quod alvo subducta sunt. Similis bubulo
talus. *Clunes* pro corporis ratione exiguæ.
Fel non discretum, sed venulis quibusdam
 confusum. Nulli in superiore maxilla prio-
 res *dentes*. Soli ex non cornigeris duo ven-
 triculi, quod spinosum ligneumque alimen-
 tum depascatur. Ideò & membrana oris in-
 terior, ex toto aspera est, & ea quæ ventri-
 bus obducitur, similiter. Medullæ & sevi
 apud authores quoque mentio. Reperiun-
 tur in Africa & Asia, Bactrianos inprimis &
 Arabas. Anaxagoras etiam in Jonia ad ur-
 bem Clazomeniam, agros suos gregibus &
 Camelis depascendos reliquit, ut ex Suida
 vertit Hieronymus Wolfius. Romæ supe-
 rato ad Rhyndacum amnem Mithridate,
 primùm visos putavit Sallustius: at pote-
 rant bello Achaico & Asiatico videri. Pto-
 lomæus Lagi Bactrianam totam nigram in-
 ter alia spectacula exhibuit. Delectantur
 spinoso ligneoque alimento; junco præfer-
 tum, cujus summitatem sæpenumero abro-
 dunt. Sed nec hordeum purum vel cum fæ-
 no, vel gramen tenue & humile negligunt;
 sæpe & carduis contenti. Hodie Arabiæ
 deserta transmittentibus, hordeacea li-
 ba quinque quæ malum Cydonium ma-
 gnitudine non superent, quotidie dantur.

Descriptio.
 Aristot. H.
 A. l. c. 1.
 Salig. c. 6.

Aristot. H.
 A. l. 5. c. 2.

Herodot.
 in Thalia.

Aristot. de
 partib. ani-
 mal. l. 3.
 c. 14.
 Plin. H. N.
 l. II. c. 37.

Locus.

Plutarch.
 in Lucullo.

Lucian. in
 Prometheo.
Cibus.
 Galen. An-
 tid. l. 1. c. 14.

Varrom.
 l. 1. c. 7.

ut quæ ictui Japonicæ macharæ facile resi-
 stat. Neque enim hæc bestia, (ut apud nos
 pingitur) scutis munita est; sed hæ plicatu-
 ræ hos clypeos mentiuntur; neque una pars
 durior est alterâ. Retro est porcino; sed
 ante acutiore, neque tam obtuso, in cujus
 extremitate cornu itud extat, unde nomen
 fortita est bellua; aliud altero majus pro
 ætate Rhinocerotis. Colore etiam cornu
 variat, modò nigrum, modò cinericeum,
 modò album est. Magnitudine autem cor-
 poris mediocri staturæ, Elephantem pro-
 ximè accedit mediocrem, nisi quòd pedibus
 sit longè humilioribus, & propterea etiam
 tam conspicuum non est animal. *Locus* si
 quaras, invenitur in Africa desertis, Abas-
 sia, multis Asiæ locis, regno Bengalæ, &
 Jacatru. Nec ævo Aristotelis Græcis notus
 erat, nec Romanis ante annum urbis conditæ
 DCLXVI. Quis primus monstraverit, in-
 ter antiquarios non convenit. Dio ab Au-
 gusto primum in triumphali pompa tradu-
 ctum, ait: At Plinius, Cn. Pompejum ludis
 primum exhibuisse, tradidit. Ideò Solinus:
 Ante ludos Cn. Pompeii Romana specta-
 cula, Rhinocerotem nescivisse, reliquit.
 Herbis & virgultis perquam spinosis vescit-
 ur, nam linguam habet asperrimam. De
Natura hoc duntaxat constat, cum Elephan-
 te inimicitias gerere, nec favere in hominem
 nisi lacescitum. Dimicaturus, cornu ad saxa
 limato præparat se pugnæ: in dimicatione
 alvum maximè petens, quam scit esse mol-
 liorem, perruptoque carniū ambitu exan-
 guem facit: quòd si alvum contingendi co-
 pia non datur, contra ipse à proboscide &
 dentibus ictus, deficit, & opprimitur. Irritatus, inquit Bontius, hominem simul &
 equum, tanquam pulicem prosternit, quem
 deinde lambendo necat, dum asperitate lin-
 guæ, cute ac carne usque ad ossa hominem
 denudat. Sclopeto læsus, dum per sylvas
 fugit; quicquid obvium est, cum summo
 fragore ac horrore audientium prosternit,
 etiam fatis crasfas arbores. Historiam in-
 signis ejus ferocitatis, vide apud eundem. Huc
 pertinet ex eodem & illud, quòd coeno mi-
 rificè gaudeat, nec prius etiam irritatus vin-
 dictam exerceat, quam catulo suo provide-
 rit. *Voce* suæ imitatur: Grunnit enim. *Carni-
 bus* vescuntur Mauri: quæ tam nervosa,
 ut dentes ferratos exigat. Cutis in vino ma-
 cerata, à Zacuto, in malignis propinatur.
 Cornu veneno extinguendo quidam propi-
 nant: lautioribus apud Romanos pro gutto
 in balneis erat. In eo oleum asservabatur
 loturis idoneum. In *Genera* quædam distin-
 gui, affirmare non ausim. Dicitur tamen in
 Africa deprehensus, magnitudine asini syl-
 vestris, cornu bicubitali, pedibus cervinis,
 auribus equinis, caudâ bovinâ.

Locus.

Dio Hist.
 l. 51.

Plin. H. N.
 l. 8. c. 20.
 Solin Poly-
 hist. c. 30.

Bontius
 l. c.

Solin. Polyhist. c. 62.

De Potu ita Solinus. Sitim etiam in quadri-
duum tolerant: verum cum occasio bibendi
data est, tantum implentur, quantum & sa-
tiet præterita desideria, & in futurum diem
profit. Lutulentas aquas captant, puras
refugiunt, denique nisi canosior liquor fue-
rit, ipsi assidua proculcatione limum exci-
tant, ut turbetur. At recentiores, etiam in
duodecem imò in quindecim dies totos, si
fors ferat, abstinere potu solere scribunt:
imò oculatorum fide constat, in hara &
Biled Elgerid, nunquam bibere, quam diu
viride gramen, quod depascant, invenire
possint. De Generatione hoc habemus, à C.
Plinio prodi, aversum coire; ab Aristotele
non item. Hujus enim verba. Cameli seden-
te foeminà coeunt, nec averfi, sed comple-
ctente mare ut cæteræ quadrupes agunt,
& coitum toto die exercent. Petunt reces-
sum solitudines, cum libet coire, nec ali-
quis eò tuto accedere potest, præterquam
pastor armenti. De gestatione & partu non
conveniunt authores. Suidas, decem men-
ses gestare, undecimo parere, & anno inter-
misso rursus prurire scribit. Secundum Plin-
ium, duodecem mensibus ferunt, à trimatu
pariunt vere, iterumque implentur à par-
tu. Aristoteles verò, gestationi duodecem

Generatio.
Plin. H. N.
l. 10. c. 63.

Aristot. H.
A. l. 5. c. 2.

Arist. H. A.
l. 5. c. 15.

Arist. H. A.
l. 6. c. 26.
Inimicitia.

Ælian. H.
A. l. 7. c. 36

Morbi.

Aristot. H.
A. l. 8. c. 22.

Hieronym.
in vita Hi-
larionis.

Ætas.

Aristot. H.
A. l. 6. c. 16.
Solin. Po-
lyhist. c. 62.

Plin. H. N.
l. 8. c. 18.
Ælian. H.
A. l. 4. c. 55.
Ingenium.

mitur. Ad Ingenium & Morès spectant, vin-
dicta, Docilitas, & musices amor, verecundia,
pietas & φιλοσοφία Percussus aliquando,
iram reponit longo tempore, & ubi occasio-
nem nactus fuerit, nulum retribuit. Ad
tympani sonitum choras ducere edocetur.
Includitur, inquit Leo Africanus, junior ca-
melus, ubi pavementum præcalidum sit, ut
alternatim pedes attollat, dum calor urget,
idque frequentissimâ alternatione facit,
dum hunc dum illum pedem attollit pun-
gente calore, atque interim semper ad fores
tympanum percutitur. In schola hujusmo-
di scholasticus hic exercetur ad annum in-
tegrum, aut circiter. Ufu igitur confirmato
hâc diuturnitate, quotiescunque tympani
sonitum audierit, eadem pedum alterna-
tione, eodemque loco persistens, dum inso-
net tympanum, choreæ ductum spectatori-
bus præ se fert. Musicâ delectari vel exinde
colligas, quod fessus non verberibus sed
cantu ad progrediendum invitetur. In ma-
trem tantâ est reverentiâ, ut eam nunquam
ineat, nec se, ut faciat, cogi patiatur. Oper-
tam cum aliquando violasset, admissorem
paulò post necavit. Verecundiam de genera-
tione exposuimus. Pietatem compassio ex-
primit. Torâ nocte manducant, quod si
aliquis in stabulo ægrotet, cibo abstinent.
φιλοσοφίαν Indi detexere. Cum celeritate
maximâ uti cupiunt, fatus Cameli per ali-
quot milliaria cum matre abducunt; illâ
abactâ, pullos relinquunt. Dum redeunt,
mater passus duplicat, quo citius pullis re-
stituatur. Usum in pluribus præstat. In Me-
dicinâ, caro provocat urinam. Adeps gibbi,
suffumigatus confert hæmorrhoidibus. Ce-
rebrum exsiccatum cum aceto epilepsiæ. Fel
cum melle potum anginæ. Sanguis concep-
tioni & præfocationi matricis, si post pur-
gationem menstruum adhabeatur. Lac
ventrem lenit, valdè subtile & aquosum,
asthmâ confert, & desiderium cibi excitat.
Urina quæ fullonibus utilissima, quod apud
Plinium legimus, ad dentes quoque deal-
bandos & purgandos, vim habere credebatur.
Cauda arefacta, solvit animum. Fimi ci-
nere cum oleo misto crispatur capillus. I-
dem albus cum melle tritus tumores reprimi-
t, & vulnera mundat. Seta è cauda con-
tortâ & alligatâ sinistro brachio quartanis
medentur, si credere fas est. Invenit & in cibis
locum. Arabas novimus camelorum lacte
vesci. Carnes, teste Galeno, Alexandrinis in
usu. Heliogabalus aliquoties in coenis exhibuit:
& calcanea, quia maximè tenera, Apici
exemplo, comedit. Apud Judæos inter
vetitos cibos habebatur. Carnem & lac qui-
dam inter suavissima censent. Hoc, partui
vicinarum caseosæ & butyrosæ substantiæ
minus habet. In bellis adhibitos passim apud
Historicos habetur. Hinc armaturæ, qua
in expeditionibus muniuntur, nomina, de
qui-

Basil. He-
xam. ho-
mil. 8.

Leo Afri-
canus in
Africa.

Aristot. in
Mirabil.

Tzetzes
Chiliad. 12.
c. 404

Plin. H. N.
l. 28, c. 8.

Apul. l. 1.
Apol.

Galen. l. 1.
de Alim. fa-
cult. c. 2.
Lamprid. in
Heliogab.



Camelo pardus seu Gierafra



Camelo -

pardalus




Camelus. Indi.
Kamel thier

Camelus Indicus
Indianisch Camel



Camelus Indica
versicolor

Alus Camely



quibus si Deus voluerit in Philologicis. Itinera in Arabia, Ægypto, &c. vel hodie absque camelis confici non possunt. Sunt & oneri ferendo accommodati, sed nec ultra justum pondera recipiunt. Sexcenta pondo communiter gestant, licet, si necessitas urgeat, mille ferre possint. Dum onerantur, aut onere levantur, in ventrem procumbunt, & ut sentiunt se æquale viribus suis impositum, exsurgunt, nec plus recipiunt. Africani molestias itineris non intermissi quinquaginta diebus totis haud agrè sustinent. Species Camelorum apud veteres sunt variae. Sunt pingues, macri, rusci, albi. Dedit & cursus differentiam: *Dromedarii* enim & *Tromades* dicuntur, qui minoris quidem sunt staturæ, sed cursus perniciosissimi. Centum & amplius millia uno die peragere solere, Isidorus Hispalensis habet. Aristoteles equis Nisanis vel potius Nisæis præponit. Fœminas esse velociores ab Achmete Seirimio & aliis observatum est. Præcipua differentia à regionibus sumitur. Sunt *Arabici*, *Bactriani* & *Caspii*. Illi, bina tubera in dorso habent. Unde *δρυλοι* & *δίκυρπι*, dicuntur. Isti fortissimi habentur, & singula in tergo tubera, alterum verò in pectore, cui incumbant, gerunt. Hos, ad equorum maximorum magnitudinem accedere, Ælianus ait. Moderni de Differentiis Africanorum ita agunt, & in his *Samuel Purchasius*. Camelorum tres species habent. Prima vocatur *Hugium*, ingentis staturæ & roboris, pendo mille librarum ferens. Secunda minor, duplici in tergo tubere, oneribus ferendis & equitationi apta, *Becheti*, dicta, quam solam Asiatici agnoscunt. Tertiam vocant *Ragvabil*, macilentam & gracilem, ad sola itinera non accommodatam. Eam quippe inequant, conficitque uno die amplius quam centum passuum millia. Atque iis Rex Tombuti solet mittere Nuncios Segelmeffem aut Darham, nongentis millibus passuum distantem, septem aut ad summum octo diebus, sine ulla in itinere morâ aut requie.

ARTICULUS II.

De Camelopardale.

CAmelo pardalis, seu ut aliis placet paulo barbarè, Camelopardalus, à Camelo & Pardale nomen sortitus est. Corporis vastitie Camelum, macularum varietate Pardum imitatur. De cætero si Varroni attendimus, nomen hoc Alexandria, unde istud animal Romam erat adductum, venit. Multas autem sortitum est appellationes. Dicitur enim *Ovis fera*, quod in aviis regionibus degat, & ovi mansuetudine respondeat; *Nabis* apud Solinum; *Nabuna* Æthiopibus ut apud Plinium legitur; *Anabula* & *Saffarat*, Alberto M. quæ nomina ex aliis detorta esse judico; *Orafius* Majolo, sed falsò, cum

Vincentius Bellovacensis pulcherrimum animal esse scribat, Camelopardus verò sit deformis; modernis denique *Giraffa*, ex quo Saffarat corruptum est. Nec Aristoteles ejus meminit, nec Ælianus; Strabo verò & Agatharchides ex veteribus in diversa, in eo describendo abeunt. Hunc si sequimur, varietatem à Pardale habet, magnitudinem à Camelo, monstrosam crassitiem, collum adeò longum ut summis arboribus pabulum carpat. Apud illum legimus, nullâ re pardali similem, cutis varietate hinnulo simillimum. Addit, virgatis pilis distingui, posteriora humiliora esse anterioribus, ut à cauda sedere videatur ad bovis altitudinem: verticem sublimiorem Camelo habere: ne feram quidem esse, sed pecus. Plinius collo similem facit equo, collo & cruribus bovi, capite camelo, albis maculis rutilum colorem distinguuntibus. Dio partes posteriores humiliores habere scribit. Heliodorus tenuem cervicem, de reliqua corporis mole in olorum collum se tendere, ait. Inter recentiores exquisitissimè Bellonius & quidem oculatus testis descripsit. Giraffam, inquit, Græci & Latini vocant Camelopardalem. Vidi in urbe Cairo tres, duo cornicula ex fronte eminebant circiter sex digitos, in fronte media tuberculum existerat, velut tertium cornu, altum circiter duos digitos; collum longum septem pedes; cum caput extollit, sedecem pedes à terra effert. Illius longitudo à cauda ad capitis verticem est duodviginti pedum; tibiæ tam altæ posteriores, quàm priores at femora anteriora longè altiora posterioribus. Nimirum, dorsum à cauda ad summum verticem capitis, velut scala, velutque tectum carinatum attollitur. Totum corpus grandibus maculis distinguitur coloris cervini, obquadratis, sed in collo, magisque in corpore quoquo versus latis circiter dodrantem, at clausula macularum alba digito latior. Itaque totum corpus reticulatum est: neque tamen ut Pardalis maculas habet rotundas, sed aut obquadratas, aut rotundas. Pes est bifidus ut bubulus, labrum superum longè eminet infra inferum, Cauda tenuis & exigua, in acumine pilosa. Jubam habet ut equus, à dorso ad capitis verticem. In gradiendo claudicare videtur, nunc dextris nunc sinistris, non modo cruribus sed etiam lateribus, cum ex terra aut potum aut cibum necesse haberet, crura latissimè distendebat priora. Nonnisi enim latè diductis, longèque diu arcuatis tibiis, cibum ex terra capere potest. Addendum ex Josaphati Barbari Veneti itinerario, Linguam bduos pedes longam, suboscuro quasi violacei coloris, teretem sicut anguillis, habere: hâc ramos, frondes, herbasque capere, mira celeritate in os trahendo, ut vix ab attento spectatore videatur. Purchasius ex Fernando Jesuita, tam vastum animal esse

Strabo Geogr. l. 16. Agatharch. apud Phot. in Bibliotheca. Descriptio.

Plin. H. N. l. 8. c. 18.

Dio Hist. l. 43.

Bellon. observ. c. 9.

Aldrovand. H. Bifidus. c. 35.

Varro l. 4. L. L.

Solin. Pólyhist. c. 43.

Locus.

Solin. Polyhist. c. 43.

Suidas.

scribit, ut eques rectus sub ejus dorso transire possit. *Reperitur* in Africa, apud Trogodytas, ut ex Strabone habemus, & Æthiopia. Romanis omnium primus ludis suis exhibuit Cæsar Dictator: postea Gordianus decem exhibuit, Aurelianus aliquot in triumpho duxit. Leoni Imperatori oblatuſ est ab Æthiopibus, Frederico à Sultano Babylonio, Laurentio Mediceo ab alio Sultano. Tractu motuque tam facilem hanc feram Heliodorus prodit, ut eam quo velit, tenui capistro vertici devincto, veluti fortissimo vinculo, magister perducatur. Judæis prohibita est in cibis. Unde fortè frequentiore olim in Judæa fuisse colligas.

CAPUT IV.

De Quadrupedibus non ruminantibus.

ARTICULUS I.

De Sue.

Nomen.

Varro R. R. l. 2. c. 4.

Isidor. l. 12. c. 1.

Quinque in descriptione suis occurrunt nomina, videlicet, *Sus*, *Porcus*, *Scrophæ*, *Verres*, & *Majalis*. *Sus* Græcis est *ὕς*, nomen & Apro commune, unde Latinum fluxisse videtur. Olim, ut verbis Varronis utar, dicebatur *Thysus* dicta, ab illo verbo quod dicunt *θύειν*, quod est immolare. Ab uillo enim genere pecoris immolandi initium primum sumptum videtur; cujus vestigia, quod initis Cereris porci immolantur, & quod initis pacis fœdus cum feritur, porcus occiditur; & quod nuptiarum initio, antiqui Reges ac sublimes viri in Hetruria in conjunctione nuptiali, novus maritus & nova nupta primum porcum immolant. Prisci quoque Latini & etiam Græci in Italia idem fecisse videntur. Nam & nostræ mulieres, addit idem, maximè nutrices, naturam quæ fœminæ sunt, appellant porcum, & Græcè *χοῖρον*, significantes esse dignum insigni nuptiarum. *Porcus* Isidoro quasi spurcus dicitur, quod se coeno & limo illinat, immergat & ingurgitet. Varronis locus, in quo dicitur, Porcus quod Sabini dicunt de Aprino Porco Poridus; inde Porcus nisi à Græcis, quod Athenis in libris sacrorum scriptum est, *καπρὺ καὶ πόρυον*, difficilis nimis est. Videtur tamen esse Græcum antiquum, sed obscuratum, quod nunc eum vocant *χοῖρον*. *Scrophæ* originis est incertæ. Quidam ex sono fictum nomen ajunt. Græcis est *χοιρὸς* & *σχορὰ*. Significat suem quæ sæpius peperit, & aliquando pro ipsa porca peculiariter sumitur. *Verres*, dicitur porcus non castratus & mansuetus. Marcellus sylvaticum pro apro dixit. *Majalis* est verres seu porcus castratus, ut inter equos canterius, inter gallos gallinaeos, capus. *Hybrydas* antiqui vocabant fues semiferos, id est, ex domestico & fero pro-

genitos. *Descriptione* notissimi animalis est opus non videatur, paucis tamen singularia quæque attingemus, (& quidem per saturationem.) *Ossibus* itaque parum medullæ inest. *Pili*, qui quod rigidiores & erecti, *setæ* dicuntur, crassiores sunt quàm in bubus & elephantis: apud nos ferè ruffi, in Gallia & Italia nigri, in Provincia, quod si benè à nobis observatum plerumque versicolores, qui in cervice rigent, *λοφίον* vocamus. *Pinguedo* inter cutem & musculos collecta, *Lardum* dicitur: axungia verò, adeps suillus inveteratus, aut cum sale, aut syncerus. *Cerebrum* pinguiusculum est, & magis minuitur lunâ decrescente quàm ulli animali. *Oculi* cavi profundique, ut sine vitæ periculo eximi non possint; quare vel altero tantum privati extinguuntur. *Supercilia* nasum versus deorsum nutant, ad tempora verò retrahuntur. *Nasi* pars extrema crassa est, *frons* angusta, *labra* lata. *Os* totum valdè porrigitur, & ut facilius infodiat, latum est. *Rostrum* dicitur, & cutem in eo, callum Grammatici vocant. *Dentes* fœminis pauciores sunt quàm maribus, nec unquam decidunt. *Corium* circa cervicem durius, *καλὸν* vocant. *Corda* in articulatione habent fues. In *auriculis* invenitur humor quidam felli similis, minus tamen liquidus, sed densitate sua humori splenis similis. *Ventriculus* amplius est flexuosusque, ut diutius concoquat, cum levibus & paucioribus crustis. In *jecinore* lapilli candidi inveniuntur. Caro exos infra umbilicum *spectile* dicitur. Plures habent fœminæ *Mammæ* toto ventre duplici ordine, quod numerofo fœcunda sint partu: generosæ duodenas, vulgares binis minus. Eadem *genitale* eâ continent parte, quæ pecoris ubera habentur: & cum per libidinem turgent ac pruriunt ad coitum, sursum tantisper hoc retrahunt, vertuntque foras, ut inde mari coitus sit facilius. Reversum id longè productius, & dehiscens amplius est. *Apria* vulvæ inter fœmina adhæret, quæ maribus testes maximè continentur. *Caudam* intorquent, & talo probiore carent, inter solipedes & bifulcos ambigui. Sine *Liene* putantur inveniri, qui vel extamariscinis alveis bibere, vel radicem splenii comedere. *Costas* iisdem denas apud Plinium legimus. Sed de interioribus suis ita Severinus. In sue asperæ arteriæ circuli cartilaginei obliquè descendentes. Verùm cum primus circulus, qui latissimus est omnium, sit paulò minor, quam transversus, cæteri verò inferiores sint obliqui; necessario inter hos, & primum erat intercapedo, quæ ut compleretur, posuit natura quartam circuli partem, quæ respicit posteriora latiore, quæ vero in anteriora definit, auctam. Aliud est notandum ab his non dissimile: In circulis paulo inferioribus, quam sint medii, fecit natura duos semifectos, qui sibi parte acutiore invicem occurrunt, cujus varietatis usus adhuc ignotus.

Plin. H. N. l. 11. c. 37.
Arist. H. A. l. 2. c. 1.
Arist. l. 3. de partib. c. 4.

Aristot. H. A. l. 6. c. 13.

Zootom. Democrit. p. 299.

In

In intestinis tenuibus ileo quippe, parte externâ tubercula quâdam visâ duriuscula feminis lentis magnitudine & figurâ, quæ, me trahente, secuti sunt ab interna parte lumbrici duo, alter longitudine palmi, alter longitudine digiti. Uterque cavus, & plenus succo albo veluti chylo aut colostro: formam autem referebant ambo veri lumbrici terrestres. Disce igitur sic hærere lumbricos humanis intestinis. Illa autem durities nodosa, in quam insertum erat os lumbrici, facta est, puto, ab ulcere & morfu lumbrici. Cuticula in sue concolor est pilis albis nigris, &c. De utero verò suis à se secto, ita scribit. Præterea quæ scribit Sylvius, in extremis cornubus appendices quâdam membranæ exungues, in quibus, ut apparet, reservantur fecum & urinæ recrementa. Vena umbilicalis bifida, cum appropinquat utero; umbilicalia vasa primo sub alam sinistram tendentia, mox cervicem transversim amplectentia, revolvuntur extrinsecus ad brachium dextrum. In fætu verò ipso circiter menstruo omnia ferè viscera interna conspiciuntur. *Hepar*, ventriculus, intestina, lien, renes, diaphragma, cor, pulmo. Cor albidum, pulmo concolor hepatis, hepar rubrum opacum, renes magni, pro ratione venæ apparentis per rectos pedes anteriores; posteriores, sed magis per posteriores. Item jugulares etiam illæ, quæ ad caput ascendant, labdæ quasi figuram facientes. In porcello vero perfectio detecto thorace per transversas duas sectiones, primum intueris nervulos duos, qui jugulum perforantes & pericardio adhærescentes recta per cordis latera descendunt ad diaphragma, cujus circulo nerveo inferuntur per duos ramulos aut tres, hinc transit alius ramus ad ventriculi os superius. Vides hic conspiciue divaricationem venæ axillaris & thymicæ. *Auricula cordis* intus cavæ, divulsæ à corde parte anteriore, conjunctæ posteriore. Processus *urachi* à fundo vesicæ post latos digitos duos inferitur in arterias. In fine *penis* glandula rotunda: In cervice *vesicæ*, glandulæ duæ, ad hanc committuntur vasa ejaculatoria, quæ, ut apparet, ad prostates, alias glandulas, mediis venis deferuntur, & hinc ad exortum penis. In *ventriculo* & intestinis succus viscidus colore in ventriculo, ut ovi album, in intestinis vero, ut mel dilutius. Vena sine pari in medio spinæ ad costas singulas utrinque mittens ramusculos. Ubique ferè in nostris regionibus invenitur. Strabo Galliam togatam suis ita abundare suo tempore scripsit, ut & porcorum gregibus qui ibi alebantur, Roma aleretur; ex Lugdunensi verò Gallia, optima fassamenta eo apportarentur. Sed & Syracusæ proverbium ob bonitatem meruere. *Cæsus Siculus*, à *Syracusis* suis. Solinus nullos in Arabia haberi prodidit, nullos in India Ælianus, ita

ut ne nasci quidem, illatos exspirare putent. At in terra Australi, nihil esse quadrupedum, quæ in nostro orbe inveniuntur, præter bubalos, vaccas, capros, & porcos. Hesselius Gerardus in descriptione terræ Australis reliquit. Quantum ad *Cibum*, videntur suis esse quasi *παμφαγοί*. Vescuntur ex plantis & earum fructibus, radicibus, glandibus, castaneis, dactylis, vinaceis, cytiso, bulbis, rapunculi sylvatici radice, cicuta, cicere, hordeo, tritico, furfure, & aliis. Glans fagea suam hilarem facit, carnem coctibilem ac levem & utilem stomacho: iligna suam angustam, nitidam, strigosam, ponderosam: querna, diffusam, & gravissimam. Proximam huic cerream Nigidius facit, nec ex alia solidiorem carnem, sed duram. Iligna tentantur, nisi paulatim detur. Fungosa caro fit, esculo, robore, subere. Haliphlaei glandem attingunt quidem, sed non nisi, cum aliud pabulum non suppetit. De Castaneis, postquam præstantiora genera recensuisset, ita subdit Plinius: Cæteræ suum pabulo gignuntur, scrupulosæ corticis intra nucleos quoque ruminatione. Dactylis in Ægypto, Cypro, Syria, & Seleucia Assyriæ faginantur. Fraxini quoque fructu pinguescunt. Cytisus aridus ab Aristomacho Atheniensi miris laudibus deprædicatur. Bulbi illud genus in Bavaria ideò suillum dicitur. Rapunculus verò ille sylvaticus, violarum folia habet, acutiora, radicem candidam, dulcem, non sine lacte. Hyosciamo sumpto insaniunt. Ad viridia pabula haud sine noxa deducuntur. Nec carnibus abstinent. Occisorum à latronibus corpora in sylvis devorasse, exemplis probari posset. Propriis fætibz non parcere, nec à gallinis aut anseribus hyeme imprimis, abstinere, experientia me docuit. Effodiunt & lumbricos; limacibus quoque & testudinibus nemoralibus pascuntur. Pinguescunt sexaginta diebus, sed magis tridui inedia faginatione orsa. Fico, caricâ faginare, & à satietate necare, inventum Apicii fuit. Angli per integrum annum faginant, cujus pingue solidius & lautius fieri voluerint. Cæterum usque adeò suis pinguescere solet, ut se ipsa stans sustinere non possit, neque progredi usquam. Itaque eas si quis quo trahere velit in plaustum imponit. In Hispania ulteriore in Lusitania cum suis esset occisus, Attilius Hispaniensis minimè mendax, & multarum, rerum peritus, in doctrina dicebat, Lucio Volumnio Senatori missam offulam cum duabus costis, quæ penderet III. & XX. pondo, ejusque suis à cute ad os, pedem & III. digitos fuisse. In Arcadia spectavit Varro suam, quæ pro pinguitudine carnis, non modò surgere non posset, sed etiam, ut in ejus corpore forex exesa carne nidum fecisset, & peperisset mures. Idem Basileæ accidisse, Gesnerus, prout accepit, prodidit.

Sitis

Cibus.

Plin. H. N. l. 16. c. 6.

Columella R. R. l. 7. c. 9. & 10.

Plin. H. N. l. 8. c. 51.

Varro R. l. 1. Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Lectus.

Strabo Geogr. l. 5.

Sitis ipsi per ætatem infesta, sed turbidâ aquâ pinguescit; vinaceis verò colluviei immistis, inebriatur. De *Generatione* ita breviter Plinius, Suilli pecoris admixturâ, à Favonio ad æquinoctium vernum, ætatis octavo mense, quibusdam in locis etiam quarto, usque ad septimum annum, in aliis erat ad octavum annum. Partus bis in anno. Tempus utero quatuor mensium: numerus fecunditati ad vicanos, sed educare tam multos nequeunt. Diebus decem circa brumam, statim dentatos nasci, Nigidius tradit. Implentur uno coitu, qui & geminatur propter facilitatem abortiendi. Remedium, ne primâ subactione, neque ante flaccidas aures coitus fiat. Mares non ultra trimatum generant. Fœminæ senectute fessæ, cubantes coeunt. His adde Luna de crescente coire, ut Plutarchus prodidit. Verrem unicum vel decem suis implendis sufficere: subantis verò voce auditâ, nisi admittatur, cibum non capere: propter copiosum humorem multum ac diu coire: initum matutinum appetere, fœminas, post meridiem blandiri: & si pinguet, omnibus anni temporibus, interdiu & noctu, inire posse. Idem antequam sit anniculus prolem vitiosam generat: at fœmina annicula quidem parit, sed mense Februario iniri debet: ubi decimum quintum annum nata est efferatur, nisi fortè benè nutriatur. Subans verò in tantum etiam efferatur, ut hominem laceret, candidâ inprimis veste indutum. Rabies ea mitigatur aceto naturæ asperfo: nec, prægnans venerem arcet. Eandem tantum coitu spumam fundere diligentiores observarunt. Quantum ad *Partum*, apud nos sedecem parere audio, inquit Gesnerus, sed rarò: sæpe octonos vel denos. Paucissima, prima partione edere, vigere secunda, nec senescentem copiâ fœtus defici, quanquam lentius coeat, Aristoteles author est. Aliis placet, tot parere debere porcos, quot mammas habet. Fœcundior tamen putatur alba. Fœtus qui in utero læsus minutusque fuerit, *Metachærum* dicitur, quasi Posthumum voces. Polux cordos & parvos porcos *μειχονες* appellat. Hyemæ editi, sunt exiles, & infelicitissimè nutriuntur. Helvetii Martio natos præferunt. In calidioribus regionibus melior est hyemalis quàm æstivus. Cum scrofa peperit, primas mammas, primo qui editus fuit porco præbet. Eæ sunt faucibus proximæ, & plurimum lactis habent. Suam quoque quisque novit in foetu quo genitus est ordine, eaque alitur, nec alia. Detracto illa alumno suo, sterilesceit illico ac resilit. Uno verò ex omni turba relicto, sola munifex, quæ genito erat attributa, descendit. Si gravidæ glandem copiosius ederint, abortum faciunt. *Antipathiam* gerunt suæ cum *Elephantis*, *Lupis*, *Salamandris*, *Vu-*

guento amaracino, *mustela*, *hyoscyamo*, *scorpionibus*, *equis*, & *novellis segetibus*. Elephas grunntum eorum ferre non potest. Lupus *σώπις* seu compascuos aggredi non audet ob vocem. Salamandras absque periculo devorant. Amaracinum unguentum ipsis venenum est. De Mustelæ discordia apud Plinium legimus. Hyoscyamo enecantur. In Scythia & Scorpionibus unico ictu exanimantur. Equo, teter odor, turpis grunntus, fœdus halitus, infensa. Cum dentes nunquam amittat, debiles tamen & totâ vitâ infirmi redduntur, post gustatas segetes novellas; naturâ penè indomitam obsæni pecoris ingluviem sic plectente, quando aliter reprimi non potest. De *Ætate* hoc habet Plinius, oculo amisso putari cibo extingui, alioquin vitâ ad quindecim annos, quibusdam ad vicanos. Inter *Morbos*, quibus suæ laborant, est præcipuè *χαλαρά*, seu grandio, quæ in viventibus latet, in dissectis apparet: nec ulla ferè est, quæ non grandinis tria ad minimum grana habeat. Subjectæ inprimis huic, quibus crura, collum & armi carne humidior constant. Cognoscuntur, quod in inferiore linguæ parte hæreant, & si setam dorso evelas, cruorem pili inversi radices exhibeant. Cum à magno fervore in frigidam incumbunt, præsertim si non statim pergere cogantur, membris omnibus convelluntur. Infestantur & à pediculis; & æstate, nisi frequenter excitentur, lethargo capræ dormiunt. Corripiuntur & raucedine, anginâ, strumis, & alvi profluvio. Nisi assatim biberint, pulmonariæ evadunt. Ad *Ingenium* pertinet, quod de *brutalitate*, *spurcitie*, *immensa libidine*, & *voracitate* dicitur. Maxime certè brutum est, animamque ei pro sale datam, haud illepidè existimabatur. Volutari in luto est eorum requies, ut lavatio hominis. Loca in quibus se volvunt, volutabra dicuntur. De *Ardore in venerem*, superius diximus. Gryllus tamen, apud Plutarchum singularem in eadem modestiam & continentiam probat. Non hic, inquit, ut inter homines, fœminæ simulatione ludunt, aut libidini, fraudes, præstigias, denegationesque prætexere solent: neque mares, stimulo & luxuria agitati, mercede, labore, aut obsequiis coitum redimunt, sed doli expertem & tempestivam sectantur venerem, quæ statim anni tempore, cupiditatem animalium, velut germen quoddam excitans, illico restinguit. De *voracitate* etiam superius aliquid attactum. Ne cadaveribus quidem sui generis abstinet. Inextinguibilis hæc vorandi aviditas, Laphygemus dicitur, ut Cælius Rhodiginus observavit. Huc *vocum humanarum* intellectus pertinet. Compertum agnitam Suarii, furto abactis, mersoque navigio, reclinatione unius lateris, remeasse. *Fox* ipsis est Grun-

Phile in Carm.

Ælian. H. A. l. 9. c. 28. Plin. H. N. l. 10. c. 74. Aristot. H. A. l. 8. c. 29.

Ætas. Plin. H. N. l. 8. c. 51.

Plin. H. N. l. 8. c. 51.

Rhodig. Lect. l. 25. c. 26.

Grunnitus. De *Ufu in Cibo*, verum fateamur necesse, quod Plinius dicit, neque alio ex animali numerosiorem materiam ganear, quinquaginta propè saporibus cum cæteris singulos. Nota apud Livium de Chalcidensi hospite historia, qui varietatem exquisitam ciborum, & speciem ferinæ carnis, ex mansueti sue produxerat. Heroico ævo in precio fuisse apud Homerum invenies; vescanturque macilentâ servi, pinguior Dominorum usibus cedebat. Solennitas quoque Saturnalium, non alio pœnè cibo, certe non lautior, transigebatur, ut observavit Lipsius eoque itum luxuriæ, ut & integritate farti, unde Porcorum hortulanorum & Trojanorum nomina, apponerentur. Taceo, ita artificiosè apparasse, aut ab altera parte esset ἐπίδαλῃ & κρεμβάλῃ, assatus & probè tostus; ex altera verò jurulentus, utpote ex aqua coctus; ita etiam jugulatus, ut ἀσφαλίῃ videretur, quod apud Athenæum videre est. Porcelli tamen maximè in deliciis, quos δελφάκας & δελφάκια Græci vocabant. Reperiuntur verò etiam, qui suilla in totum abstinent, Judæi nempe, quibus lege prohibita est; Arabes, quod apud Solinum legimus; Muhamedani, qui ex porci naribus murem natam fabulantur; Mauri, Tartari, ut & olim, prodente Pausania, Pessinuntii. Cæterum si de temperamento & quomodo se ad sanitatem humanam caro suis habeat quæras, Delphacum qui & λακτεδόπτελοι dicuntur, humida est, & superfluitatibus abundans, nec boni succi. Suilla Simeoni Sethi boni succi & facilis concoctionis, propter similitudinem quam cum humano corpore habet, magisque quam alia cibaria alit. Hoc postremum & Galenus quidem concedit, athletarum exemplo fretus: sed addit, bubulas in tantum lentore antecedere, in quantum bubulæ suillas crassitie vincunt. Alibi tamen ex pedestribus probatissimum cibum suppeditare ait, quod & apud Hippocratem invenies. Idem porcinas pravas esse ait. Suavissima suis mediæ ætatis; juniorum, si diu in ventriculo retineatur, corrumpi solet. Athenæus ex Sicilia tanquam præcipuas laudat. Apicius variè porcellos præparabat. Unde farfili, liquaminati, assi, Vitelliani, Flacciani, laureati, Frontoniani, Oenogerati, Celsiniani, tragani, & cæterorum nomina. *Iecur* omnibus præfertur, si quis animal aridâ ficu paverit, ut apud Aëtium extat. Habitæ tamen & aliæ partes in pretio apud veteres, collum nempe, glandium, vulva ejestitia inprimis post porcarias, lardum, perna, petaso, testiculi, sincipita, Omasmus, & cæteræ. Inter pernas laudabantur, Asiaticæ, Lyciæ, Cerretanæ, Italica, nunc Britannicæ, Westphalicæ, Moguntinæ, Ruthenicæ. Ex carne & aliis fiunt, Illicia, profecta, lucanica, salisci, fundali, farcimina, hotelli, apexabones, tomacula, ossa, hira seu hila, afratum, ruceta, fartutilli & alia, quæ alibi De o volente explicabimus. *Usum medicum* quod spectat, accuratissimè iste à Gesnero describitur, *Carnium* decoctum opitulatur contra Buprestim. *Sanguine* porci calido benè verrucæ inunguntur: ubera verò suis sanguine circumlita, minus crescere, Plinius author est. *Axungia* porcelli masculi lactentis castrati, illa maxime quæ in ventre intra carnem circa peritonæum, ad unguenta paranda à pharmacopæis adhibetur, à Medicis ad emolliendum, discutendum &c. Fracta ossa lardum elixum atque circumligatum mira celeritate solidat. Panis illinitur cum calce. Cum genista tusa genua dolentia sanat. Cum vino falso contra hyosciamum bibitur, pecoribus quoque optimè auxiliatur. *Iecur*, cum vino sumptum venenatorum moribus medetur, assum alvum sistit. *Vesica* urinam ciet, si terram non attigerit, pubi imposita. Verrina usta in potu feliciter contra mictionem involuntariam exhibetur. *Testiculi* inveterati, & in suis lacte triti contra comitalem morbum dantur. *Perna* scrofinae os amplissimum combustum, gingivas siccatur & adstringit. *Talus* combustus, donec è nigro albescat, & potus doloribus coli succurrit. *Lac* temporibus inunctum vigilias compefcit. *Succerda* in farinam redacta, ruptis, ex aceto salutaris est. Plura vide in Gesnero. De *Differentiis*, hoc duntaxat occurrit, alium esse *sylvestrem*, de quo nunc agemus, alium *Domesticum*, de quo jam dicta accipi debent. Moderni scriptores *Guineensum* & *fluviatilium* mentionem faciunt, quibus adjungi potest *Tapierete* congener sui animal. *Guineensis*, & è Guinea in Brasiliam translatus, figuratur ut nostrates & ruffi coloris: in hoc autem differt à nostratibus, quod *caput* habeat non ita elatum: *aures* autem longas, & acutas planè & prolongatis acuminibus, *caudam* longam usque ad talos propendentem, pilorum expertem. Totum corpus tegitur *pilis* brevibus ruffis splendidibus, non setis, quibus & in dorso caret, sed tantum versus caudam in dorso & circa collum paulo longiores habet pilos. Planè cicur. *Porcus fluvialialis*, Brasiliensibus Capy-bara, figuram penè porcorum habet, magnitudine exæquat porcum annum vel bimum nostratem. Longitudo corporis à capite ad anum circiter duorum pedum, crassities ventris ses quipedis. Caret *cauda*. *Pedes* quatuor porcini: anteriores quatuor ungulis, posteriores tribus præditi. Estque in anterioribus *ungula* media longissima, duæ breviores, quarta minima: in posterioribus media longior & duæ minores: habet & callum ad suffraginem usque. *Capitis* longitudo decem digitorum, & crassities totidem ferè: habetque crassum & improporionatum caput, & os longissimum ac crassum: oculos magnos, nigros, aures parvas, subrotundas.

Inferior *maxilla* brevior superiori; contineturque in utraque antèrius duos *dentes* incurvatos, qui ad sesquidigitum prominent extra alveolos suos, & ad duos ferè digitos sunt inserti; sed non eminent extra os, sed ut in leporibus intus continentur. *Dentes* reliqui mirandi sunt: constat totus ordo in qualibet maxilla octo ossibus, in quolibet nimirum latere quatuor: & quodlibet os tres dentes inseparabiles repræsentat: ut ita sint in qualibet maxilla dentes viginti & quatuor, & in totum quadraginta octo: sunt autem omnes in extremitatibus plani. Comedunt graminem & fructus varios. Caro comeditur, licet non bene sapiat, melior ossa, caput inprimis. *Tapierete* Brasiliensibus, Lusitanis *Anta*, animal quadrupes, magnitudine juveni semestris: figura corporis quodammodo ad porcum accedens, capite etiam tali, verum crassiori, oblongo, superius in acumem desinente, promuscide super os præminente, quam validissimo nervo contrahere & extendere potest: in promuscide autem sunt fissuræ oblongæ. Inferior *oris* pars brevior est superiore, maxillæ ambæ antèrius fastigiatae, & in qualibet decem *dentes* incisorii superne & inferne; hinc per certum spacium, utraque maxilla caret dentibus, sequuntur dein molares, grandes omnes in quolibet latere quinque, ita, ut habeat viginti molares & viginti incisores. *Oculos* habet parvos porcinos: *aures* obrotundas majusculas, quas versus anteriora furrigit: *crura* vix longiora porcinis, at crassiuscula: in anterioribus pedibus quatuor *ungulas*, in posterioribus tres; media inter eas major est in omnibus pedibus; in prioribus pedibus, tribus quarta parvula exterius est adjuncta: sunt autem ungulæ nigricantes non solidæ sed cavæ, & quæ detrahi possunt. Caret *cauda* & ejus loco processum habet nudum pilis, conicum, parvum, more Cutian. Mas *membrum gentiale* longe exserere potest instar Cercopitheci. Incedit dorso incurvato ut Capybara. *Cutem* solidam habet instar Alcis; pilos breves. Color *pilorum* in junioribus est umbræ lucidæ, maculis variegatus albicantibus ut capreolus: in adultis fuscus sive nigricans sine maculis. Animal interdum *dormit* in opacis sylvis latitans; noctu aut mane egreditur pabuli causa. Optime potest natari. Vescitur gramine, arundine Saccharifera, brassica, &c. Caro ejus comeditur, sed ingrati saporis est.

ARTICULUS II.

De Apro.

Aldrovand.
Hist. Bifalc.
c. 37.
Nomen.

APri nomen feris suis duntaxat competit, cum sus tam de feris quàm de domesticis dicatur. Sextus tamen, aprum a-

grestem nominat, quasi verres etiam, id est, sus cicur mas, eodem nomine nuncupari possit. Græci vocant *καπερον*, Poëtæ inprimis, quod vocabulum rei rusticæ scriptores de verre intelligunt, & *σάαρον*, *χλάνης* verò quibusdam est *εὐτορίας*, id est, exfectus eunuchusque aper; (atterunt arbori aut saxo testiculos) Homero *μόνορχης*; aliis sus in agris libere pascens, quasi *χλοδύνη* ut Varinus habet, id est, in herbis fænove dormiens; quibusdam, magnitudine viscenda aper. Aristophanes *μονιόν* cum chlyne eundem facit; alii & verius epitheton feri scribunt, quod cum aliis minimè aggregetur. Colore sunt ferè nigro, vel spadiceo nigricante. Plinius, pilum æreo similem agrestibus dixit. Albos tamen se vidisse, scribit Pausanias. *Oculos* gerunt iracundis similes, & apertis palpebris patulos. *Dentes* habent magnos & recurvos, ad incidendum aptos, albos, hinc *δερμίδεις* Homero, acutos valdè, hinc Sidonio *sicæ*, quod ficarum more res quaslibet violent. In his hoc est mirabile, quod vivente bestia possunt idem quod ferum; mortuæ verò detracti, vim incisionis amisisse credantur; ut liber de natura rerum prodit. Audio exertos aliquando ita excrefcere, ut circum quod ferè absolvant toti in se reflexi. In India cubitales dentium flexus gemini ex rostro. Cum ad terram canibus & hastis debellatus procubuit, dentem inflammato anhelitu ita ignescere ajunt, inquit Gyllius, ut si quis de cervice fetam detractam, ad ejusdem etiamnum, spirantis dentem admoverit, candens in orbem contrahatur ac aduratur: ac si eo dente canes insectantes attigerit, statim ignita vestigia pelli ipsorum imprimat. Hinc dentes aprorum *αἰθωνας* cognominavit Oppianus. *Os* habent ad modum scuti, quod venabulis & machæræ opponunt. *Fel* nullum, *Sanguinem* qui fibris refertus non est. Nulli sunt in Creta, si Plinio credimus: nulli in Africa, si huic & aliis: idem de India Ctesias prodit. At apud Theophrastum legimus; in Ægypto (in Nilo) insulas magnas coagmentari, fuesque permultos in eis nasci. In Macedonia mutos esse Ælianus prodidit. Hispani in quadam novi orbis parte invenerunt nostris minores, caudis brevissimis, adeo ut abscissas fuisse arbitrarentur; pedibus etiam dissimiles, posteriores quippe ajunt pedes in his apris uno digito non unguato constare, carnibus multo quàm nostrorum tum suavioribus tum salubrioribus. Scilicet, palmeta ibi propè littus multæ erant, inter quæ & palustres ulvas, magna aprorum multitudo libera vagabatur. Lycotas rusticus in Bucolicis Calphurnii, refert se vidisse Romæ in spectaculis, nivos lepores, & non sine cornibus apros. *Cibus* apri non alius quàm cicurati porci, glandes, poma, hordeum, herbæ, radices, & alia.

Plutarch.
de causis
natur.
quæst. 12.

Descriptio.

Pausanias.
in Arcadi-
cis.

Oppian. de
venat.

Locus.

Theophr.
H.P. l. 4.
c. 13.


Ælian. H.
A. l. 17.
c. 10.
Plin. H. N.
l. 11. c. 51.

Petrus
Martyr.
Decade
Ocean. l. 2.

Cibus.

Verres

Eber



Aper

Wild. Schwein



Scrofa

Mock





Porcus pumilo Taxus porcing



Aper Wild Schwein



alia. Lumbricos etiam rostro effossos comedit. Ficus aridas supra modum appetere, ex *Æliano* discimus, Minus tamen immoratur foetidis quàm domesticus. Inveniuntur aliquando inter filicum folia, quæ ipsi sibi collegerunt aut substraverunt. Genus verò quoddam farris, quo Germani circa Alsatiâ vescuntur, acutis armatum aristis, non attingunt, propter aristarum acutiem, ut *Tragus* prodidit. De *Generatione* hoc habemus, in venerem dum inflammantur, cervicis fetis sic inhorrescere, ut cristæ galearum esse videantur. Spumas fundunt ab ore, magno dentium stridore concrepant, & effervescentem spiritum anhelant. Admissi mares, bilem deponunt; rejecti, vel vi subigunt, vel opprimunt. Principio hyemis coeunt, vere pariunt, petentes maximè invia, prærupta, angusta & opaca. Mas cum foeminis conversari dies triginta solet. Numerus partus, & tempus ferendi idem atque in urbanis suis. Semel anno gignunt, & apris maribus non nisi anniculis generatio. *Vox* etiam similis, sed foemina vocalior est, mas raro vocem emittit. Quantum ad reliqua, quæ ad hujus quadrupedis naturam spectant, solent in remotis & profundis præcipitum locorum recessibus versari. Auditum nos vincunt: gregatim incedunt, nec alios quàm de sua progenie secum vesci patiuntur, lachrymam dulcem habent, spumant, dum exagitantur tenacem. Tam gravis iisdem sua urina est, ut nisi egesta, fugæ non sufficiat, ac velut devincti opprimantur. Exuri illà eos tradunt. Mitigari tardè concipiunt, nec nisi ab infantia educati. Ab aconito & syanchi radice occiduntur. Cum per imprudentiam hyoscyamum comederunt, statim attrahunt posteriora, ita demisse sese gerentes; hinc, contracti quamvis, ad aquas perveniunt, & collectis cancris vescuntur. Ederà in morbis sibi medentur. Ad quadrinatum capiunt incrementa. Muficà illecti capiuntur: ideo in leporario quodam Varronis, in Tusculano, ad buccinam inflatam, certo tempore conveniebant ad pabulum. Sapiunt vestigia palude confundere. Foeminæ, si multæ simul sunt, fugiunt, ubi vident venatorem, cum natis: sed ubi quis aliquem ex natis venatur, non amplius fugiunt, ne si una quidem sit, sed ruunt adversus capere molientem. Dentes acuunt ad luctam. Inter se concertantes, cum viderint lupos, quasi confederati, se juvant mutuo, & ad vocem clamantis quotquot audierint concurrunt. Cæterum, varia aprorum cæterorumque sylvestrium, primus togati generis invenit Fulvius Hirpinus, qui in Tarquinienfi feras pascere instituit: nec diu imitatores defuere, L. Lucullus, & Q. Hortensius. In *Cibis* adhibitos & adhuc adhiberi, nemini ignotum.

Primus Romanorum P. Servilius Rullus, pater ejus Rulli, qui consulatu Ciceronis legem agrariam promulgavit, solidum aprum epulis apposuit. Apri verò *milliarii* dicebantur mille librarum, quos solebant in coenis apponere Romani. De Condimentis consule Apicium. Caro ipsa, melior domestica suis carne, citò descendit, multum nutrit, & succum gignit crassum ac viscosum. Heliogabalus exhibuit sumina aprugna per dies decem, tricena quotidie, cum suis bulbis. Quo die Lentulus flamen Martialis inauguratus est, in coena fuerunt, lumbi aprugni, sumina, & synciput aprugnum. Invenere & in *Medicina* locum. *Cerebrum* contra serpentes cum sanguine laudatur, verendorumque carbunculis succurrit. *Lardum* elixum atque circumligatum mirâ celeritate solidat fracta. Epinyctides adipe cum rosaceo inunguntur. Cinis *maxillarum* ulcera sanat quæ serpunt. *Dentis* scobes pleuritida solvunt. *Pulmo* cum melle commixtus, pedibus à calceamentis læsis, supponitur. *Iecur* lethargicos excitat; & auribus purulentis instillatum proficit: ex vino potum, citra salem, recensque alyum sistit. Calculi in eo inventi, & triti, calculos pellunt. *Fel* tepidum illitum strumas discutit, & coitum stimulat. *Ungularum* exustarum cinis, potioni inspersus, plurimum urinae difficultates juvat. *Ungues* exusti & triti submejlis in potione profunt. *Fimus* aridus, in aqua aut vino potus, rejectiones sanguinis sistit, vetustum lateris dolorem mulcet, ad rupta & convulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato rosaceo medetur. Recens & calidus præcipuum est contra fluxum narium remedium. Ex vino subactus, & emplastri more impositus, quicquid corpori inhæserit, celeriter extrahit. Tusus cribratusque, & cum melle deteriore subactus, articulis impositus medetur. *Vrina* purulentis auribus infunditur. *Vesica* elixa & manducata submejlis prodest. Plura in Gesnero vide. Ad *Differentias* refero *Zainum*, de quo *Nierembergius* ita: Montanam miri ingenii feram vocant Indi *coya metl*, alii *quauhcoya metl*, alii *quauhlo coyametl*, alii *quapicotl*, alii *fajassou*, alii *saynum*, sive *Zahinum*. Similis est nostrati apro, nisi quod minor sit & deformior, umbilico ejus existente supra dorsum & circa renes. Mirum aspectu: ibi humor aqueus receptus digitis expressus effluit; nec tamen inquit Franciscus Hernandus, verus est umbilicus, aut subest quidquam ab eo quod in aliis animalibus reperiri solet diversum, (quod eo dissecto cognovimus) aliudve quàm glandulosa quædam & mollis pinguedo. Antonius Herrera putat respirare per fun-

Plin. H. N. l. 8. c. 51.

Lamprid. in Heliogabalo.

Gesnerus P. 1047. de quadruped.

Differentia. Nieremb. Histor. Natur. Exotic. l. 9. c. 27.

pinum hunc umbilicum. Fætidus est. Lærius omnino fævet. Scribit aprum Americanum habere foramen in dorso, quemadmodum in capite fues marini, quo spiritum emittit admittitque: addit frendere terribiliter, & macilentiorē esse nostratibus. Attentior est censura Francisci Hernandi de tumulo dorfi. Iracundi sunt. Venatores conscendunt arbores: accurrit grex zainorum, mordent & lacerant truncum, cum hominem non possint, quos ille supernè tutus venabulo cædit. Gregatim discurrent; eligunt ducem, & ut fertur, minorem aut viliorē omnium. Antonius Herrera scribit esse senem & flaccidum, neque nisi duce occiso societatem & cohortem dissolvere: prius enim occiderentur, quam regem defererent, auctor est Petrus Simon. Aliqui Bachiris hoc imputant. Mirum odium in tigridem. Dux Zainorum convocat quoscunque potest sui generis, usque ad trecentos aut plures, quemadmodum Imperator, conducit militem. His copiis invadit tigridem: quæ licet ferocissima præ omnibus Americanis feris, vincitur multitudine, non sine magnâ zainorum strage. Inventi innumeri occisi simul cum tigride, ut paucissimi possint epiniciū canere. De ingenio hujus feræ sic narrat *Franciscus Hernandus*. Ferus est ac truculento morfu, cum primum est captus. Sed cum cicuratur, placidus est domesticis, & habetur in deliciis. Caro est similis suillæ aprugnae, sed durior atque infuavior. Setæ sunt asperæ, albo ac nigro promiscuè variatæ colore. Vescitur glandibus, radicibus & aliis montanis fructibus, nec non vermiculis, lumbricus, atque aliis hujusmodi animalibus quæ lacustribus, humidis & uliginosis locis nascuntur. Devastant etiam sacra, cum ab eis non arcentur. Gregatim ambulant; & redditu mites, aluntur quibuscunque esculentis. *Digiti* pedum variant. Siquidam alii productiores sunt, alii breviores. Scribunt aliqui apros Indicos brevissimis esse caudis, ut abscessas esse putes. *Pedibus* etiam esse nostratibus dissimiles, & posteriores uno digito non ungulato constare. Carnes multò nostrorum carnibus saporosiores salubrioresque, sed saynis opus est præcidi umbilicum, alio qui uno die corrumpuntur. Idem est cum Tajacu Caaigora Marcgra vii: Icon tamen variat, & descriptione plenior est. Ideò & hanc & illam addidimus. Habuit eum & quidem familiarissimum Amplissimus de Laet, quem cum per semestre & amplius, humidis cibis aluisset, mortuus est ex ileo, ut videbatur. Valckenburgius umbilicum illum mammam esse putabat, quòd vasa mammaria haberet. Verum qui animal penitus norunt, catulos suos illâ parte alere negant.

TITULUS II.

De Bisulcis aquaticis.

CAPUT UNICUM.

De Hippopotamo.

AD Bisulca Hippopotamum retuli, Aristotelem secutus. Ad digitata tamen recentiores referunt, & fortè, ut ex icone & descriptione apparebit, melius. Dicitur verò Hippopotamus, id est, fluviatilis equus, non quòd equum similitudine referat, sed quòd magnus sit, ut *ἵππος* vim augendi significatum habeat. Fluvius ille Nilus est. Dicitur & *equus Niloticus*, *Bos marinus* teste Bellonio, *porcus marinus*, quòd parte anteriore bubulam figuram, reliquo corpore suillam repræsentet; *Elephas marinus*, tam ob magnitudinem, quàm ob dentium candorem & duritiem. Sed & *Elephantus Aegypti*, *Rosmarus*, *Rohart*, *Gomarus*, in regionibus inprimis Prete Gani, si Alvaresio credendum. Circa *Descriptionem* dissentiant à veteribus recentiores. Ælianus ad quinque cubitorum altitudinem excrecere, ungulas bubulas habere, tres utrinque dentes maxime omnium animalium circa os eminentes; auribus, cauda, voce, equum præ se ferre, reliquo corpore elephanto similem esse, scribit. Aristoteles, jubam equinam habere, ungulam bubulam, rostrum resimum, talum bisulcorum, dentes exertos, caudam apri, vocem equi, magnitudinem asini, internas partes interaneis equorum & asinorum non dissimiles, reliquit. Leoni Africano, formâ equum, magnitudinem asinum refert, depilis est, & cymbis insidiatur. Bellonius, qui parvum Byzantii vidit, capite eum vaccino, auribus urinis, brevibus & subrotundis, oris rictu adeò vasto ut leoninum superaret, patulis naribus, labiis repandis, dentibus equinis obtusis, oculis & lingua prægrandibus collo nullo aut admodum brevi, caudâ porci, corpore obeso ad instar suis, pedibus tam brevibus, ut vix quatuor digitos à terra attolleretur, ungulis, ut in sue divisione, descripsit. Accuratissimè verò eum nobis exhibuit Fabricius Columna, ex cadavere sale asservato, & in Italiam Damiatâ, à Nicolao Zerenghi, Chirurgo Narnensi, allatam. Nullam habebat cum equo similitudinem, ad bovem potius, si magnitudinem attendas, & ursum, si crurum figuram, accedebat. A capite ad caudam pedes erat tredecim; corporis latitudo pedes quatuor cum dimidio; alitudo pedes tres cum dimidio; *venier* potius planus quàm carinosus, *crura* à terra ad ventrem pedes tres cum dimidio; ambitus crurum pedes tres. *Pes* latus pedem, *ungula* singulæ uncias tres. *Caput* vastum in comparatione ad totum animal, duos pedes cum dimidio latum, pedes tres longum. ambitu

Aldrov. Dig. l. i. c. 12.

Bellon. de aquat. l. i.

Description. Ælian. H. A. l. i. c. 44.

Aristot. H. A. l. 2. c. 7.

Leo de script. Africæ. l. 9.

Columna in l. observ. aquat. & terrestr. c. 15.



Grijphus

Grijps

Wasser Ochs



Hippopotamus

Hippopotamus







Lica Capra



Ovis Cretenfis



Camelo Pardalis



Ovis Peruana





Aries Guineensis



Zainq. s. Tajaen Porcus sulvester

Porcus Guineensis





Leo.

Leo.





Leena.



Leo





bitu pedes septem crassum. *Oris* rictus pedem unum, rostrum carnosum, & repandum; *Oculi* exigui, lati unciam, longi uncias duas; *aures* parvæ, breves, neque uncias tres excedentes; totum corpus obesum; *pes* latus in quatuor ungulas divisus; Ungulæ quales in bubus, & quidem quadrifidæ; *talus* callosus; *cauda* aprina, vel potius testudineæ aut ursinæ non dissimilis. *Cuius* admodum crassa, dura, colore pullo. *Nares* imaginem S. repræsentant, fissura longa unciarum duarum cum dimidio. *Rostrum* habet instar leonis vel felis, pilis ex poris quibusdam prodeuntibus asperum, nec in toto corpore alii conspiciuntur. *Dentes* singulariter idem Columna descripsit. Habebat, inquit, in inferiore maxilla sex, quorum bini exteriores, è regione, longi semipedem, lati, & trigoni uncias duas cum dimidio, per ambitum semipedem, aporum modo, parum retrorsum declives, non adunci, nec exerti, sed admodum conspiciui, aperto ore. Intermedii verò parum à gingiva exerti, trigonæ acie, digitali longitudine, medium locum occupantes, veluti jacentes, crassi, orbiculati, elephantini, semipedem superant longitudine atque aciem in externis partibus planam. Maxillares vero habebat utrinque septem crassos, latos, breves admodum. In superna vero mandibula, quam Crocodili more mobilem habet, quæ mandit & terit, anteriores sex sunt, sex imis respondent, acie contrario modo adaptata levissimæ & splendidæ, clausoque ore conjunguntur, & aptantur imis, veluti ex illis recisi, ut planum plano infideat. Verum omnium acies pyramidalis, veluti oblique recisi calami modo. Sed medii superiores non aciem inferiorum, & medium illorum, in quo retractio rotunditatis conspicitur, petunt. Molares totidem quot inferni, sed bini priores parvi, exigui, atque rotundi, & ab aliis distant ut medium palatum, inter dentes anteriores, occupare videantur. Inter maxillares dentes locus linguæ semipedalis remanebat, durities dentium filicea, adeo ut percussione cultelli costæ, cum circumstantium admiratione, ignis favillæ excitarentur. Qua propter verisimile foret, nocturno tempore, hoc animal, dentes atterendo, ignem ex ore evomuisse, quam proprietatem prisca huic feræ attribuerunt. Propria ipsis patria Saitica Ægypti præfectura, si Plinio credimus. Unde fortè Herodotus in ea parte sacros scripsit. At Leo Africanus, & qui navigationes describere in Nigro quoque fluvio reperiri ait. Sed & in mari versari dictum, Plinio & illis, qui in Oceano regiones

Petzoræ alluente, reperiri scripsere. Barbosa multos in Gofala observavit, à mari ad prata exire, denuoque reverti. Maturis segetibus & flaventibus spicis vesci, Ælianus prodidit. Cum ad confirmatam pervenit ætatem, periclitari incipit in patre suo vires. Si pater cedit, cum matre congreditur, ipsum verò dimittit: si pater resistit, interimitur, ut apud Ælianus legimus. In sicco parere & educare solet, si Odon credimus, eaque est fecunditate, ut singulis annis enitatur. Ad *Naturam* & *Mores* spectat, quòd ex Nilo in campo egressus, & segetibus satiatus, averso vestigio, ad flumen rursus properet, seu ut agricolas corpore averso excipiat; seu ne venatores exitum deprehendere possint: quòd hominibus non minus quàm Crocodilus infensus sit: & quòd nimia corporis obesitate pressus, caudici arundinis tam diu se affricat, donec venam aperuerit, sanguine ad sufficientiam emisso, eandem cœno obturat. Columna tamen primum illud negat, & recto incedere tramite tradit. An hinniat, in dubio est. Veteres affirmant, recentiores negant. In *Cibus* ab Æthiopiis usurpatur. Narrat enim Clusius, in Guinea circa promontorium Cabo Lopez Gonsalvez, Navarchum van der Hagen / cum sociis id observasse, visaque in oppido Ulibetto plurima hippopotamorum capita, ex quibus dentes mirandæ magnitudinis, comites ejus retulerint. Non est ergo mirum, à Firmio Seleucio, quod Capitolinus prodit, hippopotamum devoratum fuisse. Habere & in *Medicina* locum, à veteribus & recentioribus proditum est. Ægyptii, prodente Columna, ad hæmorrhoides cœcas & apertas, dentem alligant, vel annulum ex eo fabricatum gestant. Nigritæ eodem à quodam morbo præservantur. Plinius eosdem dentes, in odontalgia sedanda insignem habere prærogativam scribit. Idem adipem febrientibus contra rigores commendat: corii cinis cum aqua illitus ad panos dissolvendos. Pellis frontis inguinibus alligata, eodem auctore, venerem inhibet. Testiculos exiccatos contra morsum serpentum exhibet Dioscorides. Sed & ad alia partes ipsius adhibentur. Nam Pausanias refert, Dindymenæ matris faciem ex dentibus ipsius factam: sanguine cum aqua gummosa dissoluto pictores loco cinnabaris uti possunt, apud Plinium. Pinguedine delibuti impunè inter Crocodilos versari, apud Julium Capitolinum legimus. Pelle tecta, fulmine non tangi, prodidere quidam. Corii tantam crassitudinem Plinius facit, præsertim circa tergus, ut inde validæ hastæ torquentur.

Cibus.

Ælian. H. A. l. 11. c. 43.

Generatio. Plin. H. A. l. 11. c. 44.

Ælian. H. A. l. c.

Mores. Ælian. H. A. l. 11. c. 43.

Vfus.

Clusius in Curis posterioribus.

Dioscor. M. M. l. 2. c. 22.

Locus.
Herodot.
l. N. l. 2.
Leo Afri.
9.
lin. H. N.
32. c. 11.

HISTORIÆ NATURALIS

DE

QUADRUPEDIBUS

LIBER III.

De Quadrupedibus bisculcis.

TITULUS PRIMUS

De Digitatis viviparis Feris.

CAPUT I.

De Leone.



ACTENUS de Bifulcis actum est, sequuntur *πλεῖστα* digitata, Græcis *πλυγυῖα* & *πλυδάκτυλα*, quæ vel sunt *ζώονα*, seu vivipara, vel *ὄονα* seu ovipara. Illa,

iterum vel sunt *Fera*, quæ aut sunt feris moribus imbuta, aut difficulter cicurantur, aut si aliquando mitiora redduntur, nunquam tamen ferociam penitus deponunt; vel *semissera*, vel *Domestica*, quibus Appendicis loco *Dubia* addi possunt. Ex illis sunt *Leo*, *Pardus*, *Lynx*, *Tigris*, *Ursus*, & *Lupus*. *Leo*, Græcis *λέων* ὡς τὸ λέω, video, quod perspicaci præ cæteris oculorum acie polleat, & ἡγεῖ fero per antonomasiam dicitur. Catulos Æschylus *ἑρμαῖα*, vulgus *σκύμους* ab obmurmurando Poëtæ *λεονίδες* & *λεονίσκος*, appellant. Plin. ursum Numidicum, dum scribit, Domitium Rhenobarbum Ædilem curulem, urfos Numidicos centum, & totidem Æthiopas venatores in circo dedisse, Lipsio appellare videtur. Sed perperam nisi fortè pro Urso, Leones substituendum sit. Parum enim credibile est, si Romani pro leone dixissent ursum Numidicum, ignoratum id fuisse Plinium: qui meminerat & apud Maronem Acestem vestitum induci -- pelle Libyftidos urfæ.

Dio quoque seu Xiphilinus ab urfis feras Libycas distinguit, ut taceam, neminè veterum tam insolentis locutionis meminisse. Aristoteles eum capite mediocri, fronte quadrata in medio cava posuit, supercilio eminenti, & nasum versus cujusdā nubis instar porrecto, oculis charopis, non valdè volubilibus, neque valdè prominentibus. Recentiores medios inter cavi, & extantes *oculos* notavere, *nasum*, crassiorē potius quàm tenuiorem, superiorem maxillam inferiori æqualem, rictum instar ovis amplum, labia tenuia, ita ut partes superiores superjectæ sint inferioribus, *collum* rigens & magnum, mediocriter crassum, *pectus* robustum, metaphrenum latum, *medium ventrem* gracilem, *crura* valida & nervosa, *pilos* flavos, neque rectos, neque

valdè crispas. *Pedes* anteriores quinis digitis, posteriores quaternis distinguuntur. *Leenam* à mare juba quā caret, & binæ in medio ventre mammæ distinguunt, ex quibus numerum catulorum arguere non licet. Lactis inde inopia, adsumptum in sui nutrimentum cibo, quem rarius assumit. *Interiora* si spectes, Musculos temporales. Galen. de Ufu part. l. 9. cap. 19. fortissimos habet, ut mordendo valeat, *Linguam* asperitate imbricata horrentem; *Viscera*, canum interioribus penitus, Arist. A. l. 5. c. 80. similia, *lienem* nigrum, quod observavit Galenus. *Cervicem* unico osse constare ab Aristotele & Cardano proditum, ex vertebra componi à Scaligero. *Ossa*, medulla carere apud Ælianum legimus, paucissimam habere, quod perpetuò resolvatur, Fallopio, qui ea se fregisse dicit, credendum. Michael Ephesius angustissimos habere meatus, ita ut iis penitus carere videantur, reliquit. In Europa inter Acheloum & Nessum fluvios imprimis crescere, Aristoteles prodidit: nusquam in ea nasci, nisi id ex hominis industria fiat, certum. *Natalis* ipsis, Mauritania, Parthia, Massylia, Marmarica, Caspia, Libya, Getulia solum. Habentur & in Syria nigri, si Plinio fides est. Nasci & in Tartaria Paulus Venetus passim prodidit. In Caragol rustici metu eorum, armati terræ cultui operam navant, ut Balbus in itinere suo prodidit. In deserto Angad juxta Telesinum, teste Johanne Leone, non solum in armenta, sed & in homines indiscriminatim sævire solent, ab iisdem silvarum Fetz carbonarii sæpe numero devorantur. Taceo regnum Senegæ, montem juxta Adenam editissimum, terram sanctam, & alia loca. In Cuba degunt innoxii, si Martyri credimus. Aglam & regiones circumjacentes tam meticulous alere, ut in proverbium abiverint, Ælianus auctor est. Temperamenti est calidissimi & siccissimi, quod ab acris cordis æstuatione promanat. Non omnes tales pariter esse, vel exinde colligas, quod qui montes incolunt, minus ferociæ habeant, & Gesnerus, partes in iis anteriores calidas esse, posteriores ad oppositam naturam degenerare, scribat. *Cibus* ipsis carnes bubulæ, & Ælian. H. A. 2. l. c. 10. Camelinæ imprimis, fame urgente humanæ & avicularum. Idè multi in Africa crucifixi à Polybio Æmiliano Comite visi, ut reliqui

Galen. de Anatom. adm. l. 6. c. 10. Scalig. Ex cr. 208. Ælian. H. A. l. 2. c. 1.

Locus.

Arist. H. A. l. 8. c. 23.

Leo Africa l. 4.

Temperamentum.

Gibus.

hoc

Nomen.

Plin. H. N. l. 8. c. 36.

Lipsius E- lect. l. 2. c. 4.

Virgil. Æneid. 5.

Description. Aristot. H. A. l. 6. c. 31.

hoc spectaculo, à cæde hominum deterre-
rentur. Multa solida & sine ullo dissectu una
vice devorare, inde bidui vel tridui spacio,
perfectè celebratam coctionem expectare,
Aristoteles docuit. Cadavera an degustent,
non constat inter Authores. Non attingere
seu ob foetorem, seu ob superbiam quod
Tzetzæ placet, quidam volunt, vorare,
ideò reliquias condere, & supra illas teter-
rimum flatum exhalare, ne inventæ ab aliis
feris vorentur, apud Ælium legitur. Ele-
phantorum quoque pullos aggredi, succur-
rentibus matribus fugere, Strabo prodidit.
Catulus ubere relicto, imbellium ferarum
carnes depascitur, sed & palmulis victitat.
Potus. Potum si spectes, parcus is secundum Aristo-
telem, & Ælium, triduo non bibit, ætate
inprimis, hyeme indulget. Aversi coeunt,
Generatio. quod omnibus animantibus quæ retrò uri-
nam mittunt commune. Tempus veneris
continuum, sed ver, Ælian. H. A. l. 2. c. 2. in-
primis, tunc cruentam inter se exercent pu-
gnam, & octo aut duodecem unam leonam
sequuntur. Elapso primo anni tempore, ma-
ribus ob nimium calorem coire non valenti-
bus, leonæ cum pardis, unde Leopardi, pan-
theris, unde foetus non jubatus, Hyenis, unde
Crocuta, miscentur. Est ipsis & cum cane
commercium. Solæ inter quadrupeda adun-
cis unguibus prædita catulos videntes eni-
tuntur. Unde animalis solaris nomine dona-
tam Plutarchus opinatus est. Imperfecti &
quidem post sex mensium spacium, exeunt,
non quod unguibus uterum, Ælian. H. A.
l. 2. c. 2. vellicent, sed quod ob numer. in-
opia alimenti, Aristot. de gener. Animal.
l. 4. c. 6. laborent. Magnitudinem mustela-
rum non excedere apud Wottonum habe-
mus, novissimo pariendi actu, uterum ex-
cernere, fabulosum est. De numero catu-
lorum non convenit inter Authores. Non
plures quam sex edere, aliquando unum
Wottonus prodidit. In capta & interfecta
octo inventos Philostratus. Ætate gravem
præter omnium spem sex Florentiæ pepe-
risse, Villanus. Quod verò Phile quinquies
eniti, quinos primum, quatuor deinde,
ternos posthac, inde binos, quintum uni-
cum scribit, id ex Aristotele, de leonibus
Syriæ incolis accipiendum est. Huc *Sympa-*
thia & Antipathia spectat, quæ leonibus
cum plurimis rebus intercedit. Favet Del-
phino, seu quia ambo senectute & morbo
gravati simia vorata sanitati propriæ consu-
lunt, ut Æliano placet, seu aliam ob cau-
sam. Abhorret à muliebribus verendis. Ho-
rum, Leo Africa l. 9. ostensu in Africa fu-
gatur, à sue, Aristot. H. A. l. 9. c. 1. asper-
rimis fetis horrente, lupo cervario, onagro,
Tauro, simia, Plin. H. N. l. 8. c. 38. Leon-
tophono, quo gustato, tanta illa vis & ex-
teris imperitans, illico expirat. Animal à
plurimis scriptoribus nominatur, à nullo de-

scribitur. Galli cantum extimescere tam
certum olim Græcis, ut animam Cecropis,
quam in leonem migrasse credebant, immo-
latis gallis gallinaceis evocare sibimet ipsis
persuaderent: alii id de cristis rubentibus &
igneis accipiunt: nos falsum esse ex Came-
rario didicimus, qui in aula Bavariæ Prin-
cipis, unum ex leonibus miris saltibus in vi-
cinam domui aream sese demisisse, & gallos
cum gallinis devorasse prodidit. Idem à cu-
licibus in Africa pellitur. Homines succo
alii perlinitos, vel aqua, in qua illud ma-
duerat perfusos, non attingit. Scillæ &
Ælian. H. A. l. 1. c. 36. ilicis folia si incautè
conculcaverit, illico à torpore corripitur.
Ad rotarum strepitus exhorrescit. Mappam
albam refugit, & Æl. H. A. l. 6. c. 2. l. 7.
c. 6. ignem, quia igneæ naturæ est, abomi-
natur. Creduntur *Vite* diuturnæ esse. Den-
tibus enim defectos captos fuisse affirmave-
re quidam, effractis alii. Cum procis foeta
dimicat, oculorum aciem traditur defigere
in terram, ne venabula expavescat. *Dor-*
miunt & in aperto, & apertis oculis, quod
oculum magnum incumbens oculo longe
minor pellis obrepere non possit, caudam
quoque sopore detenti motitant, ut se omni-
no non dormire ostendant. De *Voce* non con-
venit inter authores. Alii mugire dicunt,
quod apud Virgilium invenies; quod ju-
nioribus prædam nactis forte competit: alii
fremere, quod Mancino & Volaterrano pla-
cet, ut de Seneca Tragædo taceam: non-
nulli frendere, quod tum accidit, cum præ-
iracundia dentes concutit: plerique rugire
affirmant. Quantum ad *Ingenium*, ducen-
tos aliquando equites, Leo Africa l. 9. A-
fricanus adoritur, etiam lethali vulnere per-
cussus, à catulorum tutela non recedit. Æ-
gritudinem fastidii tantum, Plin. H. N. l. 8.
c. 16. sentiunt, in qua medetur eis contu-
melia in rabiem agente, annexarum lascivia
simiarum, solus, Ælian. H. A. l. 2. c. 17. ve-
natum egreditur, foetorem oris patitur,
quod à Plinio proditum est. Neminem,
Plin. H. N. l. 8. c. 16. limis oculis inietur.
Generositas in periculis maxima deprehen-
ditur, non in illo tantummodo quod sper-
nens tela diu se terrore solo tuetur, ac velut
cogi testatur, cooriturque non tanquam
periculo coactus, sed tanquam amentię ira-
tus, illa nobilior animi significatio, quam li-
bet magna canum & venantium urgente vi,
contemtim resistansque cedit in campis, &
ubi spectari potest: idem ubi virgulta syl-
vasque penetravit, accerrimo cursu fertur,
velut abscondente turpitudinem loco. Dum
sequitur, insilit saltu, quo in fuga non uti-
tur. Vulneratus observatione mira percus-
sorem novit, & in quantalibet multitudine
appetit. Eum verò qui telum quidem mi-
serit, sed tamen non vulneraverit, corre-
ptum, raptatumque sternit nec vulnerat. Il-
lud

Vita.

Somnus.

Vox.

Mores.

Plin. H. N.
l. 8. c. 16.Aristot. H.
A. l. 8. c. 5.Ælian. H.
A. l. 2. c. 3.Strabo
Geogr. l. 15.

Potus.

Ælian. H.
A. l. 8. c. 5.

Generatio.

Plin. H. N.
l. 8. c. 16.Plutarch.
symp. l. 4.Philostr. in
vita Apol-
lon. l. 1. c. 7.Sympathia
& Antipa-
thia.Ælian. H.
A. l. 15. c. 17.Ælian. var.
l. 1. c. 9.

lud adolescentis ex Jubæ exercitu exemplum apud Ælianum docuit. Læsus sagittâ ab eunte, anno interposito vertente, redeuntem, in media turba dilaceravit. Hoc illius apud Albertum, qui lancea confodere voluit, sed fallente ictu non fecit, collapsi ad terram caput leo in galea compressit, sed non vulneravit. Dum incedunt, ungues retrahunt veluti in vaginas, ne hebetentur: nec rectum iter peragunt, sed obliquum, variis vestigiis impressis ut melius lateant. *Circurari* posse non est quod dubites. Onomarchus Catanæ Tyrannus convictores habuit. Johanni II. Lusitaniæ Regi, tanquam canis adfidebat: in templo Adonidis regionis Elimeæ, adeo erant mites ut ingredientibus adularentur. Cujus Martialis mentionem facit, tam unanimiter cum ariete commemorabatur, ut alter terroris, alter immanitatis videretur oblitus. Jugo subdidit eos, primusque Romæ ad currum junxit M. Antonius, & quidem civili bello, cum dimicatum esset in Pharsalicis campis, non sine quodam ostento temporum; generosos spiritus jugum subire illo prodigio significante: nam quod ita vectus est cum minima Cytheridè, supra monstra etiam illarum calamitatum fuit. Primus autem hominum leonem manu tractare ausus, & ostendere mansuetum, Hanno, è clarissimis Pœnorum traditur: damnatusque illo argumento, quoniam nil non persuasurus vir tam artificis ingenii videbatur; & male credi libertatem ei, cui in tantum cessisset etiam feritas. Sunt quoque & fortuita clementiæ ipsorum exempla. Mentor Syracusanus in Syria leone obvio, simpliciter volutato, attonitus pavore, cum refugienti undique fera opponeret sese, & vestigia lamberet adulanti similis, animadvertit in pede ejus tumorem vulnusque, & extracto furculo liberavit cruciatu. Pictura casum hunc testatur Syracusis. Simili modo Elpis Samius natione in Africam delatus nave, juxta littus confecto leone hiatu minaci, arborem fugâ petit, Libero patrè invocato: quoniam tum præcipuus votorum locus est, cum spei nullus est. Neque profugienti cum potuisset fera insisterat: & procumbens ad arborem hiatu quo terruerat, miserationem quærebat. Os morsu avidiore inhæserat dentibus, cruciabatque inedia, tum poenæ vim immensis ejulatibus testantem, ac velut mutis precibus orantem, contuitus, fidentior it contra feram, multo diutius miraculo quam metu cessatum est. Degressus tandem, evellit præbenti, & quàm maxime opus esset accommodanti. Traduntque, quandiu navis ea littore steterit, retulisse gratiam venatus aggerendo. Nihil de Androdo apud Gellium dicam; nec de illo, qui Seneca spectante, unum è bestiariis in Ampitheatro agni-

tum, ab aliarum ferarum impetu protexit. Ideo *Plinius*. Leonitantum ex feris clementia in supplices: prostratis parcit: & ubi sævit, in viros prius quàm in fœminas fremit, in infantes non nisi magna fame. Credit Lybia intellectum pervenire ad eos precum. Captivam certè Getuliæ reducem audivi, inquit idem, multorum in sylvis impetum à se mitigatum alloquio, ausam dicere, se fœminam, profugam, infirmam, supplicem animalis omnium generosissimi, cæterisque imperantis, indignam ejus gloria prædam. Capere eos ardua quondam erat operis, foveisque maximè. Principatu Claudii casus rationem docuit, pudendam panè talis feræ nomine, pastoris Getuli fago contra ingruentis impetum objecto: quod spectaculum in harenam protinus translatum est, vix credibili modo torpescente tanta illa feritate, quamvis levi injectu operta capite, ita ut devinciatur non repugnans: videlicet, omnis vis constat in oculis. Habuisse olim in mensis apud quosdam populos, Agriophagos, inprimis; locum, Solinus author est, ab esu tamen lienis in totum abstinuisse, Brugerinus prodidit. In *Medicina* eximii est usus. *Dens* caninus pueris collo alligatus in ortu secundorum dentium à dolore dentitionis eos præservat. *Cor* in pulverem redactum Epilepticis & quartanariis prodest. *Adeps* ductu Dioscoridis lotus, aurium dolores immixtus sistit, & membris à frigore adustis feliciter illinitur. Eodem quidam in scirrhis & pernionibus utuntur. Ea peruncti ab aliis feristuti esse prædicantur, & si fas est credere, gratiam apud principes inveniunt. *Caro* juxta mentem Sexti ad pavores & arcenta phantasmata laudatur. *Sanguis* contra carcinomata valet. *Ostrum* pulvis febres simplices cum aqua Eupatorii expugnat. *Pellis*, si ei infideatur, hæmorrhoidum dolores efficaciter lenit. Calcei ex eo gestari podagricos demulcent. *Stercus* cum unguento rosaceo permixtum, mendas faciei emendat. De Usu in deliciis, ludis, triumphis, & suppliciis non est quod multa dicamus. Heliogabalus exarmatos in deliciis habebat, & ita edoctos, ut ad secundas menfas accumberent. Augustus ita cicuratos, ut cum leporibus innocuè colluderent. Idem se Constantinopoli vidisse Bellonius reliquit. Simul plurimum pugnans Romæ princeps dedit Q. Scævola P. filius, in curuli ædilitate. Centum autem jubatorum primus omnium L. Sylla, qui postea Dictator fuit, in prætura. Post eum Pompejus M. in circo D.C. in iis jubatorum CCCXV. Cæsar Dictator CCCC. Varias apud Authores fortiantur *Differentiæ*. Leoni, inquit Plinius, præcipua generositas tum cum colla armosque vestiunt jubæ. Id enim ætate contingit è leone conceptis. Quos verò pardi generavere, semper insigni hoc carent. Sed & jubæ, aliis

Ælian. H.
A. l. 2. c. 5.

Martial. Epigr. l. 9.
c. 73.

Plin. H. N.
l. 8. c. 16.

Gellius Noct. Attic. l. 5.

Plin. H. N.
l. 8. c. 16.

Plin. H. N.

Plin.

S. lin. in Polyhist. Brugerin. de re cibor. l. 12. c. 17 Porta Physic. l. 3. c. 41. Plin. H. N. l. 29. c. 3.

Scoliaft. Sexti Philosophi apud Aldrovand.

Bellon. observ. l. 1. cap. ult. Plin. H. N. l. 8. c. 16.

Differentiæ. Plin. H. N. l. 8. c. 16.

Pardus Leopardus
Parderthier Leopard



Pardus Parderthier



Tigris Tigerthier





aliis est brevior & minus crispa, crispa & prolixior aliis. *Ferociam* si attendas, sunt quidam timidi, alii ferocissimi: & Archoleontes; si *colorem*, sunt aurei, flavi, albi, & nigri, quales intima Africa & Abyssina gignit. Sunt in Lybia Discolores, qui ore sunt rubro, nigris floribus cyaneo colore distinctis ornantur, neque multum pilum gerunt. Vergunt & ad cineritium colorem in occidentali India. Ignaviores apud Indos novi orbis, inquit Nieremburgius, natio leonum. *Puma* Peruani vacant. Minores quam Africani sunt, fugaces, aut innocentes, nisi invadantur; degeneres omnino animo; mole, jubâ colore fuscii sunt potius, quam fulvi. Ad eos venandos conveniunt Indi. Lapidibus ac fustibus occidunt. Conscendunt ferè aliquando in arbores, eò usque hastis & sagittis illos infestant barbari. Vescuntur festive eorum carne (alba est & crassa) adipem medicamentis reservant, ossa saltationibus & choreis. Quidam Hispanus deturbavit arbore leonem ingentem, quatuor transverberatam sagittis. In ventre duotigridum catuli inventi, quos per adulterium sui generis conceperat. Paternæ maculæ indicia criminis fuerunt. Leones marinos comederunt Hollandi. Sunt præterea aliæ feræ leoni vicinæ. *Mitzli*, quemadmodum à Barbaris appellatur, leoni nostro non jubato aut idem est, aut congener, in infantia fuscus, & fulvus in juventâ, interdumque rubeus aut subalbidus, in maiorem tamen corporis assurgens molem (quod ob regionis diversam naturam potest evenire) ac longè minus ferox. Est quoque *Quamitzli* affinis leoni, unde nomen mutuatum, sed mitior, agiliorque: quo fit, ut quidam Hispanorum pantheram esse putaverint. Ad ejusdem pertinet differentias *Macamitzli*, qui à cervo & leone sumpsit nomen, quos quibusdam corporis partibus imitatur: nec non & *cuitlamitzli*, à leone & lupo indigenâ nomenclatione mutuata. Hac bestia est leone crassior, mitior tamen minorque. Vivit cervorum, ovium & crotalium venatione, interim etiam satur quæcunque offenderit animalia. Cum famem semel explevit, binos, ternosque dies dormit, abstinens à prædâ, donec rursus esuriat. Est & *Tlalmitzli* fele minor sed facie leoninâ. Mirabilis est in parvo corpore animalis vultus & ferocitas. *Cacamitzli* vocatur aliud animal, quod ad leonem parvorum feliumve genus pertineat, & in juncetis versari solet. Quadrupes est, quaternas spithamas longus, sed corpore non admodum amplo, fulvo pilo, & aliquantisper prolixo, auriculis brevibus ac pænè nullis, olorino capite, caudâ prolixiâ hispidioreque. Adeo est ferox, ut cervos plerumque aggrediatur, etiam accidat. Unde fortassis ei nomen, nisi à fele potius profectum sit. *Mixtli* enim apud Mexicanos interdum ælurum, interdum significat leonem. Vivit apud Panucenses. Quid

si quædam harum specierum ad Cercopithecos reducantur. Vide Caput de iis.

CAPUT II.

De Pardo.

FEra, quam descripturi sumus Pardus, Nomen. seu ab *αἰδω* irrigo, quod ejus pellis nigris maculis quasi irrigata sit: seu ab *δεδαλω* inquinio, quod iis quasi inquinata videatur, dicitur. Vocatur & Leopardus, cujus vocis nemo ante Julium Capitolinum & Ælium Spartianum meminit: & Pardalis, quamvis nonnulli marem Pordalim, Pardalim foeminam vocitent, alii illud comune, hoc Atticum vocabulum esse putent; alii Pardi nomine marem indigitent. Appellatur denique & Panthera, quod vocabulum distinguendum est à Panthere lupi maculosi specie, seu quod omne ferarum genus in venatione capiat; sed quod omnifaria feritate sit prædita, nec crudelitatis unquam etiam mansuefacta obliviscatur, seu quod omnium ferarum coloribus ornata spectetur; & *ῥέονον* quod sit variegata, & varia. *Facies* ipsi est parva; *os* magnum; *oculi* parvi albicantes & vagi, *frens* longa; *aures* rotundæ, magis quam planæ; *collum* valdè longum & tenue; *pectus* parvis costis præditum; *dorsum* longum; *clunes* carnosæ & foemora. Partes circa ilia & ventrem habet magis planas, id est, nec protuberantes nec cavas; *colorem* varium; corpus totum inarticulatum & asymmetrum. Wottonus quatuor mammas in medio ventre habere, quinque digitos in pedibus anterioribus, quatuor in posterioribus Gyllius. Addit ille, *oculos* in umbra longius quàm aliorum hujus generis animalium refulgere, hebetari in sole. Pellis aureo in fusco, & nigro in candido conspicitur, ut Oppianus, descripsit. Ideò Solinus narrabat, in Hircania numerosas esse pantheras, minutis orbiculis superpietas, ita ut oculatis ex fulvo circulis, vel cæruleo, vel albo, tergi suppellex distinguatur. Plinius, in candido Plin. H. N. l. 8. c. 17. breves macularum oculos appellavit. An similem Lunæ in orbes crescentē & pari modo cornua curvantē maculam, in armo habeat, quod Plinius affirmat, difficile est dictu. Plin. H. N. l. 8. c. 17. Quantū ad *internas partes*, habet *linguam* imbricatā, *dentes* acutissimos *ungues* acutos, *cor* Plin. H. N. l. 8. c. 37. in comparatione ad animalia ejusdē magnitudinis magnum; *pinguedinem* paucam, quod eā à nimio calore absumatur, *ossa* deniq; densiora. In Europa nulli habetur. In Africa haud pauci, inopiā aquarum ad paucos annos congregantibus se feris. Ideò multiformes ibi animalium partus: variè foeminas ejusq; generis mares, aut vi aut voluptate miscent. Unde etiam vulgare Græciæ dictum. Semper aliquid novi Africam asserre. In Asia etiam degunt. Nam & Pamphylia illis abundat, ut Philostratus prodidit, & provincia Comeri, & in regno Bengalæ, ut Ferdinandus Lopezius reliquit. In Caucaſo monte, odorato mul-

Descriptio.

Wotton.
de Differ.
Animal. l. 5.
c. 82.
Ælian. H.
A. l. 2. c. 20.

Plin. H. N.
l. 8. c. 17.

Plin. H. N.
l. 8. c. 17.

Plin. H. N.
l. 8. c. 37.

Locus.

Ariff. H.
A. l. 8. c. 26.

Lopez.
Navig. l. 4.
c. 27.

tos vagari, quod odoriferis herbis delectentur quidam venditant. In monte Hermon, qui ab Amorræis Sanir appellatur, haud paucos, ex Canticis Salomonis colligi potest.

Cibus. Vescitur Pardus carnibus, canum inprimis, & agnorum si fames urget, nec à simiarum abhorret, quas simulata morte decipit, si **Leo Africae** **l. 9.** **Ælian. H. A. l. 2. c. 23.** **Generatio.** **Æliano** credimus, odore ille etas sponte accedere **Plutarchus** prodidit. Homines invadere author quidam historiae Indiae Orientalis reliquit, quem pantheram cum tigride confundere **Ambrosinus** arbitratur. *Congregatur* saepe cum leone, ut superius diximus; aliquando cum cane, nonnunquam cum lupo, plures uno partu producere catulos, mammarum multitudo argumento est. tempus partus eosdem antevertere, & prae impatientia uterum matris lacerare, **Isidori** fabula. De *Sympathia & Antipathia* hoc habet, ita insensam secundum quosdam homini, ut vel in charta expressum laceret; secundum alios, ita hominis cranio, ut eo conspecto fugiat. Secundum nonnullos faciem duntaxat acri odio infestat, quod exemplo Regis Galliarum bestiarum, qui ad venationem emissam, non nisi averfus reducere potuit, **Gesnerus** confirmat. Par cum gallo serpentibus & allio dissidium. Ideo jure galli perunctos à pantheris non attingi **Plinius** prodidit, pantherina pelle indutum angues non infestare, alii, parietes litu allii infectos, pantheras non attingere **Cælius**. Cum hyæna tam male ipsi convenit, si **Plinio** credimus, ut si utriusque pelles è regione suspendantur, pantheræ depilentur. In Armenia per montana vagantes, ad stercoris lachrymas ferri, quoties ab ea parte ubi arbores gummi stillant odorem ventus pertulerit, fide **Philostrati** habemus. *Vox* pantheræ rugitus est, quod Græcis βρυχάδω. **Spartianus** rictare dixit. Condito mucrone unguium in vaginis incedit, averfisque falcibus currit, nec nisi appetendo protendit, quod & de leone superius diximus. Odore quo cæteris quadrupedibus prævalet, (felem zibetti, & capreolum moschi excipe) cunctas sollicitat, seu semper, seu destituta per senium viribus. Eo invitata reliqua animalia, postquam accessere, præda fiunt. Nec est quod odore invitari cum Alberto dubites: nam & Cattaria sua Catti delectantur, & canes saepe à persequenda fera odoribus averti videmus. Quod aliquo affectu correptæ, (solent autem rabie agitari) aut à pardalanche herba læsæ, ad sanguinem capræ sylvestris, vel stercus humanum confugiunt, quod catulos semper præcedunt, & ad mortem usque tuentur; quod fœminæ post partum cryptæ præfident, mares de victu prospiciunt; quod cicurati nunquam ferè feritatem deponunt, *natura & ingenio* debetur. Miserandum illud quod à **Gesnero** refertur, post mortem **Francisci Galliar. Regis** Leopardos marem & fœ-

minam caveis elapsos, plurimos circa Aureliam laniasse, & inventa mulierum cadavera quibus mammillas tantum devorassent. Sed memorandum quod de Panthera tradit **Demetrius Physicus**, jacentem media via hominis desiderio, repente apparuisse patri cujusdam Philini, affectatoris sapientiæ: illum pavore coepisse regredi, feram verò circum volutari non dubiè blandientem, seseque conflictantem moerore, qui etiam in panthera intelligi posset. Foeta erat catulis in foveam delapsis. Primum ergo miserationis erat non expavescere, proximum ei curam intendere: sequutusque, quâ trahebat vestem unguium levi injectu, ut causam doloris intellexit, simulque salutis suæ mercedem, catulos exemit: eaque cum iis prosequente, usque extra solitudines deductus, lata atque gestiente: ut facile appareret, gratiam referre, & nihil invicem imputare: quod etiam in homine rarum est. Quæ de hædo apud **Ælian.** habentur, quem post mortem objectum attingere tanquam contubernalem recusabat, ex eodem petantur. Locum in cibus apud agrestivos, & qui inter caucasum & flumen Cophena, ut **Philostratus** prodidit, habuere. Majoris speciei etiam in India adhuc sunt edules, bis olim elixabantur, facilius à stomacho concoquendæ. Habet & *in Medicina* aliquem. Nam cerebrum cum succo crucæ genitalibus illitum, sopitam venem excitat. Testiculus dexter in provocandis mensibus remedium est singulare; quod **Cardanus** prodidit. Sanguis varicibus benè applicatur. Pinguedo inter præstantissima Cosmética censetur, ut de aliis taceam. Pellis vetustissimis Græcorum pro indumento erat. hodiè Mauri iisdem se amiciunt, & **Æthiopes** hisce cooperti præliantur. Olim ipsæ bestiae Circensium gratia Romam importabantur. Primus **Scaurus** edilitate sua varias, centum quinquaginta universas misit: dein **Pompeius M.** quadring. decem, **D. Augustus** quadringentas viginti. De generibus nihil ferè occurrit. Quidam tres Pardos. differentias constituunt, Pantheram nempe; Pardum, Leopardum: alii quatuor, Pantheram, Pardum, Leopardum non jubatum, qui ex Pardo & leæna nascitur, & maculosum Leopardum, qui ex Pantheræ & Leonis coitu prodiit. Apud **Plinium** ista leguntur. Nunc Varias & Pardos, qui marès sunt, appellant in eo omni genere, creberrimo in Africa Syriaque. Quidam ab iis pantheras candore solo discernunt: nec adhuc aliam differentiam inveni. Senatusconsultum fuit vetus, ne liceret Africanas in Italiam advehere. Contra hoc tulit ad populum **Cn. Aufidius Tribunus** plebis, permisitque Circensium gratia importare. Huc forte pertinet animal, quod **Dasyipoden pinuum**, vocant **Hispani**, *Thecotochili* Indi. Vertagi est magnitudine, tereti, humili, & crasso corpore, auriculis parvis, facie leo-

Plin. H. N. l. 8. c. 17.

Ælian. H. A. l. 2. c. 24.

Vfus. Plin. H. N. l. 6. c. 30.

Galen. de Alim. facult. 3. c. 1. & 2.

Porta Phys. cogn. 3. c. 46. Alex. ab Alex. l. 5. general. d.

Plin. H. N. l. 8. c. 17.

Plin. H. N. l. 8. c. 17.

Nieremb. H. E. l. 9. c. 1.

Gesner. in in Hist. Quadrup.

Lynx *Luchs*



Tigris *Gesneri*



Panthera





leoninâ sive felinâ, vividis oculis & rubrâ iride, crassis cruribus, aduncis unguibus, fusco circa dorsum pilo, circa ventrem candido, reliquum corpus cinereo, nigris ubique confpersum maculis; rostro ac caudâ brevibus, asperâ linguâ, ululatu exili, & incredibili pernecitate. Vivit Tetrococamis montib. venatur cervos, & alia ejusdem molis animalia, interdum etiam homines. Linguæ ejus tanta inest vis veneni, ut si prædæ oculos vel allambuerit vel attigerit, eam confestim excæcet, imo interimat. Occisorum cadavera herbis, fœno, cespitibus tegit; deinde conscendens propinquas arbores, ululat. Tunc feræ circumjacentes arcano naturæ documento conscia invitationis, ad epulum ocyus advolant, prædâ ex signo inventâ fatiantur: postremus ipse ocotochtus descendit, ut innocuè pascantur convivæ: nam si ille prior vesceretur, corruptis veneno suo reliquiis, ceteræ perirent feræ, quotquot deinde gustarent. Tantâ urbanitate charitati favit, tam comi providentia salutali alienæ. Scilicet nemo est qui prodesse nequeat, si velit. Non ita viribus & opibus beneficentia quam voluntate & studio constat. Plurimi opulenti inutiles sunt, utinam non etiam noxii; at nemo benevolus non beneficus.

CAPUT III.

De Lynce.

Feram, quæ Græcis λύγξ dicitur, Latini non Lynceum ut Cardanus voluit, à Scalligero ideò reprehensus, sed Lynceum *ἀπὸ τοῦ λύγξ*, à luce, quod omnium animantium acutissimè videat, vocant. Appellatur & *Lupus cervarius*, non quòd lupo sit similis, sed quòd pari cum eodem aviditate feratur, & in cervos hostiliter eat. Thoën non esse in sequentibus videbimus. Chaos an sit quem Galli Raphium dicunt, Pompeii M. ludi ostendere, quemque facie lupi & maculis pardorum Plinius facit, in medio relinquerem, nisi alibi quoque in luporum genere cervarium reponeret, qualem ex Gallia in arena Pompeii M. spectatum diximus. *Capite* est parvo, *oculis*, fulgentibus, *facie* alacri, *Mammæ* habet in pectore. Maculæ magis mari distinctæ & orbiculares. Pellem ita descripsit Gesnerus. *Pellis* extensa lyncis à summo naso ad caudam usque, est longitudinis trium pedum, & unciar. quatuor, *cauda* longirudinem unciar. septem non excedit, latitudo circa collum (non ambitus dicimus, sed dorsi tantum) est dimidiati pedis, & in imo dorsi unciar. quindecim, crura anteriora longitudinem unciar. quatuordecim, & posteriora duodecim æquant. *Pilus* undique mollissimus, & densâ lanugine confertus, extremæ pilorum dorsi partes albicant, & venter medius est candidus, in quo puncta quædam passim nigricant, crebra verò sunt juxta imum ventrem ad latera, *auriculæ* parvæ sunt, quasi triangu-

lum referentes, ambitu nigro, & supra eas villus niger, cum paucis pilis albis eminet; *barba* ad instar felium ex fetis albis constat. *Pedes* admodum villosi sunt, & anteriores quinque digitis, posteriores verò quatuor tantum integrantur, & tantum cauda in extremitate nigricans per totum æqualis crassitudinis conspicitur. Muscutorum tempora habet debilia. *Cranium* tribus futuris insignitur. Sed & viginti *dentibus* armatur, quorum incisores sunt duodecim (verba sunt Ambrosini) sed primus & sextus tam inferioris quàm superioris mandibulæ, quatuor mediis paulò minores sunt, quales in mustellis observantur. Canini quatuor cæteris longiores sequuntur. Molares sunt decem, quatuor superiorem maxillam utrinque muniunt, primi propè caninos trigonæ sunt figuræ duplici quadam appendice insigniti, ultimus in utraque superiori parte bifidus est utrisque, & altero valdè latior. Inferior maxilla sex molaribus decoratur, primus propè caninos, trigonam refert figuram, secundus floris lili rudimentum repræsentat, tertius utroque latior & major est, fissus in medio, summitatibus acutis. Maxilla inferior illi est parva, quòd prona cibum non sumat. Pes acutissimis, crystallinis, tunica atque membrana inclusis armatur unguiculis, qui figuram unguium aquilæ & vulturis æmulantur, pars inferior callosa est. Lynces in Orientali plaga vagari Vitriacus scribit, inde in Europam delatos Ovidius, reperiri & in Americæ montibus Thevetus author est. Elegantioribus nigris per dorsum maculis insigniti in Lithuania, Polonia, Moscovia, & Suecia circa Helsingiam, ubi lynx *Kattluchs* nominatur, capiuntur: inventos & in Ducatu Wirtembergico, in rusticumque prætereuntem aliquando infiliisse, & ab eodem securi prostratum, Gesneri author est. *Cibus* lyncibus. caro animalium, catorum sylvestrium imprimis, quorum caro suavior, si Olao M. credimus. Habent & cerebella quadrupedum in deliciis, hinc Gesneri se à quodam intellexisse scribit, lynces in arboribus aliquando latitare, & in majores quadrupedes prætereuntes insilire, & unguibus cervici infixis non dimittere, donec animalis prostrati laniato capite, cerebrum devoraverint, sunt qui affirmant, corpore intacto sanguinem tantum fugere. Scaliger pauciora in Scandinavia animalia reperiri scribit, quòd lyncibus in alimentum cedant. More canum averfi congregiuntur, ut canes implentur, & ritu leporum superfœtant. Catulum ipsis adscribit Isidorus duos, tres, aut quatuor Odonus. Clarissimè omnium quadrupedum cernunt, ideò quidam corpora solida visu penetrare fabulati sunt. Velocis sunt cursus, adeò, ut eum saltu præcipitent. De urina ita Plinius. Lynci humor ita redditus, ubi gignuntur, glaciatur arescitve in gemmas carbonculis similes, & igneo colore fulgentes, lyncurium

Ambros. de-Digitar. l. 3. c. 3.

Galen. de usu part. l. 11. c. 2.

Locus.

Ovid. Metam. l. 15.

Gesner. in Hist. Quadrup.

Cibus.

Gesner. l. 2.

Generatio.

Scaliger. Ex. 210.

Aristot. H. A. l. 5. c. 1.

Isidor. Orig. l. 12. c. 2.

Plin. H. N. l. 28. c. 8. Visus.

curium vocatas, atque ob id succino à ple-
risque ita generari prodito. Novere hoc
sciuntque lynces, & invidentes urinam ter-
ra operiunt, eoque celerius solidatur illa.
Hoc postremum apud Ælium & Isido-
rum invenies, prius Dioscorides vanum ef-
se, quod lyncurium sit succinum pterigo-
phoron, & pennas ad se alliciat, fatetur, &
Brafavolus inane esse experientiâ ipsâ com-
perit. Tanta quoque oblivione, si prædam
ferens retrospexerit, occupari quidam af-
firmare audent, ut prædæ ipsius oblita a-
liam quærat, ego si id verum est, nimis avi-
ditati istud adscripserim. Æstate depilari,
hyeme valdè hirsutum reddi, Odonus tra-
didit, quod villosis animantibus commu-
ne. An viscera virulenta & spumæ rabido-
rum canum comparandi habeat, quod apud
Lucanum legimus, in mediorelinquo. Haud
contemnendas habet in medicando vires.
Evonymus saxifragas herbas cum sanguine
ad minuendos calculos miscet; Wekerus ex
pinguedine unguentum ad eosdem pellendos
componit. Crollius sal ex lapide & oculis
cancris conficit. Unguis qui est in dextro
pede pro pollice, contra convulsiones ar-
gento inclusus & appensus valet. Eos-
dem omnes cum corio exuri efficacissimè in
Carpatho insula tradunt. Hoc cinere po-
tu proluvia virorum, ejusdemque asperfu
foeminarum libidines inhiberi, item pruri-
tus corporum, urinâ, stillicidia vesicæ. Ea-
dem & jugulorum dolori monstratur in re-
medio. Pellis Bononiæ centum viginti li-
bris venditur. Oppianus à magnitudine &
parvitate eas distinguit, sibi undiquaque si-
miles. In Italia duplex pellis ostenditur.
Ampla, ad albedinem magis tendens, quæ
lupi Cervarii esse creditur, & Ruffa, paulò
minor, quam Cati pardi autumant.

CAPUT IV.

De Tigride.

Nomen huic belluæ à velocitate datum
à Medis, qui tigrim sagittam vocant, pu-
tatur. Genere masculino Varro extulit, fœ-
minino Plinius, invenies & Tigrides in plu-
rali apud Philomelæ authorem. Ad magni-
tudinem canis leporarii & ultra excrescere,
quidam putant, ad equi Nearchus. Visa pel-
lis, cujus longitudo quinque pedum mensu-
ram superabat. Oculis habet splendore igneo
micantes, collum breve, quale illis quæ pa-
scendi gratiâ cervicem in terram non deji-
ciunt, ungues aduncos, dentes acutos, pedes
multifidos. Magna ipsorum in Oriente & ver-
sus Austrum, in India nempe, intra Gangem
& Hyphasin fluvios, in monte Caucaaso, apud
Besingos Peninuleis vicinos, copia, ut ma-
lè, in Hyrcania duntaxat haberi, Poëtæ pro-
diderint. Inveniuntur & in Java, ubi pro-
pter ipsorum metum minus gummibênjuini

colligitur, Bengala, & montibus Peruanis.
In Taprobana diuturna lucis usura frui,
nonnullis proditum. Omne animantium ge-
nus devorant. Elephantes sæpè superant, mu-
los pede apprehensos trahunt, oves, boves,
canes, &c. laniant, nec ab hominibus tempe-
rant: hædorum tamen præcipuè carnibus
delectantur: tanta verò aviditate feruntur,
ut viso animantis unius sanguine, per totum
cupiant ire pecus, ut apud Statium habe-
tur. Omne genus fœmininum esse, quod
nulli mares capiantur, Tzetis memoriæ
lapsi cum aliis opinio. ideo ex vento concipere
prodiderunt. Fabulæ à velocitate ani-
malis apud veteres decantata origo, aver-
sos congregi, & multos uno partu catulos
edere, certum, nec inter se duntaxat miscen-
tur, sed & in canes exardescunt. Modum
porcreandi apud Aristotelem habes. Alligan-
tur, inquit, canes locis desertis, per quæ ti-
gres versantur, & nisi tigris in luxuriam sol-
vatur, lacerantur, sed cum desiderio vene-
ris premitur, mitescit, quod Plinius, ut
apud Ælium est, ita protulit. E tigribus
eos (canes) Indi volunt concipi: & ob id in
sylvis coitus tempore alligant fœminas. Pri-
mo & secundo fœtu nimis feroces putant
gigni: tertio demum educant. In India Oc-
cidentalī nullam Hispanis vim facere, in-
festare Indos, in provincia Bambæ, albos ho-
mines non attingere, nigros adoriri, imò
homine albo & nigro simul dormientibus al-
bo intacto, nigrum corripere, Linschotta-
nus prodidit, an ad Sympathiam referre de-
beat, dubito: sed quod Elephantis viso ve-
hementer excandescant, quod bubalorum
fimo pellantur, quod denique ad sonum
tympani ferè insaniant, & seipsos saucient,
inter antipathiæ exempla refero. Vox ipsius
propriè per rancatum exprimitur. Mutare
& frendere, ira correptum scilicet, Oppia-
nus dixit. Velocitati tremendæ & maximæ
dum capitur esse, constanter à veteribus
creditum. Totus n. fœtus, inquit Plinius, qui
semper numerosus est, ab insidiante rapitur
equo quàm maximè pernici, atque in recen-
tem subinde transfertur. At ubi vacuum cubi-
le reperit fœta (maribus n. non est cura sobo-
lis) fertur præceps odore vestigans. Raptor
appropinquante fremitu, abjicit unum è ca-
tulis. Tollit illa morsu, & pondere etiam o-
cyor acta remeat, iterumque consequitur, ac
subinde, donec in navem regresso inanis feri-
tas sævit in littore. Et hæc veterum senten-
tia. Recentiores & ex his Bontius, inter er-
rores ponunt, quæ de velocitate dicuntur.
Quia hæc fera tardigrada est, ac hominem,
(multò minus aliam feram) vix cursu asse-
queretur, hinc est, quod apri, tauri sylve-
stres, cervi, sagacius hoc animal odorantes,
ejus ungues cursu facilè eludant: ideoque in
carrectis, ac inter virgulta latens circa flu-
mina, quo prædictæ feræ ad potum, ve-
niunt,

Dioscor.
l. 2. c. 74.

Mores.

Lucanus
Pharf. l. 6.
Vjus.Plin. H. N.
l. 28. c. 8.Differentia.
Oppian.
Cyneg. l. 3.

Nomen.

Descriptio.

Locus.

Gibus.

Stat. l. 8.

Tzetzes
Chil. 12.
c. 339.
Generatio.Ælian. H.
N. l. 3. c. 1.Aristot. H.
A. l. 8. c. 74.Plin. H. N.
l. 8. c. 40.Sympathia
& Anti-
pathia.
Balb. in
Hodepor.
c. 34.
Pierius l. 2.
Hierog-
lyph.
Vox.
Oppian.
Cyneg.
Cayfus.
Plin. H. N.
l. 8. c. 18.Bontius de
Med. Ind.
p. 13.

Leucureuta



Leo Minor



Martigora





niunt, saltu obliquo in aliquam earum fertur, non secus ac feles in mures ac glires impetum faciunt: sic etiam ex insidiis hominem aggreditur, ac si, (quod sæpe fit) nimia cupidine prædæ aberraverit in saltando, lentè ac rugiens recedit: si quoque ab homine detectam se sentiat, abibit, &c. hæc Bontius, quo mortuo, multa quoque Exotica de plantis & animalibus interisse doleo. De cætero, sobolis est amantiissimi hæc fera, ideo viso homine protinus catulos transfert, ablati, in obvium quodcumque crudeliter sævit, & rabie correpta, perit. Etsi autem indomitæ ferè sit crudelitatis, indulget tamen aliquando patientiam flagello; & Ovidius, obsequium Tigres domare dixit, & apud Senecam, osculatur Tigrim suus custos. Nec desunt mansuefactorum exempla. D. Augustus Q. Tuberone, Fabio Max. Coss. IV. Nonas Majas, theatri Marcelli dedicatione, tigrin primus omnium Romæ ostendit in cavea mansuefactum: Divus verò Claudius simul quatuor. Sub Gordiano decem Romæ visæ, in triumpho Aureliani quatuor. Heliogabalus tigrides currui junxit. Nunquam tamen feritatem exuunt, aliquando submittunt, sed cum minimè expectaverimus, torvitas mitigata exasperatur. Id Abdias Babylonius prodidit, nec ignotum, dum per urbem ad spectaculum ducuntur, campanulis cingi, ut spectatores ab improviso impetu sibi caveant. Sæpè nec catenis benè vinciuntur. Succo Mandragoræ vel opio in stuporem conjiciantur necesse est, ne per urbem deductæ, lædant. Posterioribus hujus feræ partibus in cibus Indos usos, prioribus tanquam Phœbo sacratis, quas versus orientem solem attollere, ut ajunt solent, abstinuisse, Philostratus author est. Tota carne Congitanos vesci, ab alis seu mustacibus quod eorum esu morte furiosâ corripiantur, ideò edictis Principum cautum est, ne quis pellem illis carentem venum deferat, abstinere, apud Linschottanum legimus. Ledesma Hispanus bubula carne nihilo deteriore invenit. Ungues incolæ Cerebari in corollis texunt, his redimitti, animosiores se existimant. De *Generibus* Tigridum, nihil ferè apud veteres Authores occurrit. Equidem refert ex Ctesia Pausanias, esse apud Indos Manticora dictum animal, cui triplex dentium sit in utraque maxilla ordo, missiles in cauda aculei, idque Tigrim esse quidam opinantur. Strabo quoque ex Megasthene reliquit, Tigrides apud Prasios dupla fere ad Leonem magnitudine esse, quis tamen quæso id de Tigride sumendum probaverit. Apud recentiores tamen aliquot illarum *Differentiæ* occurrunt, quoad molem, furorem, & speciem. Vulgaris, inquit Nieremberg. nostris est major: huic alia similis, quæ, quia minor, ab Indis *tlaco ocelotl*, id est, parva tigris nuncu-

patur, maculis nigris & fuscis conscripta, non pallidis & candentibus ut aliis communes sunt. Peruani, ut Garcilassus putat, tigridem vocant Uturuncu: nam, quod Joseph Acoſta dixit, urſos dici aboronocos, corruptâ nonnihil ab Hispanis voce, non ita exploratum censet; veumari n. urſus dicitur. Ferociores sunt leonibus: a vide Indos quærun, etiam in domibus & casis; & nisi constanter fores sint clausæ, clanculum ingrediuntur, & correptum aliquem barbarum mordicus deferunt; non secus ac felis murem: nec adversus illas arbores asyla, quas ascendunt ut illinc dejiciant fugientem & lacerent. In expeditione Fedremani quædam tigris cohortem militum agressa, in medio omnium dilaceravit Hispanum unum, tres Indos, tutaque & impunis evasit. Nihilominus tanta feritas elumbatur: si vel baculo circa renes cædatur, languet & vincitur; non alia via patet victoriæ. Nulla alia fera magis timetur Indis Occidentibus imò in veneratione est. Dæmon illis sæpissimè specie tigridis loquebatur. Ungues venenati creduntur, nunquam reparatur plaga ex illis. Jam post introductum Evangelium reverentiam imò timorem hujus feræ amisit Barbaries. Capitur laqueis, alicubi muscipulis. In Bengala ferocissima invenitur, & contumacis odii: usque ad triginta millia insequitur per littora navim quæ aufugit læsor. Obvis præterea quibuscunque hominibus & feris atrox. Prævenit natura tantam pestem. Comitatur tigrim aliud animalculum, quod assiduo latratu illam indicat, quo audito feræ aliæ recedunt, aut conduntur, homines fugiunt. Sunt illæ tigrides humanæ carnis avidissimæ, avidiores Nigritarum quos internoscunt navium, si quam in ora perspexerint, per viginti leucas cursitando prosequi solent, ut si quis in terram exscenderit, devorent. De nocte in naves insiliunt, ut incautos navicularios opprimant. Referam hujus exemplum memoratu dignum, quod accidit interim dum nostri in Bengalâ agerent. Æthiops quidam servus cum somniasset à tigride se abreptum, sequenti nocte sub navis, quæ vehebatur, prorâ se abscondit. Rogatus à Domino causam, somnium nocturnum enarrat, cujus veritatem illâ ipsâ nocte eventus probavit: omnibus n. dormientibus, tigris in navim insiliens, cæterisque qui plus quam triginta in navijacebant, intactis, de sub prorâ miseri Æthiopsis apprehendit latus, & abripuit. Felicius alterius fors fuit, sed divina protecti providentiâ. Hic cum haud procul in navi ageret à littore, à tergo hinc cum tigris, ab aquâ è flumine illinc crocodilus invadit: sed audi casum. Tigris, ut adversarium præverteret, prædamque extorqueret, nimia velocitate ultra hominem delata, & in navis latus impacta, in crocodili fauces in-

Mores.

Plin. H. N. l. 8. c. 11. 17.

Jul. Capitol. in cod. Vopisc. in cod.

1. 6. Hist. Apostol. Thevet. Cosmogr. T. 2. l. 19. c. 7. Petr. Viator. variat. lect. 4. c. 3. Vfus.

Philostr. l. 2. vita Apollon.

Petr. Martyr. Decad. 3. l. 2.

Differentia.

Pausan. in Bæot.

Strabo Geogr. l. 15.

Nieremberg. Hist. Exot. l. 9. c. 15.

cidit; hoc modo evasit. Dici nequit, quantopere Bengalani tigridum rabiem metuant: hinc variis è nominibus nuncupant, veriti ne si proprio dicerent nomine, continuò dilacerentur. In Brasilia magna trigidum vis, quæ famelicæ horribili possent velocitate, tremendis viribus. Eadem pastæ tantâ dicuntur esse ignavia, ut à gregariis etiam canibus confestim in fugam agantur. Non homines tantum perdit gula. In novâ Hispania speculatur ex arboribus, ad ripas fluminum crocodilos: inde desiliit, & incautos occidit. Aliquando non minore jaçtura à tigride Indicâ infesta Darien fuit, quam olim à fero leone Nemea, & à rapido apro Calydonia, ut Petrus Martyr narrat. Integro namque semestri noctem ajunt exactam fuisse, nullam indemnem, quin vel juvencam aut equum, canem aut porcum, intra vici ipsius vias interfecerit. Armenta gregesque jam minuebantur: imo & minime tuto referunt domo exisse quenquam, eo tempore præcipue quando catulos alebat, tunc namque adoriebatur & homines, fame urgente catulorum, si homines prius occurrebant quam brutum animal. Necessitate cogente tandem ars inventa est, quâ tanti sanguinis poenas lueret. Exploratis quippe angustis semitarum, quibus è cavernarum latebris ad prædam noctu prodire solebat: excavatâ ibi scrobe aliquâ, cratibus & aggesta terra levi superstratis, fallaciam occultarunt Indi. Veniens incautus (mas quidem erat) tigris decidit in foveam, & sudibus acutis in scrobis fundo defixis inhæsit. Saxi tum ingentibus ex fossæ margine in eum sudibus infixum dejectis, peremptus est. In mille assulas, & mille frustula fixa dextra directas hastas, & ab alto jaculatas, dirumpebat. Semianimis & exanguis formidine replebat intuentes, quid solutus & incolumis fecisset? Joannes quidam Ledesma Hispalensis, Vaschi Nunes amicus, & laborum socius, de tigride illo se comedisse fassus est, bovinaque carne nihilo deteriore esse retulit. Unde tigridem esse dicant, interrogati qui nunquam tigridem viderant, respondent, à maculis, à feritate, à dexteritate, signisque aliis ab Auditoribus datis tigrim arbitrari, cum & pardos pantheras maculatos ex ipsis plerique se vidisse prædicent. Tigride mare perempto montes versus vestigia ipsius secuti, antrum, conjugale ipsius domicilium, adeunt, duos absente genitrice catulos uberibus adhuc matris indigos auferunt. Mutato consilio, quo grandiusculos effectos in Hispaniam post hæc mitterent, ferreis catenis diligenter in colla compositis, ad maternum antrum parvulos reportant à matre lactandos. Post paucos inde dies regressi ad speluncam, nec catulos reperientes, credebant eos à matre in frustra præ rabie dilaceratos, ablatosque, ne quispiam eis frueretur. Asseverant nam-

que, solvi è catenis nullo pacto potuisse vivos. Pellis peremptæ tigridis ad Hispaniolam, siccis herbis & culmo facta missa est ad Admirantum & Primores. Plura de his vide apud eundem Nieremberg. & Marcgr. H.B. 1. 6. c. 10.

CAPUT V.

De Vrsō.

URSUS, vel ab urgendo, quòd impellendo *Nomen.* tum homines tum cæteros animantes prosterнат; vel quasi orsus, quòd ore suo format foetus; seu quod in ventre orsus, extrâ ventrem linctu compleatur, vel quasi sursum, quia horret pilis, & *δασύτριχος* est, Latinis dictus est. Græci *ἄρκιον*, vel ab *ἀρκῶ* propulso, quod ad injurias propulsandas anterioribus pedibus valeat; vel ab *ἀρκέομαι*, quòd sine externo alimento hyemem transigat, vocaverunt. Quantum ad Rationem externarum partium: *Corpus* ei crassum, & vix mobile, semper crescere quidam affirmant, inventosque longitudine quinque cubitorum, latitudinis tantæ, ut quodlibet vel bovis tergus vinceret, talemque Maximiliano Imperatori in Thermis Badenfibus oblatum. *Pellis* ei spissa & villosa, *dentes* ferrati, & penitus reconditi. *Os* longum, *celeres oculi*, *pedes* manibus similes, in brachiisque & lumbis maxima vis, interdum posticis pedibus insistent, *cauda* diminuta, *genitale* simul ut exspiraverit cornescens. Adde his, *mammæ* quatuor, *ventriculus* amplum, & *intestinum*, cum hyeme in antris dormientes capti exenterantur, vacuum, & adeò adductum, ut simul cohærere videatur. Galenus nervos recurrentes, qui in aliis animalibus difficulter observantur, in hoc evidentissimè conspici posse scribit. *Caput* ipsis invalidum est, vel præsertim synciput, quod leoni fortissimum: idèò urgente vi, præcipitaturi se ex aliquarupe, manibus ex operto, jaciuntur. Eo tempore quo latitant, *sanguinis* exiguas circa cortantum habere guttas, reliquo corpori nihil inesse, Theophrastus credidit. Nulla denique eis secundum Plinium medulla: axungiam & lardum habere, Monachis in Mesuen visum. In plærisque terrarum partibus degunt, sed in Germania, Polonia, Lithuania, Norvegia, &c. & aliis Septentrionalibus, in Nova Zemla in primis, maximè. In Anglia nunc non reperiri, Gesnerus prodidit nec in Creta insula, Plinius. In Africa quoque non haberi olim creditum, sed falsò. Esse, præter Herodotum & Solinum, Strabo testis est, dum Mauros, leonem, pardalium, & urforum pellibus indui scribit. Magis autem montanis quàm planis delectantur. Unde Alpinæ rupes apud Stumpfium animosis abundant: in montibus Peru, multi nigri stabulantur, & Pernes mons Atticus apud Pausaniam, venatione urforum clarus est, *πάρμαρον* est animal. Plantis victitare apud Mathiolum, Al-

Description.

Vadian. in Melam.

Solinus Polyhyft.

Plin. H. N.

Aristot. H. A. 1. 8. c. 27. Scalig. ed. 1. 8. c. 21.

Plin. H. N. 1. 8. c. 36.

Theophr. de animal. latitantib.

Locis.

Plin. H. N. 1. 8. c. 58. & 1. c. Herod. in Melpom. Solin. c. 29. Strabo Geogr. 1. ult.

Vicius.

Ursus
Baer



Albertum, & Gesnerum invenies. Ille specie rubi qui mora rubicunda & odorata producit, delectari scribit. Iste, herbam cuculi, quam Botanici trifolium acetosum vocant. Hic, radices quasdam quibus cupiditas cibi expletur, & somnus conciliatur. Nam in Alpibus Helveticis ajunt, vaccarum pastorem, postquam ursum, radicem è terra avulsam comedis, eminus vidisset, radice eadem, post ursi discessum degustata, tanto somni desiderio captum, ut in via se prosternere necessum habuerit. Herbam arum comedere, quamprimum è latibulis egrediuntur, Aristoteles author est. Sed & arbutum quoddam spinosum, foliis ferè ut apii divisis, flore albo, baccis rubentibus, in montibus circa Tridentum panis ursi appellatur. Vescuntur & fructibus arborum, quas condescunt, leguminibus, melle, cancris, formicis, & carnibus, seu præmaceratis & propemodum putridis, seu recentibus. Maxime tamen favos appetunt, habeturque apud Jovium faceta de quodam rustico in Moscovia historia, qui in cava arbore, profundo mellis gurgite collo tenus immerfus, & biduo vitam solo melle sustentans, urso in arboris ejusdem cavitatem, more humano se dimittentis, beneficio, cujus pellem tergoris manibus prehenderat, extractus fuit. Piscibus in Islandia & glaciali Oceano vesci, Gabottus Venetus, prodidit. Bibunt quidem aquam, sed nec lambendo, quod carcherodontum, nec sorbendo, quod continuis dentibus munitorum proprium, sed aquam mordendo, ut apud Aristot. habetur. Ursæ veneris sunt appetentissimæ: Ideo, quoniam feræ gravidæ maribus non misciscuntur, præter lyncem & leporem, ne diutius maritis careant, & maturius ad Venerem redire possint, ventrem ante certum tempus elidere creduntur. Mares, in puellas quoque libidine ferri, proditum. Raptam ab uno in montibus Allobrogum quandam, quam venereo complexu profecutus est, & pomis agrestibus pavit, Philippus Cossæus, Constantiensium sacris præfectus, Gesnero retulit: Danorum verò Regum stemmata, à quodam dicto urso, qui ex puella ab urso compressa natus esse dicitur, deduci, & Saxo refert; & duo Magni Upsalenses Episcopos, Gothicos Reges ex urso & virgine nobili originem ducere produnt. *Cœunt* mensè Februario, seu hyemis initio, non eodem modo quo quadrupedes, sed intra mutuos amplexus, velut humanas conjugationes, seu ut Plinius, ambo cubantes complexique id est humanitus strati. Gravidæ latent, secretique honore reverentur mares gravidas. Uterum triginta dies ferunt. Pariunt tum unum, tum etiam duos, sed complurimum quinque. De *partus forma* variatur. Lucinæ illis properantius tempus est, inquit Plinius & Solinus, quippe uterum trigesimus

dies liberat: unde evenit, ut præcipitata fecunditas, informes creet partus. Carnes pauxillulas edunt, quibus color candidus, oculi nulli, nulli pili, & de festinâ immaturitate tantum rudis sanies, exceptis unguium lineamentis. Has lambendo sensim figurant, & interdum ad pectora foveant, ut assiduo incubatu calefacta, animale trahant spiritum. Idem Aristoteles, Oppianus, Ovidius, & alii dixerunt. Inde quibusdam Ursus quasi Orsus dicitur. At recentiores contrarium experientia docuit. Capta in valle Anania supra Tridentum gravis ursa, quam exenteratam, catulos omnibus membris distinctos gestasse, animadvertum est. In senatus verò Bononiensis Musæo, ursulus à cæso matris utero extractus, omnibus suis partibus formatus, in vitro vase servatur. Nec malè Cæmærius opinatur, secundinarum quibus foetus ursæ obvolutus est, tantam crassitiem, ut non nisi diuturno linctu à matre avelli possit, errori occasionem dedisse. Capitale odium gerit cum *Phoca*, equo, apro, mortuis, & mappa. *Phocam* summopere abominari Oppianus reliquit. Agnoscit equus hostem nunquam visum, ac protinus se parat ad pugnam: in qua arte potius quam viribus utitur. Transilit enim ursum, & ipso saltu posteriores pedes impingit in caput. A mortuis abhorre dicuntur, quod homines prostratos, ore ad terram verso, retentoque spiritu, illæfos relinquunt. Visa mappa, teste Seneca, ad iram concitantur. Aconito quoque pereunt, nec non faba lupina, seu marcillio, quam consiliginem esse putat Gesnerus. Pisces etiam quidam nigri venenati in Armenia reperiuntur, quorum farina aspersa fici si comederint, intereunt. Musica delectari, experientia docuit. *Vocem* si attendas, sævire dixit Spartianus, rugire alii. *Naturam & Ingenium*, sequentia testantur. Cum degustavere mandragoræ mala, formicas lambunt. Cum nausea laborant, myrmeciam adeunt, assidentesque linguam fluore dulci fluentem exertam, leviter tam diu tenent, donec formicis scatere viderint. Vulnerati, siccis herbis sibi medentur. Ursæ à latitatione egressæ in liberam diem, tantam patiuntur lucis insolentiam, ut cœcitate oblitæ putes. Oculi quia hebetantur crebrò, maxime favos expetunt, ut convulneratum ab apibus os, levet sanguine gravedinem illam. In antrum, non recto sui corporis motu sed supina ingreditur ursa, & dorsi sui tractu repit, ut vestigia oblitteret. Ibique postquam est egressa, se quieti dans, habitum corporis extenuat per quadraginta dies: è quibus quatuordecim immobilis manet, reliquis aliis movetur: tantum solo lingendo dextro pede se sustentat, eique intestinum eatenus adducitur, ut propemodum cohareat. Mares, inquit Plinius, quadragenis diebus latent, foeminæ quaternis mensibus.

Specus

Specus si non habuere ramorum fruticum-
que congerie ædificant, impenetrabiles im-
bribus, mollique fronde constratos. Primis
diebus bis septenis tam gravi somno pre-
muntur, ut ne vulneribus quidem excitari
queant. Tunc mirum in modum pingues-
cunt. Ab iis diebus residunt, ac priorum pe-
dum fustu vivunt. Mirum dictu, credit
Theophrastus per id tempus, coctas quo-
que urforum carnes, si asserventur, incre-
scere; cibi tunc nulla argumenta, nec nisi
humoris minimum in alvo inveniri: sangui-
nis exiguas circa corda tantum guttas, reli-
quo corpori nihil inesse. Procedunt vere, sed
mares præpingues, ut movere sese facile ne-
queant. Fœminæ non ita pinguescunt, quod
eo tempore pepererint. In iisdem licet fo-
veis, partitis tamen per scrobes secubationi-
bus dividuntur. Exeuntes herbam arum di-
ctam, laxandis intestinis alioquin concretis
devorant, circa furculos cum dentiunt præ-
domantes ora. Si quando tauros adoriuntur,
sciunt quibus potissimum partibus immo-
rentur, nec aliud quam cornua aut nares
petunt: Cornua, ut pondere defatigent, na-
res, ut acrior dolor sit in loco teneriore. Ani-
mæ virus pistilens. Contacta halitu ejus at-
tingit nulla fera, citiusque putrescunt affla-
ta reliquis. In Myfia ajunt esse genus albo-
rum, qui cum à venatoribus urgentur, ta-
lem halitum edunt, qui canum carnes pu-
trefaciat. Quantum ad *Usum* in *Cibis*, et si ca-
ro urforum sit frigida, mucosa, difficilis
concoctu, spleni & hepatis in commoda: Al-
pinis tamen & Helvetiis, Brujerino teste, in
deliciis habetur, ipseque se eas in coena apud
Symphorianum Campegius comedis-
se, culinæ artificio conditam asseverat. Sed ju-
venculus ille ursus erat, qualem, & quidem
hyeme captum, in cibis adhibere debere,
Bartholomæus Scappius scripsit. Licet n.
Quintili mense ob pabulum pinguiore sint:
tamen, quod caro tum malum odorem spi-
rare soleat, à mensis excluduntur. Cæterum
anteriores duntaxat pedes inter cibos sua-
viores ab Eliano reponuntur, quos & prin-
cipes viros appetere Michael Herus prodi-
dit, forte quòd plurimum exerceantur. Sal-
fos & in camino siccatos qui ederunt, opti-
mum & suavissimum esse cibum Gesnero
retulerunt, nec amplius se mirari, quod eos
per hyemem inter latendum fugant. Cere-
brum venenatum esse Savanorola scripsit. In
Medicina magni sunt partes usus. *Oculus* ex-
ficcat & puerorum collo appensus, adver-
sus pavores nocturnos amuletum esse dici-
tur: supra sinistrum hominis brachium alli-
gatum, quartanam febrem mitigat. *Sanguis*
panos & apostemata, in quacunque parte
discutit, & pilis qui in oculis nascuntur pro-
dest, & pulices enecat. *Adeps* livores & ma-
culas eximit: ambutis, cum lilii radicibus
prodest: igni sacro illinitur: ulcera in tibiis

& cruribus admixtâ rubricâ sanat: rimas pe-
dum, alumine addito, farcit: raptos alope-
ciæ vitio capillos restituit, & unguento sym-
pathetico seu armario admiscetur. *Pellis* de-
morsis à cane rabido substernitur. *Pulmo* at-
tritus à calceamentis contractos ab inflama-
tione tuetur. *Fel* articularum doloribus uti-
lissimum tradunt: ab Arnoldo Villanova
ad epilepsiam commendatur: tuslim ad-
mixto melle sanat: in pessum ad conceptum
promovendum adhibetur. *Pili* cum adian-
tho & arundinum radicibus adusti, magnæ
sunt in generandis pilis efficaciam. Difficiles
partus solvi, cum quis testum in quo gravi-
da sit, lapide quo ursus interfectus est, trans-
miserit, Plinius fabulatur. Adhibetur ursus
& ad alia. *Pelles* Samojedis & Lapponibus
ad vestimenta inserviunt: aliis ad stragula.
Olim equites, loricas & galeas iisdem tege-
bant, ut truculentiores apparerent. Palla-
dius ferramenta quorum in agris colendis
usus, sebo, adversus grandinem & gelu in-
ungit: Mizaldus, cortices vitium adver-
sus erucas & glaciem. Fuit eorum & in spe-
ctaculis ac suppliciiis fumendis usus. Anna-
libus notatum est. M. Pisone & M. Pisone &
M. Messala Coss. ad XIV. Calend. Octo-
bris, Domitium Ænobarbum ædilem curu-
lem urfos Numidicos centum, & totidem
venatores Æthiopas in Circo dedisse. *Diffe-*
rentias quod spectat, sunt Magni, Parvi,
Nigri, Albi. Tales infestavere Hollandos,
cum per glaciale Oceanum transitum in
Catajam quærent. Stupendæ erant ma-
gnitudinis. Nam occisor. pelles ad trede-
cem pedes ascendebant. Sunt & in Myfia al-
bi, quorum superius facta mentio. Strabo
fulvosum, in illa Arabiæ regione ultimo pro-
montorio contermina notat: Agricola in
fuscis & nigris dividit. Helvetii parvos,
saxatiles, magnos *capitales* vocant. Sunt &
in novo orbe ignavi, qui solis formicis victi-
tant, canibus cedunt, & bacillo percussi
fugiant, nec ullum caudæ vestigium habent:
Myrmeciphagos appellare possis. Inveniun-
tur in provincia Veræ pacis maximi, lani-
geri satis, nigris pilorum sive lanæ grumis.
Cauda illis palmaris duntaxat: manus velut
humanæ. Simi sunt velut nigræ, rotundo
rostris, depili & rugoso: In Virginia edun-
tur. Meticulosi sunt, fugiunt homines, au-
fugiunt ad arbores, inde deturbantur, fan-
ciati jaculis. Provincia Beach, si Paulo Ve-
neto credimus, domesticos & innoxios pro-
ducit. Hoc unicum addere placet, habuisse
Suidrigellum Lithuaniam Principem ursum
matutinis horis à nemore discedentem, qui
palatio appropinquans anterioribus pedi-
bus fores percutiebat, & cibo sumpto, reme-
abat in sylvam. Solent & sectæ cujusdam
apud Turcas religiosi, ex eremo egressi, cer-
vum vel ursum tintinnabulum collaferen-
tem per urbes & pagos circumducere.

Solin. l. c.

Ufus.
Galen. de
Alim. fa-
cult. 3. c. 2.
Brujer. l. 13.
de cibis.
c. 41.

Plin. H. N.
l. 8. c. 36.

Differentia.

Purchas.
Navig. T.
3. l. 4. c. 5.

Strabo
Geogr.
l. 16.

Majol.
Colloqu.
de qua-
drup.

Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 23.

Textor
Tomo. 2.
Off.

Lupus Wolff




Zilio Hyana

Vulpes Fuchs



Hyana



Lupus Marinus

Gesneri et Bellonij



Hyæna



Gula Vulturis





Lupus Scythicus



Semivulpa



Veruex Aethiopicus





12.
H

CAPUT VI.

De Lupo.

ARTICULUS I.

De Lupo in genere.

Lupum in genere & specie considerabimus, eidemque *Gulonem* adjiciemus. Dicitur Latinis lupus, vel quasi leopus, quod in pedibus leoninam virtutem gerat; vel à Græco λύκος, à rabie nempe rapacitatis, vel δὸν δὲ λύκης, à diluculo, seu quod in colore pellis crepusculorum albedinem æmuletur, seu quod primâ luce ad raptum exeat; seu quod oculi ipsorum sint terfi & in tenebris fulgeant. Græcis dicitur λύκος, κνηκίας, si textus apud Varinum corruptus non est, Hefychio ὀλκός, quod potest esse ab ὀλέκω. Alibi νυκτερινοὶ κύνες vocantur. Fœminæ, λύκαινα nomen. Sunt verò lupi canibus magnis, mastinis, seu pastoralibus similes, coloris, ut in differentiis dicitur, varii. Habent oculos ramos, qui splendent lucemque jaculantur. *Dentes* serratos, teretes, acutos, & inæquales. *Rictum* amplum, & os quod maximè diducunt. *Collum* in eas brevitatis angustias compulsum, ut contorqueri retroque versari non queat: & si retrò velit aspicere, totum corporis truncum contorqueat necesse est. Ideò quidam ex solido osse constare prodidere, sed falsò. Clamorganus enim in dissectis vertebrae observavit, cui & Philes adstipulatur. Habent & musculos temporales magnos & nervosos, pro-dente Galeno. *Cerebrum* quod cum luna crescit & decrescit, si Alberto credimus. *Cor*, si ficcetur, odoratum. *Iecur*, ungulæ equinæ simile. *Genitale* osseum. *Pedes*, priores quinque digitis distinctos, posteriores quatuor. *Ossium* substantiam densiorem. *Reines* aliis similes, sed qui, in senectute, vermes vel serpentes, quod se in tribus vel quatuor cadaveribus observasse, Clamorganus scribit, producant. In *vesical* apillus reperitur, qui Syrites dicitur. Nulli sunt in Sardinia, si Pausania credimus; Creta, si Aristoteli; Olympo monte Macedonia, si Plinio & Solino. Angliam hoc animalis genus non alere certum. Sub Edgario, Ednii II. excindi cœpti, in totum postea eradicati sunt; non in Cambria tantum, sed in aliis quoque provinciis. In Septentrionalibus provinciis magna luporum copia: in Muscovia imprimis, pecori, jumentis & hominibus insidiantur, cujus exemplum apud Olearium in itinerario Orientali invenies. Haud paucos in regno Senegæ inveniri, prodidit Cadamustus. In provincia Scotiae Angusia, ejusque valle Glamore reperiri, qui ferarum duntaxat raptu vivant, apud Boëthium habetur. Carnivori sunt, & imprimis ovillam appetunt. Ideò caulam ingressi, omnes ferè inter-rimunt. Equis, bobus, anseribus, insidiantur.

Humanæ sapore maximè illiciuntur, si humanum cadaver prius gustaverunt. Prægnantibus capto odore insidiari Olaus M. prodidit. Sed nec suæ speciei, si fames pre-mat, parcunt: testaturque Clamorganus duos lupos die antecedenti occisos, ab aliis nocte subsequente devoratos fuisse. Alianus verò animadvertit, fame urgente multos simul excurrere, vertigine correptum & cadentem à cæteris laniari. Coram catulis qui ablaetantur, prædam nuper voratam evomunt, & grandioribus factis agnum vel anserem apponunt. Præter carnes, plantam illam Scythicam Borametz dictam appetunt. In regno Congo oleum quod ex palmis elicitur, sorbent. Terram quoque & argillam comedunt. Inde fortè lapis lithargilos dictus, qui in ventriculo, undecim uncias pendens, gyris & plicis intortus, à Schenckio observatus est. Albertus, non fame sed naturali instinctu id facere, dixit, ut gravior redditus, quæ invasisset, sua mole deprimere posset. Exsaturatus per magnum temporis intervallum fert inedia, eique tum venter latè projicitur, lingua tumescit, os obstruit, mansuetusque evadit: lingua extenuata, iterum in lupum transformatur. An cibos defodiant, ex æquo eosdem dividant, & ad reliquias ululari alios advocent, quod Albertus prodit, venatoribus decidendum relinquo. Coeunt eo modo quo canes, in medioque coitu, inviti etiam coherant; coeuntque uno anno nonnisi per dies duodecim, quos à natali Christi quidam computant. Libidinis tempore acius in eos qui accesserint sæviunt, inter se tamen, quod gregales non sint, non dimicant. Gerunt utero duos menses, & tandem quoad numerum & cæcitatem catulorum ut canes pariunt. Novem catulos generare vulgaris apud Helvetios sermo, teste Gesnero, qui etiam ex Rhæto quodam audivit, catulos in Rhætia circa Calend. Majj, septem vel novem aliquando ex una parente, ex latibulis auferri. Idem ajebat vulgò ferri lupam primo partu unicum eniti catulum, secundo geminos, & sic deinceps, singulatim catulo semper auctiorem fieri partum, usque ad decem, inde sterilefcere. Intra duodecim dies parere, quod Latonam oberrantem totidem diebus ex Hyperboreis Delum deduxerint, sub specie lupæ, propter metum Junonis, fabulosum est. Antipater apud Plutarchum partum projicere adserit, cum glandiferæ arbores florem abjiciunt, quo gustato uteri illarum reserantur; cum ejus copia non est, partum in ipso corpore emori, nec in lucem venire posse: præterea regiones illas à lupis non vastari, quæ glandium quercuumque feraces non sunt. Potus sunt parcissimi. De *Antipathia* hæc apud authores occurrunt. Homo, quem prius viderint conticefcit: & anticipatus obtutu nocentis.

M

licet

Olaus de
gent. sept.
l. 18. c. 16.
Clamorg. l.
de venat.
lupi.

Porta Phy-
siogn. l. 4.
c. 4.
Linfchot.
in Navigat.

Schenck in
Hist. mon-
stror.

Generatio.
Arist. H.
A. 1. 5. c. 2.

Aristot. H.
A. 1. 6. c. 15.

Plutarch.
probl. 38.

Antipathia.

Solin. in
Polyhist.

licet clamandi votum habeat, non habet vocis ministerium. Oculus erutus, quadrupes domesticas terret. Mulier si unquam supra calidam lupi urinam minxerit, non concipiet. Canda ad praeſepe ſuſpenſa, facit ne comedant. Rumpi traditur equos, qui veſtigia luporum ſub equite ſequantur: quod ſi lupi calcaneum equi quadrigam trahentes concuſcent, ſiſtentur tanquam ii cum quadriga conglaſſent. Oves ab eo adeſe ſuaviorem habent carnem, verum lana pediculos & pruritum generat. Agni nuper nati, nec alicujus animalis effigiem extra caulam conſpicati, audito repente luporum ululatu, exanimantur. Pellis eorundem lupina ſuperpoſita ſtatim depilatur. Stercus in ovili occultatum, pecudes quieſcere prohibet, niſi auferatur: Fides ex inteſtinis ovium, cum inteſtinis luporum permixta, obſtrepenſes omnem citharae concentum interturbant, quod tamen falſum eſſe experientia docuit. Scillam ſi contigerit repente contrahitur. Lapides ideò perhorreſcit, quod in parte à ſaxis iſta vermes naſcantur. Scintillis ex ſilice emicantibus ita terretur, ut etiam famelicus accedere non audeat. Tympanum ex ejus corio formatum cætera animalia fugat. Cantus denique & ſonus ipſi inimicus eſt. Pythiocaris tibi cinem, cum tibiâ magnâ contentione incitatos numeros caneret, impetum luporum repreſſiſſe prodit. Gefnerus verò novit quendam, qui cum lapidibus lupum terrere non poſſet, ſono tympani, quod geſtabat, perterrefactum fugavit. Dicitur Pſittacum amore proſequi. *Morbos* ſi attendas, rabie, podagra, & cynanche laborare ſolet, lycoctono ſumpto interit. Vulneratus, in luto ſe volutat, & ſic ſanguinem ſiſtit. Per multos annos vivunt, & ex dentibus in ſenectâ malè afficiuntur, ita ut etiam edentuli fiant. De *Moribus & Ingenio*, ut aliquid dicamus, viſcera quia habent infirma, ideò herbas comedunt, Dracontium inprimis ad acuendos dentes. Breves, inter cæteros magis audaces putantur. Cum in foveam inciderunt, vel ſe incluſos ſentiunt, præ ſtupore innoxios ſe exhibent, quod una & altera hiſtoria, Gefnerus confirmat: Percuſſores cognoscunt, & ex obſervato invadunt. Fetus ſuos amant: foemina partus cuſtodit, mas pro catulorum ſalute cibos ad ipſam deſert. Cum fugiunt, catulos ſecum ferunt: Cælo præcipue nubo infidantur, ut magis lateant. Cum per folia incedunt, ne ſtrepitum faciant, lingua pedes ſuos lambunt, & lubricos reddunt. Fluvios tranſmiſſuri, ne undarum fluctibus abripiantur, ſinguli apprehenſis morſu prænantium caudis, unâ ſerie tranſmittunt, à quo ingenio *λυνάεας* annus dicitur. Suidas *καμῶν* & *ὥρα*, ita tranſmittere ait. Apprehenſis quoque mutuò caudis, bovem è palude extrahunt. Dum cibum capiunt, vel

intuentibus irafcuntur. Si homo pariter & aliud animal ſe offerant, ſemper homini, narrante Alberto, parant. Narravit ſanè Gefner. mihi, inquit Conradus Gefnerus, quidam, lupum ſe vidente, morſu comprehendiffe lignum triginta vel quadraginta librarum in ſylva, & cum eo ſe aſſueſciſſe tranſilire grandem eo in loco arboris abſciſſæ truncum: tandem, cum ſatis peritus tranſiliendi ſibi videretur, ſe abſcondiſſe: & adveniente propter ſatam ibi avenam porcâ ſylveſtri, cum pluribus ætate differentibus porcis, aniculis, bimis, prorupiſſe, apprehenſoque porco, qui æqualis pondere videbatur ligno, quo cum tranſilire truncum didicerat, ſaltu retrò truncum ſe recepiſſe, & interemptum ibi porcum devoraſſe. Aliquando cum canibus amica ſocietate conſocderantur, & caulas invadunt. Si in minorem aliquam pecudem inciderint, auriculâ comprehenſâ, ſecum currendo abducunt; renitenti clunes caudâ feriunt, ita ut lupo interdum celerius currat. Ubi caulas intraverunt, omnes interficiunt, antequam aliquam ad comedendum attingant. Tauros à fronte adoriri non audent, quod cornua extimeſcant. Quamobrem primum, quaſi rectâ viâ pugnaturi eſſent, minas gerunt, & illorum oculis ſeſe crebrò inculcant: deinde ſe retorquentes in dorſum inſiliunt, & acerrimè ad ejus perniciem incumbunt. More equorum & canum per ætatem caneſcunt. Famelici, noctu vento adverſo, odorem eſcæ, per medium milliare ſentiunt, inventumque cadaver trahunt & devorant. Quandoque uno ululante alii conveniunt, & omnes ſimul equorum gregem adoriuntur, quod in Bononiënſi territorio ſæpe accidere ſolet. Turmatim etiam progrediuntur, & nocte intempeſtâ, juxta deſtinatum pagum commorantur. Interim illorum unus in pagum excurrens canes excitat, & ſimulatâ fugâ, uſque ad inſidiarum locum, ad ſe perſequendum invitât, ubi canes ab aliis lupis dilaniantur. Frondes & falicis ramiſculos porrigunt, ut capras his gaudentes ineſcant. Vocis ſerè oblitus eramus, quem eruditi ululatum vocant; Græci, per *ὤρυς* & *ὤρυγες* exprimunt. Ad menſas inter honeſtos non admittitur, quod carnem habeat ſiccâ, craſſâ, fatidâ. In Inſubria tamen aliquando editur. In *Medicina* multi eſt uſus. Vivus, oleo cerati modo incoctus ad podagram laudatur. *Corio* ventrem conſtringere, in colica prodeſt, ſi Rhafi credimus. *Carnes* ediſſe, parituris prodeſt: aut ſi incipientibus parturire, ſit juxta, qui ederit, adeò ut etiam contra illatas noxas valeat. *Adeps* antipodagricis unguentis admisceſtur. *Sanguis* cum oleo nunc mixtus, ſurdidati prodeſt. *Caput*, ſub pulvino reconditum, ſomnum inducit. *Oculus* dexter ſaluſ ad alligatuſque, febres periodicas arcet. *Dens* gingivas extenuat, quo

Plin. H. N.
l. 20. c. 14.

Ælian. H.
Ad. l. c. 6.

Porta M. N.
l. 1. c. 14.

Oppian. in
Cynget.

Morbi.

Vita.

Ingenium.

Gefnerus
Hiſt. Qua-
drup. p.
721.
Plin. H. N.
l. 8. c. 22.

Ælian. H.
A. l. 8. c. 14.

Gefner.
Hiſt. Qua-
drup. p. 723.

Ælian. H.
A. l. 5. c. 19.

Ambroſin.
de Digit.
l. 1. p. 147.

Albert l. 2.
de Animal.

Vox.

Vſus.

quo dentes levius proveniant. Qui per *lupi guttur* in synanche bibit, evadit. Hoc experimentum se ab Adolpho Occone accepisse, Agricola fatetur. *Cor* antepilepticis admiscetur. Medicamentum quod in M.S. Gesnerus invenit, ex visci quercini uncia unâ, visci de piro unc. f. mucronum de cornu cervi scobe dr. ij. cordis lupini dr. j. componitur. *Hepar* Archigones apud Galenum ad oris crustas commendat. Haud pauca de ejusdem usu apud Marcellum habebis. Idem, tussim ex vino tepido sanat, & phthisicis medetur. *Fel* cum elaterio umbilico alligatum, alvum solvit. Pars de *virga* in furno assa & incisa sumpta, veneris appetitum excitat. *Testiculus* dexter oleo permistus, & cum lana genitali muliebri applicatus, desiderium coeundi adimit. *Stercus*, colicis potandum, tempore Galeni, cum successu dabatur: imò, vel appensum, juvabat: sed in fruticibus & vepribus colligebatur. Vide Galenum. Quin & ossa in excrementis inventa, colo medentur alligata brachio, si terram non attigerint. *Ossa* exsiccata & in pulverem redacta, dolorem intercostalem tollunt. Inservit & aliis. Nam caput in columbario suspensum, mustelas & feles arcere dicitur. Rostrum inveteratum veneficiis resistit. Sanguis circa agrorum fines sparsus, lupos arcet. Eodem olim in sacrificiis utebantur, cum Dæmonas invocabant. Adipe novæ nuptæ, postes apud Romanos inungebant. Cauda supra præsepe suspensa lupos à stabulis arcet. De *Differentiis* sequenti articulo agemus.

ARTICULUS II.

De Lupo in specie, & de Gulone.

EX Lupis, alii sunt *Sylvestres*, alii *Aurei*, *Scythici*, *Marini*. *Sylvestrum* in Doffri-
niis montibus, qui Norvegiam à Suecia di-
rimunt, Olaus, in Sardinia Lonicerus, me-
minit. Villosior est vulgari, flavi coloris, &
caudam erectam gestans. Frequens est ejus
apud Mediæ populos in ludis usus. Armati
cum eis congregiuntur. *Aurei* à colore fla-
vo eoque pereleganti ita vocantur. Mino-
res sunt lupis communibus, voracitate ta-
men pares. Gregatim incedunt hominibus
& armentis innoxii. More canum latrare vi-
dentur. In Cilicia & Turcia visuntur. Tur-
carum domos & tuguria noctu subeunt, &
quicquid in eis esculenti reperiunt, devo-
rant: quod si nihil horum obvenerit, pileos,
vestes, calceos, & quicquid coriaceum est,
auferunt. Ex pellibus vestes parantur. *Scy-
thicus* in ultima Scandinavia, post Norve-
giam & Gothiam reperitur. Animal est lu-
pi magnitudine, perpetuò iracundum. Ger-

mani ab acie unguium, quibus maximè sæ-
vit, Grimmeklaw vocant. *Marinus*, ani-
mal est amphibium, magnitudine ursi, pelle
adeò dura, ut gladiis penè sit impenetrabi-
lis. Caput habet enorme, Oculos permul-
tis pilis obumbratos; naribus & dentibus
caninis; pelle villis erectis hispidâ, nigris
maculis distincta; caudâ oblonga, crassâ,
villosa. In ventriculo nonnulli lapilli repe-
riuntur. Pinguedine scatet. Conspicitur in
Oceani Britannici littore. In Insula Angræ
tanta eorum multitudo, ut quandoque mil-
liarius armentorum grex esse videatur. Vi-
suntur & in insula post portum S. Crucis
sita, & in Maritimo Peru tractu. Inimici-
tias cum avibus Buitri dictis gerunt, à qui-
bus aliquando interficiuntur. Adeò amplas
alas habent, ut extensæ spatium XV. pe-
dum occupent. Lupo conspecto, altera lu-
pi pedes apprehendit, altera ipsum rostro
excæcat. Rugiunt ad instar leonum adulti;
parvi, vocem hædorum imitantur. Hepar
est edule. Angræ incolæ carnibus eorum
tam recentibus quàm salitis nutriti, diu vi-
vunt. Pelles ad vestimenta adhibentur. *Gul-
loni* nomen à voracitate impositum est. Sca-
liger Vulturem quadrupedem; Crollius
Boophagon Germani Biesfrass/ nominant.
Est, describente Miechovio, magnitudine
canis, facie catti, corpore & cauda vulpinis,
colore nigro. Reperitur in Lithuania, Mo-
scovia; & aliis septentrionalibus regioni-
bus. Vescitur cadaveribus, tantumque vo-
rat, ut tympani instar infletur. Plenus, an-
gustiam duarum arborum aut rupium an-
gustiam ingreditur, & vi per infernas & su-
peras partes excrementa trudit, rursusque
ad cadaver regressa, sese implet. Congener
ipso fera Arabibus *Dabuh*, Africanis *seses*
dicta, magnitudine & formâ lupum refe-
rens, quæ etiam cadavera eruit. Forè est
eadem cum veterum hyæna, quod & Ges-
nero placet. Sanguis hujus feræ pro potu
venatoribus inservit: & melle rarissimo con-
ditus, in pompis nuptialibus, propinatur.
Pinguedine ulcera superlinunt. Intestina
ad usum chordarum trahuntur. Ungulæ ab
animali recenter avulsæ, & canibus aut fe-
libus ostensæ, easdem fugant: appensæ,
contra tinnitum aurium faciunt. Pellibus
ob pulchritudinem vestes subducuntur:
eorumque tegumentis honorabiliores ho-
spites excipiuntur. Ideò ad exteros evehe-
re non permissum. Stuporem si verum est
incutit, quod proditur, in cubilibus hæ-
rum ferarum quiescentes, res naturæ Gu-
lonis conformes, & quod semper comedant,
fomniare.

Bellon. l. 1.
de aquat.
c. 3.
Lopez.
Hist. Ind.
l. 1. c. 3.

Miechov.
in descript.
Sarmat.
l. 2. c. 3.

Leo Afri-
can. l. 9.

Olaus lib.
13. c. 6.

TITULUS II.

De Digitatis semiferis.

CAPUT PRIMUM.

De Vulpe.

ARTICULUS I.

De Vulpe in genere.

Tantum de Digitatis feris. Semifera vocamus, quæ licet feris sint instructa moribus; ob parvam tamen corporis molem, ab hominibus facile superari, regi, & domari possunt. Talia sunt, *Vulpes, Simia, Cercopithecus*, & alia hujus generis Indica, *Cyncephalus Papio, Upalim, Taxus, Castor, Lutra, Ichneumon, Mustela, Genetta, Animal Zibethi, Lepus, Cuniculus, Sciurus, Glis, Mus, Talpa, Echinus terrestris, Hystrix, & Tatus*. *Vulpes*, & ut alií volunt *Volpes*, vel est quasi volupes, quod semper tortuosis anfractibus ad alias animantes decipiendas currat: vel quasi volipes, quod ob cursus celeritatem volare videatur: vel quasi valipes, ob pedum valorem, Latinis dicitur. apud Græcos plurima habet nomina. Dicitur namque *άλωπιξ*, quod nomen tam in masculino quàm foemino reperitur, *ἄλως τὸ ἄλω & ἄλωπος*, à fallendis oculis: *βαοσαρῆς & βαοσάτη* Cyrenensibus; *ῥάμιξ*, *κερδῶ* ab astutia, quæ Græcis *κέρδω* & *κερδοσύνη*; *καθάρη*, *κερδάλη*, *κερδα κηλας*, *ἄλως τὸ κηλεῖν*, quod cauda ejus ad demulcendum apta sit; *κίναδω*, quod nomen quidam bestię omni imponunt; *κινάνδρα*, *κιδάφη*, seu *κίδαφω*, *κίρα*, *κίραφω*, *κέρδης*, *κίλοδερω*, *κροῖτις*, *λαμπηρίς*, *σκαφώρη*, & cætera. *Οὐανδὴν* Phrygibus vulpem etiam significat. *Descriptione* non est quod insitum cum notissimum sit animal. *Genitale* mari osseum ut lupis, & mustelis. *Caudam* habet villosam, *Aures* breviores quàm canis. *Cibum* si spectemus, delectatur gallinis, anseribus, astacis, otidibus, cuniculis, leporibus, sylvestribus muribus, felibus, parvis canibus, quos coercere potest, locustis denique. Cum Massiliæ piscatores Buopas Mænarum genus & magnos astacos per noctem in navicula reliquissent, vulpes buopibus insidiata, abastaco, forcipe, cui pedem interposuerat, capta est. Ab uvis quoque maturis non abhorrent, ut nec à pyris, si proverbium hoc sensu sumi debet. Non habentur in Creta, si Solino credimus, At in Russia frequentissimæ sunt: ut & Alpinis Helvetiorum locis. Ideò mercatores multas ibi pelles coemptas, in alias regiones divendunt. De *Congressu* tradidit Plinius, ad latera projectas coire, alii ad terram. Aristoteles, supervenientes commisceri. Invadunt & diversi generis animalia, modò corporatura & tempora graviditatis sint æqualia. Ideò ex cane &

vulpe, ad montem Aristoteles, Canes Latrocinii, *Alopecides* dicti, generantur. Pariunt catulos cæcos, quatuor ut plurimum; & parturientes ita secedunt, ut rarissimè gravidæ capiantur. Editum fætum lambunt, refovent, & concoquunt. Cum serpentibus adeò amicè vivunt, ut in iisdem cavernis quietè morentur. Hostilitatem verò exercent, cum plantis, avibus, & quadrupedibus. Rura sylvestris cum eduliis gallinarum mista, vel ejus ramusculus sub alis gallinarum alligatus, easdem à vulpe tutas reddit. Milvus, vul-tur, & aquila, vulpium catulos sæpe rapiunt. Circus & Æsalo pilos ab iisdem avellit. Corvos & vulpem in caveâ clausos, tam acriter dimicare Avicenna vidit, ut corvi caput fauciatum sanguinem emisserit; corvus verò labia vulpis adeò constrinxerit, ut hircere nequaquam posset. Taxi cum vulpibus sæpenumero præliantur: hi taxos, cryptas stercore foedando, fugant. Cervi eorundem gannitum reformidant. Lepores sunt in illis infulis frequentiores, in quibus nullæ vulpes. Ululando & latrando canem imitatur, quando irascitur & dolet; alioquin, cum aliquid, si domi alatur, petit, gannit & blandè immurmurat. Hinc *κυσζαίω* seu *κυσζέω*, propriè de canibus, queribundum ululatum edentibus, profertur. *Moribus & ingenio* est dolosis. In Thracia amnes gelatos lacusque nonnisi ad pascus itura redituraque transit: & observatum, aure ad glaciem appositâ, crassitudinem gelu conjectare. In caverna, multiformes aditus facit, ne tam facile à venatoribus illaqueari possit. Quia lupus contactu scillæ convellitur, latebris suis eandem apponit. Pulcibus infestata, manipulum fani mollissimum, aut pilos ore continens, paulatim à posteriori parte in aquam se mergit, ut pulices ad caput ascendant, eoque immerso, in fœnum vel villum colligantur. Echinos in arctum constrictos, quia adoriri non potest, urina in os redditâ, suffocat. Cum lepore se ludere velle simulat, & incautum devorat. Famelica, insidiosè mortuam se simulans, spiritu compresso, exertaque lingua, postquam se in argilla rubra, ut cruenta quasi appareat, volutasset, accedentes aves corripit. In Ponto sic Otidas venatur, ut & sese avertens, & in terram abiciens, tanquam avis collum, sic caudam extendat. Eæ, hac insidiarum instructione seductæ, ad illam tanquam suam gregalem accedunt, & nullo negotio, capiuntur. In pedica capta, morsu pedem præscindit, ut aufugiat: nullâ fugæ patente viâ, mortem simulat. Gallinas in pertica sedentes, caudâ huc & illuc impulsâ perterrefactas, dejicit & devorat. Nihil de pisciculorum & vesparum captura, quos cauda astutè capit, dicam. In procera arbore deprehensa, jucundum aliquando sui spectaculum præbet. In ea enim tanquam in arce oppugnari solet: cum neque ignem timeat,

Aristot. H. A. l. 6. c. 34.

Sympathia & Antipathia.

Vox.

Mores & Ingenium Plin. H. N. l. 8. c. 28.

Albert. l. 2. de Animal.

Ælian. H. A. l. 6. c. 64.

Ælian. H. A. l. 6. c. 24.

Ambrosin. Digit. l. 2. c. 1.

Nomen. Isidor. Origin. l. 12. c. 2.

Descriptio.

Cibus.

Locus. Michev. de Sarmat. c. 1.

Generatio.

nisi

nisi pars proxima ardeat: plerumque etiam acutas cuspides non fugiat, & perfodi potius sustineat, quam in turbam canum descendere. Tandem verò descendere coacta, impetu quodam instar fulguris dejici solet, in numerosam canum cohortem, ut sagacissimos laniet, & à præstantioribus dilaceretur. Vulpium carnes nitidior vita damnavit. A Sarmatis tamen, Vandalis, & rusticis Gallis seu elixæ seu assæ comeduntur, ut olim à Bæotis. Incolæ insulæ portus sanctæ Crucis, aliquando crudas, aliquando parum fumo induratas vorant. Brujerinus qui eas degustavit, nescio quid virosi & agrestis habere scripsit. At Galenus, vim ei inesse carnibus leporinis similem, reliquit. *Cerebrum* infantibus sæpius exhibitum, à comitali morbo eos præservat. *Lingua* in armilla gestata à lippitudine: arefacta, in collo contra albugineas suspenditur. *Pulmo*, phthisicis commendatur: suspiriosis à Dioscoride, lienosis à Sexto propinatur. *Iecur* in jecoris affectibus præscribitur. *Fel* cum melle mixtum, oculorum caliginem delet: & in pefso, ad masculorum conceptionem, inditur. *Renes*, cum pinguedine, gonagræ opitulatur: iisdemque ad faucium tumores dissolvendos guttur perficitur. *Testiculus* ad juvandum congressum & conceptionem in electuariis exhibetur. *Genitale* osseum oleo & bitumine imbutum, tanquam pessus, ad provocandos menses supponitur. *Pudendis* vulpis fœminæ in cephalalgia caput circumdatur. *Sanguis* recens calculosis exhibetur, eodemque pudenda illinuntur. *Pinguedo* liquata & auribus instillata, affectiones earundem inveteratas tollit: nervorum morbis magno est adminiculò: Unguentum ad calculum ingreditur: in alopecia mirandum in modum valet. Eodem pedes & manus à frigore præservat, dum modo sæpius antequam intumescant inungantur. *Siærcus*, cum sinapi mixtum, Plinius, in ulceribus capitis adhibet: Rhafis cum oleo rosaceo mixto virgam inungit, atque hoc modo venerem sopitam excitat. *Pellem*, Galenus in capillorum affectu, Sextus in Podagra, dum calceos ex ea parari jubet, utitur. Ischiadicos ab ea juvari compertum est. *Caudæ* summa pars brachio illius suspenditur, qui ad venerem iners est. Ex tota vulpe, oleum ad omnes arthritidis species valde efficax, paratur. Pellem in vestitu usurpari, notissimum: nigræ inprimis, quæ aliquando quindecim aureis vænit.

Differentiæ. Vulpium, à magnitudine, colore & more sumuntur. *Magnitudinem* si spectes, Odonus minores in Ægypto quam Græcia reperiri scribit. In Peruana quoque sunt pusillæ, terribili odoris, adeo ut si urinâ aliquid fœdaverint, fætor nunquam ablui possit. Quantum ad *Colorem*, dantur in sylvis septentrionalibus nigræ, candidæ, rutilæ; crucigeræ, & isatides. Visæ nigræ, quæ ab

aliquibus albis pilis, quodam ordine digestis exornantur. Ruffescentium duas species. Una quæ guttur in albonigricans, veluti carbonum pulvere conspersum exhibet. Altera, candidum, quæ species tanquam rarior in Germania magnifit. *Albarum* major in Suecia & Norvegia copia: sed maxima circa Novam Zemblam, quæ sole sub horizontem demerso emergebant, emerso, occultabantur, quæque Hollandis ibidem vi frigoris constrictis, cuniculi carnes sapere videbantur. In *Crucigera* ab ore per caput, tergum, & caudam, recta nigri coloris linea protrahitur, deinde alia transversa per artus ad pedes, anteriores ducitur, quæ duæ lineæ crucis figuram exprimunt. *Morem* si attendas, Ælianus in Caspiis regionibus vulpes esse scribit, quæ & urbes innoxia ingrediuntur, & incolis tanquam caniculæ intervium.

Ælian. H. A. l. 7. c. 30.

ARTICULUS II.

De Vulpibus Indicis.

Vulpium Indicarum varia sunt genera, variisque ab iisdem nominibus insigniuntur, *Cojotl*, *Cuit lax cojotl*, *Azcacojotl*, *Ilpe maxtla*, *Oztoa*, & *Izquiepotl*. *Cojotl* animal est lupino capite, oculis vividis, magnis ac pallentibus, parvis & acutis auriculis; rostro nigro, longo, nec admodum crasso; Cruribus nervosis, & unciis; Crassis ungibus; cauda hispida crassaque; noxio morfu; fusco, longo, candidoque pilo. Magnitudine est inter lupum & vulpem mediâ. Frequens est in nova Hispaniâ, locis inprimis frigus & rigorem declinantibus. Viçtitat imbecilliorum animalium præda, maizio, & arundinibus saccarinis. Invadit aliquando & cervos & homines. Sagax est venatui, & vulpinis moribus, atque adeo injuriæ illatæ ultor, & ereptæ aliquando sibi prædæ memori, ut post dies aliquot agnoscat raptorem, infectetur obvium, & interdum etiam aliis sui generis comitantibus, adoriatur, & trucidet; cognitisque magno studio & cura ædibus, ac interentis quibusvis domesticis animalibus, ulciscatur injurias, & poenasumat. Erga beneficos verò est tam gratus, ut allatis ante eum cohortalibus, & cætera prædæ parte, benevolentiam plerumque testari soleat. Fertur dolorem dentium pene ejus expurgatorum subito sedari. *Cuit lax cojotl* iisdem quoque præditus est moribus, & forma etiam esset eadem, nisi Cuetlaztli pilo similis videretur, unde nomen accepit: collo crasso, & impenfè hirsuto, pectorisque & faciei pilorum longiorum acervo terrificus. *Azcacojotl* formicarum cavernis insidet. Cum noctu ululat, multiformes edit clamores. *Ilpe maxtla*, candido, nigro, & fulvo pilo vestitur. Capite est parvo, articulis modicis,

Nieremb. H. Exot. l. 9. c. 10.

Blondus apud Gefnerum.

Vfus in Cibus.

Brujer. de re cibarij. l. 13. c. 26. Galen. de victu attenti. c. 8.

Vfus in Medicamentis.

Scalig. Exerc. 217.

corpore gracili; ac quatuor ferè dodrantes longo, rostroque prolixo & tenui. Offenditur ubique, sed præcipuè calidis in locis. *Oztoa* genus est vulpis forma & magnitudine nostri simile. Tres dodrantes vix superat, nigro candidoque vestita pilo, sed quibusdam partibus fulvo. Incolit foveas. Alitur cohortalibus. In terræ cavitatibus occultè educat sobolem. Atrociter mordet. Cum aliter manus venatoris effugere nequit, simulat se mortuam. In cibi ibidem usum venit, quamvis crepitus ventris incolis sit fætidissimus. *Izquiepatl* maizium tostum colore imitatur. Duos est ferè dodrantes longa humilisque, rostro tenui, parvis auriculis, piloso & nigro corpore, ac præcipuè juxta caudam, quæ longa est, & nigro candidoque pilo, quemadmodum & dorsum univsum vestita. Brevibus cruribus, nigrisque, & uncis unguibus. Vivit in antris inter saxa ubi educat prolem. Vescitur scarabeis, & vermiculis, cohortales jugulat, solumque earum devorat capira. Fundit, cum pedit, halitum fætidissimum. De urina superius diximus. In extremo constituta periculo, reddita urina, aut fæcibus dejectis, ad octo pluriumve passuum intervallum (tanta vis est excrementi) sese ab omni vindicat injuria, ac vestes inficit indelebilibus luteisque maculis, & nunquam satis perspirante putore. Editur ejus caro stercusve, saluberrimo eventu, ab iis qui lue Hispanica laborant. Sunt & alia duo vulpeculæ hujus genera, eadem penè forma & natura, quorum alterum *Izquiepatl* vocatum fasciis multis candentibus distinguitur: alterum verò *Conepatl* seu vulpecula puerilis, unica tantum utrimque ducta, perque caudam ipsam eodem modo delata. *Bachira* quoque dicuntur animalia vulpibus similia. Rotundiora sunt & jucundæ carnis. *Anna* etiam appellantur ab Indis, animalia illa fele domestico minora, pestilentis odoris, quæ oppida noctu adeunt. Fætorilla prodit, etiamsi distent centum passus, nec fores, nec fenestra clausa obsiant.

ARTICUTUS III.

De quibusdam vulpi congeneribus.

PUNCTUM I.

De Carygueja & Tajibi.

Marcgrav.
Hist. Brasil.
l. 6. c. 2.

QUINQUE imprimis in Brasilia invenio animalia, quæ vulpibus cognata esse videntur, *Carygueja* nempe, *Tajibi*, *Tamandua guacu*, *Tamanduan*, & *Coati*. *Carygueja* aliis Jupatiima, Lerio Sarigoy, Ximeni Tlaquatzin dicitur. Animal est ex descriptione Marcgravii, catuli seu mediocris felis magnitudine: *Caput* vulpinum habet. Ore acuminato, estque inferior pars oris paulo brevior superiore: linguam longam, quam

tamen os aperiens & morsum minitans non exerit, quamvis posset, sed versus posteriora attollit: *Dentes* instar felis seu vulpis, antè nimirum, tam superius quàm inferius parvulos, hinc quatuor longos caninos, superioris quidem longiores, inferiores breviores, hinc iterum sex alios, & dein molares: nimirum, sedecem molares, duodecim intermedios, quatuor caninos, & incisores parvulos, in inferiore mandibula octo, in superiore decem: nam duos majusculos in medio habet more leporis. *Nares* habet patentes, *Oculos* pulchros rotundos, nigras: *aures* pro more corporis amplas, longas, latas, vulpinas, quas erectas gerit, sed constant tenui membrana glabra, translucente, cui fusci aliquid admixtum. *Barbam* habet felinam pilis nigris, sub mento autem sunt breves, in superiore parte oris longiores, supra oculos aliqui, & itidem in utraque gena. *Caput* tres digitos aut paulò plus longum: aurium quælibet duos digitos longa, sesqui ferè lata. *Collum* breve nec supra digitum longum: reliquum corpus septem digitos, usque ad caudæ exortum: *Cauda* pedem longam quam curvatam gestat, nam ea se arborum ramis more simiæ appendit. *Pectus* latiusculum. *Crura* duo anteriora breviora, nimirum quodlibet tres digitos longum, posteriora paulò plus quatuor. *Pedes* anteriores digitis quinque instar manus constant, unguibus albis, instar avium curris: posteriores longiores, ut in cercopithecis esse solet, item quinque digitis ut manus. *Pilis* vestitur longis, sed qui in capite, collo, infimo ventre & cruribus breviores: pili autem capitis, colli inferius, & caudæ inferius propè exortum sunt flavi: secundum longitudinem autem capitis per oculos & medium capitis, tendit ampla nigra stria; collo superius etiam nigri pili admiscuntur. Per totum autem dorsum, latera & caudam, superius propè exortum, maximam partem nigra est, sed luecophæis pilis admixtis. Cauda ab exortu suo tantum ad quatuor digitos pilosa est, reliqua parte nuda, ubi cute vestitur, ad quatuor digitos nigra, quatuor digitos ultra albicante, fusco colore intermixto. Rotunda est, & sensim attenuatur. Mas fœminæ per omnia similis. In infimo ventre propè crura posteriora, pellis ejus dupla est, & exterior rima scissa duos & semis digitos longa, facitque quasi bursam, pomi aurantii majoris capacem. Est autem hæc bursa intus pilosa, & continet mammas in interiore pelle ad ventrem, octo papillis: bursæ autem os arctè clauditur, ut non appareat, nisi duobus digitis distendatur. Hæc bursa ipse uterus animalis est, nam alium non habet, uti ex sectione illius, inquit *Marcgravius* comperi: in hac fœmen concipitur, & catuli formantur: & hæc ipsa, quam describo, bestia sex catulos vivos & omnibus membris absolutos, fed

Simia

Affe. 1



Cynocephalus
Hunds Kopf
Mommet . 1

Cynocephalus 2
Pertrand

Simia 2



Cercopithecus

Cercopithecq





Captaia

Cagui Brasil



Cercopithecus barbatus Guin


*Iija sine Cariguébeiu
Lutra Indica*



*Capý-bara Parcus flu-
Viaticus Bras.*

*Cuaná s. Ourico cachiero
Eijfern Vercken*





Cercopithecus Major seu Manticora




Papio Pavion 1



Papio. 2





sed sine pilis in hac bursa habebat, qui etiam hinc inde movebantur; quilibet catulus, duos digitos erat longus: in ea tandiu retinentur, donec ipsi sibi victum querere possunt: inter ea tamen interdum progrediuntur foras, & iterum ingrediuntur. *Testes* sub ano habebat interius jacentes. Pellis ejus facile detrahi potest, ut vulpina aut leporina, modò in ventre incidatur. Fætet animal instar vulpis aut Martis. Mordax est. Vescitur libenter gallinis, quas rapit ut vulpes, & arbores scandendo avibus insidiatur. Vescitur quoque faccari cannis; quibus sustentavi per quatuor septimanas in cubiculo meo; tandem funi cui alligatum erat se implicans, ex compressione obiit. Tantum Marcgravius. Invenitur in Dariene Brasiliâ, & Floridâ, & nova Hispania. Videtur quidem ei Ximenis Tlaquatzin descriptio competere: quin Nierembergius Cerigonam Brasiliensibus vocari scribit: icon tamen, quam Nierembergius exhibuit, ab icone Marcgravii planè differt, ut ex collatione unicuique apparere potest. Sed nec Ambrosini Vulpisima, vel Simivulpa huic, si iconem spectes, similis est. Ideò in mustellarum numero reposuimus, icone hic adjectâ. Ut ut sit, cauda hujus animalis, magni est in Medicina usus. Drachmæ pondere ex aqua vicibus aliquot jejunis hausta, mundat ureteres, calculos expellit, venerem excitat, lac generat, colicis doloribus medetur, parientibus prodest, partum accelerat; & si masticatam imponas partibus quibus spinæ infixæ, extrahit illas. *Tai-Ibi*, quod Lusitani *Cachorro do mato* appellant, animal est corpore tereti & oblongo. Vestitur pilis albis splendentibus, qui in extremitatibus nigricant. Caput habet vulpino æmulum, ore acuto, barba felinâ: oculos conspicuos, & prominentes, nigros: aures subrotundas, molles, graciles, albas, teneras, ut charta mollis. Cauda in exortu ad quinque digitorum longitudinem pilis vestitur albis, in extremitatibus nigricantibus: reliqua pars major ad finem usque, corio tenui, squamoso, albicante, instar exuviarum serpentis cincta est. Caro graviter fætet: comeditur tamen. Pili tenui cuticulæ inserti sunt, quæ salvo corio crassiore detrahi potest.

PUNCTUM II.

De Tamandua-gvacu, Tamandua-i, & Coati.

Tamandua-gvacu animal est canis lanionum magnitudine, (Abbeyllanus mollem equi attribuit) capite tereti, promuscidelongissima; ore acuminato edentulo, lingua tereti, viginti quinque aut septem digitorum, imò duos pedes & semis subulæ instar, longa, quam in ore duplicatam gerit.

Oculos habet parvos, nigros. Aures subrotundas: caudam instar muscarii hirtam, setis equinis constantem, unius fermè pedis latitudine, qua diducta se totum potest tegere: crura teretia. Pedes anteriores quatuor habent ungues recurvos, duos in medio maximos, duos & semis digitos longos, & ad utrumque latus minores: volam pedis rotundam. Pili capitis & colli breviores & atrorsum versi: anteriora albis vestiuntur: ad tactum omnes aridi sunt. Tardum est in currendo animal: & formicis vescitur. Tandem enim illarum tumultu linguam imponit, donec ab iisdem obsideatur. *Tamandua-i* est vulpeculæ Americanæ magnitudine. Caput habet acuminatum, rotundum; conum acutum repræsentans, paulum infra incurvatum: os nigrum, angustissimum, edentulum: oculos parvos, nigros: aures erectas, unum circiter digitum longas. Pilos totius corporis duos, splendentes, & ex albo flavescentes. Linguam instar subulæ teretem, octo digitos longam, quæ quasi canali inter inferiores genas incumbit. In prioribus pedibus quatuor ungues incurvos. Ferox est animal, sed mordere non potest. Baculo tactum posterioribus pedibus insidet ut ursus. Totâ die dormit, capite sub collo & anterioribus cruribus abscondito; noctu vagatur. Quando bibit, pars per nares iterum exsilit. Quum mactarem hoc animal, inquit Marcgravius, maximam partem excoriatum adhuc vivebat, quamvis octiduum in ediam tolerasset. In rene sinistro superius processum triangularem inveni, per duplicem tenuem membranam reni adnexum: in intestinis multos teretes lumbricos: valvulas cordis insignes: vesicam fellis magnam. Corium est crassum. Caro vulpinam olet, & non comeditur. *Coati* est Brasiliensium vulpes, magnitudine felis, cruribus & manibus brevibus Cercopithecorum. Caput habet acuminatum, vulpinum: aures subrotundas & breves. Oris partem inferiorem superiore brevior: promuscidem longam & acuminatam: nares amplas quasi fissuras: oculos nigros: caudam suo toto corpore longiorem, quam superius erectam gestat & incurvatam, ejus pali annulatim variegati cum umbra & ochra. Quando comedit, anterioribus pedibus tenet cibum. Arbores velociter conscendit ad ramorum extremitates. Habui aliquando ejusmodi animal cicuratum, inquit De Laet, & valde domesticum & mihi amicum, ita ut ad os meum eniteretur, & ex illo cibum caperet: sed cum caudam suam prærodere cepisset, non potuit ab ea abstinere, ita ut illam tandem penè totam consumeret, & moreretur.

Marc. H.
B.l.c.

Merc. Hist.
B.l.6.c.6.

CAPUT. II.

De Simia.

Nomen.

Anglic. de
re. proprie.

Descriptio.

Aristot. H.
A. l. 2. c. 8.Galenus
Comm. 3.
supra Hip-
pocr. de ar-
ticularis.Galen. de
usu part.
l. 16. c. 6.Vesal. de
fabrica cor-
por. huma-
ni.

Simia seu Simius, vel à depressis & simis
naribus, (σιμός Græca vox est) vel quasi
mima, quòd faciliè hominem imitetur, La-
tinis dicitur. Festus *Clunas* appellavit. Bar-
tholomæus Anglicus quasi Simeas, id est,
hominibus similes dici voluit. Apud Græcos
vocatur *πῖθηξ, πῖθηκος, πῖθων, ὡς δὲ τὸ περὶ*
δου, quod facile ad humanarum actionum
imitationem persuadeatur; *ἡμιμῶ*, quasi ge-
sticulator; *ἀεμιμῶ*, veteri Hetruscorum
lingua; *βάρης*, quòd faciliè arbores scan-
dat; *καλλιάρ* Laconibus, Gyraldus *καλλιάρ*
vocari observavit. Tam pronâ corporis par-
te pilosa est, quàm supina. Pilo crassiore ve-
stitur. *Nares*, aures, dentes, tam primores
quàm maxillares, hominis more habet. *Ci-
lium* in utraque palpebra prætenue & proli-
xius, inferiore inprimis. In *pectore* binas
mammarum papillas; & brachia hominis
modo sed hirtiuscula, quæ & ipsa & pedes
ut homo inflectit. Manus, digitos, ungues,
hominis similia, etsi rudiora, efferatioraque.
Pedes ipsi sui generis, sunt enim velut manus
majusculæ, & digitis ut manus constant,
medio longiore. Vestigium etiam manui si-
mile est, nisi quòd in longum se porrigat, &
volam referens tendat ad postrema. Callosi-
us hoc sui parte extremâ est, & calcem ineptè
atque exiliter imitatur. *Lacertos* habet & fe-
mora proportionem cubitorum & tibiarum
brevia. *Umbilici* loco qui eminere solet, du-
rum quid. Partem corporis superiorem mul-
to majorem quàm inferiorem. Carent nati-
bus utpote quadrupes, caudâ utpote bi-
pedes. *Internas partes* si spectemus, *Cor* ha-
bet pyramidale: quamvis cujusdam cum
duobus acuminibus repertum sit. Venæ &
arteriæ per brachia perinde ac in homine
distribuantur. Vena, quæ in dextram cor-
dis aurem fertur, moxque in ejus sinum dex-
trum penetrat, in iis supra auram cordis sita
est. Quæ à cava propagantur, & in renes in-
feruntur, amplissimæ sunt, post deferun-
tur ad testes. Musculi temporales sunt exiles
& debiles. Auris substantia immobilis. Car-
nosi, qui nates integrare solent, ridiculi
sunt. Etsi verò in multis partibus homini as-
miletur: in multis tamen quoque differre
certum est: nempe, in musculis thoracis &
brachia moventibus; in iis qui cubitum &
femur agunt; in manus internâ structura; in
musculis digitos pedis moventibus; in ten-
dine pedi sub lato; in colo, mesenterio, &
pulmonis quinto lobo venam sustinente. Sed
& in ossibus ab humano sceletio discrepat. Ad
lumbos enim sex vertebræ conspiciuntur:
humeri articulus plurimum est à thorace
abductus: Crura non recta ad spinam ten-
dunt, ideo dum bipes incedit, claudicat.

Pedes habet concavos, & digitos valdè fissos.
Plura apud Aquapendentem occurrunt. In
plaga Orientali, & aliis calidiori cœlo sub-
jectis nascuntur. In Lybia, Mauritania, par-
te Caucasimontis quæ in mare rubrum por-
rigitur, regno Basman, & cæteris. Omne
latifundium, quod inter Ægyptum, Æthio-
piam, & Lybiam diffunditur, omni simia-
rum genere repletum est. In Indiæ montibus,
tanta earum copia, ut sæpè Alexandri ex-
ercitui terrorem incusserint. In regno Bas-
man, captæ, & mactatæ, excepto mento
depilantur, & aromatibus conditæ exsic-
cantur, mercatoribusque venduntur, qui
aliò translatos pro homunculis marinis ven-
ditant. Montanis tamen potius quàm planis
delectantur. Ideò montes Enisæ, prodente
Leone, frequentant. Herbis & tritico de-
lectantur, ideo ad maturas spicas magno
comitatu incedunt. Pediculos quoque hu-
manos, vermes & araneos vorant. Inter
fructus pomis & nucibus potissimum fruun-
tur: at reperto in iis amaro cortice, totum
abjiciunt: sed & carnum sagina delectantur,
à quarum esu pilos deponunt. Vinum etiam
bibunt. De *Generatione* pauca occurrunt.
Natalis Comes circa æquinoctium vernum
commisceri, & circa solstitium æstivum
duos catulos parere prodidit. Ælianus quo-
que binorum fatuum meminit, quorum
unus charior ulnis gestetur, alter contem-
ptus penes matrem inambulet. Solent tamen
quando in urbes ducuntur, in sexum mu-
liebrem furere. Amicitiam gerit cum cornice
& cuniculis: cum gallo, testudine, torpe-
dine, & limacibus dissidet. Cornix, sedulo
ipsius speciem admiratur. Cuniculos ali-
quando in Anglia, apud virum nobilem,
contra mustelas defendit. Ob antipathiam
matricidæ culeo infuto, gallus simia & vi-
pera addebantur, ut simia gallum perseque-
retur, vipera gallum fugiens, in hominem
sæviret. Testudinem in capite pueri conspi-
cata Romæ quædam, ita exhorruit, ut præ-
timore, alvi & vesicæ excrementa redderet.
Si limacum corona eidem circumponatur,
nec eas comprimere, nec attingere audet.
Laborat hernia, propter omentum ponde-
rosus, morbo comitiali, atrophia, inflam-
matione hepatis, splenis, vesicæ &c. Gale-
nus valdè emaciatam diffecuit, & cæteris
partibus illæsis in pericardio tumorem præ-
ter naturam invenit, qui humorem qualem
hydatides emittere solent, continēbat. De
morsu nihil dico. Virosum esse tradunt, &
Avicennas, emplastrum ex cinere cum mel-
le & amygdalis amaris imponit. Naturam
mores & ingenium quod spectat, in maxil-
larum cavitatibus cibaria condunt, indeque
sensum ad mandendum manibus expromunt.
Adeò petulantes sunt, ut & leones,
illorum clunibus affixæ, exagitent. Injuriam
diu meminisse prodidit Albertus, faciliè obli-
visci,

Aquadepend.
de sensib.
l. 2. c. 8.
Locus.Leo Africa.
l. 3.

C'bu.

Generatio.

Ambros.
Hist. Digiti.
l. 2. c. 5.Porta Phy-
siogn. l. 7.
c. 8.Galen. de
laffil. 5. c. 2.Natura &
Ingenium.

Cercopithecus Sagorin Clusj



Mapach




Cercopithecus Barbatq Clusj



Ignavu sine Haut Clusj



Armadillo Genus Alterum Clusj



Armadillo sine Aiatocheli




Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



visci, alii. Mansuefactæ catulos suos omnibus ostendunt. In nœomenia exultant, in interlunio summâ tristitiâ afficiuntur. Statim atque per tactum, aut mortem, aut morbum putridum deprehenderint, inusitato narium strepitu personant. Ideò Crollius credit, Medicos sphygmicam ab hoc animali edoctos. Aliquando transverso latere facilius gradiuntur. Inventæ quæ aurigæ munus obibant: latrunculis cera effictis ludebant. Fuit quædam, quæ cum infantem à nutrice lavari & fasciis involvi videret; absente, eundem nudatum in ferventem aquam abluendi gratia imposuit, & interfecit. Quæ Pareus de simia in ædibus Ducis Somei habet, vide apud Ambrosinum. Dum quæ venatores facere vident, imitantur; faciliè capiuntur. Nunquam ita mansuescunt, quin faciliè fiant rabidæ. Delectantur, quidem puerorum & canum lusu; sed non custoditos strangulant, vel ab alto præcipitant. Vino inebriantur. Zabeces & Zygarites Africæ populi, iis vescuntur, ut Herodotus prodidit. Carnem frigidam & austeram Rhasis iudicavit. Cor assium & cum melicrato coctum memoriam acuit: quod Porta signaturæ adscribit. Quantum ad *Differentias*, forma, colore, jubis & magnitudine discrepant. Aristoteles in Caudatas, sine cauda, & canicipites dispescit, quod & Oppianus sequitur. Plinius, coloris albi apud Orseos in India vagari asseveranter scribit. Marcus Polus, quasdam erectas incedere, humano more, prodit. Huc pertinet *Orang-outang* Indorum, ex Angola delatus, & Friderico Henrico Arausionensium Principi donatus, quem Tulpius, *Hominem sylvestrem*, vocat. Erat quadrupes, longitudine pueri trimi, crassitie sexennis. Corpore nec obeso, nec gracili, sed quadrato: habilissimo tamen ac perniciosissimo. Artubus tam strictis, & musculis adeò vastis, ut quidvis auderet & posset. Anterior undique glaber: atponè hirsutus ac nigris crinibus obsitus. Facies mentiebatur hominem: sed nares simæ & aduncæ rugosam & edentulam anum. Aures verò nihil discrepare ab humana formâ. Uti nec pectus, quod ornatum utrimque mamma prætumida (erat enim sexus fœminei.) Venter habebat umbilicum profundior: & artus cum superiores tum inferiores, tam exactam cum homine similitudinem, ut vix ovum ovo videris similis. Nec cubito defuit requisita commissura, nec manibus digitorum ordo: nedum pollicis figura humana, vel cruribus furæ, vel pedi calcis fulcrum. Incedebat multoties erectus, nec minus gravatè attollebat, quàm transferebat, qualescunque gravissimi oneris pondus. Bibiturus prehendebat canthari ansam manu altera; alteram verò vasis fundo supponens, abstergebat madorem labiis relictum. Cubitum iturus in-

clinans caput in pulvinar, corpus stragulis firmiter operiebat. Tantam habere animi confidentiam Rex Sambacensis retulit, ut non semel in viros armatos impetum faciat. Fœminarum tam ardenti flagrant desiderio, ut sæpe raptas constuprent. In Guinea scribit P. Jarricus, esse quasdam, quæ instar famuli in pila tundunt quæcunque in ea imponuntur, quæ aquam à fluviiis in hydriis capite domum deferunt, ita tamen, ut ubi primum domus fores attigerint, illicò hydriis exonerandæ sint, alioqui eas excidere, casuque isto frangi. Dicuntur *Baris*. Torosi sunt & robusti. In India meruit etiam quædam simia alba divinos titulos. Reliquias Zeilan servavit, dentem duntaxat. Præda tandem, inquit Nierembergius, fuit, Constantini Proregis Lusitani, cum barbari Principis thesauros cepisset, inter quos & dens ille fuit. Tantâ summorum Regum reverentiâ & divinitatis opinione, habebatur, ut singulis annis à Pegu mitterentur legati, magnis onusti donariis & muneribus, ut solum permitterentur, in argillâ quadam aromaticâ, quam in auro custodiebant, imprimere sigillum ejus, ut absentiam tanti pignoris divini, ejusdem adoratione vel solum per umbram solarentur. Deinde conscius Rex Pegu captum à Lusitanis sacramentum suum, misit ad Constantinum legatos, onustâ navimercibus, & auri cruciatis trecentum millibus pro redemptionis precio. Plæriq̃ue Lusitani donandum censuere, exactâ majori summa: usque ad millionem expectabant. Et quidem Rex ille plus dedisset: at noster Rex, in angustia ærarii, prætulit lucro pietatem, atque ut omnibus constaret, publico confessu jussit dentem afferri, agnosci, extrahi, è locupletissima theca, gemmis & auro exornata: deinde manu sua in æreum mortarium jact, tundi jubet usque ad pulvisculum: mox pulverem in ignem ad hoc præparatos dissipat, ut in fumum evanuerit.

CAPUT III.

De Cercopitheco.

Cercopithecus caudatum simiarum genus est. Unde nomen sortitur. Græcis eodem vocabulo venit. *κερκ* cau- *Nomen.*
dam, *πίθη* simiam significat. Dicitur *Ambrosin.*
& *κίπ*, quod vocabulum alii *κίς*, *de Digit.*
κελός, & *κίτ* efferunt. Non desunt *l. 2. c. 6.*
qui à voce Græca *κερ* levis vocari putent, quòd hoc animal ob miram levitatem, in diversas partes saliat. Albertus Mamonetum vocat, Itali Spingam, Celtæ *ἀβελγας*. De *Descriptione* dum in genere de eo agimus, non est quòd simus solliciti: in specie de iis acturi, singulas describemus. Genitalia nobis delineavit Aurelius. Inveniuntur *Locus.*

Ælian. H.
A. l. 7. c. 27.
Plin. H. N.
l. 8. c. 34.

Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 45.

Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 46.

Vfus.

Porta Phytogn.
l. 1. c. 17.

Aristot. H.
A. l. 2. c. 8.

Tulpius
observ. l. 3.
c. 56.

Strabo Geogr. l. 15.

Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 44.

in Æthiopia, & quidem, si Plinium attendimus, nigris capitibus pilo asinino: in sylvestribus Javæ, & regni Congo; in India supra Emodos montes, quod Strabo scripsit: in monte editissimo, urbi Aden Arabiæ, vicino: in omnibus denique continentis Indiæ locis. In Malabar vilissimo precio venduntur, quod nuci Indicæ, à qua ad incolas magnum commodum, infesti sunt. Censentur esse inter *παμφάγους*; sed quando desiderio carnis premuntur, propriam caudam arrodere solent. Crocodilos adeo acerbo odio prosequuntur, ut pelle ipsorum visâ ferè exanimentur. In Orientali India, quæ Lusitanis subest non tantum comeduntur; sed & in morbis, tanquam saluberrimi exhibentur. In deliciis propter mimicos gestus haberi, notum. Ossa tusa & hausta dolores Gallicos, evocato fudore levant. De *Ingenio & Moribus* ipsorum ita eleganter *Nieremburgius* scripsit. Omnes, inquit, penè filiorum charitate insignes sunt, amplexu graves. Vescuntur fructibus arborum & ovis avium. Ebibunt plures lotium & fordes suas. Nonnunquam videntes hominem solum, descendunt ad ludendum cum eo. Omni sunt astu industrii. Mirificum est, arborum stipites, quas conscenderunt, in viatores torquere & jaculari, transilire flumina caudis invicem apprehensis, & ab arboribus fluviis vicinis vibratas, tamdiu, donec extremus oppositæ trans amnem arboris ramum abripiat: quo affixo arbori, catena simionem utrimque protenditur. Deinde cum is qui in alterâ parte hæsit, tutò se affixit, vociferatur, signum jam notum ipsis, quo audito, alter extremus se solvit; ita omnes transmittuntur. Super omnia sagitta aliove telo confossi, vicissim quantam possunt, ne dicam quantum solent homines hominibus, opem ferunt, admotisque foliis muscove arborum vulneri, sanguinem confluentem callent sistere, atque ita vitam, si fieri possit, tueri. Educunt filios, singulos pariunt, circumferunt, amplexu tenaci adhærescentes mirapietate & amore erga prolem, atque id juxta montium verrucas, & summa cacumina, ubi venatores pyram construunt maizio circumdatam, adjecto lapide cacalotetl sive corvino, cujus est natura, si igne calefactus fuerit, tonitru edere, atque dissilire. Accurrunt cercopitheci, juxta incubant, edentes sparsum cacacoatl: sed terrente eos subito in illos emisso lapide, obliti filiorum, ac velut expertes luminis, aufugiunt, deferentes sobolem charissimam venatoribus prædam. Deportant quoque in tergoribus prolem, donec commode jam sibi possit providere. Complectitur filiolus matrem manibus per collum, pedibusque per spinam: Magna aliquibus pernitas: ferè volucrum ritu occupant arbores, transvolantque ab una in aliam. Visus est qui transcendit uno impe-

tu fluvium. Plura de calliditate dixi alibi, pauca adhuc hîc appendam, & diversa. Simiarum duces, quando agmen aliquod nostrum transire sentiunt (nec enim pauci, ne dicam soli, audent) plebejâ multitudine variarum specierum convocatâ, procurrunt obviam, & clamoribus horrendis ex arbore in arborem transilientes, nostros, quacunque gradiuntur, infecutâ, mille scurrilitatibus & gestibus mille derident, caudatâ præsertim, finguntque sapius velle turmatim nostros impetere; sed ubi, ad arborum jam truncos demissæ, vident sagittas & sclopetas, quas expertæ sunt aliquando, aptari, ac in se dirigi, vento velocius ad arborum culmina resultant, ibi conquestibus rabidis emissis, dentibus frendent minabundæ. Tantam esse illarum dexteritatem inquirunt, ut discussas in sua corpora sagittas evitare sciant, & manu prehendere, ac si sponte porrectas acciperent: sclopetarum tamen globulos non ita disjicere didicerunt, quibus multas juniores, fortè non ita sagaces, nostri extinxere. Quando sociam vident aliquam de suo grege præcipientem ruere vulneratam, à nostrisque tolli è terra, tanto fremitu ac strepitu tonant & replent athera, ut mille leonum rugitus & tigris totidem superent runcatus. Sed unum est auditu gratissimum. Quæque simia, quando jam captant arbores ascensu suo, lapides quotquot unâ manu gestare potest, orè etiam aliquot supportat, indeque lapidibus certant in transeuntes, quando aut sagittas, aut sclopetas in eas jaculari cessant nostros. In vetulam melampo majorem, caudatam simiam, sagittarius è nostris tetendit scorpionem: expectaturam se simulavit simia; sed ubi jam dirigi oculo clauso sagittam vidit, jaculato in sagittarium lapide, faciem acriter contudit, & dentes illi dicitur confregisse. De nova tamen stratagemate poenas cercopithecus dedit: quo enim tempore lapis ad sagittarium decidebat, sagitta in simiam ascendeat. Interfectam comederunt indeliis. Comedissent & bufones, aut si quod deterius; tanta illos fames urgebat. Quod de occursum in milites fertur, occasionem puto dedisse præcis, ut simios aliquos vetusti orbis homines putarint ob simile stratagma. Hæc natalitia Cynocephalorum fabulis. Aliquando putavi & pygmarum fortasse fuisse, adeo in pluribus simulant humanos actus. Illud mirum commercii quodammodo capaces esse. Johannes Ardenois scribit, magnam familiaritatem contrahere simios cum barbaris, pro argento cum illis ludere, deinde ex lucro parato invitare ad tabernam, & solvere pretium vini numerata pecunia. Fortasse major est calliditas quam ob oculato teste accepi. Aderat inter milites Havanæ, dum luderent simius: observabat illum qui plus lucraretur, hærebatque ejus lateri donec

colludium largiretur pro more. Si nolebat, pugnis simius cædebat; si donaret statim ad tabernam convolabat, & manu acceptum vas porrigebat vendenti vinum, ut sibi infunderet. Coronato calice tunc ebibeat, mox solvebat pretium, colludio tradito, & recedebat: quod si excederet pretium colludii, expectabat ut rursus venditor infunderet merum: quod bis aut ter repetebat pro valore argenti. Josephus Acoſta alium narrat miſſum ad tabernam, non prius tradere ſolitum pecuniam, quam acciperet lagenam plenam, quam adverſus pueros tatabatur, fugans eos correptis per intervalla lapidibus: & quamvis vini avidus potor eſſet, illibatam tamen Domino referebat. Idem mulieribus fuco ornatis valde inſenſus, diſcerpebat crines & cultum. De *ferocia* illud admirandum, quod Petrus Martyr prodidit hac hiſtoria, animalia nutriti in arâ Cariai eadem, quæ jam diximus: ſed unum reperere naturæ longè diſſonæ, id eſt grandi cercopitheco par, cauda longiore procerioreque. Cauda ſuſpenſus, & robur, ter quaterve ſe devolvens, captando, ex ramo tranſiliit in ramum, & ex arbore ſeſe projecit in arborem, ac ſi volitaret. Arcuarius è noſtris unum ſagitta conſixit. Vulneratus ſeſe deſcivit cercopithecus, hoſtem vulneratorem rabidus adoritur. Striſto enſe agit in pecus venator, lacertum cercopitheco abſcidit, cepitque mancum ferociter renitentem. Ad claſſem perductus, inter homines parumper manſuetudinem induit. Dum ſic ferreis vinſctus catenis ſervatur, è littoribus adducunt aprum venatores alii (cogebat namque carniſum deſiderium nemora perluiſtrare) cercopitheco aper, & ipſe ferox oſtenditur. Setas excutit uterque. In aprum cercopithecus furibundus ſalit, cauda circumligat aprum, cum ſervato à venatore victore ſuo lacerto, guttur apri prehendit, reluſtantem ſuffocavit. Aſtuto etiam ſtratagemate ſuo uſum alium ſimio Hiſpali, quem volebant occidere: ille per domorum teſta fugax, vidit ſe à ſagittario peti. Deſcendit illico per fenestram quandam, & caſu obvium infantem ab incunabulis corripſiens, complexus eſt, iterumque ſe teſtis reſtituens quoties ſagittarium videbat, obiciebat pro clypeo infantem. Conſciuserat, non emiſſurum ſagittam cum periculo innocentis. Tantum Nierembergſius. *Differentia* Cercopithecorum ſunt variæ, ſeu magnitudinem, ſeu colorem, caudam, & alia ſpectes. Scribit Megathenes referente Æliano, in Præſiana Indorum regione vagari maximis canibus non inferiores, caudamque quinque cubitorum longam trahere. *Coloris* ratione, alii ſunt nigri, alii cinerei, cæſii, varii. Scaliger aliquos nigros cum maculis albis; alios gilvos; alios furvos; alios fulvos obſervavit. Caudam alii longiorem, alii brevior

habent. Cæterum optimè mihi in *Barbato*, *Erecto*, *Leonino*, *Moschato* & *Ambiguo* diſtingui poſſe videntur. *Barbatorum* aliquot ſunt genera. Qui *Guariba* apud Braſilienſes dicitur, caprinam & rotundam habet. Ipſe magnitudine eſt vulpis noſtratis: facie elata, oculis nigris, ſplendentibus: auribus brevibus ſubrotundis: cauda longa & verſus extremitatem nuda, quam ſemper torquet; pilis totius corporis nigris, longis, & ſplendentibus. Maximo numero in ſylvis inveniuntur, ibique horribilem clamorem excitant. Singulis diebus, inquit *Marcgravius*, ante & poſt meridiem ſemel atque iterum conveniunt. Unus eorum minor in medio & altiori loco reſidet, reliqui paulò inferius circumſident, tunc præcinit ſuperior alta voce & ſigno manu dato, reliqui omnes accinunt, tamdiu cantiones prorogantes, donec ſuperior iterum manu ſignum det, tunc omnes uno momento ſilent, & ſuperior grandi voce cantionem finit. Catulos ſuos in dorſo geſtant in ramis arborum diſcurrentes. Mordax animal, nec domari poteſt. Dantur & alii nigri ingentes, qui longam, nigram, & villoſam barbam habent. Nigritam mulierem ſi ſolam offendere, vi adaſtam ſtuprant. Quem Cluſius deſcripſit, hoc peculiare habebat, quod ejus ſatis longa cauda in floccum deſineret, leonum ritu. Guineenſis ille qui in Congo vocatur *Exquima*, pilos habet fuſcos, ſed per totum corpus quaſi aduſtos: fuſcis punctulatis albus inſpergitur. Barba, quæ egregiè alba, capillis duos digitos longis paſſis, & quaſi pexis conſtat. Iratus, os amplè diducit, & mandibulas celeriter movet. Ad hunc referri poteſt *alter* magnitudine par, qui in utraque gena, magnam copiam pilorum longorum ex albo flaveſcentium, inſtar magnæ barbæ hircinæ, utique & ad utramque aurem tenet. Crura & pedes nigri. Ludit & clamat ut alter. Ambroſinus trium icones exhibet. *Primum* Callitrichen eſſe putat, quem in alio cælo, quàm Æthiopico, vivere poſſe negat. *Alter* quoque ipſi congener eſſe videtur. *Tertius* facie eſt ſenſis, caudâ longiſſimâ nigrâ. *Erectum* nobis Geſnerus prodidit; facie, cruribus, & membro virili hominem æmulantem. Stando magis perſeverat; ideò nomen dedimus: pueros & mulieres non ſecus amat ac homines ſuæ regionis; conaturque, ſi vincula effugerit, palam cum illis concumbere. Tantæ eſt indiſtriæ; ut aliqui homines, minus ingenio valere dicantur. *Leoninorum* aliquot ſunt ſpecies. Prima eſt illa, quæ Braſilienſibus *Cagvi*, Congenſibus *Pongi* dicitur: eſtque *major* & *minor*. Major obtinet magnitudinem Cercopithecici Cay, cui & aliquomodo ſimilis eſt. Facies illi rotunda, leonina; aures nigræ & pilis nudæ: os leoni-

Marcgrav.
Hiſt. Nat.
ur. Braſil.
l. 6. c. 5.

Marcgrav.
Hiſt. Braſil.
l. 6. c. 5.

num: oculi nigri. Cauda unum pedem & quatuor digitis longa, & pilis ruffis vestita. *Major*, Leonem quoque facie refert; capite parvo, & vix pomum minus æquante; naso exiguo; oculis tenens: dentibus acutissimis; auribus subrotundis: caudâ decem digitorum longa; ex albo quasi & fusco annulata. Velocissimus est in saliando: & vescitur pane, farinâ Mandioca & aliis. Totum corpus longitudinis est sex digitorum. *Altera* est, quæ *Sagovin* dicitur, formâ, quantum ad collum, rostrum, anterioremque corporis partem, leoninæ similis: sed adeò delicata, ut navis in mari agitationem nullo modò ferre possit. Præterea, adeò superba, ut ob levissimam occasionem inediâ potius & cibi abstinentiâ, vitam finire cupiat, quam minimam molestiam perferre. Quem Nierembergius vidit & descripsit, à Roderico Lincio advectum, erat sciuo minor, & adeò delicatulus, ut villosâ pelle fovendus esset. Rostrum & capitis pars anterior, leoninam quodammodo formam referebat; fuscoque colore, cui rubedo permixta erat prædita. Aures albicantibus villis erant hirsutæ; quibus ruber color etiam admixtus: guttur & pectus longioribus villis, partim fuscis, partim albis tecta habebat: reliqui pili per corpus sparsi nigri & albi, radiati à dorso ad ventrem alternis erant dispositi: Cauda etiam, quæ longa erat, similis coloris pilis alternatim erat tecta: venter nigris pilis tectus: Crura breviores albi pili quâdam rubedine infecti tegebant. Pedes in quinque digitos, non valdè longos fissi, albis unguibus erant præditi, fortasse nullus elegantior. *Moschatus*, Brasiliensibus *Caitaja* dicitur. Pilo est longiore ex albo flavescente. Capite subrotundo; fronte haud elatâ, aut penè nullâ, naso parvo & compresso, caudâ acuatâ. Altissimâ voce clamat: & faciliè ad iram commovetur. Memini me apud Generalem Wardenburgium ex Brasilia reducem Amstelodami vidisse. Est & alia hujus species pilo magis fusco, instar Zobellinorum. Ad *Ambiguos* spectant, *Macagvo* Congensum, *Cay* Brasiliensium, & *Guineensis* alius. *Macagvo*, colore est lupi: naribus bifidibus elatis; capite urfino; natibus calvis; caudâ arcuata. Longitudo corporis à capite ad caudam, unius pedis & supra: Crassities ubi maxima, unius pedis & novem digitorum. Clamat, hah, haha. Penem habet humano similem. *Cay* apud Touvoupinam butios est frequentissimus, pusillus, & nigri coloris. Maxima ex parte in sylvis versatur, & potissimum peculiaribus arboribus insidere solet, ferentibus filiquas perinde crassas, ut nostræ majores fabæ, quarum fructu vescitur. *Guineensis* alius, pilo est ex umbra gryfco, fusca & flavo ex umbra admixto; ferè ut in dorso leporino: capite parvo, & cauda longa.

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 9. c. 44.

Marcgrav.
Hist. Brasil.
p. 227.

Marcgrav.
Hist. Brasil.
l. 6. c. 5.

Lerius Hist.
American.
c. 10.

CAPUT IV.

De Cynocephalo, Papione, & ferâ Upalim.

Cynocephalus à canino capite nomen accepit, quasi κυνὸς κεφαλή, Gesnerus Tartarinum alicubi vocat, quòd primùm ex Tartaria hoc animal advectum sit. *Ælianus* κυνοπεόσωπον dixit, quod faciem caninam habeat. Aristoteli fortè est χοιροπιθήκης, seu simia porcaria. Ejusdem fermè formæ est cujus simia caudata: at in corporaturâ, crassior, validior, & magis efferatus, faciemque caninam à natura adeptus est. Strabo faciem Satyro similem ei tribuit. Fœminis sua natura excidit, ut palam expositam extra corpus vulvam, per omnem vitam ferant. Reperiuntur in Æthiopiæ partibus, si Solino fides; in regione Arabiæ à Dira usque ad Austri cornu, & præcipuè in ultimo promontorio, si Straboni. *Ælianus* montes supra Dachinabadem ipsis tribuit; Herodotus regionem quam Aratores in Lybia versus occidentem habitant. *Cibus* ipsis idem cum simiis. Fructus testaceos dum edunt, in volucra rejiciunt. Carnibus quoque & aslis & elixis vescuntur: illis inprimis, quæ ad delicias in culina paratæ sunt. Vini potionem non recusant. *Vox* iisdem rudis & varia. Aliquando acutum strident, aliquando ululant. Orus latrare dicit. Ad *Naturam* & *Mores* Cynocephalorum pertinet, quòd faciliè ad iram effunduntur: quòd nunquam à petulantia sunt alieni, præterquam quòd, teste Plinio, simiis sint efferatiore: quòd instinctu quodam naturali ducti, *Æliano* auctore, tempore æquinoctii, singulis horis diei ac noctis mingunt, & clamorem quandam edunt: quòd denique mas in interlunio, nec comedit nec quopiam intuetur, sed faciem in terram dejicit: fœmina verò, etiam sanguinem è genitali emittit. Lunæ exorienti congratulari dicuntur. Ideò in sacris ab Ægyptiis nutriebantur, ut inde tempus Synodi luminarium scire possent. *Ingenio* quoque sunt singulari, & proximè post elephantinum ad humanum accedens. In Ægypto discunt ad quemlibet epistolas deferre. Observavit Bellonius qui nummos hero deferendos, manu prætenfa, à spectatōribus exigebant. Referri ad Cynocephalos potest, tum illud animal cujus Alvarez in Æthiopia itinere meminit; tum illud cujus Clusius. *Illud* vervecem magnitudine æquat, & instar leonis hirsutum est; gregatimque in monte secus locum Calote dictum incedit. *Hoc*, corpus villis longis cineracii coloris oblitum habebat, caudam cercopitheco brevior, rostrum longum, extimâ parte obtusum; nates glabros prorsusque depiles, & sanguineo colore refertas, ac si cutis ab illis detracta fuisset. *Pavio* Germanis *Pappon/ani-*

Nomen.

Gesner. in
Appendice
quadrup.

Descriptio.

Locus.

Cibus.

Vox.
Ælian. H.
A. l. 6. c. 48.

Ælian. H.
N. l. 6. c. 5.

Strabo
Geogr. l. 15
Bellon.
Observ.
l. 2. c. 52.

Ambrosin
Hist. Di-
git. l. 2. c. 7

Tamandua 1




Tamandua guacu 2





Ai seu Ignavus



Tatu seu Armadillo




1817



Carigueya

Aperca Cuniculi Species
Veld Ratte




Aguti vel Acuti Cunic
Bra. spe.

Cavia Cobajja Cunic.
Brasil spec




Cuniculi Indq Gesneri.

Paca Cunic. Bras. spe



Tatu Apra

Dachs



Ambrosin.
Hist. Di-
git. l. 2. c. 8.

animal est, ex descriptione Gesneri, magnum, hirsutum, horrendo capite, brevibus cruribus, cauda ferè vulpina, sed admodum brevi & plerumque erecta. Pedes sunt humanis similes, & proceritati corporis minimè respondentes. Tam est solutissimum animal, ut ad foeminarum conspectum effervescat. Vescitur pomis, pyris, & aliis arborum fructibus: aliquando panem & vinum pro potu appetunt. Foemina geminos marem nempe & foeminam unica pariturâ, ut plurimum eniti solet. *Fera Vpalim* Cercopitheci aethiopici est magnitudine. Pellis quasi cocco tincta rubet, maculis aliquot in locis conspersa. Caput instar globi rotundum. Pedes rotundi & lati, nocuis unguibus vacui. Mauri carnem assulis verberatam ut tenerior evadat, comedere solent. Quibus cibariis delectetur, ignotum.

CAPUT V.

De Ignavo.

Marcgr.
Hist. Bra-
sil. p. 221.

Clus. in
Auctar.
Exoticor.

DUas Ignavi species nobis authores prodidere. Primam Lusitani *Perillo ligo*, seu Caniculam agilem per antiphrasin vocant; aliquando *Priguiza*. Magnitudine est mediocris vulpis nostratis. *Collo* brevi, duos ad summum tres digitos longo: *Capite* parvo & subrotundo: *Ore* turbinato non amplo. *Dentes* habet instar agni, nec acutos; *nasum* glabrum, elatum, nigrum: *Oculos* parvos, nigros, somniculosos: *auriculas* nullas: *caudam* obtusam figurâ panis sacchari. *Ungues* in singulis pedibus tres, ex albo flavescerentes & deorsum incurvatos; superius arcuatos, inferius excavatos. Totum corpus prolixis & duos digitos penè longis pilis est vestitum cinereicoloris, Taxi similibus, sed mollioribus & cum albedine mistis. Animal est ignavissimum, & tardissimi incessus, adeo ut eum in vivo cum admiratione Cl. de Laet, observarit. In arboribus lentissimè rependo progreditur, ibique habitat, foliis arborum vescens. Nunquam bibit. Vocem iiii rarissimè edit. Arctissimè quæ semel unguibus apprehendit, tenet. Pluviam etiam levem metuit. In dissecta foemella observatum; cor motum suum, corpore avulsum, per semihorium retinuisse: placentam uterinam constituisse multis particulis carneis, instar substantiæ renum, rubicundis, magnitudinis variæ instar fabarum: in quas per multos ramulos vasa umbilicalia inserta erant. Fatum, pilos, dentes, ungues habuisse. Cor foemellæ, inquit Marcgravius, duos insignes habebat auriculas, cavas. In ventriculo os superius duos digitos transversos à pyloro: eratque in altera parte ventriculi, ubi superius aliàs communiter os esse solet, processus instar intestini spithamæ longitudine, sed nullum exitum habens. In ventriculo planè viridis materia foliorum

arboris comestorum inveniebatur. Papillas duas in pectore. Corium solidissimum & tenax. Animal, addit idem, sine dubio vivax. Intestinis enim omnibus exemptis adhuc se movebat, & pedes contrahebat. Icon quam adjicimus, paulo longius collum exhibere, De Laetius, qui vivum vidit, testatur. Addunt quidam tanta pertinacia adhærescere, ut, nisi mortuus non avellatur. Hernandus unius diei spacio vix quinquaginta passus pertransire posse dixit: Nocte duntaxat sonitum edere, posterioribus syllabis sensim magis ac magis gracilescentibus: & in arboribus viginti aliquando dies nullo cibo assumpto commorari: obtuso denique visu præditum esse, addidit. *Alterâ* species, quæ Lerio *Hay* dicitur, simiæ habet faciem, cutem hispidam & villosam, crura hirsuta, ternos in singulis pedibus acutos & oblongos ungues. Capta sine difficultate cicuratur.

Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 15.

CAPUT VI.

De Taxo.

TAXUS nullum proprium apud Græcos nomen habet. Latinis dicitur etiam *Daxus*, ut Alberto, fortè à Græco *δαυς* hirsutus & villosus; *Meles* seu *Melis*; *Melus*, ut Bartholomæo Anglico; *Melo* & *Melotus*, ut Isidoro; seu propter membrorum rotunditatem seu propter aliud quid. Est animal fele majus, & vulpe, ad cujus naturam accedit, humilior, pelle villosa, rigidâ, coloris leucophæi. *Pilos* plures habet albos quàm nigros. *Caput* in medio nigrum, in lateribus album: *Dorsum* latum: *dentes* acutissimos. *Crura* sinistri lateris ipsi quidam breviora assignant, sed experientiâ reclamante. Reperiuntur passim, in locis montanis Italiæ, Helvetiæ, & aliis. *Vivunt* crabronibus & vermiculis; pomis & uvis, quorum esu autumno potissimum pinguescunt. Cuniculorum tamen carne apprimè delectantur, tum anseribus, pullis & aliis avibus. Foetus more vulpium in utero gerunt, & cum luna ternos orbes compleverit, pariunt. Adventante autumno quandoque duos, interdum tres enituntur. Summa taxis cum vulpibus antipathia. Hi enim ubi egressos observavere, latibula eorum excrementis conspurcant, & foetore replent, ut alia exstruere cogantur. De *Natura* & *Moribus* habe, Pellem adeo densam gerere, ut ictui resistat: Nasum tam imbecillum, ut violato, moriatur. Ideo fortè Plinius, has bestias distenta & sufflata cute moribus canum & ictibus hominum reluctari scripsit. A canibus aut aliis feris vexatus semetipsum resupinat, atque dentibus & pedibus repugnat. Brevitatis pedum conscius non longè à latibulo digreditur. Urgente bruma occultatur, & somno pinguescit. Ad focum hyeme allatus, in carbonibus se conjicit, ut Carolus Stephanus obser-

Ambros.
Hist. Digi-
tat. l. 2. c. 11.

Descriptio.

Locus.

Cibus.

Generatio.

Antipathia.

Natura & Mores.

Plin. H. N. l. 8. c. 28.

vavit. Crescente lunâ adipem ejus augeri, decrefcente minui, interlunio eâdem destitui, incertum. Morsus ejus exitialis, quod crabronibus & aliis venenatis viçtitet. *Ingenium* in quibusdam ostendunt. Dum latibula effingunt, ignavum effossæ terræ vectorem constituunt, & postquam supra supinum extensis cruribus terram accumulavere, per pedes mordicus apprehensos, extra antrum educunt; idque toties repetunt, donec latebræ latitudo habitatoribus sufficere possit. Tantam palcarum & foliorum prosternendo sibi lecto, unica vice, capite & pedibus intra foveam ducunt, quantum homo sub brachio deferre non posset. Latibula cum duobus ostiis fabricant. Flante Austro septentrionale aperiunt; flante Boreâ, australe. Viçtum pro hyeme colligunt; quâ durante, dum mas an ad vernum tempus sit duraturus dubitat, ne fœmina ad satietatem comedat prohibet. Quando in senio excœcantur, tunc ex fovea ad pastum non egrediuntur, sed se invicem nutriunt. Dum in eminentiori colle deprehenfi venatores sentiunt, pedes anteriores supra capitaponunt, corporeque in globum redacto, more urforum, sese præcipitant. In Italia, Germania, & aliis regionibus, habentur Taxorum carnes in deliciis, inprimis si autumnocapti fuerint. Apud Helvetios cum pyris coquuntur. Savanorola porco sylvestri assimilât; Platina carni hystricum. Quantum ad *Medicinam*, adeps taxi per clysterem infusus, dolores nephriticos mitigat; mammarum scissuris prodest, in compositionibus arthriticis adhibetur. In membris contractis oleum commendatur, cujus parandirationem Veckerus docet. Sanguis siccatus lepræ medetur, si Carolo Bobuillo credimus. In peste cum sale & cornibus animalium destillatus offertur. Lonicerus diebus tantum canicularibus destillat, & drachmas duas præscribit. Gesnerus compositionem quæ recipit sanguinem taxi, terram Armenam, Crocum, & tormentillam, fœvissimâ peste, feliciter adhibitam, se legisse scribit. Cinis suppressendo sanguini inservit. Nihil de cerebro, testiculis, & dente vel pede sinistro, quem brachio subligatum memoriam juvare, Albertus prodit, dicam. Expellibus Taxorum olim quoddam genus vestis texebatur, quæ ab humeris usque ad lumbos pendeat. Ex iisdem canum collaria conficiuntur. *Differentias* si attendas, Olus *Domesticorum*, qui ludicri, & *sylvestrium*, quorum setæ rigidæ, mentionem facit. Communiter in *Caninos* & *Porcinos* distinguuntur. Ambas in agro Matifconensi se accepisse, affirmat Brujerinus. *Canini* rictu sunt canino; latibula in locis fabulosos fodiant, & quidem sine multis cuniculis; & cadaveribus, illisque cibis, qui canibus in deliciis vescuntur. *Porcinos* Carolus Ste-

phanus subalbidus & caninis majores facit; & circa ostium cavernæ, parvâ prius rostro excavata fovea, excrementa deponere scribit. Addit Gesnerus, radicibus, fructibus, & omnibus quæ fues appetunt, vesci. In regione Americana quoddam animal vagatur nomine *Heyrat*, quod bestiam mellis avidissimam significat. Colore est castaneo, magnitudine Cat. Quotidiè apum opificium inquirens, in arboribus versatur. Potest ad Taxum referri: *Quaupecotli*, & *Tzcuintecuan*. Illud, animal est duos plus minus dodrantes longum; rostro prolixo, tenui: versus superna contorto, prolixâ item cauda, pilo longo, circa alvum candente, cætera fusco aut atro, candentique, sed circa dorsum nigriore, atris pedibus & incurvis unguibus. Mitescit facile, vorax est; nullis escis oblaris parcat; placidum est item, ac mille modis blandiens, sed ignotis noxium. Reperitur in nova Hispania, & gaudet montibus. *Tzcuintecuan*, seu Cynodeticus, est huic congener, non solum magnitudine & moribus, sed etiam rostro, quod prælongum est ac tenue, & pedibus. Color albus est, maculis nigris ac magnis distinctus. Nomen habet à mordendo. Vivit non longè à mari Australi. Hisce congener est *Tlacoyotl*, animal pilosum, duas spithamas longum, unguibus melis, cruribus brevibus, nigro vestitis pilo, brevissimâ cauda. Caput habet parvum, rostrum tenue & longiusculum, caninos exertos, corpus albū in fulvum vergens, sed dorso ac superna capitis parte & colli nigris, lineaque distinctis candenti. Viçtus eadem ratio, quæ quanperotli.

CAPUT VII.

De Castore.

Castor, Græcis κάστωρ, nomen δὲ τοῦ ἑρῶς; id est à ventre invenit, *καποράσειον γὰρ τὸ ζῷον, ὃ χρεδὸν ἔλθον καί λια*: quod ferè totum hoc animal venter sit. Ridiculi, qui à castrando deducunt, quasi venatoribus visis, conscius se propter testiculos peti, eosdem dentibus evellat, & abjiciat. Parvos enim habet & spinæ adhærentes, qui superflite ipso, avelli non possunt. Dicitur & *Fiber*, non tam quod circa extremas fluminum ripas assidue versetur, & fibrum antiqui extremum dixerint: quàm ab Æobeo φιβρὸς mollis, quod molles pilos habeat. Lutram ab iisdem extremis fluminum oris dici, quæ Priscis, lytræ, falsum. Diversa enim sunt animalia. Bellonio est Aristotelis *Latax*, sed falsò. Distinguuntur enim. An Orchia dici possit, non decido. Quidam Semipiscem ob vitam amphibiam dixere. Colore est ex albo cinereo in dorso nigricante: pilo quam Taxi subtiliore, qui quo nigrior, eo pellis preciosior. *Dentes* habet acutissimos, quibus ligna fecat, anteriores rubidos.

Pedes

Olaus Magnus l. 18. c. 18.

Wfus.
Bruyerde
Recibaria
l. 13. c. 3.

Vecker. l. 2. Antid. Special.

Differentia.

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 9. c. 43.

Nieremb.
l. 9. c. 77.

Nieremb.
l. c. c. 73.

Nomen.
Ambrosin.
Hist. Dig.
lit. l. 2. c. 13.

Salmaf. in
Solin.

Descriptio.

Pedes priores caninis similes, posteriores propter membranam interjectam anserinis quibus innatando utitur, utrosque quinque digitis constantes. *Caudam* piscium similem fecit Plinius. Secundum eundem, in maiore, sesquipedalis est, fenos digitos lata, duos crassa, quatuor interdum librarum pondo, ad margines in tenuitatem desinens; membranâ glabrâ & lividâ contexta, super quam lineæ quædam, squamas piscium mentientes, incredibili artificio depictæ sunt. In inguinibus geminos habet tumores ori anserini magnitudine, utrinque unum, membranâ sua conclusum. Inter hos pudendum residet. Tumores hi, folliculi sunt membrana contexti, in quorum medio meatus, ex quibus liquor pinguis & cerosus exsudat, quo, admotō ore deterſo, corporis quos contingere potest partes, velut oleo oblinīt, non aliter ac aves quedam, quibus supra podicem vesicula est, liquorem pinguem & olei æmulum continens, eundem rostrō exhauriunt, & penas perungunt, ne sub dio morantes, mader fieri possint. Testes non esse, vel exinde colligere licet, quod nullus ab his conspiciatur meatus. *Partes* internas suspecemus, lingua, corde, ventriculo, intestinis, & hepate in quinque lobos diviso, porco potius quàm alteri animali similis est. *Fel* sub minoribus jecoris lobis latitat. *Splen* parvus pro magnitudine corporis judicatur. *Renēs* magni tanquam vituli anniculi, & copiosa pinguedine obducti. *Vesica* suillæ similis. *Testes* parvi & spinæ adhærescentes. *Fœmina*, observante Matthiolo, unico tantum meatu, & parit, & egerit, & mingit, uteri & vesicæ cervicibus illuc concurrentibus. In secto Castoreo, comperit Gesnerus, substantiam in folliculo flavam, solidam, ceræ similem, acrem & minimè terream. Ipsum unius libræ pondere fuit. Comperit & genitale, quod unico ossiculo constabat. Invenit in utroque tumore & aliū folliculum, substantiam melleam & foetidam putrescentis casei instar, continentem. Habetur & in fœminis, sed adeo exiguum, ut vix unciam ponderet. In quo Bellonius calculos ovi magnitudine invenit, adulteratum sine dubio erat. Reperiuntur Castores, apud Burgundiones circa Matronam fluvium; Sequanos in agro Cabillonensi, Lotharingos, Austrios, circa Danubium ubi Biferi nominantur, in Helvetia, circa Arulam, Rusam, & Lomagum fluvium. In Polonia quoque, Russia, Prussia, & Italia, ubi potissimum Padus in mare se exonerat. Denique circa fluvios Ponti, unde optimum castoreum venit, & in Hispania. Aquas septentrionales potius quàm Rheni, Danubii, & alios qui continuo navigiorum decursu sollicitantur, frequentare, Olaus Magnus auctor est. Ubicunque autem degit, amphibium est animal. Ideo vicinas littoribus cavernas ponit. Vescitur foliis arbor. Corti-

cibus item almi, populi & aliorum. Salices tamen platyphilli maximè, ob summam amaritiam appetit. Piscibus vesci Albertus falsò prodidit. Nam Pelicerius Episcopus Monspelienſis frequenter vivos & mortuos apponebat, quos tamen nec olfacere quidem voluerunt. Ineunte æstate, quo tempore Delphini constellatio unâ cum sagittario occidit, in libidinem solvuntur. Tempus parituræ finis autumnus est, quo folia delabi solent. *Vocem* Julius Pomponius cum per Onomatopæiam exprimere non posset, scriptis mandavit, vagitum infantis apprimè representare. *Naturam* & *Mores* sequentia testantur. Non prius mordere desinunt, quàm fragorem ossium audiverint. Quando domi aluntur, tantus ipsis pudor, ut nec stercore nec urinâ domum inquinent: si non patet egressus, querulantur. Tanto amore foetum prosequuntur, ut quædam, portis & clavis evulsis, ex exalto se præcipitem dederit, quod ab Episcopo Monspelienſi Pelicerio proditum. Pedibus anterioribus tanquam manibus ori cibum admovent. Alvo, propter arborum cortices quibus vescuntur stipata, seu quod parum fellis ad intestina confluat, partes posteriores sæpe in aqua mader faciunt. De avulsione testium, dum venatores fugit, quod dicitur, falsum est; nataque inde opinio, quod eas tam astute occultet. *Ingenium* singulare habere, observatio dedit. Nam cum ligna ad exstruenda habitacula convehunt, super senes resupinatos eadem artificiosè inter crura componunt, eosdemque arreptis caudis ad destinatum locum trahunt. Senibus dorsum mirum in modum glabrescit. Illi qui Scythiis *servi* dicuntur, poma legunt, & cortices cadunt; alii supra duorum junctorum dorsum, crate ex bacillis composita, poma & cortices superimponunt. Iidem nigris, qui & *Domini* vocantur captis, luctum & gressu & facie indicant. Ligna cæsuri, semper eadem semita à fluvio ad arborem gradiuntur, arboremque non prius relinquunt quàm totam dentibus dissecuerint, & propè casuram, ne opprimantur, singulis ictibus suspiciunt. *Ædificia* denique, quandoque, in loco altiori, aliquando in de cliviori, prout amnis undare solet, construunt. Mutant ea pridè quàm fluminis aqua augeatur. Carnes non sunt insuavis gustu, si omnem virositatem apparatu deponere. Partes anteriores de calore participant, posteriores, teste Matthiolo, tanta scatent frigiditate, ut ad instar testudinum terrestrium, jejunii tempore admittantur. Cauda apud Lotharingos in deliciis est, & saporem murænæ benè præparatæ refert. Aſſatur à quibusdam, & pauco zingibere conspergitur. Gesnerus saporem carniū thunni vel anguillæ præ se ferre scribit. In *Medicina*, Castorei, fellis, coaguli, urinæ, caudæ & pellis usus est. *Castoreum*, quod

Generatio.

Natura & Mores.

Ælian. H. A. l. 13. c. 47.

Vfus.

Plin. H. N. l. 8. c. 30.

Bell. H. H. Aquat.

Locus. Scalig. Exerc. 215. Deijer. Rei Cibaræ. 18. c. 4.

Cibus.

secundum Dioscoridem, multis naturalibus tunicis circumdatum, liquore intus velut ceroso, gustu acri, & odore gravi, eligendum est; quod ab animali in vigore ætatis constituto, extrahendum est, & extractum, cum melleo liquore, in tunicis contento, exsiccandum; quod denique ad septennium vires obtinet; in morbo comitiali, lethargo, in aceto acerrimo cum ruta decoctum; vertigine, si eo cum semine viticis, ex oleo rosaceo, vertex perungatur; oblivione chronicos morbos insequente prodest. Cum ammoniac & aceto mulso asthmaticis opitulatur. Singultuosus à plenitudine vehementer succurrit. Colicam affectionem sedat. Gonorrhœam, in succo viticis & aceto decoctum, cataplasmatibus instar pectini & genitalibus applicatum, sistit. Adjuvandam conceptionem suffimenti ex eo genus, Rondeletius commendat. Omnes uterinos affectus à frigidis causis procedentes, inprimis suffocationem, compescit. Puerperii excrementa purgat. Opium optimè corrigit. Plurimâ denique medicamenta, aquas nempe, pilulas, extracta, olea, unguenta, cerata ingreditur. *Fel* venerem stimulat. *Coagulum* in morbo comitiali incredibili adjuvamento esse solet. *Vrina* contra venena datur. *Cauda* intestinorum vulneribus medetur. *Cinis pellis* cum pice liquida combustæ, succo porri mollitus, sanguinem undiquaque manantem, excellenter supprimit. Eadem paralytici utiliter vestiuntur. *Dentes* de collo suspenduntur, tanquam amuletum contra casum. *Pinguedine* pisces inescantur. Ex pilis mollioribus galeri & tibialia fiunt. Ex pellibus apud Gelonos populos rhenones. Circa Differentiam nihil planè occurrit. Scythæ in *Nigros, rufescentes*, & ex utrisque mixtos distinguunt; illos *Dominos*, hos *servos* appellant.

Differen-
tia.

CAPUT VIII.

De Lutra.

Lutra, quæ & *Lytra* Varroni, vel *ῥοτό* & *λύειν* seu solvendo, quod arborum radices ad fluminum ripas sitarum dissolvat, vel *ῥοτό* & *λύειν*, à lavando, quod piscem in aquis investigando, frequenter se in aqua abluat, nomen sortita est. Græcis vocatur *ἐνυδρεας*, ab aqua, quod in eadem degat; Aeolibus *ἐλύδρεας*, unde fortè Lutra. Suidas cum ea *ἰέτιμ* confundit. Sylvaticus Hydrion perperam vocavit. Gaza Lutria vertit. Aëtio est *κύων ποταμίου*, canis fluviatilis, quod canis instar prædam in aquis requirat. Corpore est quàm Castor graciliore & longiore, capite canino, dentibus instar canis venatici; formâ oris quadrata, unde *πλεγμανοπέσων*, dicitur, auribus Castoris, cauda oblonga, terete, & in fastigium desinente, vulpinis cruribus, paulò tamen crassiori-

Ambros.
Hist. Dig-
it. l. 12.
c. 13.
Nomen.

Suidas l. 37.

Descriptio.

bus, pedibus posterioribus planis & membrana communitis, pelle denique minus quàm Castoris spissa, frequenti & brevi pilo conspersa, nonnihil ad castaneæ colorem accedens. Reperiuntur passim in Europa. Sed & in America haud parva ipsorum copia; in Canada inprimis. Maximè verò circa fluentia & lacus degunt, & quia cavernas quoque sibi effodiunt, inter amphibia reponuntur. Brasavolus copiosiores in agro Neapolitano stabulari prodidit. Vescuntur piscibus, quorum tantam copiam interdum in cavernas deferunt, ut aëris infectio metui possit. Vescuntur & mollibus herbarum cuminumibus, fructibus arborum & corticibus. Agricola hyberno tempore ad pastum egredi scribit. Ad *Naturam, mores & ingenium* referri debet, quod in urinando aërem per intervalla exortis naribus hauriunt, ne suffocentur: quod in antro veluti tabulatum ex ramis & virgis construunt, super quo, ne madeant noctu cubare solent: & quod per aliquot milliaria ex aquæ rivulo piscinæ ordorem excipiunt. Facilius etiam auram secundo flumine hauriunt. Jejuna cursum amnis superant: saturata cum aquæ fluxu delabuntur. Piscinam ingressæ mirâ agilitate meliores pisces aggrediuntur, & in omnes quamvis devorare non possint, sæviunt. Facile cicurantur, & ad certum signum in aquas ad pisces capiendos se conjicere edocentur. In Suecia, ad coqui nutum pisces ex piscina in culinam deferunt. Carnes in Germania & Gallia à rusticis comeduntur, sed sunt crassæ lentæ & pituitosæ. Gesnerus etiam Carthusianis concedi scripsit. In Medicina præstat suum usum. Nam *adepts* medicamentis digerentibus infarctæ & exarsata ad tollenda articulorum vitia, teste Hollerio, perutilis est. *Sanguis*, si Ælianum sequimur, cum aqua & aceto mixtus, nervis humanis intumescens conductit. *Testes* in morbo comitiali à quibusdam laudantur, castoreo tamen minus sunt efficaces. *Iecur* in furno tostum ad dysenteriae suppressionem commendatur. Sedilia ex *pellibus* hæmorrhoides levant. Pelles ipsæ paralyti, vertigini, & capitis dolori conducunt. Calceamenta ex iisdem dolores pedum mitigant. Ex iisdem apud nos chirothecæ villosæ ad aëris injuriam coercendam consiuntur. Nec non ex pelle integra, cum capite, pedibus & cauda semimanicæ hyemales fiunt. Circa *Differentias* nihil ferè occurrit. Congeneres videntur Lutræ, *Saricoume*, & *Carygueibeju*, animalia Americana. *Saricoume*, non excedit magnitudinem felis, pilo est molli, leucophæi coloris: pedes membranis quibusdam fulciuntur. Amphibia est. *Carygueibeju*, aliàs *Iya*, est magnitudine canis mediocris, capite obrotundo quasi felino sed acutiori, auribus obrotundis, & quæ inferius sitæ sunt, cruri-

Locus.

Gibus.

Bellon. A-
quatil. l. 2.

Natura &
Ingenium.

Scaliger.
Exerc. 215.

Vfus.

Bruijnde
re cibatur.
l. 13. c. 35.

Ambros.
Hist. Dig-
it. l. 2. c. 13.

Marogr.
Hist. Bra-
sil. l. 6. c. 9.

Sciurus Getulus

Mus alpinus Marmota
Murmel thier



Glis Aldr.

Mus Indic,



Ichneumon s. lutra
Aegypti.





Lutra Otter



Vitulus Marinus
Zee Kalb



Castor Fiber
Biber




Lonx Lonza

Hystrix Dorn schwein Stachel schwein



Herinaceus Igel Seewin Igel





bus & pedibus Cercopithecorum more. Quinque digitos quilibet habet, quorum interior brevior reliquis. Pilistegitur ad tactum mollibus haud longis. Totum animal atri est coloris excepto capite, quod obscure fuscum. In gutture maculam habet flavam. Vivit gammatis, piscibus, & farinâ Mandiocæ in aqua madefacta. De *Su* quod Ambrosinus ad Lutram redegit, alibi agemus.

CAPUT IX.

De Ichneumone.

Ichneumoni nomen ab *ἰχθυόεν*, investigando, quod noxia diligenter investigans, alimenta à venenis optimè distinguere valeat, impositum est. Albertus *suillum* appellat, quod pilis suillis induatur, & perperam *ibin*, & Anschycamum. An Avicenna Thyamonem dixerit, ignoro. Manardus Alcasim vocatum putat. Græcis est *ὤμα*, porculus, seu suillius, quod more suis rostrum dum investigat, semper in terra habeat. Hodie teste Bellonio, *Mus Pharaonis*, seu Ægypti vocatur. Ælianus, *murem Indicum* dixit. Alii *Lutram Ægypti*. Magnitudine est felis, sed longior, pilis instar pili lupini duris, albicantibus seu subflavis per intervalla, & leucophæis. *Rostrum* habet nigrum, suillum, *auriculas* breves & rotundas: *crura* nigra, quinque in pedibus posterioribus *digitos*, quorum postremus ab interiori parte perbrevis est. *Caudam* longam, & circa lumbos crassam. *Testes*, linguam, dentes, felis instar. Meatum denique extra foramen excrementi per amplum, undique pilis cinctum, pudendo muliebri non dissimilem, quem, magno urgente æstu, loco excrementi interim clauso, aperire solet. Hinc scriptores omnes indiscriminatim Ichneumones & mares & foeminas esse arbitrati sunt. Sola Ichneumonem Ægyptus proferre creditur. Ideo Ichneumonem Ægypti vocavit Aristoteles. Haberi tamen & ex altera parte montis Atlantis, ad Nili capita, Vitruvius prodidit. Amphibium est animal, & ad Niloticas ripas commoratur. Vescuntur muribus, serpentibus, limacibus, lacertis, chamæleonte, ranis, & aliis hujus generis. Aves, & imprimis gallinas vehementer appetunt. Hepate Crocodilorum delectari, & ideo in dormientium ventrem irrepere, communiter proditur. Ideo etiam singulariter inter Ichneumonem & Crocodilum antipathia esse creditur, cujus ova in littore inventa frangit, Ægyptiorum, ne tot Crocodili nascantur, bono. Adversatur etiam aspidi, & omni serpentum generi. Ventum maximè abominatur. Ideo eo flante gradum ad latibula accelerat. Mures & serpentes, more felium & mustelarum depopulari, (ideo in Ægypto cicurantur,) assidue collusionibus gaudere, ne frigore lada-

tur, caput inter genitalia abdere, & Echini terrestris instar, in pilam se contorquere; conspecto aliquo animali pilos erigere, & magno etiam se cani opponere, selemque tribus dentium ictibus strangulare, omne animantium genus, equos etiam & camelos adoriri; tot numero foetus quot canes eniti, ad *Naturam* & *mores* spectat. Quæ de utroque sexu apud Ælium extant; & quomodo victi muliebri pati necesse habeant, fabulosa sunt. *Ingenium* multa testantur. Prædaturus se in posteriores pedes erigit: prædam verò conspiciens, tranquillo per humum tractu se promovet, & tandem magno impetu adoritur. Hostes suos, nunquam nisi advocatis fociis aggreditur. Contra aspidem dimicaturus, in luto prius volutatus, in sole apricatur, donec quasi lorice munimentum acquirat: si lutum desit, aquâ madefactus, in pulvere se volutat. Gnarus teneras sibi nares, solo caudæ flexu in acerrimâ dimicatione eas tuetur. Inservit & in Medicina. *Lotium* cum vaccæ nigræ lacte propinatur contra dolorem colicum. *Cinis* pellis combustæ in aceto maceratus adversus serpentum ictus facit, si eo homines illinantur. *Pilorum* suffumigatio, contra lumbricos facit.

CAPUT X.

De Mustelis.

ARTICULUS I.

De *Mustela vulgari*.

Mustelarum duo summa genera inveniuntur. Sunt aliæ *vulgares*, aliæ *sylvestres*. Hic de prioribus agemus. Nominis originem quidam à mure & telo deducunt, ut sit quasi mus longus. Telum à longitudine dictum, omnium ferè Lexicographorum placitum est. Alii à mure & *πίλε* quod est longè. Figulus à *μῦς* & *πῆλα* surripio, quod mures à cavernis ad se trahat. Græcis antiquis dicitur *μῦς* & in prosa *μῦς* & *πῆλα* à lacte vel candore, quod hoc animal vel secundum se totum vel secundum partem candidum sit: quibusdam *κερδω*, quod vulpi ob astutiam convenire superius diximus: recentioribus *νυμφίτζα*. Circa *Descriptionem* nihil singulare occurrit. Vulgaris ista in lateribus & dorso est rutila, raro subflava, circa guttur semper alba. Corpus ei tenue, cauda brevis Albertus de candida scribens dicit, Ermineum esse animal candidum, figuræ mustelarum, & in extremitate caudæ nigerrimum. *Dentes* habet minores quàm mures, *cor* parvum, sed in comparatione ad alia animantia satis magnum. Inveniuntur passim: sed albæ, in regionibus septentrionalibus imprimis. In Mauritania sunt prægrandes. In territorio Tartesi urbibus extra Herculis columnas maximæ, ut Suidas auctor est. In Java loca sylvestria incolunt. In Porde felene insula limites non transeunt.

In Bœotiam delatæ aut pereunt, aut statim aufugiunt. In cavernis, petrarum fissuris, fœnilibus, & stabulis habitant. Est ex animalibus *μῆστρον*. Vescitur ut plurimum muribus, & talpis. Non abhorret à serpentibus. *Vilus.*

Insihiatur vespertilionib. In columbariis ova absorbet, & avium interemptorum sanguinem fugit. Defunctos invadit, & eorum oculos effodit. Lepores denique invadit. *Plin. H. N. l. 29. c. 4. Alian. H. A. l. 1. c. 12. c. 22.*

Generatio. Vifa quæ eum ore tenebat. Ore parere vulgaris fabula est, ex illa quæ de Galanthide Alcmenæ ancilla in mustelam à Junone conversa, conficta. Uterum habere certissimum est.

Antipathia. *Antipathiam* cum corvo & cornice gerit, quod harum avium ova absorbeat. Gallinæ auditâ mustelarum voce ferè exanimantur. *Arist. H. A. l. 9. c. 1.*

Natura. Cum catis decertat. Cum serpentibus congregitur, ramo rutæ vel soncho munita. his destituta, opprimitur. Ad *Naturam* & *Ingenium* spectat, quod earum finis, si per agros & sylvas liberam vitam agunt, moschum redoleat: quod ratione ætatis varium colorem induant: catulis visum deperditum herba quadam restituant: faciliè cificentur, inprimis si dentes allio confricaveris: majora etiam animalia adorianur: Caveas duabus foraminibus munitas exstruant, quorum alterum Septentrionem, alterum Austrum versus obvertitur: fœtus spacio unius diei in diversa loca transferant: cum serpentibus denique nonnisi ruta vel soncho munitæ congregiantur. Quia in rabiem concitatur morsus ejus lethalis est. Ideo & vaccarum ubera, si ea attigerit, inflammatione corripiuntur. Oleum in quo mustela computruit, remedio est: vel si locus affectus pelle ejusdem sicca confricetur. *Aristides* Locrensis ejus morsu periit. Mexicani eas in *Cibis* adhibent. Galenus sale conspersas & exsiccatas, carnibus leporinis respondere scripsit. Quantum ad *Medicinam*, *Cerebrum* exsiccatum adfert haud parvam Epileptici utilitatem, teste Galeno. *Ventriculus* coriandro impletus demorsis à serpentibus auxiliatur, apud Dioscoridem. *Pulmo* in pulmonis affectionibus efficax est. *Iecur* vertigini & epilepsiæ prodest. Quia decrescente luna minui dicitur, crescente augeri, Epilepticos quoque, teste Glyca, juvat. *Fel* contra omnia venesicia salutare deprædicat Plinius. Matthiolus eodem cum succo fœniculi mixto, in auferendis oculorum nubes, & in cute emaculandâ utebatur. *Virga* exsiccata singulare est stranguriâ laborantibus remedium. *Testiculi* & *Uterus*, more lapidis aëtitis, fœtum in utero cohibere dicuntur. *Sanguinem* cum succo Arnoglossæ in mitigando podagræ dolore extollit Lonicerus. Galenus parotidibus eundem illinit. *Fimum* melle exceptum & cum farina lupinorum vel fœnu græci mixtum, ad strumas discutiendas magnificat Matthiolus. Est & *tota* in usu. Dioscorides sale inveteratam,

detractis intestinis, contra venenatorum morsus commendat. Pulverem exsiccata in morbo comitiali adhibuit Galenus. Matthiolus crematâ cinere aqua subacta & illito vehementes capitis dolores mulcet, & oculis caligantibus injecto, suffusiones emendat. Marcellus ad catarrhum in fauces descendentem, eandem die Jovis, Luna decrescente, in olla rudi, ita cremat, ut in pulverem redigi possit, quem cum melle mixtum patientibus exhibet. De *Uso in Variis*, consule Ambrosinum. Apud Portam legimus, semina rosæ cum seminibus sinapi, & pede mustelæ intra ramos arboris infœcundæ suspensa, eandem in fœtus resolvere. Gesnerus tradit equum à subito & pernicioso morbo, *Tach* Germanis dicto correptum, portione pellis Mustelina exhibita, à veterinariis liberari. Quidam semina cineribus mustelæ permixta per agros spargentes mures à segetibus abigunt. Alii in copiosa aqua fervefaciunt, & decoctionem postea ad fugandos mures à campis feliciter adhibent. Circa *Differentias* variant authores. Plinius appellatione Mustelarum & Ictida & Galen complexus, duas species constituerebat, alteram in domum tectis errabundam & domesticam, alteram in agris & nemoribus versantem & sylvaticam cognominabat. Carolus Figulus, vulgaris duas species ponit, alteram totam albam, *Hermellani*, alteram secundum pectus & ventrem, *Viselam* dictam. Ad easdem referuntur sequentia. *Rosola* Alberti seu *Guifela* cujus excrementum odoriferum est. *Quadrupes digitatum* variis maculis insignitum & Salamandra dictum, fortè quod ob colorum varietatem Salamandræ ex genere lacertorum assimiletur. *Gwella* muris, genus in Austria, magnitudine mustellæ. Pelliones Itali nigri rutilique coloris pellem parvam ex regionibus frigidis delatam ostendunt, hancque Rosoleum vel Romulum nuncupant. Alii *Chiurcam* inter mustelas connumerant. Georgius Agricola in genere Mustelarum *Vormele* animantis Viverræ seu Eurone minoris meminit, & Cardanus *Lardiromi*. Idem Genettam quandam mustelam esse statuit. *Chiurcam* verò ita Scaliger describit. Viverræ inquit, est facie & magnitudine, capite vulpino, sub terra habitat, Fœcundissima est, duodenos parit exiguos. Cauda eitenus pænè glabra. Ipsa pilo atro. Catulos in bursa sub alvo obtenfa secum fert. Est & *Africana mustela*, quæ apud Clusium ita describitur. Erat, inquit, hoc animalculum majoris muris seu gliris non prorsus adulti magnitudine, corporis forma mustelam & sciurum quodammodo referens. Nam capite & cauda longis pilis prædita sciurum æmulabatur: illam quidem attollens, minime tamen supra caput retorquens ut ille, sed in altum nonnunquam valde explicans.

Porta Phytogn. l. 6. c. 4.

Differentia

Figul. in Dialogo de Mustela.

Nieremb. H. E. l. 9. c. 32.

Co-

Mustela *Wiesel*



Putorius *Iltis*

Martes *Marter*



Martes

Porcellus *Indicus*
alius

Taxus *suilla*



Kystrix



Comedens clunibus sciuri instar infidebat, anterioribus pedibus cibum tenens & versans. In utraque mandibula binis longioribus dentibus in anteriore rictus parte erat præditum: aures ferè orbiculares habebat, & pilorum colorem varium à spadiceo, fusco, & albo, singulis coloribus à capite ad caudam, secundum corporis longitudinem virgatim & radiatim excurrentibus. Summa venustas erat in cauda, similibus coloribus etiam virgatim distinctâ, cum ut dicebam, illam interdum valdè explicaret pavonis caudæ pænè instar. Pedes in quinque digitoserant divisi, quaternos antrosum spectantes, eorumque binos medios longiores, quintum autem brevem calcari non dissimilem retrosum spectantem. Omni cibo ipsi objecto indifferenter vesci intelligebam, præsertim verò pane delectari: ferox non esse sed facile cicurari & domesticum fieri, ut liberè nullo vinculo adstrictum, quo vellet vagari, permitti posset. In navi qua vehebantur, tam cicura hæc animalia evasere, ut nautarum sinum & caligas subirent. Nierembergus Mustelam Lybicam vocat.

ARTICULUS II.

De *Mustela sylvestri* &
Putorio.

MUSTELA sylvestris, quibusdam, Furo, Furus & Furunculus seu Furectus, seu quòd more furis noctu surripiat; seu à fureo, id est, obscuro colore, quòd subterraneos meatus & cuniculos ingrediatur & effodiat, dicitur: aliis Viverra, quòd vi verruncet, id est animantes à cuniculis expellat. Græcis est *ιντις*, & per aphæresin *ντις*, fortè *ντις* & *ιντις* ab ave hujus nominis cujus colorem pilusejus æmulatur. Grapaldus pholitam vocat, Gesnerus pholeutam, & rectè, legit. *φωλεα* apud Græcos lustrum est. Author de natura rerum, colorem ei esse inter album & buxum medium, ventre albo, oculis rubicundis, mustelâ domestica majorem. Aristoteles corporaturæ catelli Melitenfis facit, in pilo verò, formâ, albedine partis inferioris, multum à Mustela vulgari discretam. In Italia, Gallia, & Germania non reperiri Gesnerus prodidit. In Africa tantum esse, Strabo. In Anglia haberi multi perhibent. *Viſſitat* melle, piscibus, columbis, & carne cuniculorum, quam maximopere appetit. Fœminæ libidine correptæ, nisi se mari commiscuerint, inflatione correptæ pereunt. Coeunt more felium. Septem vel octo catellos unicâ pariturâ edunt: dum tamen spacio quadraginta dierum utero gesserint. Fœtus post partum per triginta

dies cœci sunt, & diè quadragesimo post acceptam visionem ad venationem proficiſcuntur. Ad iram provocatæ excrementa alvi odorata egerunt. Cicurati in capsis ligneis plurimum temporis dormiendo confumunt. In Gallia Narbonensi utuntur eis in cuniculorum venatione. Alibi, in extrahendis de nidis parietum, inaccessis inprimis, aviculis. Pertinet ad eam Viverræ in insula Zeilan genus, serpenti coronato inimicissimum. Quoties adversus eum dimicat, radicem ligni colubrini præmordet. Nec alterius est generis animalculum illud quod Agricola *Hameſter* vocat. Majus est mustela domesticâ. Color dorſi leporinus, ventris niger, & laterum rutilus. Pedes breves. Multa frumenti grana in specum congerit. Ager Thuringiæ eis abundat. *Putorius*, ab odore nomen fortitus est. Semper enim putidum ab ore halitum emittit. Quidam Ichtim dixere, quòd piscibus valdè delectetur. Scaliger Catum fortentem, ni, fallor, dixit. Corpore Marte est similis, sed major: Circa collum angustior, circa imum ventrem latior, in cauda & cruribus nigrior, & ad latera flavior. Pellis duplici pilorum ordine constat. Alii sunt breviores & flavi, alii longiores & nigri. Crura sinistri lateris breviora esse, à quibusdam creditum, sed ipsa *ωντῖα* repugnat: *Incolunt* horrea, stabula, sylvas, & ripas. *Viſſitant* muribus, gallinis, avibus, quibus statim caput auferunt, piscibus, ranis, &c. Tempore vernali pelles gravissimè olent: hyeme non item. Albertus meminit cujusdam mustelæ quam *Noerz* vocat, magnitudine martis. Pili ad colorem lutræ accedunt. In remotissimis nemorum penetralibus latet, & putidum odorem de se emittit.

CAPUT XI.

De Marte & *Mustela Zibellina*.

MARTES à ferocia nomen accepit. Est enim Martia. Alii Martam & Marterum vocant. Nonnulli Foinam, Gainum, & Scismum: Dentes habet candidissimos inæquales & asperos. Canini in utraque mandibula eminent: quibus sex exigui diversæ altitudinis interjiciuntur, qui incisorum munus obeunt, cum hac tamen differentia, quòd incisores mandibulæ inferioris perexigui sint. Molares, quorum octo, sunt ferrati, triangulares quidam. Ultimi in superiore oris parte multò cæteris interius sunt, nempe, in ipso palato Severino circa interiore frequentia sunt observata. Sub cutem *fibræ* nervæ extensæ, numero & situ costis omnibus respondentes. *Costæ* autem num. 14. *Membrana* nulla carnosa: *Musculi* abdominis inter duas peritonæi tunicas; ideo videtur peritonæum crassum & densum, non minus

Q 2 quam

Differentia.

Clus. Exot.
l. 1.Agricola
de animal.
subterr.Ambrosin.
Hist. Dig.
git. l. 2. c. 17Ambros.
Hist. Dig.
git. l. 2.
c. 16
Nomen.

Descriptio.

Locus.

Viſſus.

Generatio.

Ambros.
Hist. Dig.
git. l. 2. c. 18Zootom.
Democrit.
p. 317.

quam cornea tunica oculi bovini. In longitudine per eam lineam, quæ respondet umbilico carnosum erat, sed non late & in infima sui parte. *Omentum* ventriculo inferne annexum intestinis & lieni, sed *lien* parvulus satis parte sinistra ventriculo appensus, omenti parte adalligante. *Ventriculus* amplior, quam pro pusillo corpore, constans duplici tunicâ, sed externa albidior & levigata interna, utraque tenuis. *Intestina* retrorsum annexa spinæ per membranam. Nullum cœcum intestinum, uniformia omnia. *Vesica* urinaria oblonga, tenuis, sed ventriculo magis, recto intestino incumbens. *Hepar* septem fibris constans, quarum infirma quædam trifida, velut pes pulli, media sic triangularis figuræ, venæ cavæ per membranulam parvo spacio annexa. *Ren* dexter superior. *Emulgens* sinistra longior quam dextra, utraque ab arteria magna enascens, à vena cava non item: Dubius tamen sum & nescio, num per injuriam non offerim. Ad cavam venam hinc & hinc *glandula* subrubræ seu flavæ, sed dextra superior annexa hepatis per venularum furculos. *Vena cava* multos spinæ ramos mittit per lumbarium musculorum intercapedinem, sic & *magna arteria* cavæ subdita. *Vasa spermatica* à renum medio descendunt, sed parte ima finduntur utrinque, quorum alter ramus continuus testi fit, abdomen extra pervadens. *Penis* à ligamenti coccygis nascens cartilagineus & durus instar ossis, summa sui parte contortus ut terebella; amictus suâ tunicâ, quæ juxta sui principium validè adhærebat, in extremo perforatus, ut acus; ureter dexter insertus vesicæ superius, quàm sinister, nervus subtilissimus descendit rectus adalligatus dextero lateri cavæ venæ, inferens sese in principium cavæ. Nervulus item alius latere sinistro descendit ad orificium superius œsophagi. *Diaphragma* ad fines hepatis oblique descendens eadem illi parte connexum. Inseritur vena cava in dextrum ventriculum cordis propè auriculam dextram, quæ nigra & plena sanguine, major quam sinistra: hæc autem alba & exsanguis. Eadem cava variè in pulmonem conspergitur parte dextrâ. Arteria magna inserta in sinistrum cordis ventriculum, dum se contorquet ac flectit ad inferiora: Vena cava dextrorsum pulmonem parum supergressâ sese contorquet & divaricatur in sex ramos, fitque *αὐτοῦ*, ascendit eadem superne ad utramque mandibulam inferiorem. Pulmo dextrorsum quatuor constat fibris minoribus, sinistrorsum duabus majoribus. In Septentrionalibus regionibus ut plurimum inveniuntur: in Germaniæ Alpibus quæ meridiei & Italiæ obvertuntur. Incolunt magnorum ædificiorum tecta, nec non faginas & abjetinas sylvas. Retulit quidam rusticus Gesnero, se in præalta abiete

Martem cum quatuor catulis comprehendisse. Gallia Martibus abietum caret: ex Polonia deferuntur aliquando colore fusco diluto. Dicuntur præter cibos mustelis suctos, fruticibus etiam vesci. Excrementa Moschum redolent. Facile cicurantur. Habebat cicurem Gesnerus, canis quo cum nutriebatur amantissimum, quem in itinere sequi solebat. Vinculis soluta circa ædes vagabatur, & semper redibat, supina quoque cati ritu ludebat. Infida tamen est: idèò nonnulli suadent, ut canini dentes amputentur. Pellis est in usu. Ex illa quæ sub gutture, salutare capiti pilei concinnantur. In Canada mulieres infantes suos eis infuunt. Duæ ipsius sunt *species*. Altera *Domestica* pilo fulvo nigricante vestitur, excepta ea gutturi parte quæ albicat, quam pelliones Fainam vocant. Est corporaturæ felis, sed paulò longior, cruribus ungulisque brevioribus. Per rura vagatur, gallinas jugulat, & ova exhaurit. Altera est *sylvæstris* pilo clariore & molliore, gutture luteo. Ex his aliæ sylvas fageas, quernas, & ilignas inhabitant: aliæ piceas & abiegnas. Circa lacum Bregantinum dicuntur versari quæ noctu lucent. *Mustela Zibellina* Aristoteli ex quorundam sententia sub nomine *Satherii*, sub *Cebali* Nipho venit. Alciatus *murem Sarmaticum* & *Scythicum* vocat. Agricola paulò minorem Martem facit, totam obscuro colore fulvam, præter guttur, quod cinereum est. Inveniuntur in partibus septentrionalibus & extremis Moscovitarum sylvis, sed & in Lithuania, alba Russia, & locis mari Cronio vicinis: ut & in Lanceruca Scandinaviæ sylva. Præstantissimæ sunt pelles quas Tartari & Lapones mittunt. In regni Congani provincia quadam copiam ipsarum dari, descriptionis Guineæ historia testatur. Insidiantur aviculis, dum in opaco saltu latitant. Animalia sunt natura agilia & semper inquieta. Observatum est pelles ipsorum in imo arcæ repositas & aliis vestibus onustas, post triduum plus minus in summum ascendisse. Si manibus tractentur semper æquales remanent. Præstantiores, quibus pili longi, & ad nigredinem vergentes. Soli expositæ corrumpuntur. A blattis præservabis, si sæpè concutias, & ramis absynthii involutas, reponas. Pretium illis ingens, Quadraginta pelles mille coronatis emptas vidit Agricola. Semimanicam hyemalem ex iisdem concinnatam quadringentis libris Bononiensis monetæ Ambrosinus. Incolæ Obdoriæ eas idolo suo Zlata baba dicto, offerunt. Magni Tartarorum Chamitentoria, iisdem subduci, M. Paulus Vennetus testis est.

Renod. l. 3. Pharmacop.


Differentia.

Ambrosin. Hist. Digittat. l. 2. c. 19.



Cuniculq porcellq Induq Kaninich Kuniglein





Two Rabbits



CAPUT XII.

De Genetta, & Animali
Zibethi.Ambros.
Hist. Di-
git. l. 2. c. 21.

ANimalis, quod *Genettam* vocamus, nomen, unde desumptum sit, ignoratur. Quidam, quia Hispanicum est, ab aliquo ibid. loco appellatum, credunt. Alii *Catum Hispania*, quidam *Genethocatum*, vocant. Nonnulli *Pantheram minorem* Oppiani opinantur. Minor est vulpecula. Corpus totum maculis nigris eleganter distinguitur: nam reliquum fuscum, vel cano fuscum permixtum est. Tota pellis molli & denso pilo & lanuginosa, non ingratum odorem spirat. Reperitur in Hispania, & quidem circa aquosa loca, ut inde victum quærant. Semimanica hyemalis ex illius pellib. constans, viginti quinque, imò triginta libris monetæ Bononiensis venditur. *Animal Zibethi*, quod antiquis fortè ignotum est, moderni Græci *Zapetion*, Scaliger *catum zibethicum*, Ludovicus Roman. *selem zibethi*, alii *Sivettam* seu *Civettam*, & *Catum sylvestrem*, Gyllius *Panthera* genus, quod veteribus hæc sola odorata ferebatur, Bellonius *Hyenam veterum*, vocant. Armatur dentibus & pilis asperioribus. A capite ad initium caudæ integrum hominis brachium adæquat: altitudo crurum usque ad pedes ad trientem brachii reducitur. Magnitudinis ferè est vulpinæ, colore lupino maculis nigris resperso insignitur. Folliculum circa inguina gestat, in quo odoramentum Zibethum dictum, colligitur. Rondeletius addidit, rictu esse oblongo instar Taxi, linguæ non tam scabræ ut felis. Reperiuntur in Pegu, regno Congitano, China, Cambaja, sylvis Æthiopiæ, quod apud Leonem Africanum legimus. Advehuntur & ex Ægypto, ubi copiosum partum enituntur. Ex Hispania in Italiam deferri, non malè Cardanus scripsit. Delectatur crudis carnibus & muribus sylvestribus. Romæ apud Cardinalem Galeottum carne pipionum alebatur. Comedit etiam dulciaria & oryzam cum ovis. in China, lignum dulce quod Comaron vocant, si id animal est, cuius Pigafetta in itineralio suo meminit. Adeò cicuratos Romæ & Mantuæ vidit Scaliger, ut innoxie supra humeros ab hominibus gestarentur. Consul Florentinorum Alexandria adeò mitem habebat, ut cum hominibus coludens, nasum, aures, labra, dentes sine noxa apprehenderet. Ab ineunte ætate humano lacte educabatur. Excrementum quod ex oculo circa extremam abdominis partem intra femora, cavernis & angustis instructo dimanat, primò est album, teste Fallopio, progressu temporis subluteum, tandem nigrescens. Primis diebus hoc odoramentum grave est, namque mirandum in modum fe-

Ambrosin.
Hist. Di-
git. l. 2. c. 22
Scalig. Ex-
erc. 211.Rondelet.
Pharmac.
l. 3. c. 16.Bellon.
obser. l. 2.
c. 20.

rit: concretum & aëri expositum, suavitatem gratissimam acquirit. Nonnulli sperma animalis esse voluerunt. Colligitur cochleari argenteo, æreo, vel corneo, singulo quoque die drachmæ unitus pondere. Majorem zibethi copiam fundit, si, antequam colligas, virgula exagitetur, ut in iracundiam præceps feratur. Alii spontè certo anni tempore incalescere, & liquorem odoriferum è genitali ejaculari scribunt. Collectum in vase corneo melius & diutius quàm alio servatur. Sunt quidam Ulyssipone nobiles, quorum ex zibetho reditus, ad mille & quingentos aureos ascendunt. *Vsum* tam in Medicina quàm alibi habet. In Colica effectione granum unum umbilico inungitur, pane calido supra posito. A Crollio in vertigine & apoplexia commendatur unguentum, cuius compositionem & hic succus ingreditur, extremitatibus narium, temporibus, & vertici illitum. In uteri suffocationibus pudendo affricatur. Adulteratur felle bubulo, styrace liquida, & melle. Parantur ex eo pulveres Cyprii, saponès, aquæ, olea, essentia, suffitus, de quibus consule Ambrosinum.

Majol.
Colloq. 7.

CAPUT XIII.

De Lepore.

LEpus Isidoro dicitur quasi Levipes, ob currendi celeritatem, vel quod mollissimè propter villosos pedes incedat: aliis ab Æolibus Bœotiis qui antiquâ voce, animal hoc, λέπρε, indigitabant, descendit. Dicitur autem ita quasi λέπρε, πρὸς ὅδῳ, quod lubricè eat, nec facilè sit eum apprehendere, aut retinere. Scaliger tamen λίπρε, & λιπρὸς legit. Aliis Græcis dicitur λαγῶς, λαγῶς, λαγῶς Atticis, λαγὸς Jonibus, ut Eustathius docet. Vocatur & δασύπους, à pedum villositate, δρόμαλος, πῶξ, & ταχύνες, sine dubio, à cursus celeritate. Cretenses Lepores κεκηνῶς vocant. Albertus Leporem, Trochum Aristotelis interpretatus est. In *Descriptione* non est quod immoremur, *Caput* habet breve & rotundum: *collum* angustum, rotundum, molle, oblongum; *aures* sublimes: *scapulas* rectas & laxas: *pectus* non carnosum: *spinam* teretem: *ventrem* depressum: *Crura* levia, quorum priora exiguo intervallo distinguuntur, posteriora, infra genū instar literæ A divaricantur: *Corpus* denique totum flexile. *Interiores* partes si spectes, *Cor* ipsi datum maximum: illis verò, qui circa Brilerum, Thernen, & in Chersoneso ad Propontidem vagantur, quique in Symino agro circa Bolbam versantur, duplex jecur, seu quod revera tale sit, seu quod adeò fissum est, ut duplicati jecoris faciem repræsentet. *Oculi* sub angulo anteriori cartilago latior est: vermiforme corpus cerebello postremum: corpus concameratum in aliis non

Isidor. O-
rigin. l. 12.Varro. de
LD. l. 3.
c. 12.
Nomen.

Descriptio.

Plin. H. N.
l. 11. c. 37.Zootom.
Democr.
p. 309.

observatum: os auriculæ tenuæ pellucidum-
que ut felis. Inter animantia dentata, uni-
cumque ventrem habentia, solus coagulum
obtinere. Reperiuntur passim, tam calidis
quàm frigidis regionibus. Ex Lybia albos
delatos reliquit Pausanias. In insula Indica
Mazzua dicta, tanta ipsorum copia, ut ab
incolis passim interimantur, si Ferdinando
Lopezio credimus. In Atho quoque monte
tot, ut Ovidio in proverbium abierint. In-
colunt tam culta quàm inculta, ista tamen
præcipuè, quæ à venatoribus non frequen-
tentur. In Ithaca non esse, nec vivere illatos
prodidit Aristoteles. De *Victu* leporum ita
elegantè Bargeus:

*Decerpunt lati turgentia graminacampi,
Et culmos segetum, & fibras tellure repostas
Herbarum, & lento morsus in cortice
figunt.*

*Arboris, atque udos attondent undique li-
bros;*

*Nec parcut strato pomorum, aut glandis
acervo,*

*Aut vicia, aut milio, aut proceræ frondibus
ulmi,*

Præcipuè grata sylvestria graminamenthe.

*Quaque colunt riguas inculta sylvimbria val-
les,*

*Et vaga serpillæ, & palegi nobile gramen
Percipiunt.*

Generatio. Commiscentur averſi, ut omnia animantia
quæ retrò urinam mittunt. Solvuntur quo-
cunque tempore anni in libidinem: Xenoph-
on tamen & Pollux verno potissimum
tempore congregi statuunt. Post primum
congressum superſœtat, ut verè Poëta scrip-
ſerit.

*Prolis amans, gignit fœtus, lactatque te-
nellos*

Dumque superſœtat, dum parit; usque coit.
Non est ergò mirum, catulos prægnantes in
dissecto lepore inventos, quod apud Ælia-
num legimus: nec mirum, Aſtypalæam ex
geminis leporibus, tempore Antiochi Go-
natæ, brevi tempore, tot leporibus fuisse re-
fertam, ut intra annum spaciū plures sex
millibus caperentur, ut apud Athenæum le-
gimus: totamque Geronem Scarii maris in-
sulam olim leporibus vacuam, intra breve
tempus, à prægnante lepore, foetu occupa-
tam fuisse. Enituntur in locis nemorum se-
cretioribus; nunc duos, interdum tres, ali-
quando quatuor catulos. *Sexum*, sic optimè
agnosces, si consideraveris, fœminam esse
capite oblongiore, corporaturâ crassiore, au-
ribus oblongioribus, & pilo dorsi leuco-
phæo, ad nigredinem vergente, canibusque
persequentibus semper suam regionem cur-
rendo circumambire, & pereundem locum
pluries transire: marem verò humeros habe-
re rubentes, in quarum medio pili oblongio-
res, observentur; caput brevius & obtusius,
pilos barbæ & palpebræ longiores; aures

breviores & latiores, canibus perſequenti-
bus recto itinere se committere, & quando-
que ad decem millia passuum currere. *Inimicitias*
micitias gerunt cum aquilis, corvis, muste-
lis, vulpibus & canibus. *Vivunt* ad septen-
nium. *Ætas* ex cavernis vel potius fissuris
fecus foramen excrementorum colligitur, si
Archelao & Alberto credendum. *Vocem*
habent acutam. Philomelæ author gemitum
appellat. Ad *Naturam* pertinet videndi fa-
cultas eximia: nam dum dormit oculos aper-
tos tenet: auditus acerrimus: nam & ad le-
vissimum foliorum motum concitatur & fu-
git: Utitur etiam auribus tanquam incita-
mento ad cursum, quibus eundem dirigit &
moderatur. Dormituriētes, ne cavernæ lo-
cus deprehendatur, huc illuc discurrentes,
vestigia primo disturbant, tandem magno
saltu in cavum profiliunt; ubi decumbentes,
fœmen ilibus subjiciunt, cruribus prioribus
ut plurimum junctis, & auribus super utrum-
que humerum demissis. Cavernis egressi,
libentissimè ferenis diebus apricantur. Lo-
ci natalis tam sunt amantes, ut nullum pere-
grinum admittant. Facile cicurantur, & ni-
mis pinguefacti, intereunt: at levi datâ oc-
casionē vincula effugiunt, & ad pristinos
mores redeunt. In sylvis rarò pinguescunt;
fortè quòd sibi metuant. Ad *ingenium* spe-
ctat, quod hyeme impendente cubilia in lo-
cis apricis constituunt; æstate ad Aquilonem
cubant: quòd ad pabula longinqua profici-
ſcuntur, ut longo cursu exerciti, pedum ce-
leritatem firment: quòd, ut venatores fallant,
per flexuosas incedentes vias, frutices om-
nes evitant, ne pili iisdem affricati, odorem
canibus prætereuntibus præbeant: quod ubi
segnes ad perſequentium canes vident, lento
gradu properant; ubi urgere, citatissimo
cursu feruntur: quòd denique à venatore
agitati inter glebas, quæ sunt ejusdem secum
coloris; ingeniosè latitant. In *Cibis* eos Judæ-
is gustare nefas: at apud gentiles, postquam
ab Attalico Cydoniensi ad epularum appa-
ratum deducti sunt, in deliciis semper fuere,
adeò inter mattyas caro leporina poneretur,
formositateque vultus conciliare crederetur.
Ideò certè Alexander Severus, ut in
Lampridio legimus, singulis diebus come-
debat, & aliquod hujus vestigium apud
Martialem ad Galliam habeamus. Cate-
rum cujus sit caro hæc temperamenti, non
est quòd multis disquiramus; sola distin-
ctione res confici poterit. Bimestres, tri-
mestres, & ad summum semestres, opti-
mi sunt succi, & facilis concoctionis. An-
niculi & adultiores crassum sanguinem ge-
nerant. Visi tamen venatores, quorum quo-
tidianus leporina cibus, qui tantum abest ut
mœrore distraherentur, ut etiam lætitia per-
funderentur. Quod autem Cato, Censori-
nus oleribus & carnibus leporinis ægrotis
ali volunt, de catulis fortè intelligendum
est:

Aristot. de
partib. ani-
mal l. 3. c.
15.

Locus.

Ovid. l. 2.
de arte a-
mandi.

Aristot. H.
A. l. 8. c. 29.
Vitus.

Bargeus
Cynegct.
l. 3.

Generatio.

Athen. Di-
pnoſ. l. 9.

Sexus.

Inimicitias.

Ætas.

Vox.

Natura.

Ingenium.

Martial. l. 5.
Epig. 30.

Brugerin.
l. 13. de re
cibaria.

est. Meliores verò iis qui ad aquas degunt, illi qui in montosis & planis habitantes, serpillio, pulegio, & aliis vescuntur. Maximè etiam urgente bruma in cibis commendantur. Præparandi rationem vide apud Ambrosinum. In *Medicina* nulla ferè pars est quæ usum non præbeat: imò & excrementa eidem inserviunt. *Caput* usum cum adipe ursino aut aceto alopecia mederi, Galenus reliquit. *Cerebrum* dentitionem infantum promovet, si gingivæ sæpius eo illinantur: ex vino potum, urinæ incontinentiam cohibet. *Cor* quartanariis alligatur: pulvis sicci cum tertia parte mannæ thuris epilepticis à Sexto in vino albo propinatur, septem dierum spacio. *Pulmo* oculis dolore affectis superponitur. *Hepar* coeliacis cum vino austero propinatur. *Fel* saccaro exceptum gemmas & oculorum nubeculas delet. *Coaguli* ab animali quod nondum quicquam præter lac degustavit, & ad solem vel in fumo exsiccatum est, magna præstantia. Fluxu dysenterico laborantibus à Dioscoride propinatur. Spinas partibus infixas extrahit, si cum thuris polline, & visco querno miscèatur. Ad punctiones serpentum adhibetur. Viri congressum & foeminae conceptionem juvare perhibetur. Dioscorides potum foetum necare ait. *Renēs* coctos in lithiasi Matthiolus exhibet. Inveterati & pedibus alligati podagram levant, si Olæo Magno fides est. Ex *Matrice* medicamentum ad foeditatem concitandam Quercetanus parat: eadem in vesicæ malis commendatur. *Carnem* in oleo frixam Albertus in dysenteria & intestinorum ulceribus per clysterem infundit. Iisdem *sanguinem* assatum. Dioscorides propinat: quidam cum farinâ hordeaceâ miscent. *Lac* mulieres foecundas reddit. *Adeps* extrahendis spiculis cum floribus fabarum inservit. *Dens* appensus dolorem dentis mitigat. *Talus* seu ossiculum illud in posteriori suffragine leporis, in colica affectione funiculo expilis leporinis à Marcello alligatur: pulvis adversus colicam feliciter bibitur: à Trago mulieribus ut facilius pariant, in liquore stillatitio pulegii propinatur: in Epilepsia, cum visco querno, margaritis, corallis, & semine præonia præscribitur. Urinam denique in lithiasi validè provocat. *Pellis* ceratum ad hernias ingreditur. *Pili* coercendo sanguini undecunque mananti inprimis ex naribus confert. *Pedes* à vivo abscissi in dolorem podagrico applicantur. *Urina* hydropticis cum spica nardi utiliter propinatur. *Stercus* à mulieribus gestatum conceptionem impedit, si quibusdam credimus: si Matthiolo, subtus immissum nimios mensium fluxus cohibet, & humentem uterum exsiccatur. *Totius* cremati pulvis, ex vino tepido, calculosis propinatur. Ad eundem affectum Montagnana electuarius componit, eidemque lapidem judaicum, & spongas in lapil-

lis repertas addit. *Differentia* à colore, quantitate, pinguedine, eo loco sumuntur. *Ratione coloris*, sunt alii cyanei, alii in terris nigris fusci, alii in rubris rutili. Oviedus in America quosdam vagari scribit, quorum dorsum leporini est coloris, reliquum corpus album, latera leucophæa. Observati, ut Plinius prodit, albi in Alpibus, & in summis Ananiae vallis montibus. Gesnerus quoque candidum vidit, cum pilis in summitate aurium nigris, carnemque cæteris teneriorem expertus est. *Magnitudinem* quod spectat. Elymaei vulpes corporatura adæquant. In Macedonia & Gallia trans Alpina sunt magni; in Italia & Hispania minores. *Pinguiores* in Pannonia inferiore quàm Italia Manardus observavit. Quantum ad *odorem*, dicitur quoddam Leporis genus ita moschum redolere, ut canes persequentes in furorem agantur. A *Loco* sunt montani, campestres, palustres, Italici, Gallici, Hispanici, Indici. *Montani* à cæteris nigritia, magnitudine, ferocia, & densiore pilo discrepant. *Italici*, secundum Varronem, sunt primis pedibus humilioribus, dorso pullo, & ventre albo. *Gallici*, ut plurimum candidi visuntur. *Hispanici* cuniculos complectuntur. De *Indicis* ita Nierembergii. Leporem *Cili* vocant Barbari novæ Hispaniæ. Similis nostratibus est formâ atque alimento, sed auriculis pro corporis magnitudine longissimis latissimisque. Intexi solent ejus pili ab indigenis vestibus & linteis, quibus utuntur palliorum loco. Brasilienses *Cotias* nominant animalia quædam magnitudine & formâ, & sapore leporum, rufo colore, parvis auribus, caudâ ferè nullâ. Majores sunt ejusdem ferè speciei, quas *Pacas* vacant, rostro tereti, ad faciem felis, fusco colore, candidis maculis interstincto: neque carne tantum, sed & corio ipso prætenere: ideò in delicatioribus epulas expetuntur. Amatus Lusitanus quoque tradit animal facie & magnitudine leporis in India vagari, quod incolæ tamdiu baculis cædunt, donec moriatur. Mortuum pelle nudant, & carnem ex ietibus lividam conterunt, manibusque quasi ad pastam redigunt, quam pellibus ejusdem animantis involutam, Moschum nominant.

CAPUT XIV.

De Cuniculo.

Quadrupes quod *Cuniculum* dicimus, à cuniculis quos sub terra fodit & inhabitat, nomen sortitum est. Ab aliis vocatur lepusculus, ab Æliano parvus lepus. Recentioribus Græcis est *σύναι* aliis *δασύναι* quem Plin. à cuniculo & lepore distinxisse videtur. Strabo *γαυρόνυχος λαγίδας* lepores fossores nominavit: nec non *λεβηρίδας*, fortè à voce *λεβήρις*, quæ Græcis antiquis *ὁ ὄφεις γῆρας*, serpentis spoliū. Hinc Cuniculus recens

Differen-
tia.Plin. H.N.
l.18.c.555.Ambrosin.
l.2. De Di-
git. ovipar.
c.23.Nieremb.
Hist. Exot.
l.9.c.8.

Nomen.

Strabo.
Geogr. l.3.Galen. l. 11.
de simpl.
med. fa-
cult.Montagn.
Antidot. l.2

Descriptio.

Zootom.
Democrit.
p. 327.Vitus.
Carol. Ste-
phan. Agri-
cult. l. 9. c. 2.

Generatio.

Natura &
Ingenium.

recens natus & adhuc impilis, *liberis*, *labe-
ris* & *lauris* appellatur. Hermolaus in Dio-
scoridem *Adapis* nomine indigitavit, fortè à
vocabulo *ἀδάπων* Ⓞ, quod rem quæ minimè
potest consumi denorat. Fœcundissimi e-
nim sunt. Erotianus *λιμοπόιον* vocavit, quòd
annonæ penuriam faceret. Circa *Descriptio-
nem* non est quod laboremus. Notissimum
enim est animal. In secto sequentia Seve-
rino sunt observata. *Musculi* omnes abdo-
minis inter duas peritonæi tunicas dispositi,
firmè ipsis adhærentes. Intestinum rectum
fatis exile. *Cor* exile: *hepar* magnum, renes
magni, *lien* oblongus magnitudine respon-
dens parvæ hirundini, gallinacei: *παρήταρ*
figurâ cultri calcearii cum manubrio latro,
medium inter latas fibras hepatis. *Ventriculus*
figura parum varius à fuillo, simillimus verò
muris & gliris. *Cystis* exigua affixa hepati.
Cæcum uno palmo vulgari & amplius magni-
tudine respondens communi pollicis, cellu-
latum & cum appendiculo trium digitorum
aut amplius satis exili. *Processus lumbarium
vertebrarum* longiusculi, quos intercurrent
insignes interni musculi. In insula Ebuso
generari negat Plinius, at alibi plurimi repe-
riuntur; in Germania nempe, Gallia, Italia,
Mauritania, Moscovia, Polonia, &c. Scal-
lig. circa Mosaiscum Moscovitarum oppi-
dum innumeram cuniculorum multitudi-
nem ponit. Maximus tamen eorum in Hi-
spania proventus. Balearibus insulis, olim
devotarum messibus non vulgarem tamen at-
tulerunt. Apud Zelandos quoque in ipso
Océani aditu, immensa vis cuniculorum
conspicitur, quâ post solstitium brumale
tota Brabantia alitur. Vescuntur gramine,
trifolio, brassicâ, lactucâ, cichoreo, rapo-
rum putaminibus, pomorum corticibus, &
baccis lauri inprimis. Sanguine humano
citissime pinguescunt: sed ab omni humidi-
tate abhorrent. *Semestres* vel potius anniculi
congregiuntur: & singulis mensibus in cali-
dis regionibus concipiunt. Niphus à quodam
eorundem altore accepit, foeminas binos &
ternos enixas, post quatuordecem dies ite-
rum totidem peperisse. In Germania tamen
& Italia brumali tempore rarò eniuntur.
Quinos & ad summum novenos in lucem
edunt. Nonnulli in hoc animantium genere,
tam marem quàm foeminam parere fabulati
sunt. Foemellæ per spacium unius diei supra
viginti lac catellis præbent. Si quis eos ma-
nibus pertractet indignantur, & vel deferunt,
vel lædunt, vel etiam interimunt. Mares
etiam libidine stimulatî fœtus enecant, &
inprimis, si foeminæ liberis nutriendis inten-
tæ, eos refugiant. *Naturam* & *Ingenium* se-
quentia detegunt. Salu captum evadunt.
Locum, si quid in eo periculi senserint, defe-
runt: migrante verò uno, reliqui quoque
gregatim abeunt. Ruminare compertum
est. Sibi invicem aliquando ita æmulationis

studio infesti sunt, ut alter alterum quando-
que auribus, quandoque pedibus mutilet.
Facile tamen mansuescunt. Observavit Car-
danus quandam qui canes ultrò persequer-
batur. Terram assidue fodientes, specus
multifores sibi parant. Quare M. Varro
reliquit, in Hispania non incelebre oppi-
dum in loco arenoso ædificatum, adeò à
cuniculis subrutum fuisse, ut incolæ aliò mi-
grare coacti fuerint. Ex cuniculis nonnisi
manè & vesperi egrediuntur, nec longè ab
iisdem abscedunt. Foveas in quibus stabu-
lantur, arenâ cooperiunt, ne à transeuntibus
deprehendi possint. Caro cuniculorum te-
nerior est leporina, juniorum inprimis. Pri-
mus, Hispanus quidam in escam mensis ap-
posuit. Circures in Hispania contemnuntur,
quod nutrimenti saporem concipiant. Agre-
stes in deliciis habentur. Durantes primò
elixari jubet, post herbis odoriferis & pin-
guedine suilla confici. *Quantum ad Medi-
cinam*, pinguedo nervos mulcet, & nonnullis
urinæ affectibus præsto est. Adhibetur con-
bustus ad curandam synanchen, à Marcello,
de quo vide Ambrosinum. *Differentia* cu-
niculorum à *colore*, *magnitudine*, *Extis* &
Loco fumuntur. *Coloris* ratione, sunt albi,
nigri flavi, cinerei, variegati, candidis, nigris,
vel rutilis maculis stellati. *Magnitudo* si spe-
ctetur vidit Valerianus Veronæ apud circu-
latorem nostris quadruplo majores, & mirâ
corporis obesitate. In Betica Plinius gemi-
nis extis esse putat. *Quantum ad locum* sunt
animalia quædam in India, *Utiæ* dicta, ma-
gnis foricibus similia, & cuniculis æmula.
An à Thracicis & Macedonicis cuniculis
differant, quas Scaliger leporino pilo, bre-
vioribus auriculis, corpore crasso, & com-
pacto, cauda longa & ad sciurinum acceden-
te descripsit, judicandum lectori relinquo.
Alii mures Pharaoni, squidam Indicos lepo-
res vocant. Ex Indicis cuniculis sunt etiam
illi, quos *Porcellos Indicos* nominamus. Ma-
gnitudine sunt cuniculi nostratis, sed cruri-
bus brevioribus, cum digitis senis in pedibus
anterioribus, & quinque in posterioribus.
Dentes iis ut in muribus: cauda nulla: ro-
strum acutum: aures parvæ & rotundæ, &
fetis potius quàm pilis vestiuntur. Vox non-
nihil ad grunitum procellorum accedit.
Vescuntur omni herbarum genere, fructi-
bus, pane & avena. Multorum sape men-
sium spacio sine aqua aluntur. Foemellis
septenis vel novenis mas unus sufficit. Ritu
cuniculorum superfætant. Hyeme quoque
catulos non cæcos ante sexagesimum diem
eniuntur. Duo mares præsentem foemina
præliantur. Adjecimus & alterius cuniculi
Indici iconem. Nierembergii novem cu-
niculorum Indicorum species facit. Prior,
inquit, est *Paelli*, seu Hispanicus, si in pin-
guibus versetur agris; non minus jucundam
præstat quàm apud Hispanos alimoniam.

Vsum.

Differen-
tia.Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 8.Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 7.

Secun-

est. Meliores verò iis qui ad aquas degunt, illi qui in montosis & planis habitantes, serpillio, pulegio, & aliis vescuntur. Maximè etiam urgente bruma in cibis commendantur. Præparandi rationem vide apud Ambrosinum. In *Medicina* nulla ferè pars est quæ usum non præbeat: imò & excrementa eidem inserviunt. *Caput* usum cum adipè urfino aut aceto alopecia mederi, Galenus reliquit. *Cerebrum* dentitionem infantum promovet, si gingivæ sæpius eo illinantur: ex vino potum, urinæ incontinentiam cohibet. *Cor* quartanariis alligatur: pulvis sicci cum tertia parte mannæ thuris epilepticis à Sexto in vino albo propinatur, septem dierum spacio. *Pulmo* oculis dolore affectis superponitur. *Hepar* coeliacis cum vino austero propinatur. *Fel* saccharo exceptum gemmas & oculorum nubeculas delet. *Coaguli* si ab animali quod nondum quicquam præter lac degustavit, & ad solem vel in fumo exsiccatum est, magna præstantia. Fluxu dysenterico laborantibus à Dioscoride propinatur. Spinas partibus infixas extrahit, si cum thuris polline, & visco querno miscèatur. Ad punctiones serpentum adhibetur. Viri congressum & foeminae conceptionem juvare perhibetur. Dioscorides potum foetum necare ait. *Renes* coctos in lithiasi Matthiolus exhibet. Inveterati & pedibus alligati podagram levant, si Olao Magno fides est. Ex *Matrice* medicamentum ad foeditatem concitandam Quercetanus parat: eadem in vesicæ malis commendatur. *Carnem* in oleo frixam Albertus in dysenteria & intestinorum ulceribus per clysterem infundit. Iisdem *sanguinem* assatum. Dioscorides propinat: quidam cum farinâ hordeaceâ miscent. *Lac* mulieres foecundas reddit. *Adeps* extrahendis spiculis cum floribus fabarum inservit. *Dens* appensus dolorem dentis mitigat. *Talus* seu ossiculum illud in posteriori suffragine leporis, in colica affectione funiculo expilis leporinis à Marcello alligatur: pulvis adversus colicam feliciter bibitur: à Trago mulieribus ut facilius pariant, in liquore stillatitio pulegii propinatur: in Epilepsia, cum visco querno, margaritis, corallis, & semine prœoniae præscribitur. Urinam denique in lithiasi validè provocat. *Pellis* ceratum ad hernias ingreditur. *Pili* coercendo sanguini undecunque mananti inprimis ex naribus confert. *Pedes* à vivo abscissi in dolorem podagrico applicantur. *Urina* hydropicis cum spica nardi utiliter propinatur. *Stercus* à mulieribus gestatum conceptionem impedit, si quibusdam credimus: si Matthiolo, subtus immissum nimios mensium fluxus cohibet, & humentem uterum exsiccat. *Totius* cremati pulvis, ex vino tepido, calculosis propinatur. Ad eundem affectum Montagnana electuarium componit, eidemque lapidem judaicum, & spongas in lapil-

lis repertas addit. *Differentia* à colore, quantitate, pinguedine, eo loco sumuntur. *Ratione coloris*, sunt alii cyanei, alii in terris nigris fusci, alii in rubris rutili. Oviedus in America quosdam vagari scribit, quorum dorsum leporini est coloris, reliquum corpus album, latera leucophæa. Observati, ut Plinius prodit, albi in Alpibus, & in summis Ananix vallis montibus. Gesnerus quoque candidum vidit, cum pilis in summitate aurium nigris, carnemque cæteris teneriorem expertus est. *Magnitudinem* quod spectat. Elymaei vulpes corporatura adæquant. In Macedonia & Gallia trans Alpina sunt magni; in Italia & Hispania minores. *Pinguiores* in Pannonia inferiore quàm Italia Manardus observavit. Quantum ad odorem, dicitur quoddam Leporis genus ita moschum redolere, ut canes persequentes in furorem agantur. A *Loco* sunt montani, campestres, palustres, Italici, Gallici, Hispanici, Indici. *Montani* à cæteris nigritia, magnitudine, ferocia, & densiore pilo discrepant. *Italici*, secundum Varronem, sunt primis pedibus humilioribus, dorso pullo, & ventre albo. *Gallici*, ut plurimum candidi videntur. *Hispanici* cuniculos complectuntur. De *Indicis* ita Nierembergii. Leporem *Cili* vocant Barbari novæ Hispaniæ. Similis nostratibus est formâ atque alimento, sed auriculis pro corporis magnitudine longissimis latissimisque. Intexi solent ejus pili ab indigenis vestibus & linteis, quibus utuntur palliorum loco. Brasilienses *Cotias* nominant animalia quædam magnitudine & formâ, & sapore leporum, rufo colore, parvis auribus, caudâ ferè nullâ. Majores sunt ejusdem ferè speciei, quas *Pacas* vacant, rostro tereti, ad faciem felis, fusco colore, candidis maculis interstincto: neque carne tantum, sed & corio ipso prætenere: ideò in delicatioribus epulas expetuntur. Amatus Lusitanus quoque tradit animal facie & magnitudine leporis in India vagari, quod incolæ tamdiu baculis cædunt, donec moriatur. Mortuum pelle nudant, & carnem ex iectibus lividam continent, manibusque quasi ad pastam redigunt, quam pellibus ejusdem animantis involutam, Moschum nominant.

CAPUT XIV.

De Cuniculo.

Quadrupes quod *Cuniculum* dicimus, à cuniculis quos sub terra fodit & inhabitat, nomen sortitum est. Ab aliis vocatur lepusculus, ab Æliano parvus lepus. Recentioribus Græcis est *σύναιξ* aliis *δαύπης* quem Plin. à cuniculo & lepore distinxisse videtur. Strabo *γαυαρόννης λαγίδας* lepores fossore nominavit: nec non *λεβηρίδας*, fortè à voce *λεβής*, quæ Græcis antiquis *ὄφθαλμός* *ῥῆας*, serpentis spoliū. Hinc Cuniculus recens

Differen-
tia.Plin. H. N.
l. 18. c. 555.Ambrosin.
l. 2. De Di-
git. ovipar.
c. 23.Nieremb.
Hist. Exot.
l. 9. c. 8.

Nomen.

Strabo.
Geogr. l. 3.Galen. l. 11.
de simpl.
med. fa-
cult.Montagn.
Antidot. l. 2.

Cortic-Oloreqvilin, à luteo alvi colore dictus, in duplam ferè crescit magnitudinem, alboque, nigro & fusco colore promiscuè tegitur, si ventrem excipias, qui pallens est, aut fulvus, quemadmodum attigimus, & caudam gerit prælongam pilosamque, qua se interdum operit. Vivit in terræ foraminibus & antris inclusus, in quibus etiam educat prolem. Vescitur Indico frumento, quod ab arvis raptum in hiemen recondit. Versutus est velut & reliqui, nec unquam cicuratur, aut congenitam deponit feritatem. Tertius *Techallotl* dictus, caudam ferè depilem gestat, ac brevior, nec dodrantem vincit longitudine. Non cicuratur, sed semper mordet atrociter, & corrodit ablata omnia. Fusco & candenti colore promiscuè tingitur, & posterioribus quoque innixus pedibus, oblatam edit alimoniam, sed præcipuè maizii spicas apprehensas anterioribus. Oculi sunt magni, si illos cum cæteris partibus conferas. Vivit in antris, quæ unguibus faciliè excavat, consternitque lana, gossypiove & quovis alio stramento molli, ac passeris voce imitatur. Quartus *Thalmotli* dictus, spithameus est, caputque & oculos habet pro corporis amplitudine maxima: caudam verò longam pilosamve, & lineis albis, fuscis ac nigris interstinctam, qua se eodem quo alii modo tegit. Color totius corporis varius est, & aliquando in fulvum inclinans, cætera præcedentibus similis. Quintus dictus *Quimichpatlan*, seu mus volans, fusco pilo nigroque promiscuè tegitur, qui propè brachia ac crura prolixior est, ac parvarum volucrum forma, cujus gratia tanta celeritate in has & illas arbores sese vibrat, ut volare dicatur. Est autem cæteris minor, parvo & murino capite, magnis auriculis, nec alia quam cætera horum animalium differentia utitur alimonia. Caudam ejus ustam ac redactam in pulverem, & in corpus sumptum, ajunt parientes juvare. Est & aliud genus *Ystaçtechalotl* vocatum, cæteris forma simile, prolixitateque & lanuginosa cauda; capite, collo & clunibus desuper fulvis; cauda per alterna intervalla cyanea, subalbidaque, sed fulvis distincta lineis, cætero corpore subalbido, unde nomen habuit.

CAPUT XVI.

De Glire.

Ambrosin.
de Digt.
Vivip. l. 2.
c. 29.
Nomen.

GLIREM à pinguedine nuncupatum putavit Isidorus. Gliscere enim, crescere & pinguescere significat. Tota is hyeme in cavernis degit & pinguescit. Græcis dicitur *ἐλεος*, quod antiquioribus addito gamma, *γέλαος*, unde forte glis. Vocatur ita, seu ab *ἐλη*, quoniam in sylvis & locis apricis degit: seu ab *εἰλεω* quod in arborum foraminibus per integram hyemem circumvolutus &

foporatus maneat. Alii *λαζόμερον* quasi leporem dormientem vocaverunt: quidam *μυοξόν*, quasi rictum in comparatione ad alios mures magis acutum habeat. Est rostro, ut dixi oblongiori, acutioribus auriculis, caudà non aequè villosà, ventre medio magis protuberante, quàm in sciuro, latere & tergo cinerei prorsus coloris; quamvis subrufi aliquando in ventre capiuntur. Non tantum in sylvis, sed & sub tectis rusticis stabulantur. In Hibernia non haberi proditur vulgo, nec alibi in illis ædificiis quæ ex lignis Hibernicis structæ sunt, quod me, falsum, experientia docuit. In montibus conterminis Goriciensi agro, & in Alpibus Carniolæ, Carinthiæ, & Styriæ, maxima illorum fætura. Vescuntur glarde fagina, nucibus regiis, pomis, & aliis. Poma tamèn edere quidam negant: aperire duntaxat, ut nucleis fruantur. Quantum ad *Naturam* & *Ingenium*, hyeme in cavis arborum stertendo pinguescunt: & tam altum trahunt somnum, ut igne vix revocari possint: imo dissecti tanquam mortui jaceant; nec citius membra moveantur, quam in aquam ferventem conjecta fuerint. Æstivo tempore congregiuntur, & autumnò suos fetus edunt. Parentes senio confectos insigni pietate nutriunt. Murium ritu, ædes ruinosas, trimestri etiam spacio, antequam collabantur, deserunt, quod earum compagem sensim dissolvi præsentiant. Senectus hyberna quiete finit, cum tantummodo sextum ætatis annum excedant. Omnes aliquando ejusdem sylvæ congregantur, & si aliqui monte vel flumine discreti ad eos accedunt, præliantur invicem. Aliquid venenati habere, constans authorum opinio: vulgatumque in cauda illud hæere, urinamque super partem aspersam, illam usque ad ossa putrefacere; vulnusque insanabile reddere. Epiphanius fetus à vipera excacari, & nutrir, sic venenatos reddi, scribit. Q. Scaurus primus in sumptuosis coenis carnem glirium apponi jussit. Apud Romanos in lautitiis habebantur, hinc & gliriariorum constructio. Optimi à mense Octobri ad Januarium censentur, quod tum valdè pingues sint. Durantes juniores in cibis commendat. In *Medicina*, invenit quoque locum. Carnis esu bulimo laborantes liberantur. Pinguedo ad conciliandum somnum plantis pedum inungitur. Excrementa in liquore aliquo pota caltillos discutunt: eadem cum aceto & rore marino alopeciam sanant. Cinis combusti ad claritatem oculorum prodest, si Plinio credimus. Sunt aliquot eorundem genera. Est, Bruyerino referente, apud Allobroges, Sabaudos, & agro Tarantessio, animal quod saxa rupesque incolit, magnamque anni partem dormiendo consumit, in cibis gratissimum. In Orientalis Indiæ tractu quodam sunt Nefren-

Descriptio.

Locus.

Cibus.

Natura &
Ingenium.
Aristot. H.
l. 3. c. 17.

Vfus.

Differentia.

Glires Ratten

*Mures
Mause*



*Mus avellanarius
Kaselmans*

*Sciurus
Eichhorn*



Nulmans

*Mus araneus
Spitzmaus*

Talpa Molckworff



*M. Noricus
Grosse Kaselmans Zieselmaus*



frendis magnitudine, qui domos subruunt, & muros perfodiunt. Ibidem sunt alii pilo rubicundo, odorem moschi spirantes. In Chiapa est animalculum, cuniculi magnitudine, gliris formâ: prolem dorso vehit, cum victum quaeriat.

CAPUT XVII.

De Muribus.

ARTICULUS I.

De Muribus domesticis,

Mures in Domesticos, Agrestes, Avelanarum, Araneos, Alpinos, & Aquatiles dispescimus. *Domesticus*, Latinis Mus, Ratus & Sorex, dicitur. *Mus*, à Græco *μῦς* descendit. *Ratus* majoris nomen est, à rependo vel rapiendo Græcis nuperis *ρίον*. *Sorex* vel à sono, quem in rodendo edit: vel quòd in modum ferræ res præcidat: aut quòd ex putri ut plurimum materia nascatur. *σῆν* enim apud Græcos putridū significat. Apud Græcos plurima occurrunt nomina. *Μῦς*, unde mus, dicitur communiter. Scholiastæ Nican dri lingua *Æolicâ* *ῥεῖξ*, quoniam rostrum suo illo perquam simile habet. *σῆν* & Hefychio & Varino. *ἄργιλον* Thracibus, *λαμῆς* aliis. *Descriptione* externarum partium non opus est aliquâ. Aristoteles & Plinius quantum ad interiora cor maximum habere, felle aliquando carere retulerunt. Alibi apud eundem habemus, in solis cornutis animalibus, altera tantum parte dentatis, quibus dasy podes, vespertiliones, & mures utrinque dentati adduntur, inesse uterum acetabula habentem, & potissimum tempore, quo factus in utero continetur, à quibus per media vasa pendet embryo. In iisdem à M. Aurelio Severino sequentia observata sunt, *Auricula cordis* dextra longè major est sinistrâ, inquit, & illa nigra velut cruor. Ad orificium ventriculi superius processus quidam circularis revolutus in seipsum, parte quâ ventricul um respicit, similitudinem habens avis, qui collum & caput in pectus reflectit & condit. *Vena cava*, ubi primum ab epate exsurgit, amplo suo initio, mox verò exilior & perpetuò æqualis ascendit. Cæcum habet intestinum figuram habens ventriculi suilli, magnitudinem & circumferentiam paulò minorem. *Testes* habet non minores pullo vel grandiusculo omninò, aut magno ad corporis rationem. Credo etiam, addit, epididymida descendere inferius quàm ipsi conditi testes, estque dexter venosior quàm sinister. *Ren* dexter vicinior cavæ quàm sinister. *Veretrum* qua proximè terminatur, cartilagineum & trifido acumine compositum, ni fallor, reliquum duobus nervis. Glandulosas habet prostaras ad vesicæ cervicem insignes. Diaphragma media sui parte pellucidum, oblongum & totundum. Te-

stium systema ibidem vide. Dissecuit idem aliquando & murem prægnantem. In eo uteri cornu dextrum quatuor fetus continebat, in sinistra duos, sua unicuique placenta rotunda ante umbilicum disposita contactaque. In Paro insula nullas esse scripsere quidam: in Scotia circa castellum Slani, major si importetur interit, si Hæctori Boëtio credimus. In Peruana quoque olim, nulli: ex Hispania cum mercibus delati sunt. Frumento, leguminibus, pane & carnibus vescuntur: sæpe capras & allia degustant: ex pluribus caseis optimum. Sorbent quoque vinum, & lambunt oleum. Fame impuls, in seipsos sæviunt. Fœminæ sæpe solo salis linctu implentur. Ideò Plinius generationem eorum lambendo constare dixit, non coitu. Coire tamen certum, & unico partu, plures catulos eniti. Ex una genitos CXX. tradiderunt: apud Persas verò prægnantes & in utero parentis reptas. Generantur & ex domorum ac navium foridibus. Hinc legimus in India Orientali vermes quosdam instar digiti crassos, ex putri materia in arundinibus nasci, quorum alii paulò post in papilionibus, alii in mures degenerant. In nonnullis quoque Joniæ civitatibus, ob Mæandri fluminis inundationem, tanta copia murium teste Pausania orta est, ut incolæ aliò migrare coacti fuerint. Ex putri natos non generare, & si generant, vim prolificam in filiis cessare, Cardanus prodidit. *Vocem* Homerus per *ἐξολοβύζεν* expressit. *Antipathiam* exercent cum elaterio, scilla, colocynthide, mustela, accipitre, felibus, &c. *Sympathiam*, cum majorana ad cujus radicem in morbo confugiunt & cum suis. Muris enim jecore in ficu suis dato, nullo edito grunnitu porrigentem sequuntur, hujusque experimenti periculum Pierius Valerianus Patavii fecit. De *Natura & Moribus* hæc pauca occurrunt. Acris, nempe, esse auditus, & lumen noctu odio habere, quod oculorum aciem perstringat: in officinis aurariis & ferrariis micæ metallorum devorare, & sine dubio concoquere. Theophrastus apud Plinium author est, in Gyaro insula cum incolæ fugassent, ferrum quoque rosisse eos, id quod natura quadam & ad Chalybas facere in officinis ferrariis. Aurariis quidem in metallis, ab hoc alvos eorum excidi, semperque futurum id deprehendi. Urina alicui parti aspersa eandem erodit, si Arnoldo credimus. Plures in aquam delabentes, mutuas inter se caudas mutuo tenent, ut uno exeunte omnes evadant. Albertus in inferioris Germaniæ partibus murem se conspicuum tradit, qui nutu sui magistri candelam tenendo lumen ministrabat. *Differentias* magnitudo, color, pilus, odor, & locus suppeditant. *Magnitudinis* si habeatur ratio, Aristoteles mures in Arabia foricibus longè majores scripsit. Vitriacus in Orientis partibus vulpibus pares. Americus

Locus.

Cibus.

Generatio.
Plin. H. N.
l. 10. c. 65.
Aristot. H.
A. l. 6. c. 37.

Antipathia
Sympathia.

Natura & Mores.

Plin. H. N.
l. 8. c. 57.

Differentia.
Aristot. H.
A. l. 8. c. 28.

in insula quadam maximos invenit. Quantum ad *Colorem*, afinini sunt plerique: sunt tamen & cinerei: alii etiam nigricant, alii ex fusco ad ruffum tendunt. Vidit Gesnerus albusissimum in Germania mense Aprili captum, rubicundis & prominentibus oculis, barbâ multis & oblongis pilis hirsutâ. Vidit & Scaliger alium, oculis igneis, & candore insignem. Albertus quosdam albos, eosque salacissimos, & in quorum excrementis albi lapilli inveniuntur, reperiri scribit. Si *pilos* attendamus, molliores alii habent, duriores alii, & setarum instar. Plinius in Cyrenaica regione, Ælianus apud Ægyptios pilis erinaceorum acutis indutos inveniri produit. Apud Herodotum, *ἐχίνες* genus quoddam murium leguntur. Si *odorem*, jucundi odoris à quibusdam excrementa deponi, Ruellius author est. Est & in Italia genus quoddam, quod Moschardinum dicitur. *Rationem loci* si spectes, vidit Bellonius, hosciami femine tantummodo visitantem, dorso cinereo, ventre candido, corpore oblongo, cauda proluxa, & ore mucronato. Apud Scholiasten Aristophanis sunt *καλόπες* dicti. In Cappadocia apud Varinum quoddam genus *μυέξης* vocatur.

ARTICULUS II.

De Muribus Aquaticis.

Mures sylvestres rusticam vitam ducunt. Servius Nitedulas, Marcellus, mures subterraneos nominare videtur, quod terram pedibus fodiendo, cuniculos sibi faciant. Græci *ἀρρεξίς* si per culta vagantur, *ἀγρεξίς* si per nemora, vocant. Nullibi eorum major copia, quam in Ægypto. Juxta Thebaidem post Nili inundationem, sole humum calefaciente, variis in locis ex terræ hiatu innumeri prodeunt. Bellonius inter Gazara & Belba tantam multitudinem vagari scribit, ut nisi ab avibus Perenopteris devorarentur, omne seminum genus abligurirent. Vorant lupulorum, pastinacæ, & omnium leguminum radices. Cinaræ maxime expetunt, A. 1271. adeo depopulati fuere frumenta, ut magna exinde annonæ caritas subsecuta fuerit. In Boreali regione, sub nivibus latitantes, vermibus, Cardano prodente, vescuntur. Gignuntur in quibusdam locis, post repentinos imbres, aut fluminis inundationem. Muris pars anterior conspicitur formata, posteriore informi. Aliquando & ex femine propagantur. Ex Aristotele habemus, accidisse ut cum agricolæ pridie metendum statuerint, postridie totam segetem à muribus consumptam invenirent. Caleni vidimus, inquit Niphus, quod unicâ nocte totum campum segetibus maturis refertum, mures agrestes absumpserunt. In Cantabria quidam accepta mercede mures venabantur. Æoli & Trojani, mu-

rium agrestium abundantia vexati, Smynthio Apollini sacrificarunt. Aliquando ex cuniculis egredi; eosdem sub terræ superficie struere, & bipalio apertos mox reparare: lassos, ad chondrillam confugere, naturæ ipsorum est. Reducuntur ad eos plurimi, *Differentia*. inprimis autem *Mus avellanarum*, *araneus*, *Alpinus*, *aquaticus*, & *Coyopolin Nierembergii*. Nam de foricibus, qui caudam in extremo villosam gerunt, & præter alios strident: nec non bestiola Olao *Leem* dicta, quæ per repentinos imbres de coelo decedit, & donec herbam renatam gustaverit, vivit: nec non mure Napelli, quem napello vivere Matthiolus scribit, non est, quod dicam. *Mus avellanarum*, qui aliquibus Plinii forex est, aliquibus mus corylinus, duplex est, *Major* nempe, & *Minor*. Illum Gesnerus vivum aliquot dierum spacio nutrit, & refert formâ & magnitudine ratto assimilari, colorem murinum per tergum & per latera magis ruffum, præsertim verò in capite habere, auriculis magnis glabris, & ventre candido præditum esse: pedibus esse rubicundis, caudâ tota hirsutâ, oculis majusculis eminentibus nigerrimis, barbâ partim alba partim nigra: ab eo denique animali domesticorum odorem emanare. *Minorem* Albertus rubicundi coloris esse scribit. Estque vel *odoratus* rarior, Muschardinus Italix, vel inodorus frequentior. Quidam *Luciolum* nuncupant, quod illius oculi mamixæ lucidi esse videantur. Valdè est muri araneò similis: nec fortè à mure peregrino Hieronymi discrepat. Nidificat inter ramos Coryli, vel Eupatorii Avicennæ Cannabinæ nuncupati. Nidi forma ab Ambrosino exhibetur. Tam cavernas arborum quàm terræ latibula incolit, inque iis nucibus avellanis vescitur. Quidam à fine autumnii ad initium veris dormire, & quidem continuo scribunt: alii & ex his qui nutrire, interpolato somno corripit. *Mus araneus* à figura nomen muris, ab agilitate, (super tensum filum, vel aciem gladii impunè ambulare potest) aranei accipit, si Sipontino credimus; si Gesnero, à venefica facultate, ut piscis quidam araneus vocatur. Græcis est *μυγάλη* vel *μυρογάλη*. Mustela eum multò minorem, colore ad cinereum declinante, & dentibus tenuibus Aëtius prædicat: brevem & gracilem caudam Albertus, rostrum verò longum & acutum Matthiolus ei attribuunt. Oculos in comparatione ad totum corpus tam pusillos habet, ut Plinius eum obtusa acie præditum crediderit, & Nicander *μεγαλήν τοφλήν*, Vegetius murem cæcum appellaverit. Colore est partim fusco, partim rufo, cum albo ventre. Rostrum habet porcinum, pilis refertum; caudam in comparatione ad alios mures duplo minorem. Dentes Ambrosinus ita describit. Dentes, inquit, quos in illo mure conspeximus, anterior-

Scalig. Exercit. 59.

Ælian. H. A. l. 15. c. 26.

Ruell. Hist. Plantat. l. 4.

Ambrosin. de Digit. Vivip. l. 2. c. 31. *Nomen.*

Ælian. H. A. l. 6. c. 21. *Locus.*

Cibus.

Cardan. de rer. variet. *Generatio.*

Ambrosin. de Digit. Vivip. l. 2. c. 32.

res in utraque mandibula duo erant exerti; inter maxillares nullus locus extabat vacuus, sed omnes continuati: maxilla unicum tantum habebat punctum longiusculum. Secundus omnium minimus tria habebat puncta, adeo exigua ut visum omnino effugerent. Subsequebantur maxillares quatuor: quorum priores tres majores dividebantur in tria puncta: quarti vero punctum adeo perexiguum erat, ut difficulter videretur: quatuor tamen asperitatibus aliquantulum eminentibus insigniebatur. In oris parte inferiori, præter quatuor dictos, cæteri sunt sine ullo spacio continuati. Quocirca omnes numerum vigesimum quartum explebant. Ultra Apenninum non haberi attestatur Plinius: at secundum Matthiolum in universa Italia, & præcipue in Tridentino agro, Germania quoque habentur. Hyeme in stabulis versantur: æstate hortos & loca fimo bubulo repleta frequentant. Vescuntur herbarum radicibus: sed carduos præcipue esculentos, magno agricolarum detrimento, devorant. Gesnerus, cadaveribus quoque vesci audit. Veneno in agro Tridentino carere, Matthiolum prodidit: ab orbitis rotarum maxime abhorrere Barbarus. Acutissimam in comparatione aliorum murium habet vocem: sed quia hallucinantis visus, segnis. Morsum ipsius venenatum esse vel inde colligas, quod a fele caprus, non comedatur. Prægnantis, prægnanti majus parit incommodum. *Mus Alpinus* à loco in quo degit, nomen accepit. Hermolaus Marmotam vocat. Nonnulli Græci *δενόμου*, ob similitudinem quam cum muire & urso gerit. Albertus ad eum Empetram refert, sed quid hoc animalis sit, hodie ignoratur. Capite leporem refert, magnitudine cuniculum, auresque tam breves habet, ut vix supra pilos emineant: vario oblongoque pilo instar taxi vestitur. Caudam habet brevem; pedes unguibus acutis armatos, quibus altè terram effodit. Hyeme quandoque ita pinguescit, ut monstrore intumescat. Nonnulli addunt, dentes ejus anteriores esse leporinos, & si forcipibus secantur, unà nocte renasci. De *Interioribus* observationes Severini hæ sunt. Testes aliquantulum superiores. Cæcum per amplum, ventriculi modo, internè asperum & reticulatum, in quo vulva insignis introrsum externè. Hepar multifidum septenis lobis distinctum, quorum major vergit ad sinistram partem, reliqui ad dextram, omnes a se invicem distincti. Cyctis fellis cholidochi valvula ad duodenum. Splen longus hirundinis majoris modo. Ureteres non recto ductu descendentes à renibus, sed dorso hærentes & exigui. Frequentissimi in Annanienfibus Tridentini soli montibus conspiciuntur. In nivosis quoque & frigidioribus Germaniæ partibus versantur. Vescuntur

fructibus, lacte inprimis, quod more porcellorum sugunt. Ideo sæpe in pastorum casis deprehenduntur. Cicurati edunt pulmentum, panem, pisces & alia quæ illis obijciuntur. Circa festum Nativitatis Dominicæ terrâ effossâ dormientes deprehenduntur, nec citius expergiscuntur quàm à solis vel ignis calore resoluti. Levem ob causam metu consternantur: indignabundi, argutam, sibilantis fistulæ instar, vocem edunt: vel aëris mutationem prænunciant. Odore sunt tam gravi, ut vix æstate perferri possit. Nec deest ipsis ingenium. Appropinquante hyeme fenum & paleas in latibula convehunt. Unus stratus humi feno oneratur: alii caudâ onustum in cryptam pertrahunt. Duo foramina in uno quoque latibulo parare solemne ipsis est, per quæ in unum locum tendunt, & juxta unum excrementa deponunt, & per aliud in cryptam ingrediuntur. Adventante frigore meatum ingressus claudunt; exasperato, aliud adeo obturant, ut ne bipalio quidem penetrari possit. Circa finem Septembris in cryptam ingressi, conglobati, septem pauciores vel plures, sed impari plerumque numero, super stramine ad vernum usque tempus stertunt. Reliquis egressis, cryptæ custos adfluit, & ex alto speculatur. Si quid observaverit, voce acutissimâ monet. Sic ad cryptam concurrunt, ipse ultimus ingreditur. Sereno duntaxat coelo colludunt, obmurmurant, & aliquando, observante Stumpfio, canicularum instar latrant. Cicures dentibus pediculos hominis, simiæ instar, venantur. Veniunt apud Alpium incolas in cibum, inprimis circa hyemis initia. Assantur, coquantur in jure nigro, & sale inspersi infumantur. Puerperis etiam conceduntur. Pinguedo nervos contractos emollit, & illita umbilico fomnum conciliat. Ventriculus colicâ laborantibus utiliter imponitur. *Mus aquaticus* meminit Aristoteles in *Mirabilium* libro. Bellonius ipsi tres meatus assignat, unum pro facibus, alterum pro urina, tertium pro sætu. Si Clusium sequimur, magnitudine ad talpam accedit. Coloris est fusci præter ventrem, qui pilis ex albo cinereis vestitur. Villis tegitur densis & molli-bus. Caput pro ratione reliqui corporis est parvum: pars superior rostri prominula. Dentes quatuor, in utraque maxilla bini, sed in inferiore minores & obtusi. Oculi vix conspiciui. Rictus latera longis cinereis villis obsita. Cauda rarissimos pilos habet, & osseo quodam nervo mediam secundum longitudinem secat. Posteriores pedes anterioribus sunt longiores & magis plani, & membrana quadam, prout in palmipedibus cernitur, conteguntur. Ad strymonem & Nilum frequentissimi sunt, & serenis noctibus vagantur. Gesnerus in parvulis rivis versari scribit. Aristoteles Lusis Arcadiæ in fonte

Plutarchi.
Sympof. 4.
quæft. ult.

Nieremb.
Hift. Exod.
l. 9. c. 3.

quodam. Vefcuntur plantis aquaticis, frugibus, & piscibus. A Magis olim Zoroaftrem fecutis mali Dæmonis effe putabantur: fi modo de muribus istis & non teftudinibus id fumendum eft. In nonnullis Gallia locis in cibo adhiberi, proditum à quibusdam. De *Coyopollin* ita Nierembergii. Vocant Indi *Coyopollin* parvum animal, muris mediocris magnitudine, aut paulo majus, caudâ verò auriculis & roftro *Tlacuatzin* fimile: nam caudâ & pro manibus utitur, & natus matrem, cum metuit, stringit amplexu. Cauda eft craffior murinâ, firmiorque: venter ex albo pallescit: auriculæ funt translucidæ, pedes & crura candida. Educatur in arboribus sobolem. Poffet ad genera *Tlacuatzin* referri, nifi alicui præplaceat pertinere ad mures, aut effe fui generis. Invenitur in montibus tepoplanicis. Cæterum crocodilis quoque cauda pro manu eft, illâ nimirum arripiunt prædam, belluas, homines.

CAPUT XVIII.

De Talpa.

Ambrosin.
de Digt.
Vivip. l. 2.
c. 36.
Nomen.

Descriptio.

NOmen Talpæ huic animali quod defcripturi fumus Latini indidere, feu à Græco *τῆπιον* inhumo, quod affidua terræ effoffione feipfam quafi inhumare videatur: feu quod cæcum fit, quod Græci *τὸ φλὸν* vocant: feu quod fe perpetuo *τῆπιον*; id eft foveat, sub terra: feu à Chaldaico *ܬܪܐ* findere, quod terram findat. Græcis dicitur *αἰσθαλῆς* & *ἀσθαλῆς*, *ἡ δὲ τὸ πᾶν*, quod terram unguibus affiduè vellicet: Nicocli *σκαλόψ*: Varino *σίφινδης*, quod terram fodiendo evacuet. *σίφινον* terram, & *σίφινον* Varinus interpretatur. Volaterranus & alii nuperi auctores Græce blaetam, *ὅπερ ἔβλαπτεν*, id eft à nocendo vocant, fed perperam. Descriptionem quod attinet, Scaliger muri non valde fimilem fcripsit. *Corpore* latiore & depressiore, *pedibus* quodammodo urfinis, cruribus breviffimis, *capite* bufonino. Albertus quinque digitos in *pedibus* anterioribus, quatuor in posterioribus habere fcripsit: Gefnerus, quintum ita introrfum fpectare, ut minus curiose fpectanti occultetur, reliquit. Palma anteriorum pedum lata & manui fimilis: *Collum* inter crura anteriora breviffimum & propè nullum: *pili*, breves, denfi, & in nigredine splendentes. *Interna* & *Anatomica* fi fpectes, *Dentibus* binis & antè conjunctis caret, fed infar canis & mustelæ utrinque ad latera fingulos eminentiores habet. *Pulmones* cum multis fibris feparatis, nullo inter fe communi principio cohærentibus, una cum corde, verfus inferiorem ventrem fiti funt. *Crura* anteriora ex duobus conflant offibus, quæ in os humeri inferuntur.

Sic fortius beftia hæc fodit: pofteriora crura habent os, quod paulo infra genu in alia duo dividitur. M. Aurelius Severinus hæc de internis in talpa mare habet. Vifcera, inquit, omnia, ficut in aliis quadrupedibus. I. Præterquam, quod nullum colon, inteftinaque reliqua ferè uniformia, nullum enim cæcum. II. *Teftes* intrò conditi ficut in dafipodis, colore tamen nigro: neque in loco, qui proxime renibus effe folet, fed à lateribus veficæ, in infima abdominis cavitate. III. *Renes* conjuncti proximæ venæ cavæ pufillo, five fpatio emulgentium. IV. *Fel* pro corpore majusculum, cum confpiciis cholidochis. V. *Ventriculi* janitor lineâ quâdam tranfverfa, veluti ligatus atque diftinctus. VI. Vafa ferentia fuffulta (fi rectè memini) ureteris. VII. *Larynx*, qualis in teftudine terreftri, mutum enim animal. VIII. Obfervata in *interna aure* duo, malleolus & incus, mire perpuilli: Os inter medium duobus aurium offibus egregiè pumicosum. IX. Processus inferioris *maxille* utriusque tres, X. Vera equidem funt, quæ fcribit Plinius de *oculis* talpæ. Vifuntur enim ipfi in fuo loco nigri toti, contekti cute pufilli, quale eft femen *Pfyllii*: nulli ipsis inferti nervi optici, (quantum mihi advertere licuit) nec fatis fcio, num fungi videndi munere poffint; non eam folam ob caufam, quod tekti corio funt, verum quod multa eis adhuc defint, quæ neceffaria funt. Omnino autem exiftimârim, veftigia hæc effe oculorum potius, quam oculos verè, in quibus ludere voluiffè naturam appareat, atque ostendere, non deeffe fibi facultatem oculos fingendi, quando velit; aut verius fortaffe fingimus hæc ipfi. Rurfus & in alia talpa Anno 1617. obfervata hæc: *Panniculus carnofus* totus & mirè commiffus cuti. Cerebrum pro ratione magnum & benè diftinctum & exornatum. Auriculæ non funt externæ, interna penitus abdita, cujus officula tria fupramodum perpuilla; inteftina funiculi fimpliciffimi modo exilia. In Thesfalia adeò humus talpis familiaris, ut fuffoffum ab iis ibi oppidum quidam prodiderint. In Orchomeno agro, prodente Aristotele, frequentiffimæ vagantur. At in Lebaica nullæ funt, nec illatæ effodiunt, forte propter foli duritiem. Lumbricis præcipue vefcuntur: ideo ftercoratis & fterquiliniis gaudent. Abfumunt & omne aliud vermium genus, eoque deficiente, terram comedunt. Vifi radices herbarum & frugum, bufones etiam infeftare. Ex terra pluviis madida, & putrefcente, ut plurimum generantur. Nec per horæ fpatium fupraterram vivere poffe dixit Albertus, fed falfo. Vifum quidem habent hebetem, fed auditum excellentem. Invenit in Medicina & aliis ufum, *Dens* à viva evulfus dentium dolores fedare creditur. Pilullæ ex ea cum melle

Severin. in
Zootomia
Democrit.
P. 317.

Locus.

Plin. H. N.
l. 8. c. 28.

Cibus.

Ufus.

melle subactæ & devorata strumas absumunt. *Caput* incisum, & cum terra à talpis cruta tusum, inque pyxide stannea in pastillos digestum, contra omnes colli dolores exhibetur. *Sanguis* pilos restituit: & ad paronychias commendatur. *Adeps* ad capillorum augmentum supprimendum conducit. Marinellus in hoc casu unguenta quæ ex pinguedine talpæ & vespertilionis componuntur, præscribit. Cinis in sanandis fistulis chirurgis inservit. Mizaldus periclitaturus an æger moriturus sit, nec ne, chelidonium cum talpæ corde pulvino agrotantis supponit. Cantaturum, aut clarâ voce vo-ciferaturum credit, si convalescet: fleturum, si minus. Aquâ, in qua talpa maduit & pilos deposuit, pilii restituntur. Ex pellibus pileolos confici, memorat Agricola.

CAPUT XIX.

De Echino terrestri.

EChinus, non ab aculeorum hirsutie, sed potius *ἐχὼς* & *μη δυνάμεται ἐχέειν* *ἄλς* *ἡ δυνάμεις*, *ὅτι οὐ δύναται ἐχέειν*, quod ob aculeos teneri non possit, nomen sortitus est. Galenus Acanthionem terrestrem vocat; Suidas *ἀκανθόχοιρον*, porcum spinis horrentem, *χόλιον*, & *χοιροχελιδόν*; Hesychius *ἀκανθόχοιρον*, propter dorsum spinis refertum: Lycophron ab insigni vaframento Nauplium nuncupavit, quod nomen Latini Echino marino tribuunt. Quidam cum Plinio, Hericem, Hericium, & Herinaceum proferunt; nec malè. Ab horrore enim, vel etiam ab hærendo, quod fructus ejus spinis adhæreant, hoc animal dictum esse videtur. Est bellua, ut Hermolaus breviter descripsit, cuniculi magnitudi-ne, aculeis vallata præterquam in ore, & pedibus, parte inferiori, quam rara lanugo tantum operit. Observata in illo. *Musculi* conglobatores totius corporis. *Intestina* æquè crassitudinis, imò verius tenuitatis quàm longissimæ, sine cæci aut alterius distinctione: in summa, qualia muri. *Quin* paria istorum stercora, pares testiculi, qui proximi peni; hic longissimus exortus in viam caudæ compressus semen emisit, muci flavioris imagine. Septipinne *jecur*. Peni adstites carunculæ quædam subalbidæ, racemosæ, in pinnulas distinctæ, rupis præruptæ modo, quas pulmonis fibris quadantenus assimilare possis. *Testes* intus latent, & lumbis affiguntur. *Ossa* quædam rotunda, quædam planiora, acuta alia, alia obtusa conspiciuntur. Ubique locorum reperiuntur, Cretam si excipias, si Plinio credendum. Ad annum absque cibo durare posse, scripsit Aristoteles. Pomis verò & uvis ut plurimum victitat, quæ decussa & spinis infixæ ad latibulum defert. Lac etiam & vinum in ædibus potare animadversum. *Inimicitias* gerit, cum urso, lupo, vulpe, vi-

pera, & potamogeto herba. In orbem colli-gi, & quasi mortuum jacere, simul atque vel canum latratum sensit, vel ferarum odo-rem vel venatorum accessum; cubilia ad Aquilonis & Austri vicissitudinem commu-tare; & si domi alatur, pro ventorum flatu modò ad hunc, modò ad illum parietem ac-cedere, ut Aristoteles reliquit; dum capitur, urinam, cujus contactu spinæ dorsi decidunt, emittere; humano denique ritu congregi, ad naturam ipsius spectat. Venit apud quos-dam suillus erinaceus in cibum: sed nisi bene apparetur, stranguriam adfert. Ideò unico ictu mactandum, & valis urinæ expurgan-dum quidam censuere. Mense Augusto ob pabuli copiam sunt pinguiores. Durantes cum multis aromatibus in artocreate coquit; Gesnerus in aceto & vino fervefacit, deinde lardo & caryophyllis distinctam, in veru tor-ret. In Medicina multum adfert emolumen-ti. *Hepar* renum vitiiis miro est auxilio. *Felle* contactæ verrucæ sicantur. *Lien* aslatus & pulverizatus efficacissimo est lienosis reme-dio. *Caro* ad prohibendum abortum præ-scribitur. Eadem, unico ictu mactati stran-guria laboranti commodè suspenditur. Ex-siccata plica laborantibus exhibetur. *Adipe* in autumno capti Poloni in eodem morbo utuntur. Idem in lithiasi insignem habet prærogativam. *Sanguinis* haud spernendus est in lapide vesicæ, renum, & ardore urinæ usus. Cinis *Combusti* cum adipe ursino ca-pillis decorem restituit. Eodem ad præca-vendum abortum cum oleo unguine multi utuntur. Adhibetur idem in renum dolori-bus aqua intercute & aliis. *Fimus* recens cum sandarachò, aceto, & pice liquida, flu-xum capillorum cohibet. *Corium* cum spi-nis olim ad extergenda vestimenta adhibe-batur. Distinguitur in Suillum, qui rostrum sui simile habet, & *Caninum*, qui canis. Ex eodem insignis factor exhalat. In Brasilia, ut Jesuita quidam apud Majolum habet, ani-mal Echino simile vagatur, cujus setæ præ-longæ coloris pallidi & in summitatè nigræ, valde aculeatæ erant. Mirum in illis na-tura recondidit. Cuicumque enim cuspis ejus admovetur, etiam ab animante revulsa, illam, & præcipuè carnem penetrat: expe-rimentoque compertum est, hujusmodi acu-leum, unius noctis intervallo crassissimo corio admotum, illud perinde ac esset manu hominis impulsus, penetrasse.

CAPUT XX.

De Histrice.

ERinaceorum generi adscribit Hystri-cem, Plinius, Ælianus & Oppianus. Græcis *ὑστρίξ* *ὑστρίξ*, & *ὑστρίξ* *ὑστρίξ*, nuncupatur, à *ὑστρίξ* & *ὑστρίξ* sine dubio. Plinius foeminino genere effert, masculino Oppia-nus. Quidam sub muris Africani Plauto veni-

Aristot. H. A. l. 9. c. 6.

V. S. S.

Differen-tia.

Ambrosin. de Digit. Vivip. l. 2. c. 38. Nomen.

Ambrosin. de Digit. Vivip. l. 2. c. 37. Nomen.

Descriptio.

Severin. Zoot. De-mocrit. p. 319.

Plin. H. N. l. 9. c. 12. Cibus.

Ælian. H. A. l. 16. c. 69.

Descriptio.

venire crediderunt, quod frequens in Africa esse perhibeatur. Isidorus à stridore quem aculei in motu animalis excitant, deducit, & sine aspiratione scribit. Claudianus eum ita descripsit.

os longius illi

*Assimilat porcum, mentita cornua setæ
Summa fronte rigent, oculis rubet igneus
ardor,*

Parva sub hirsuto catuli vestigia dorso.

At si Agricola attendimus, habet Hystrix os leporino simile, dentes quatuor longos, duos in superiore, totidem in inferiore parte, aures humanis similes: pedes anteriores pedibus Taxi, posteriores urfi assimulantur. Dorso & lateribus spinæ bicolores, partim albæ partim nigræ infunt, & aliquando ad duorum vel trium palmorum longitudinem accedunt, quas animal, ut pavo caudam, erigere potest. Ingressurus in cavernam, erectas dimittit. Solinus in Æthiopia frequentissimos vagari scribit: quamvis in tota Africa & India inveniuntur. Habentur & in Italia, sed in Gallia raræ. In Galæcia reperiri, Compostellani peregrinatores testantur, qui eorum aculeos in pileis deferunt. In dūmetis autem & vepribus latent. Visitant pomis, rapis, pyris, pastinacis, & pane comminuto: bibunt aquam, sed vino mixtam avidissimè. Aculeos tensâ cute in hostem ejaculari, unde fortè sagittandi ars, & nomen *αἰκλῦ ποσειδῶνος*, destinato ictu ferire, noctum magis quàm interdiu ad pascua progredi; hyeme in cavernis latere; tot dies quot urfa in utero gerere, à natura obtinuit. Nec huic gula percipit. Commendatur enim in epularum magnificentia. Apparatum vide apud Ambrosinum ex Scapio. In Medicina videtur iisdem affectibus conducere quibus erinaceus. Mulieres ad discriminandos capillos aculeis eorum potius quàm acubus utuntur. Plinius ex iisdem dentifscalia ad roborandos dentes conficit. Circa Differentias nihil ferè occurrit. Quidam in Marinum & Terrestrem distinguunt, & dentalium pro marini aculeis venditant; sed nimis audacter. Nemo enim authorum marini meminit. Referri huc potest incertæ naturæ animal, quod Cardanus Anno 1550. Papiæ vidit. Magnitudine erat vulpis, rictu leporino; dentibus prominentibus adinstar sciuri; oculis nigris & serpentinis; comâ hircinæ barbæ simillimâ, quæ à capite ad collum ferebatur, cum pedibus anterioribus taxi, posterioribus urfi; auribus in figura humanis; cum spinis ferè centum more hystricis, quarum quædam in apice curvabantur, alioquin immobiles, & in motu animalis strepitum edentes. Cauda animalis erat anserina, cujus plumæ paulatim in spinas degenerabant. Vox subobscura & rauca quasi latrantis canis: canesque odio prosequabatur. Fortè ex hystrice aliaque bestia natum erat.

Locus.

Cibus.
Agricola
de Animal.
subterra-
neis.

Natura.

Ufus.

Differen-
tiæ.

CAPUT XXI.

De Tato, seu Echino Brasiliano.

Tatum Nierembergii verbis describemus. Cataphræctum, inquit iste, quoddam animal Indiarum varie appellatum invenio. Hispani nuncupant *Armadillo*. Lusitani *Sneubertado*. Itali Bardato: Thevetus Brasilico nomine *Tatau*, Maphæus *Tatusiam*, Gesnerus *Tatum*, nova Hispania *Chirquinchum*, alicubi *Cassamin*, aliis Indis *Ajatochtli* dicitur, hoc est, cuniculus cucurbitalis; specubus enim, quemadmodum cuniculus conditur. Una nocte spacium leucæ excavat; quare nisi ligetur, nullibi se includi patiens, perfodit usquequod extra domum & oppida emergat. Variæ sunt species horum loricatorum: mihi omnium mirabilior ajatochtli, cujus & rarior mentio & sterilior, quare illud præsertim narrabo. Duris armatur laminis, quas ipse vidi. Canis Melitenensis est magnitudine. Pedes ei suis parvuli, rostrumque sed oblongum & gracile. Armatur undique crustâ, militari & cataphræcto equo persimili, in laminas connexas atque mobiles divisa, quibus se convolvit atque undique tegit. Auriculæ murinæ, sed longiores, nimis graciles. Cauda ejus est longa, teres, geniculata, eodemque modo laminis crustatis circumvallata. Venter candet, ac pelle operitur molli, humanæ haud dissimili, longiusculis exilibus, ac raris pilis vestita. Formicas venatur. Cubat supinus, atque cauda ori admota, qua rectâ procedentes formicæ incidunt in insidias, & cibum deludenti fuggerunt. Antonius Herrera addit, lotio proprio implere lacunam super ventrem inter crustas suas, sic formicas, humore obstante, per caudam procedere usque ad os. Cum fugit, in præceps caput caudamque ventri applicat, ac tuetur crustâ, & sese in spiram convolvens rotat. Quod si pertinacius quispiam insectari perseveret, semet in venatorem contorquet; ut haud rarò, validè tundens dorso suo pectus hominis exanimat. Versatur in uliginosis lacubus. Lumbrius, piscibus ac vermiculis vescitur, & quibusdam arborum baccis & pomis. Caro impensè pinguis, dulcis, ac pituosi alimenti, & excrementis redundans. Utebantur caudâ antiqui ad eas, quas zebratanas vocant, (quarum apud illos usus frequens) munientas. Crusta multis rebus utilis, tum ad bellicosus usus, tum ad pacem opportunis. Adjunt illius crustam tritam, ac drachmæ unius pondere intrâ sumptam, evocato sudore magnopere conferre morbo Gallico curando. Invenitur locis calentibus lacustribus & uliginosis. Duæ apud Lucatanenses horum animalium sunt differentiæ. Quædam innoxia

Nieremb.
Hist. Exod.
l. 9. c. 6.

teffellatum. A collo ad medium corpus, quasi orbiculatæ figuræ teffellis variè pictis distinctum, medio autem corpore ternis ordinibus quadrangularem teffellarum variè etiam picturarum insignitum. Postrema tegminis pars similibus orbibus distincta erat, qualibus pars anterior. Totum etiam caput ad nares usque similibus testis tectum. Aures patentiores, nec aded mucronatas habebat. Cauda brevis erat, duobus digiti humani extremitatibus non major, tota etiam orbicularis teffellis tecta. Ventrem nullâ crustâ tectum fuisse, sed villis duntaxat oblitum, pictura representabat, quemadmodum etiam crurum posteriorem partem, atque guttur & nares. Posteriores pedes ternis digitis, & calcari præditos fuisse, pictura fidem faciebat: anteriores vero duntaxat binis & calcari, nisi à pictore fuerint prætermitti: penem satis longum & exertum habebat. Nescio an huic desit virtus, quam de Armadillo, sive tato caudato Monardus dixit. Præcipuam ejus vim in cauda officulo esse: cujus in tenuissimum pulverem redacti pilula, confecta magnitudine capitis aviculæ, atque auri indita, dolorem ejus sedare; Et tinnitum etiam cum exigua surditate conjunctum curare traditur. Certe dolorem sedare, frequenti experientia probatum est. Adjicio astum Chirquinchi, quod audiavi ab his, qui primum fama, deinde visu acceperunt. Testes oculati sic referunt. Pluente cœlo supinus jacet: in ventre qui exermis est, colligit aquam contentam inter crustas laterum, sic perdurat transacto imbre ferme diem integrum, donec occurrat incaute cervus subundus, qui accendens ad potum, immergit buccam, tunc claudit se Chirquinchi, labra & nares comprehendens cervi. Hic discurrit hinc inde: nunquam laxat prædâ chirquinchi, donec fatigatam interimat angustia spiritus. Astum quoque erinaceorum habet, in crustis suis se, dum timet, conglobat, nec nisi ad ignes relaxatur. Conchulis hujus animalis utuntur Indi in maleficis, præcipue ad explorandos & puniendos fures. Tangunt prius cum concha terram à fure calcatam, sive aliud quicquid ille attigerit: impleant maxillam potione quam chicham vocant: tympanis deinde circumsonant, concha interim sponte subfultante & tripudiante. Hoc beneficio notatur vultus furis pustula, in genis quæ per utramque maxillam serperet, nisi maleficium diligenter dissolvatur.

TITULUS III.

De *Quadrupedibus Domesticiis*.

CAPUT I.

De *Cane*.

Ambrosin.
de Digit.
Vivip. l. 3.
c. 1.
Nomen.

Description.

M. Aurel.
Severin.
Zootomia
Democrit.
p. 306.

Tantum de Semiferis, sequuntur *Domestica*, *Canis* nempe & *Felis*. *Canis* vox olim Canes, ut plebes, trabes, pronunciabatur, venitque si Varroni attendimus, à canore latratus, quòd voce signa edere soleant. Græcis veteribus dicitur κύων, & in obliquo casu κυῶς, sine dubio κυῶς τὸ κύων, amo, seu quòd proniores sint in Venerem: seu quòd animal sit φιλοδέσποτον Modernis vocatur σκύλας nomine fortè à Scylax detorto. Aliis ὑλάειν latrator, à voce quam edit: nec non αἰκνῶντις apud Hesychium & Suidam, κυῶς τὸ αἰκνῶντις, quod cauda notis blandiatur. *Descriptionem* non est quod addamus. Notissimum utpote animal est. In Cane secta sequentia observata sunt Severino, quæ ejusdem verbis exponemus. *Uterus*, inquit, bicornis, cervice brevitatè & angustia medio digito respondente. Cornua lata, quantum manus caperet, longitudine majori, quam palmari communi mensura, crassitudine ubique æquali circumvoluta autem simplici gyro, non anfractuosa vel cellulata, uti fuillus. Feruntur extrema cornuum usque ad renes colligata venis, quæ ad uterum veniunt, & testibus ipsi incumbentibus per membranam. Ad ostium primum cervicis visitur corpus quod dum mole, figura atque colore referens caput limacis exertum à sua cochlea. Impositus in hujus os stylus ferreus non est admissus, nisi postquam est dissectus parum. Dissecto utero inventi sunt involuti fætus, involucra autem tria, chorion, allantoides, amnion: sed priora vix dividi possunt; adeò sunt annexa, adeò sunt tenuis substantiæ: In dextro cornu catuli quinque, in sinistro quatuor, singuli suis involucris contenti, chorion unicuique per medium; transversim positæ zonæ latæ duorum digitorum, distinctæ lineis atris ab extremo, & rubrâ in medio: singulæ autem sanguinem fuscum colore sibi respondentem repræsentant. *Omentum* veluti saccus, qui integit intestina superiora; nascitur ejus pars superior è fundo ventriculi per mediam ipsius lineam totum ambiens; simpliciter & pars posterior quæ inseritur in lienem & in pancreas. *Pancreas* autem statim apparet post exortum duodeni, illigatum huic & venæ portæ. *Venæ porta* mittit triplicem ramum ad conterminas partes mesentericum, coeliacum, splenicum. Coeliacus excurrit partem ventriculi

concavam. Splenicus mittit superne ramum ad ventriculum parte hujus convexâ per mediam lineam, usque quo superius ventriculi os pertingat. Ligatus est *splen* diaphragmati per mediam membranam plusdigito latam, & ventriculo per omentum: Habet splen figuram propè pedis amplè calceati. *Colum intestinum* nullum, recti finis partem accipit cæcum, cujus figura veluti involuti, quod explicatum longitudine est medii digiti. Ad finem recti internè *valvula* una insignis, altera in cæci principio sed minor. *Rectum* parte inferiore valdè corrugatum: Ab aorta sursum convolutus ad cava hepatis plexus arteriarum, qui appropinquat pancreati, attractum hoc attrahit hepar & superiora viscera. Supra os superius ventriculi glandulæ duæ, major & durior dextra quam sinistra, ambæ succulentæ humidiores. *Sanguis* canis ater valdè, propter adustionem quippe. Ad finem *linguæ* inferitur musculus teres descendens per mediam ipsius lineam. *Auricula cordis* dextra duplo major quam sinistra. In cranii parte tum dextra, tum sinistra, quas integunt muscoli temporales; nulla apparet involvens membrana, præterquam ea, quæ propria musculorum est: in aliis vero cranii partibus manifesta apparet. In radice linguæ utrinque est glandula parva & producta obliquo situ. Circuli arteriæ asperæ transversim positi, non sicut in sue obliqui. Canis *cerebrum* majus quam suis. Inverso cerebro patuere processus mammillares & spinalis medullæ initium, per quorum medium facta sectione profundiori patuerunt duo ductus parvi, alter, qui à parte mammillarum per rectam lineam tendit ad finem usque cerebelli, alter paulò citerius superne positus huic obliquè. De cætero, pedes canum anteriores in quinque digitos, posteriores in quaternos distincti sunt: foeminarum venter, duplici mammarum ordine, in utroque scilicet latere, exornatur. Albertus etiam generosi canis imas nares, rotundas, solidas, & ferè obtusas observat. Aristoteles verò & Ælianus calvam futuris carere asseverarunt. Galenus denique musculos temporales in canibus veluti in lupis & leonibus robustissimos observavit, quòd in frangendis ossibus maxillas exercere soleant. De *Loco* hoc tantum pono, nullos in Brasilia ante Vilagagnonis expeditionem fuisse, si Lerio credimus: si Textori, Sigaron Arabiæ insulam non ingredi, ingresses, vagari donec pereant. Πάμφαγοι sunt: nec vel à piscibus, vel à cadaveribus abstinent; quod primum Balbus in itineralio prodidit. A carnem tamen suæ speciei, ut & fulmine ictis abhorrent. Gramen etiam comedunt, sed medellæ gratiâ. Fraxini fructu abstinent, quòd vertebræ coxarum dolo-

Galen. de
usu part.
l. 11. c. 9.


Locus.

Cibus.

Canis Leporarij



Canes



Canis






Canes

Huide







Canis Indiq . 1.



*Canis Venatorius Iag - hund
Wind - spiel*





dolorem inde incurrant. Potione vini vel aquæ ardentis dementantur, & divagantur, donec vapor evanuerit. De *Generatio* nota. Semper eis coitum opportunum: Tardius tamen veris initium, rarius autumni tempus congregiendi idoneum, scripsit. Coeunt ad annum duodecimum & implentur: sed sæpè post novem sunt inutiles. Degenerant, si annui venere utantur: si quarto anno, generosiores producant. Quatuordecim dierum spacio vel circiter libidine tenentur; & post sextum mensem à partu marem iterum appetunt. Dum turgescere incipiunt, foeminæ genitale prominet & humescit. Congrediuntur autem & cum aliis animantibus; ut cum lupis in Cyrenensi agro, unde nati Crocutæ: cum leonibus, unde Leontomiges: cum Castoribus unde Castorides; cum vulpibus unde Alopecides. Aversam exercent Venerem & cohærent. Ferunt dies sexaginta, quædam sexaginta tres. Pariunt duodecem: aliquando & sex decem. Visa Bononiæ leporaria, quæ septendecem enixa est. Albertus verò prodit, se, ex illorum genere qui Mastini dicuntur, vidisse, quæ primo partu novendecem, altero octo decem, tertio tredecem dedisset. Quæ mulieribus in deliciis, singulos ferè enituntur catellos. Primum mares parere, & in cæteris fæturis alternare ex Plinio dicuntur, dum modo tempore opportuno congressus fiat: primusque catulus, in lucem prodians, secundum nonnullos patrem refert: cæteri, ut casus tulerit nascuntur. Gignunt cæcos, & quo largiore aluntur lacte, eo tardiorē visum accipiunt: non tamen unquam ante vicesimum primum diem, nec ante septimum. Quidam tradunt, si unus gignatur, nono die cernere; si gemini, decimo. Idemque in singulis adjici, totidemque esse tarditatis ad lucem dies: quod tamen nondum experientia demonstravit. Lac ante diebus quinque quàm pariant habent magnā ex parte: quibusdam quatuor diebus anticipat. Crassius id quàm cæterorum animalium, scrofam & leporem si exceperis. Non excedunt annum decimum quartum communiter: quamvis quidam ad vigesimum secundum ascenderint. Laconici, inquit Plinius, annos decem, foeminæ duodecem, cætera verò canum genera quindecim vivunt. Junioribus albisissimi sunt dentes, & vox acuta: senioribus hebetes, crocei, & vox crassior. *Vocem* authores variè expressere. Latrare & bauba edicuntur communiter: βόαιεν Græcis catuli, ὑλαίνεν adulti: λάλειν dum bibunt: κυζάειν grunnire, dum queruntur aut blandiuntur: σιυζάν, canire & cattullire, dum libidine feruntur: περικυαίν, quando latrant antequam feram invenerint: δραρίζεν, quando irritantur. De *Antipathia*

hæc pauca sufficiant. Metuere hyænam in tantum, ut ejus umbra, si Plinio & Solino credendum, eos obmutescere cogat: Crocodilos in tantum, ut secus Nilum currendo, aquam ejus, etiam sitibundi lambant. Cum lupis eam colere inimicitiam, ut vel ideo Porta pellem lupi suspensam super demorsum à cane rabido, aquæ timorem amolire dixerit. Ab otide metui, quòd tardo & humili volatu utatur. Abhorre quosdam à quibusdam. Blondi canis gallinarum carnem ne attingebat quidem. Alii ossa avium sylvestrium respuunt. Olim in templum Herculis victoris non ingrediebantur, seu ob odorem clavæ in limine positæ, seu ob rem aliquam invisam sub folio sepultam. Nonnulli ad citharæ pulsus miserabiliter gemunt: ad clangorem tubarum ululant: in disputatione bombardarum longissimè aufugiunt. Quantus inter eos & homines sæpè sit consensus, in sequentibus audiemus. Ad *Naturam* canum pertinet, quòd citò iram concipiant, & ideo ob unicum os diutius inter se digladiantur: quòd domos vigilias agendo custodiant: ob somni levitatem faciliè excitentur: cum mulieribus aliquando Veneris consuetudinem habeant, & palam congregiantur, unde à Spartanis templis arcebantur. Iidem odorum differentias nobis incognitas sentiunt: posteriora odorantur, quod cum sagaces sint, teste Plinio, qualitates habitudinum corporis odore cognoscant. Capitibus ad terram demissis odorem trahendo investigant, & ideo primi aëris infecti halitum hauriunt. Auditū pollent: quarto ætatis mense dentes caninos mutant, & hybernū pilum amittunt. Si stomachi gravēdine laborent, gramen vorant. Faciliè abortiunt, si mas, ex quo concepere, occidatur. *Ingenio & memoria* polle-
re, docilesque esse, multa testantur exempla. Ille apud Plutarchum, tot lapillos in ollam oleariam injecit, donec intumescēte oleo illud lambere posset. Itinera quamvis longa meminere: nec ulli præter homini memoria major. Quidam Venetiis in medio foro suum Dominum post triennium agnovit: Ulyssis post viginti annos. In Theatrum Marcelli spectante Vespasiano introductus fuit, in omnibus saltationibus instructus, & qui ægritudinem bellè simulare novisset. Nam post signa contracti doloris, tanquam mortuus concidebat, atque huc & illuc se trahi patiebatur; mox tanquam ex profundo somno experrectus, sese movebat. Franciscus Marchio Mantuæ per morbum mutus, canem ita instruxerat, ut ad suos nutus, quemlibet aulicorum vocaret. Coram Justiano

niano Imperatore, spectante populo, alius, annulos spectatorum ab hero confusus ita cognovit, ut unicuique suum redderet. Quis pauper vel dives, meretrix aut vidua quæ esset rogatus, veste cuiusque ore apprehensa, demonstrabat. De *Fidelitate* erga heros ita Plinius: Pugnavisse adversus latrones canem pro Domino accepimus, confectumque plagis à corpore non recessisse volucres & feras abigentem. Ab alio in Epiro agnatum in conventu percussorem Domini laniatum & latratu coactum fateri scelus. Garamantum Regem canes ducenti ab exilio reducere præliati contra resistentes, propter bella Colophonii, itemque Castabalenses, cohortes canum habuere: eæ primæ dimicabant in acie nunquam detrectantes. Hæc erant fidissima auxilia, nec stipendiorum indiga. Canes defendere Cimbris cæsis domus eorum plaustris impositas. Canis Jasonis Lycio interfecto, cibum capere noluit, inediaque consumptus est. Is verò, cui nomen Hircani reddidit Duris, accenso Regis Lysimachi rogo, iniecit se flammæ: similiterque Hieronis regis. Memorat Pyrrhum Gelonistyranni canem Philistus. Memoratur & Nicomedis Bithyniæ Regis, uxore ejus Consingi lacerata propter lasciviores cum marito jocum. Apud vos Volcatium nobilem, qui Cefelinum jus civile docuit, asturcone suburbano redeuntem, cum adverseravisset, canis à grassatore defendit. Item Coelium senatorem ægrum, Placentiæ ab armatis oppressum: nec prius ille vulneratus est, quam cane interempto. Sed super omnia in nostro ævo actis populi Romani testatum. Appio Junio & P. Silio Coss. cum animadverteretur ex causa Neronis Germanici filii in T. Sabinum, & servitia ejus, unius ex his canem nec à carcere abigi potuisse, nec à corpore recessisse, abjecto in gradibus gemoniis mœstos edentem ululatus, magna populi Romani corona circumstante: ex qua cum quidam ei cibum objecisset, ad os defuncti tulisse. Innatavit idem cadavere in Tiberim abjecto sustentare conatus effusa multitudo ad spectandum animalis fidem. Huc ille pertinet, qui Domini sui occisorem & prodidit & jugulavit: ut & Corfus ille, qui non citius enecti frigore heri corpus auferre familiarissimis etiam permisit, quam perimeretur. Nihil interim de illis dicam, qui cum heris cremari vel sepeliri voluerunt: qualis Poli Tragœdi, Pyrrhi, & Theodori erat. Eupolidis Poætæ Comici canem post ejus mortem, vitam inedia finivisse; Jasonis Lycii capere cibum noluisse; Darium, ultimum Persarum Monarcham solum comitem ad mortem habuisse, Xantippi, navigantem herum eo usque secutum, donec natando periisset; Historici prodidere. A carniū caninarum usu, omnes ferè moratiores gentes abhor-

rent; nisi necessitas urgeat. Populi Senegæ eis vescuntur, si Cadamusto credimus; incolæ Guineæ, si aliis. Galenus nonnullas gentes castratis vesci scripsit. In *Medicina* maximi est usus. *Calva* in pulverem redacta, testium tumores resolvit. *Cerebrum* fracta ossa restituit, si instar emplastri superponatur. *Dente* maximo si gingivæ scarificentur, dolor dentium tollitur. Longissimus nigri canis, quartana laborantibus appenditur. Caninus canis rabidi exemptus & in aluta appensus, rabiem compescit. *Coagulum* in vino dissolutum, colicos dolores sedat; in aceto, hydropicis propinatur. Per vomitum, hydropicorum ventribus superimpositum, hydropicorum aquas Sextus educit. *Hepar* rabidi aslatum, singulare est in rabie remedium. *Fel* cum melle ad ulcera interna adhibetur. *Lienem* recenter exemptum, Marcellus regioni lienis applicat. *Sanguis* partibus à rabido cane percussis, magno est adjumento. *Pinguedo* ad mentem Æsculapii, podagra laborantes sublevat. *Adipe* catuli varii in cicatricibus & maculis faciei auferendis, Plinius utitur. *Lac* in mitigando oculorum dolore adhibetur. Eodem Sextus gingivas infantium assidue linat. Potum, foetus mortuos expellit. *Lotium*, pilos & verrucas aufert: cum nitro mistum lepram abstergit. *Stercorum* pulvis in angina, dysenteria, & ulceribus inveteratis commendatur, si ossa per triduum comedat. Marcellus ex eodem ad solem exsiccat & cribrato, cum cera rubra, per partes, & modico olei, medicamentum pro ischiade concinnat. Plinius, ossibus in stercore canino inventis & alligatis, syriacum puerorum tolli putat. *Pellis* ad destillationes, si digitis inducatur; & ad anginam, si corrigiis ter collum circumdetur, adhibetur. *Pili* morfui canis rabidi impositi, venenum ad se attrahunt. In supprimendo sanguine adhibentur. Mizaldus denique in expugnando febre quartana, lotium ægri quantum in uno paroxysmo, unica vice reddidit, cum farina subactum, in placentam conficit, quam famelico cani exhibet, & sic quartanam transfert. Reliqua vide in Gesnero. Weckerus ex duobus catellis recens natis, quatuor libris olei violacei, & libra una vermium terrestrium præparatorum, unguentum ad vulnera machinis bellicis inflicta, componit. Ex catulis quoque Andreas Furnerius aquam destillat, quam in cohibendo pilorum augmento mirifice commendat. *Differentia* Canum sunt multæ. Dicuntur olim & in Hellesponto reperti cornuti. Si *vocem* spectes, in novi orbis insula Hispaniola non latrant, ut Oviedus prodidit. In Guinea, si Clusio credimus, latrare conantur, sed non possunt. Si *munera*, sunt alii fagaces, alii curfores, cubicularii, portæ, venatici,

Plin. H.N.
l. 8. c. 40.

Scalig. Exerc.
202.

Athen. H.
A. l. 7. c. 33.

Vfus in Ci-
bis.

Galen. l. 3.
de Alim.
facult. l. 2.
Vfus in Me-
dicina.

Centur. 6.

Wecker.
in Antidot.

Differentia

Ambrosin.
quadr. di-
gitat. l. 3.
c. 2.

tici, villatici. Si *locum*, sunt Epirotæ, Scotici, Anglici, Cyrenaici, Arcades, Indici &c. Nos hi cagemus ordine de *Rabido*, *Melitenfi*, *Venatico*, *Leporariò*, *Sagace*, *Villatico*, *Bellicoso*, & *Inutili*. *Rabidi* ab esu putridorum ciborum, & carnibus vermibus scatentium tales evadunt, Canicularibus inprimis. Cibus tum abominantur & potum, ab aqua abhorrent, huc & illuc vagantur, latratum edunt raucum, spumam ab ore & naribus copiosam fundunt, torvum intuentur, demissam ferunt caudam, & nullo edito latratu homines mordent. Multi multa remedia adhibent. Aëtius helleborum album ad vomitum cum polenta exhibet. Mizaldus stercora gallinarum cibus permiscet. Blondus post tertium diem venas turgentes in cruribus tundit, vel canem in lacunam projicit, in qua multæ hirudines innatant, ut sanguinem exsugant. Hinc totum corpus unguento populeo illinit, & pharmacum cholagogum propinat: tandem canem decocto fumariæ, lapathi acuti, & radicum enulæ abluit. Ad præservationem, exhibet Plinius catulo lac mulieris quæ marem peperit. Columellas caudas catulorum post diem quadragesimum ab ortu castrat. Prehenditur caudæ extremum, in quod ultima spinæ articulatio definit, & tandiu digitis torquetur, donec excidat. *Melitenfes* ab insula Melita, quæ Pachyno Siciliae promontorio imminet, nomen habent. Sunt vel brevioris vel prolixioris pili & jubati. Blondus partim albos partim nigros commendat: hodiè rufi & candidi in precio habentur. Magnitudine sunt mustelæ sylvestris. Ut parvi fiant & maneant, canistris includuntur, ibidemque nutriuntur. Delicatisimis vescuntur cibus. Si plures foetus concipiunt, subito moriuntur. Ut villosiores nascantur, curatores, loca in quibus cubant, velleribus pecudum internunt, ut ea præ oculis semper habeant. Lugduni in Gallia singuli decem aureis vaneunt. Bononiæ quadringentis libris venduntur. Mulieribus sunt in deliciis. *Venatici canes* ubique ferè locorum habentur. Præstant, quos Hircania ex canibus & Tigridibus natos, Epirus, Molossorum regio, & Chaonia proferunt. Apud Persas fuere audacissimi & velocissimi teste Megasthene: in regione Thebeth inveniuntur maximi: in provincia Gingui tam audaces, ut Leonem adoriri non dubitent. Quomodo nutriendi sint, illi qui de re rustica scribere docent. Erant in precio apud Alphonsum Neapolitanum Regem, Magnum Tartarorum Chammum, qui idè quinquies mille aluit. Distinguuntur variè. Nam si ferarum differentias respicias, sunt alii leporarii, alii humiles qui taxos tantummodò insectantur; alii ad aves, qui illas pedetentim in retia pellunt; alii ad aquas; alii ad magnas feras. Si *locum natalem*, sunt

Ambrosin.
l. 3. c. 3.

Ambrosin.
l. c. 4.

Arcades, Ausonii, Cares, Thracæque & Iberi.

Pannonici, Argivi, Lacedæmonii, Tegetæ, Sauromata, Cretes, Celiæ, Magnetes, Amorgi.

Si colores, sunt leucophæi, mellei, albi, nigri. *Albi* parumper aquam formidant. Idem nigris maculis insigniti, pedes crassos & tenellos habent. Leucophæi fortes & audaces sunt, sed cursu non ita valent. Nigri validi sunt, sed cum crura habeant humilia, celeritatem alborum non assequuntur. Eligendus verò est canis, atroci vultu, capite magnò, labro superiore ad infra pendente, oculis rubicundis, naribus apertis, dentibus acutis, collo tumente, pectore amplo ut Leonis similitudinem præ se ferre videatur. *Canis leporarius* optimus est, qui longo & plano est capite, auribus acutis retrorsum directis & parvis, labiis superioribus supra inferiora non pendentibus, collo longo & aliquantulum turgido, pectore acuto, costis longis & validis, ilibus strictis, cruribus altis macrisque potius quàm obesis, caudâ non crassâ, nec admodum longa, qui rarò aut nunquam latret. Alii ad venationem ducuntur: alii spontè exeunt, & comprehensis leporibus domum revertuntur; *Vertagi* dicti. *Sagacium* tot ferè sunt quot Venaticorum genera. In Scotia tres sunt canum species. Quidam sunt audacissimi, in cursu celeberrimi. Alii odorisequi, qui & pisces inter saxa latentes investigant. Nonnulli ut plurimum aut rufi nigris maculis aspersi, aut nigri ruffis imbuti, qui fures & furto ablata tanta cum industria persequuntur, ut & flumina tranent. Scotis & Anglis tales alere suetum: & si quis, eum, qui suâ, cane sagaci duce inquit, in secretiora non admittit, pro fure habetur. Si Blondum sequimur, debet esse brevis; simo potius quàm adunco rostro, capite concinno, cruribus eadem posterioribus ferè altitudine, quàm sunt anteriora, pectore non ventre majore, dorso plano & ad caudam porrecto, auribus pendulis, oculis agilibus. Palmam reliquis præripiunt Gnosii, Thufci, Britanni, Hispani. *Canis villaticus* & pecuarius est qui villam & pecus custodit. *Albus* probatur, ut à lupis distingui possit. Tales apud Turcas, Bellonio prodente, herum peculiarem non habent, idè nec ædes ingrediuntur. Tegetibus in area stratis incubant. Olim apud Romanos quingenti ad stabulorum tutelam alebantur. De *Bellicos* & *Inutilibus* nihil ferè occurrit. Anglia illos producit: sed & hoc anno inter homines sanguinarios canes alere cœpit, diris devota capita, qui ne Regio quidem sanguine adhuc usque satiari potuerunt. Talibus canibus & Hispani contra Indos in præliis utebantur, quos etiam saginâ humani corporis ad capiendos homines alliciebant. Vaquez

Ambrosin.
l. 3. c. 5.

Ambrosin.
l. 3. c. 6.

Bellon. ob-
serv. l. 3.
c. 40.

Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 36.

Nunnez loco carnificum usus est. Obliti ferè eramus Indicorum, de quibus ita Nieremb. bergius. Genus caninum variat in novo orbe, præter illos quos vetustas novit. Natura & moribus pænè omnia nostris vicina sunt, nec specie valdè diversa. Illud quod *xoloitzuimti* vocant Barbari, excedit mole corporis, tres plerunque superat cubitos, nullo pilo protegitur, molli tantum & depili cute, fulvis & cyaneis maculis aspersum. Alterum appellant *Itzcéuin teporzotli* & à patria, unde datur, *Micbuacanem*. Simile est Melitenfibus. variegatur candido, atro & fulvo colore, & quadam deformitate, accommodum deliciis, & gratissimum, nec iners blanditiis, gibbo quodam fœdum à capite velut ab humeris eminenti, collo enim pænè caret. Tertium *Tetichi* dicitur, cetera nostratibus simile, nisi quod triste aspectu, Indis edule, quemadmodum olim Thracibus, quod fortasse in usu Græcis fuit, si sexto Empyrico credimus. Certè Diocles Medicus, ex eorum scholâ qui Asclepiadarum tempore fuerant, quibusdam ægrotis catulorum carnes dari præcepit. Sed Indis *Cozumelle* canes non tantum sunt alimentum, sed gula. Nutriebant comedendos quemadmodum Hispani cuniculos, quos ad esum destinant, castrant, ita pinguescunt oppidò. Procreandæ soboli servant fœminarum copiam, ex maribus exiguum numerum, quemadmodum apud nos pecuarii. Idem inopia puerorum canibus litant. Alco etiam vocabant Barbari quoddam genus canum parvulorum, quorum societate mire delectantur, & quos mire diligunt. E suo cibo detrahunt, ut illos alant. Cum iter agunt, comportant secum aut humero, aut gremio. Cum ægrotant, consortio inseparabili & familiaritate catelli recreantur. Sunt quoque *canes muti* apud Indos, qui non latrant & vulpino vultu. Cozumella insula hos alit. Quin & percussi nec gemitum, nec clamorem edunt. Hos in Hispaniolâ Oviedus statuit pro Calamitâ ranâ. His naturâ est: nec opus sunt membrana ex secundis caninis, nec fimus leporis, nec pilus. Superstitiose ista Plinius obmutescendis canibus quærit. Anonymus manuscripti mei auctor, in Hispaniola memorat fuisse canes parvulos, sine latratu, solum cum grunntu, & solum palato aptos. In Quiyita maximi canes onerantur farcinis.

CAPUT II.

De Fele.

Ambrosin.
l. 3. c. 10.

Salmasin.
Solin.
Nomen.

FELIS nomen à $\phi\lambda\theta$ impostor, fallax, quod astutissimum sit animal: vel ab $\alpha\iota\lambda\iota\varsigma$, adulator, quod cum Æolico digammate $\Phi\alpha\iota\lambda\iota\varsigma$ pronunciabatur, ut maximo Salmasio placet. Dicitur Latinis etiam Catus, vel Catus, seu à capiendo, seu quod sit cautus. Græcis vocatur $\alpha\iota\lambda\epsilon\pi\acute{o}\varsigma$, $\omega\delta\acute{o}\tau\epsilon\tau\acute{o}\alpha\iota\acute{o}$.

$\lambda\epsilon\iota\upsilon\kappa\eta\kappa\alpha\iota\alpha\iota\alpha\gamma\alpha\gamma\eta\tau\omega\delta\epsilon\gamma\epsilon\gamma\eta\kappa\eta\kappa\iota\upsilon\kappa\epsilon\iota\upsilon$, quod caudam subinde moveat, eademque adblandiatur. Apud Suidam est $\alpha\iota\gamma\alpha\lambda\epsilon\pi\theta$, albi $\kappa\alpha\tau\alpha\tau\eta\varsigma$. *Spatalem* etiam quidam cattum vertunt. In *Descriptione* notissimi animalis non est quod immoremur: observata circa Anatomiam ad finem capitis habebis. Ubique fere inveniuntur. Non fuisse aliquando mansuetos verisimile est. In Iberia apud Tartessios nasci maximas, omnes authores consentiunt. *Vescuntur* carnibus, piscibus, muribus, avibus, lacertis. Bufones interimunt. In Cypro viperas, & chamæleones venantur. Junioribus etiam leporibus insidias struunt: nec propriæ speciei parcunt. Novimus hic Bononiæ, inquit Ambrosinus, feles adultas cum parvulis primum colludere, deinde illis laniatis vesci. Vivunt sex annos, aliquando decem, castrati plures. Quantum ad *Generationem*: in Europa mensibus Januario & Febuario plarumque exardescunt: in India omni ferè anni tempore luxuriantur. Fœminæ in congressu clamant, seu quod à fervido nimis femine adurantur; seu quod à mare unguibus lædantur. Mas stat, fœmina subjacet. Fœminæ plus libidine agitantur quam mares. Gerunt foetum duos menses lunares, seu dies sex supra quinquaginta. Martio editus præfertur: Augusto, propter pulices minus. Ut plurimum quinque vel sex catulos enituntur. Fœmina sobolis est amantissima: Mas inventam sæpè interimit, ut fœmina novorum catulorum desiderio mota, morem iterum gerat. Exercent *inimicitias* cum quibusdam, ut muribus, bufonibus, serpentibus, vulpansere, aquila, ruta, felle proprio, suavi odore, & humiditate. Rutâ certè à columbariis pelluntur. Unguentorum odore aliquando in rabiem aguntur. Si aquâ mergantur, nec statim exsiccentur, pereunt. E contra, Valerianæ se libenter affricant: mentha cattaria delectantur. Fœmina gravida, si mas interim occidatur, abortit. Circa *Naturam* occurrunt quædam singularia. Oculi enim felium ad Lunæ vices modò majores modò minores evadunt: imò solis vices sentiunt, & pupillas oculorum syderis cursu mutant. Diluculo enim protenduntur, meridie in orbem contrahuntur, Sole occidente hebescent. Cardanus malè pupillas pro arbitrio contrahere & distendere protulit; quia nullos habent musculos. Noctu medium illuminant. In saccis procul delati, redeunt. Mutante hospite ædes, easdem non deferunt. Manu hominis demulceri ambiunt. De astu ita Plinius. Feles quidem quo silentio, quam levibus vestigiis obrepunt avibus: quam occulto speculatu in musculos exiliunt? Excrementa sua effossa obruunt terrâ, intelligentes odorem illum indicem sui esse. Adhibetur à quibusdam mensis, in Hispania inprimis, Hollandia, & Brabantia,

Locus.

Vitus.

Plin. H. N.
l. 10. c. 63.
Generatio.

Arist. H.
A. l. 5. c. 2.

Sympathia
& Antipathia.

Mizald.
cent. 4.
Natura.

Plin. H. N.
l. 10. c. 73.

Felis Domestica
Zahme Katz

Felis sylvestris
Wilde Katz



Felis Libetti

Zibet Katz



Genetta
Geneth Katz

Meles vel Taxus Canin,
Dachs





bantia, sapore que leporinam referre dicitur. Pestiferum halitum emittere, & tabem adferre, Brujerinus, haud sine causa, prodidit. Cerebrum insaniam inducit, cujus ali- quod exemplum in Uratislaviensi puella, in Weinrichio, ni fallor, (liber nunc ad manum non est) invenies. Habet & in *Medicina* lo- cum. Pulvis *capitis* in olla cremati, & in oculo insufflato, caliginem abstergit, si Portæ credendum. *Carnem*, corpori infixa tela extrahere, Galenus prodidit: hæmorrhoidum quoque & dorsi doloribus medetur. *Iecur* ustum & tritum, calculosos summopere juvat. *Fel* factum mortuum extrahit. *Pinguedo*, podagræ illinitur. *Urina* destillata ad surditatem valet. *Feces alvi* cum resina & rosaceo permixtum & suppositum, muliebri profluvium supprimit. Evonymus prodit, quosdam anserem pinguem, medicamentis & carnibus felium minutatim concisis farcire cum sale, & lento igne in veru assare, destil- lanteque liquore arthriticos feliciter inunge- re. *Adeps* in ferro à rubigine præservando aliis non cedit. Quantum ad *Differentias*, Cati alii sunt *Domestici*, alii *Sylvestres*, alii *Exotici*. Ex *Domesticis*. Hispanici rapaciores sunt, agi- liores, & mollissimâ cute teguntur. *Exotico- rum* præcipuæ sunt *Syriaci*, qui varii, ore tor- vi, pectore torosi, pedibus amplis, paucio ci- bo contenti. *Sylvestres*, domesticis sunt ma- jores, densiore & longiore pilo, colore fusco, caudâ crassiore. Vescuntur aviculis, & aliis animalibus. Suffitu rutæ ab arboribus depel- luntur. De illis qui in Malabar ita *Scaliger*. In Malabar provincia feles agrestes supra ar- bores versantur, quarum celeritate nihil un- quam memorabilius proditum est. Saltu va- lere potius. Peculiaris verò volatus. Idque, quod mirum magis est, sine alis. Membranam ab anterioribus ad posteriores usque produ- ctam tendi. Quam, dum quiescunt, ad al- vum contrahunt. Ubi volare instituunt, pe- dum crurumque agitatione protenta, colle- ctæque membrana, dum sustinent, tum fe- runtur. Est & in India genus quoddam, pi- lis vestitum nigris & promiscue candentibus. Rostrum ei est longum, auriculæ parvæ, crura breviora, cauda fasciis nigris candidis- que intercisâ. Pulvis febrientibus conferre dicitur. Huc pertinent & monstrosi, quo- rum unus, pedes habet horrendos, alter sex. Feli simile est animal in regione Singui- pilo cervino, pedibus multifidis, dentibus in utraque mandibula binis, duorum digi- torum magnitudinis. Vesicam habet car- neam, prope umbilicum, sanguine ple- nam, qui moschum redolet. Iconem adpo- suimus cujusdam animalis felis similis, quod caput in suprema parte valdè acutum ha- bet. Appellamus felem *ὄφιον*. Obser- vationes Anatomicæ, quas apud M. Aure- lium Severinum invenimus, quasque su- perius promissimus, aliæ felem sectum, ut

ipse ait, aliæ musculum concernunt. In fele secto hæ sunt insigniores. *Lienis* oblon- gi veluti remi nostratis pars, quæ ad aquas spectat. *Cervix* vesicæ fellis veluti varicosa non semel vel bis: Ad fundum ejus rectæ descendunt venæ extrinsecus procurrentes. Bini nervi à lateribus *aspera arteria*, utrin- que unus, descendunt ad orificium ventri- culi superius, qui interim ad dicta latera asperæ arteriæ & ad pulmones mittunt ra- musculos. Nectuntur dicti nervi communi nervulo oblique descendenti, à sinistro in- feruntur in ventriculū pluribus fibris. Ubi primum finditur aspera arteria, apparent nonnullæ *glandule* majores, & parvæ albæ, rubræ, cineritiæ, mistæ. In *aspera arteria* semicirculi, ut in homine divisi, sed parte posteriore duplici tunica comprehensi: Al- terà quidem externa & carnosa; altera verò interna & nervosa, quæ interna, nascitur ab extremis circulatorum marginibus. In *cor- de* auriculæ differentium colorum, dextra quidem albo & atro distincta magis, quam sinistra: Præterea dextra crassior & rotun- dior, sinistra tenuior & oblongior; caninæ similis. Ambæ intus cavæ & filamentosæ veluti sinus cordis. In sinu dextro plexus re- ticularis magis quam in cane conspicuus & prolixus; sed contra in hoc non valvulæ sic- ut in cane. *Arteria magna* ferè in medio cor- dis; magis tamen ad sinistram declinat. In-terna tunica *ventriculi* satis rugosa, rugis se- cundum ventriculi ductum procedentibus; & in rotundum replicatis, veluti in ventre bovis. Tunica ventriculi tenacissimæ, ad- hærentes ab orificio superiori ventriculi, tu- nica interna rugis transversis distincta. Co- lor *hepatis* veluti caniculæ piscis. In ossè *au- ris* cochlea; labyrinthi; fenestella, annulus; musculus rotundus, tria ossicula, sed stapes non perforata, ut Casserius describit. In *ce- rebro* sinustres, sed duo circulares cum ple- xu choroide. In *oculo* uvea parte anteriore non cohærens corneæ; hinc dilatatio huic generi majori minor. Eâ parte est uvea co- lore pallidi folii. Opticus ferè ad medium, quamvis declinet ad inferiora, membrana externa crassa oculum aliqua parte velans, ut in gallinaceo genere. At in *Fele* musculo, hæ observationes occurrere. Extra abdo- men, infernè supra pubis os, prodeunt per duo foramina, *vasa spermatica* ad testiculos descendunt, qui testiculi per mediam membranam cuti alligantur à lateribus pe- nis, qui *penis* medio digito longus, infernè fulcitur musculo oblongo desinente ad me- dium penis vel amplius; fulcitur etiam mus- culo oblongo descendente ad medium spa- cium musculi sphincteris, cujus officium est, anum claudere. Linea alba lata digiti tertia parte per rectum abdominis descen- dens; subjacet musculis peritonæi, membra- na in hoc animali tenuissima; *Peritonæum* sub

enlfor-

Brujer. de
re cibaria
l. 13. c. 36.

Porta Phy-
togn. l. 5.
c. 26.
Galenus
simpl. l. 11.

Differenti-
æ.

Scalig. Ex-
erc. 217. l. 9

Nieremb.
H. E. l. 9.
c. 30.

M. Paulus
Venerus l.
1. c. 62.

M. Aurel.
Severin.
Zootom.
Democrit.
p. 4. c. 309.

eniforme satis pingue. *Omentum* præpingue alligatum fibræ uni dextræ hepatis, & spleni & ventriculo, & intestino duodeno, ad figuram marsupii, s. sacculi cujusdam constitutum. Alligata *vesica* peritonæo supernè, ad fundum vero alligata intestino infernè recto. *Testiculi* quatuor tunicis sunt rekti; quæ dicitur scrotum, id est, bursa externa testiculorum; secunda dicitur dartos, etiam externa: Tertia dicitur erythroides, id est, rubra, quæ propinquior est prædictis; quarta vero est immediata. Descendunt ad testiculos *vasa præparantia semen*, & sunt venæ & arteriæ: Venæ quidem quæ descendunt à vena cava; & arteriæ, quæ descendunt ab arteria magna: & ista vasa, postquam attingerint proxime testiculos, constituunt corpus quoddam, quod dicitur epididymis; corpus, sive substantia sub testiculis posita. Vidimus *vasa jaculatoria* sive deferentia dicta propterea, quod deferant semen in testibus præparatum ad glandulas parastatas, quæ deferentia primò oriuntur ab infima parte per medium testiculorum & vasibus præparantibus annexa usque ad medium ipsorum recurvantur ac reflectuntur, donec pervenerint ad parastatas: vidimus & *ureteres* descendentes à parte sima seu concava renum ad collum vesicæ, & præcipuè ubi definit ipsum collum. Vidimus & *venas emulgentes* ad renum tendentes partem gibbam, ambas nascentes è trunco cavæ, sed altior sinistra quam dextra altitudine modii grani hordei, & eadem sinistra longior fere duplo est quam dextra. *Intestinum rectum* colligatum caudæ principio per medium ligamentum. Habet intestinum rectum, venas & glandulas quasdam miliares asperas, quæ in cane nobis alias sunt observatæ. Vidimus *mesenterium* & venas meseraicas etiam *pancreas*, id est, corpus glandulosum. Vidimus & *intestinum cæcum* latitudine pollicis longum. Præter intestinum rectum & cæcum, totum, quod reliquum est intestini, uniforme est, sed tortuosum, adeò, ut si violentius extendas, ferè disrumpatur. *Renes* perampli, magnitudine nucis majoris, intra quos paucæ cavitates sunt & sinus (non ut in cane) in quibus percolatur urina. Vidimus & *venam portam* facientem duos ramos, unum quidem mesentericum, id est, ad mesenterium propagatum, quique descendit usque ad extremum intestini recti. Alterum vero splenicum, id est, transmissum ad splenem per totam ejus internam partem, rectà viâ distributum per multos ramos hinc inde. A dicto ramo splenico derivatur alter cœliacus, sic dictus, quia ventriculum circumplectitur; hic ducit humorem melancholicum ad ventriculum, ut possit appetere. Vidimus *venam ascendentem* perforare diaphragma & cor petere, in cujus partem dextram se inferit. Vidimus & *venam sine pari*

ramificatam ac propagatam, à dicta vena cava juxta cor reflexam & descendentem, per spinam à parte dextra, quæ ramos mittit, costis dextris ad sinistras, ad ipsas nutriendas. *Hepar* sex fibris distinctum. Medio duarum à parte dextra egreditur foràs *fel*, ita ut fundus inter duas, ad modum prominentis oculi, appareat. Dicta *vesicula felis* habet duos ramos, alterum, qui derivatur ab hepate in duodenum intestinum ad expellendas fæces; alterum, qui recurrit ad vesicam, ut ibi contineatur. In *intestino duodeno* digitis quatuor infra poros cholidochos, inventus lumbricus quidam parvulus magnitudine ureterum. A lateribus venæ cavæ ascendens, descendit *nervus* quidam ad circulum carnosum diaphragmatis, alter verò à sinistra descendit fultus membranæ asperæ arteriæ, deportantes sensum diaphragmati. Vidimus *nervos recurivos*, qui à sexta nervorum conjugatione propagati ad caput asperæ arteriæ inferuntur, alter quidem à sinistra revolutus sursum circa arteriam magnam, & alter circa arteriæ ramos, qui tendunt ad jugulum: cor cum duplici auricula, dextra & sinistra, dextra major & subnigra est; sinistra vero concolor cordi: Habet *cor* ventriculum dextrum, in quo generatur spiritus vitalis; sinistrum, ad quem ducitur sanguis venalis: Habet & quatuor *vasa magna*; primum est *vena cava* ascendens, quæ inferitur in auriculam dextram; *arteria magna*, quæ inferitur in auriculam sinistram. Tertium *vena arterialis*, vena quidem dicta, quoniam continet sanguinem; arterialis verò denominata, quoniam constat duplici tunica, quam habet veluti arteria: Inferitur hæc in pulmonem, ut illum nutriat: quartum est *arteria venalis* quæ inferitur ad sinistrum ventriculum cordis, cujus officium est, sanguinem in dicto ventriculo præparatum ducere sursum ad cerebrum, ad generationem spiritus animalis. In ventriculo dextro sunt *valvæ* quædam sive septa, quæ impediunt exitum sanguinis, sic etiam sunt in sinistro. Habet *pulmo* pinnas sex. Visi sunt muscoli interni circum *laryngem*, id est circa caput asperæ arteriæ, quibus inflammationis fit vera angina. Apparuerunt in radice penis *glandula prostata*, quibus inflammationis fit Gonorrhœa Syphiliæ, quæ sunt paulo majores: Est *penis glans*, id est, caput, velut lingua ipsius felis. Observavimus meatum, qui ducit ad vesicam. Felis *cranium* lineis quibusdam rubris distinctum venarum similibus. *Auricula* interior cum primis exsculpta: Hoc enim organo non vulgariter opus erat eidem ad noctu prædandum, sicut & visu. In hoc observata communio arteriæ magnæ & venæ magnæ: ubi scilicet primum usque scinditur in iliacos. Credo commune animantibus omnibus, quod observavi in medulla spinæ felis domestici. Membranæ enim

enim propiis cum integatur secundum extrema, quæ respondet duræ menynge, interior, quæ tenui vestiunt & hæc prodeuntes nascentesque ex se ipsis nervos: Verum cum in plures veluti funiculos prodeant singulæ harum conjugationes, licet adnotare, dictos funiculos, postquam aliquantisper processerint, mox in unum quasi nodum coire, non dissimilem à geniculis culmorum in plantis frumentaceis & id genus. Porro cum singuli funiculi iisdem membranis tegantur, si retrahas ad te harum substantiam, spoliatur funiculi, quoad nodum illum pertingant. Observatus in *costa* unâ legitima felis domesticæ, nodus quidam teres similis tuberibus, qui innascuntur arboribus, cujus disrupti medullium porosum crebrisque fossulis perforatum cum guttulis sanguinis. Dubitatum inter sodales sectionis, num fractura ossis

ferruminata, num error in formatione, luxuriante materia. Homini in summa parte ossis frontis quæ interjacet, æquæ duo supercilia incubant rectæ nasi radici: In hac si effoderis vel terebra os pertuderis, invenies fossulas duas oblongas, obliquè incidentes, sub cranio, parte superiori: cæcas infernè, cancellis donatas: Nullus dubitari posse videtur, esse has cameras olfactus, ubi concluditur implantatus spiritus, ut & in aure. Nescio siquidem, quid de eo senserint Anatomici; credo incompetas huc usque. Porro confirmat sententiam nostram, quod in cane sensu hoc eximie pollente sunt hæ cryptæ, & latiores & magis conspicuæ quàm in homine; in simia autem caudata non licuit invenire; fortasse, quod eo sensorio præstare minus debuisset.



HISTORIÆ NATURALIS

QUADRUPEDIBUS

LIBER IV.

De Quadrupedibus Digitatis Oviparis.

TITULUS PRIMUS

De Digitatis oviparis cute tectis.

CAPUT I.

De Rana.

ARTICULUS I.

De Ranis aquaticis.

Ambrosin.
Digit. O-
vipar. l. 1.
c. 1.



Nomen.

Descriptio.

Arist. H. A.
l. 4. c. ult.
Ovid. Me-
tam. lib. 6.

HAstenus de Quadrupedibus viviparis egimus, sequuntur Ovipara; quæ vel *cute* teguntur, vel *crusta*. Cute autem teguntur, *Rana*, *Lacerta*, *Salamandra*, *Stellio*, *Scincus*, *Cordylus*, *Chamaeleon*, & *Crocodilus*. *Rana* alia est *Aquatica*, alia *Terrestris*. Illa à sua garrulitate *Isidoro* dicitur, quod æstivis diebus suum *ra ra* peritrepit; aliis à *ῥῥ* *Ebræo*, quod est vehementer exclamare. Græcis dicitur *βάτραχ*, & *ῥῥ* *ἡ βολὴ τῶν ῥαχέων ἔχειν*, quod asperam vocem edat. Vocatur *Varino* & *βῶξ*, *βότρυς*, *βρότρυς*, *βύτρυς*, *βρόσσυς*, *κααρῃαίς*, *ῥαδῆ*, *βλιναρ*; *Cyprii* *βρέχελ*, *Ionibus* *βάθραν*, *Phocensibus* *βελανχόνη*, *Ponticis* *βάθαν*, modernis Græcis *βρόδαν* sed & *ῥῥ*, pro eadem, simpliciter apud *Ethymologum* sumitur. *Varino* etiam *βελί* & *περυσίδες*, *ranæ* sunt, quod buccas inter clamandum inflare soleant. Animal est amphibium, cujus pars prior carnosâ latitudine caret: naturâ, portionem carnosam posteriori parti in qua *crura* posteriora crassa & longa, anteriora breviora sunt, addente. *Digitos* habet quinos, longos, membranâ intertextos, ut commodius natâre possit. *Fœmina* mare major.

Terga caput tangunt, colla intercepta videntur,

Spina viter, venter pars maxima corporis albet.

Internas partes si attendas, linguam illis instar linguæ infantium primam adhærere, intimam verò à gutture absolutam *Plin. scribit. Lienem esse parvum. Hepar secundum l. 11. c. 37. Bellon. in tres dividitur lobos, sub quo una utrinque pulmonis pars conspicitur, spumo-*

*sa & minimè sanguinea. Intestina nodulis intercepta sunt. Testes & reliqua membra animalium terrestrium membris similia. In Anglia virides non conspiciuntur. In Germania, Italia, Bononiensi inprimis territorio, plurimæ sunt. In irriguis Ægypti locis tam frequentes, ut nisi à ciconiis vorarentur, omnia fœdarent. In Cyrenaica & Scripho insula mutas esse dicunt, fortè propter aquarum frigiditatem. Etsi verò & in fluentis appareant: libentius tamen in illis aquis versantur, in quibus junci & arundines virefcunt, & ulva crescit. In illis qua nunquam gelu concrefcunt, omni tempore reperiuntur. Ne dicam de bituminosis, in quibus eas viscositate sua naphtha obruit. Deglutiunt innatantia animalcula, vorant & apes, talpasque mortuos. Herbis quoque vesci verisimile. Permiscentur mare superveniente, quod apud Aristot. legimus, prioribus pedibus alas fœminæ apprehendit, posterioribus clunes: deinde ova pariunt. Plin. carnes nigras partu edi scripsit, quas oculis & cauda insignes gyrinos vocavit: formam raninam adipisci, dum cauda in duos posteriores pedes finditur. Mirumque, addit, semestri vita resolvuntur in limum nullo cernente, et rursus vernis aquis renascuntur, quæ fuere natæ, perinde occulta ratione, cum omnibus annis id eveniat. Sed id de temporariis potius sumendum est. Nam de quibus agimus, etiam hyeme in aquis calidioribus durant, & vere veteres natantes conspiciuntur. Ova circa ripas stagnorum & paludum effunduntur, continuo veluti filo sibi coherentia, quæ nigrarum & concisarum carnum speciem referunt. Chymici sperma ranarum appellant. Odio prosequuntur ciconias, cygnos, Buteonem, Salamandram, putorium, lucium piscem, anguillam & ignem. A ciconiis devorantur. Cygnus, Michaële Glycâ authore, ab affectione quadam esu earum sibi medetur. Cum Salamandris, sæpissimè præliantur. De Lucio & anguilla, res notissima est. Noctu accensis circa littora luminibus non coaxant: imò loco non moventur, & facillè manibus capi possunt. Vox ipsarum est *βενκνέξ, ῥαδῆ, ῥαδῆ.**

Locus.

Vitus.
Arist. Hist.
Animal. l.
9. c. 40.
Generatio.

Arist. H. A.
l. 5. c. 3.
Plin. H. N.
l. 9. c. 51.

Arist. H. A.
l. 7. c. 14.

Antiphatia.

Mizald.
Cent. 9.
Memorab.

Vox.

Laub frosch

Laub frosch



Laub Frosch



Frosch



Rana



Rana Frosch



Frosch



Rana



Bufo Krötte



Krötte



Bufo



Bufo Caudatus



à Circulatoribus fictus



Table 1



αἰετός. Aristoteli autem ὁλολογῶν vox dicitur, quam ranae mares effundunt, pum foeminas ad congressum vocant. Quando laeduntur, Alberto prodente, vocem instar formidantis muris exilem reddunt. In Cyrenaico agro non erant olim vocales. Illatis è continente vocalibus durat earum genus. In Seripho quoque; & quodam Thessaliae lacu mutas, apud Aelian. legimus. Caro ipsis naturā laxa, albida, humida, & putredini obnoxia. Ideo quibus frequenter in usu, colorem amittunt, & in febres incidunt. Mense Augusto, ita compressa habent labia, ut difficulter aperiantur, si Alberto credimus. Ubi diutius pectori incumbunt, latere subtus aquam, Mizaldus colligit. Nisi aliquandiu respirent, suffocantur. Quia aquas tepidiores amant, ideo aestivis duntaxat mensibus coaxare solent, & adventante hyeme occultantur. Busbequius dum Strigonium properaret, mense decembri coaxantes audivit, quod aqua in quibus degebant, minerarum sulfurearum viciniā, incalescerent. Cum pluvia imminet, clamorosos fiunt, seu quod frigidiores sentiant, seu quod dulcioribus impense delectentur. Diu sub aqua urinantur, quod exiguum pulmonem habeant. Brumali tempore interire, & vere iterum renasci, à quibusdam creditum: latere & terrā condi vel inde certissimum, quod verno tempore, non solum ranarum fetus, sed & ranarum compareant. Noctu & quidem in sicco congregiuntur, non tam ob verecundiam, quam timorem. In Aegypto, dum natricem sibi occurrere vident, frustum arundinis obliquum apprehendunt, ne deglutiantur. Ab his civitatem in Gallia pulsam, Plinius prodidit. Marem à foemina si discernere volueris, dorsum acu tange. Ex mare rubeus sanguis; ex foemina, flava aqua effluet.

Quo in Cibus habendae essent loco, Galenus non indicavit. Facile digeri, & bonum praebere succum, frigidum tamen & humidum, vulgata est sententia. Nullo olim apud Romanos in usu. Hodie totum corpus, capite abjecto, assum vel elixum apponitur, à mense inprimis Majo ad Octobrem. Coxae inprimis laudantur. Mündella in frigidis innocentiores putat, & cum à Venere abstinent. Amatus Lusitanus omnes, quia venenatae, à mensis arcet. Praeparationem vide apud Ambrosinum.

Et tota & partes variis affectibus pellen-
dis inserviunt. Sugillationibus impositae, livorem auferunt. Maxillis alligatae dolorem dentium; in aceto decoctae, mobilitatem. Succus cum eodem, anginam tollit, & tonsillis prodest. Eodem remedio certo strumae delentur, si Porta non fabulatur. Pulpa earum phthificis, cum carne caponis, pineis & faccaro exhibetur. In oleo elixa nervorum dolores emollit. In omni virulento animalis morfu vehementer à Dioscoride,

Aetio, & aliis commendatur. *Cinis* combusta adeo sanguinem sistere Galeatius de S. Sophia prodidit, ut cum quidam eum collo gallinae alligasset, amputato post ejusdem capite, nihil ex vulnere sanguinis profluxerit.

Habdarrhamanus Asiatensis in nares insufflari in haemorrhagia jubet. Idem in plumbeo vasculo cum oleo liliorum interemtam, cum unguento rosaceo contorsionem vultus sanare scribit. Oleum quomodo paratur, vide apud Ambrosinum. In doloribus articulorum à materia calida vehementer laudatur.

Partes si attendas, *Oculi* in sindone contra lippitudines in collo suspenduntur. *Cor* februm algores minuit. Alii in febribus ardentibus ad cor alligant. Contra fistulas cuidam profuisse, apud Villanovanum habemus. *Pulmo* per tergus extractus, folio brassicae involutus, & in olla concrematus, epileptico exhibitus, opitulatur. Alii id de jecore sumunt. Hoc certe remedio Elector Palatinus restitutus dicitur. Pulvis *jecoris* in accessione quartanarum utiliter fumitur. Plinius, obijci formicis oportere scribit: eam partem quam appetant; contra omnia venena esse pro antidoto. *Fel* dyentericis remedio est, & vermes in ulceribus nascentes interimit.

Adeps auribus instillatus, dolores tollit. *Sperma ranarum* in erysipellate, & aliis inflammationibus vehementer est utile, haemorrhagiam comprimit: scabiem & impetiginem pellit. Quercetanus aquam in rubore faciei commendat. Modum ejus parandi vide ibidem. Baculus quo rana à serpente excussa fuerit, parturientes adjuvare dicitur. De lingua fabulosa Plinius. Democritus, inquit, tradit, si quis extrahat ranarum viventium linguam, nullā aliā corporis parte adhaerente, ipsaque dimissa in aquam, imponat supra cordis pal-
pitationem mulieri dormienti, quaecunque interrogaverit, vera responsuram.

Quantum ad Differentias, variae illae sunt. Excluduntur quaedam ex ovis, quaedam ex limo, quod in Aegypto accidere, Diodorus Siculus prodidit. Sunt viridis, sublividae, cinereae. In Stochornii Bernensium montis duo sunt lacus, in quibus ranarum magno capite & caudā longā conspiciuntur. Praecipuam differentiam in initio Articuli dedimus.

ARTICULUS II.

De Ranis Terrestribus.

PUNCUM I.

De Bufone.

Ranæ Terrestris sunt *Bufo*, *Ranunculus viridis*, & *Rana temporaria*. Quem nos hic Bufonē, fortē quod in appropinquantes maximo impetu spiritum efflat, vocamus, is etiā *Rubeta*, quod inter rubos frequenter versetur, dicitur. Graeci φρένον vocant, Aristoteles

Aëtius l. 13. c. 55.

Habdarrham. de propriet. Animal. c. 41.

Plin. H. N. l. 32. c. 10.

Hartm. in Praxi Chymiatr. Plin. H. N. l. 32. c. 5.

Plin. l. c.

Differentiae.

Ambros. l. 1. c. 2. Nemen.

Φρυσίλε Ethymologus *Φρυσέον*, fortè à *Φρυσί* mens, quòd venenum caput petat, & vertiginem inducat. Nisi δὲ *Φρυσίλε*, seu frutice derivare volueris. Chrysippus quidem apud Plin. Phryganion febrib. quartanis alligatum remedio esse autumat, sed animal non describit. Luciano est *Φρύλα* quòd leviter contactus mirum in modum turgescat. Qui *μυόζον*, appellant, falluntur.

Description. In ejus descriptione, non est quòd multum immoremur, quia vulgare est animal. *Cutim* habet densissimam, & adeò crassam, ut sæpè nec acutissimo quidem palo perforari possit, lurido colore perfusam, maculis veluti quibusdam pustulis asperam, *ventre* turgido & inflato, unde *ventrosus* vocatur. *Locus.* *Capite* crasso, *dorsolato*. *Pilis* caret. *Amphibium* esse animal scripsit Plinius: sed fortè de palustri accepit. Opacis nemorosis cavis, quæ ac putridis locis gaudere tam certum, ac incertum, in Hyberniam illatum, solâ pulveris aspersione interiire. Non haberi ibidem, à quibusdam proditum.

Cibus. Terreo humore, herbis, lumbricis, & apibus vesci notum. Tantum verò singulis diebus terræ absumere, quantum anteriore pede comprehendere possit, à vulgo quidem creditur, sed nullo experimento fultum. Ob victum *μύοφας* à Græcis dicitur. Sub salvia sæpè stabulari, una & altera historia comprobavit. Periere subitò, qui degustaverant, ut à Mizaldo & Pareo proditur. An verò ea vescatur, ignotum.

Mizald.
Cent. 1.
memorab.
Pareus l.
20. c. 24.
Generatio.

Nascitur ex ovis, & materia putrida. Ex cremati pulvere sepulto emergere, proditum. In Dariene, si Petro Martyri credimus, ex guttis dextrâ mancipiorum manu cadentibus, dum pavimenta irrigantur, gignuntur. Exanate sepulta idem fieri, Reusnerus canit: ex menstruo sanguine Porta, cum mulieres aliquando rubetas enixas fuisse, legamus.

Porta Magiæ Natural. l. 2.
Sympathia & Antipathia.

Inimicitia ipsis intercedit, cum *sale*, *gravi odore*, & *odore florentis vineæ* ex inanimatis, cum *sele*, *talpa*, *araneo*, ex animalibus. *Sale* conspersus, ad ossa usque consumitur, si Alberto credimus, Rutæ, nasturtii, & hisce similia si urantur odore pelluntur. De florentis vineæ odore idem affirmatur. Cum *sele* dimicat & interimitur. A *talpa* devoratur, ut & hæc ab illo. *Aranei* ictu interit. Affixerat se cujusdam supinè dormientis ori arctè, oppressissetque hominem, nisi tertio aranei ictu interiire coactus fuisset. De *Sympathia* nihil singulare occurrit, præter id quod de salvia diximus. Mustelam in os rubetæ illabi, à viris fide dignis Porta se accepisse scribit. Plantagine conta morsus araneorum sibi mederi, apud Plinium alicubi extat.

Natura,
Ælian. H.
A. l. 8. c. 34.

De *Natura* & *moribus* habet, hyeme & interdiu latitare, noctu verò per loca ab hominibus trita vagari: noctu potius quàm de die

vivere; imò à solari splendore abhorrere: tardo gradu incedere, aliquando salire: sæpius verberatum, inflato corpore, virus primò ex clunibus emittere, mox guttas quasdam malè olentes effundere. Solet herbas salivâ inficere, quæ non minus est lethalis quàm napellus. Solent sonum gru gru edere. Pluviam, dum vespere cavernis egrediuntur, præfagiunt.

Agricola
de animal.
sub terra
latentibus.

Paucum venenum & mite habere, scripsit Albertus, quòd fortè de iis qui in frigidioribus regionibus degunt, sumendum est. Illarum qui in calidioribus, primi generis est. Sal ipse, quo bufo extinctus est, si in aqua dissolvatur, ita eam inficit, ut linteum vel indusium eâ madefactum, incurabili scabie hominem inficiat. Si de trahere volueris, vel pellem punge, vel virgâ exagita, vel superficie punctam, in aquam conjice. Virus infecta evadit. Infectus, tumore, pallore, singultu, spirandi difficultate, & gonorrhæâ afficitur. Aliquando, dysenteria, gutturis inflammatio, & vertigines accedunt. Fuit qui canna qua bufo infixus fuit, ita proprias manus infecit, ut tractatum iis cibum subinde evomeret, nec citius vomitus cessarent, quam ex aliorum manibus sumisset. Qui evadunt, edentuli plerumque fiunt. *Medelam* multa suppeditant, inter hæc præcipuè. Cancri fluviatiles triti & poti, cinis rubetæ, cornu cervi dextrum, lac muliebre, saliva hominis jejuni, radices arundinis, poterion herba, quæ & phrynion in vino exhibita, terra Melitenis, Smaragdus, Theriaca, & extra, oleum de scorpionibus. Sunt qui ipsius bufonis lapidem extollunt. Mithridatium, & quintam essentiam theriacalem his adde.

Venenum

Mizald.
Memor.
Cent. 3.

Noxia etsi bestia bufo, & venenata, multum tamen contra venena, & alia prodest. Marcellus eum cum adipe urfino, in olla rudi pro arthriticis coquit. Oleo in quo decoctus est, struimis felicissimè inungitur. Dissectus, & renum regioni applicitus, lotium provocat. Servatos hoc remedio quosdam hydropicos ferunt. Coctus & emplastri instar cynanchicis impositus, certo liberare dicitur. Idem filum quo suspensus erat facere apud Mizaldum legimus. Pinguedo exenterati, & radice laureolæ, stercore gallinæ, sale, & unguento dialthææ infarcti, inter assandum cadens, fistulæ benè in unguuntur: pulvere vero ita ad combustionem assari, asperso, optimè curantur, si Arnolde fides est. Exsiccatur in umbra & in manu linteolo involutus detentus, hæmorrhagiam sistit. Cinere nimius hæmorrhoidum fluxus, certissimè curatur. Nicolaus emplastrum ex eo format. Alii arefactum tanquam amuletum contra pestem, collo appendunt. Crollius pulverem contra quoscunque venenatos morsus aspergit.

Usus in Medicina.

Mizald.
Cent. 8.
Memor.

Arnold. l. 3. Brev.

Qui

Scalig. in
Hiftor.
Animal.
Arist. pag.
204.

Vulgaris. scemus. *Vulgaris* digitos habet quinos valde exiles, cum unguiculis tam in prioribus quam in posterioribus pedibus. In his, qui indicis locum obtinet, longissimus est; pollicis, inferior locus datur. Albertus ei pilosam *linguam* attribuit, ex Plinio Aristot. bifidam, secundum quem, siccum *pulmonem*, *lienem* perexiguum, & rotundum, *testes* spondyliis adherentes; foeminae *vulvam* ut in avibus, cujus cervix infernè sit magis carnosa, ova proxima septo contineantur, habet. *Reperiuntur* in Italia copiosi, in insula Capraria magni: in India, prodente Linschotano tam frequentes, ut in lecticis quandoque irrepant. Arabiae sunt cubitales: in Indiae verò monte Nyfa xxiv. pedum, in longitudine, colore fulvi, aut punicei, aut caerulei. Incolunt plerumque sepulchra, cavernas, spineta, & rudera. Genuae, in arce Principis Doricae, plurimos conspeximus apicantes. Vescuntur, carnibus, herbis, apibus, formicis.

Generatio. *Congreduntur* circa finem Martii, & quandoque, ita complicantur, ut duo capita & unum corpus repraesentare videantur. Post, ova, more serpentum pariunt, & teste Arist. terrae committunt, ex quibus sine incubatu statutis temporibus catuli erumpunt. Ore parere, vel foetus, uno inerte excepto devorare, fabulosum. *Abhorrent* à ciconiâ, quae lacertis pullos nutrit, bufonibus scorpionibus, araneis, & serpentibus. Aranei parvos lacertos in foraminibus, parietum, aggressi, filamentis obducunt, & ictibus obruunt. Cum serpentibus praellantur: ideo ophiomela *χὼν* accepere nomen. *Delectantur* carnibus cochlearum, dictamno herba, ad quam à serpentibus vulnerati confugiunt; & homine, quem etiam à serpente defendunt. Ori admoti, pituitam humanam avidissimè lingunt. Historias vide ap. Scaliger. citato loco, & Erasimum in tractatu de sympathia & antipathia.

Natura & Mores. Temporis tractu visum amittere, eundemque iterum seu solis beneficio, in quo tam diu donec convalescant, morari dicuntur, seu beneficio naturae, recuperare, cujus apud Aelianum exemplum, mensibus hybernis sub terra condi, & sic quasi semestrem vitam agere, unde *ἐξαπλωδίοι* dicuntur; hybernium & autumnale spoliū deponere; foemineum sexum majorem esse: compares incedere, & uno capto alterum in capientem efferari; ovorum quae pepere oblivisci, ut apud Plin. habetur, per medium divisos, propter glutinosum humorem, non perire, imò naturali quodam vinculo coalescere, quod ex cicatrice colligitur; ad *Naturam* & *mores* pertinet. Dicuntur & caudae saepius amputatae renasci. Theocriti interpretes exsiccatum in viperam transmutari falso scripsit. Reperiuntur & monstri visus quidam, teste Schenckio. in ceti magnitudinem Lutetiae excrescere. Dantur duab. & tribus caudis instructi, quod ab ovis dilecythis fortè profi-

ciscitur. sed & *αμφικέφαλοι* seu bicipites. Amphisbaenae iconem, in qua unius cauda conspicitur, hic quoque adjicimus. Quantum ad *usum in Medicina*, divulsa lacerta ictib. scorpionum applicatur: in cibis ad Salamandram virus à Plin. praebetur. Oleum ex iisdem in oleo suffocatis & percoctis, dissolvendis strumis, cum fimo pecudum inungitur: & ad delendas faciei lentigines commendatur. Crematar. cinis cum melle Cretico ad oculor. caliginem adhibetur. Efficacius est, si ex viridibus componatur. *Cerebrum* insuffusio-nibus valet. *Caput* contusum & appositum, seu solum, seu cum aristolochia longa, radice arundinis, & narcissi bulbo, sagittas & spinas tenaciter adherentes extrahit. *Cor* combustum & cum amurcâ mixtum, torporem membro inducit, ut Chirurgi ferrum non sentiat. *Sanguis* varices succrescere prohibet, si pusionum crura eo diligenter illinantur: in herniis quoque infantum commendatur. *Stercus* medicamento contra equorum stranguriam miscetur. In urina virili necata, ejus qui fecit, venerem cohibet.


ARTICULUS II.

De Lacerto Viridi & Chalcidico.

Lacertus viridis, à colore ita dicitur, Graecis *αὐρὴ χλωρὴ* & nuperis *χλωροσώρῃ*. Alii *Majorem* ob magnitudinem vocant. Sylvaticus *Ophiomachus*, à superandis & impugnandis serpētibus. Amant isti loca calida: ideo in Italia frequentes apparent, ubi nonnulli, (verba sunt Ambrosini) eos observant multos simul obviam egredientes, quandoquidem tum morbos praefagire affirmant. Aestivo tempore in arboribus morantur, & more ranuncolorum viridum vociferantur. Sunt & bicaudati. De *Descriptione* non adeò sumus solliciti. Icon namque subvenire poterit. *Vsus est* in Medicina singularis. In strumis à Plinio alligatur, & post dies triginta renovatur. Ramices infantum, morsu ejusdem dormientibus applicati, emendantur. Deinde animal arundine transfixum in fumo suspenditur. Vivum cum vino decoctum phthysicis jejunis Marcellus exhibet. Oleo decocto faciei lentigines depelluntur, de quo vide Gesnerum. Eodem cum pice liquida, & adipe suillo veteri Hierocles ungulam equorum inungit, ut firmior reddatur. Fumanellus in capillis denigrandis utitur. Pro iisdem regenerandis, composuit Veckerus aliud. Unguentum pro Epilepticis apud Ambrosinum vide. Cinere strumae exulceratae curantur. *Oculus* vivo erutus, quartanariis alligatur, pelli caprinae involutus. *Sanguis* attritos hominum & jumentorum pedes sanat, & clavos eruit. *Ossa* Epilepticis profunt, postquam vivus sale optimè in fistili aspersus, eadem carne amissa depofuerit.




Lacertq Viridis Liguro Bononiensibus



Lacerta et Stelliones



Lacerta et Stelliones



Lacertus Cyprius Scincoides






Gecko (Hemidactylus)




Gecko




Amphibian



Amphibian



Amphibian



Amphibian



Amphibian



Amphibian



Lacerta
Chalcidica.
Ambros.
l. 1. c. 7.

Lacerta Chalcidica nomen à Chalco seu ære; quod dorsum ejus lineæ æreæ percurrant, datum est. Dicitur Hefychio *Ἰγλὺς* Belonio *Samiamithon*, sed malè ut Salmasius docuit. Aliis *Seps*, à putredine, quod caro ad ejus morfum contracto livore putrescat: quibusdam & *Tarantula*, sed perperam. Similis est parvis lacertis, & illius serpentis colore quem Cæciliam dicimus. *Columna*, totam colore æreo refertam observavit. Nicandri scholiastes in Syria, Lybia, & Cypri nasci & inter saxa degere scripsit. More viperæ suos foetus enititur, nisi quod more aliorum oviparorum in ventre ova gerat. Fabius Columna in Gallicano castro inventum hujusmodi animal interfecit, & in dissecto illius ventre quindecim partus invenit, quorum alii membranâ exuti, alii pelliculâ diaphana circumdati, conspiciebantur. Galenus dissectum morfui applicat, & cibum fassamentorum præscribit.

ARTICULUS III.

De Lacertis Indicis.

PUNCTUM I.

De Senembi seu Iguana.

Marcgr.
Hist. Bra-
sill. 6. c. 11.

Lacertorum Indicorum plures sunt species, inter quas celebres, *Senembi*, *Tejuguacu*, seu *Temapara*, *Taraguira*, *Americima*, *Carapobeba*, *Ameriva*, *Taraguyco*, *Aicuraba*, & *Tejunhana*. Describemus eas verbis ipsius Marcgravii. Ita verò de prima iste. *Senembi*, Brasiliensibus, nobis *Iguana*, *Camelæon* Lusitanis falsò, & falsissimè Belgis Legyan. Erat longitudo totius animalis, quod hic describo (reperiuntur tamen longe majores,) ab ore ad extremitatem caudæ, trium pedum & octo digitorum: corporis ambitus vel crassities, decem digitor. ubi maxima. Tota *cutis* eleganter viridis, sed maculis nigricantibus & albis, in modum panni undulati, hinc inde variegata. *Cutis* constat è squamulis, in dorso, cruribus & caudæ initio paulo majoribus, quam in reliquis partibus. *Squama* caudæ omnes æquales, non ut Car. Clusius observat. A cervice ad extremam caudam seriem habet planarum, sed mucronatarum instar ferræ, spinarum secundum dorsi longitudinem, etiam virescentis coloris: suntque spinæ istæ ad cervicem majores, semperque minores fiunt, minimæ in extremo caudæ. *Caput* longitudinem habebat duorum digitor. ferè aut paulo minus, singularibus squamis, majoribus quàm in aliis partibus tectum: *colli* longitudo sesquidigiti, crassities quinque. Magnos claros habebat *oculos* nigricantes & binos nares patentes in prona & ferè extremâ capitis parte, singulæ mandibulæ, exiguorum *dentium*, & nigricantium, & bre-

vium numerum habebant, & os *linguam* crassam: Pone caput in utroque latere albicantem maculam instar branchiarum in piscibus sub mento ingluviem ad pectus usque propendentem, maximam partem nigricantis coloris; quam contrahere potest, & cum irascitur vel terrore afficitur propendere finit. Ab ore ad ingluviem in collo inferiori etiam habebat spinas in dorso. Quattuor *Cruribus* erat præditum, & totidem *pedibus*, quorum quisque quinque digitos continebat; cruraque & pedes squamis tecti ut reliquum corpus. Bina anteriora crura breviora posterioribus & non ita crassa, longitudo quattuor digitorum aut paulo minus; *digiti* quinque, & in iis medii breviores, quam medii posteriorum pedum: intimus & extimus digitus binis articulationibus duo illis proximis tribus medius quatuor constabant, omnium *ungues* nigri incurvati & breves instar avium. Posteriora crura longiora & solidiora anterioribus, nimirum longitudo eorum usque ad pedes, eadem quæ crassities colli vel caudæ propè corpus, nimirum quinque digitorum, pedum posteriorum longitudo unius pedis aut amplius: digitorum prior extimus anteriorum digitis extremis æqualis magnitudine & articulationibus duabus sequens hunc tribus tertius quatuor, quartus, qui longissimus, quinque, quintus seu ultimus versus caudam etiam quatuor, æqualis cum tertio longitudinis: ungues ut in anterioribus *Coryledonium* series nulla ut Clusius aliàs observavit. Saltem postica crura (tam superius quam inferius) instar humanæ furæ se habebant, priora autem non item: Crassities *caudæ* proxima corpori, erat quinque digitorum, & attenuabatur semper, donec in extremitate planè exilis esset & acuta instar subulæ. Quum mactassem, movebatur adhuc pelle detracta, & cor exemptum subsiliebat. Habebat in utroque latere *ova* ultra decem, quædam cerasi magnitudine, quædam & minora: *pinguedinem* insignem instar gallinarum: in ventriculo insignem copiam fructuum, maxime limonum dulcium: quibus pro cibo erat usus: Comedunt etiam farinam Mandiocæ aquâ madefactam. Diu in ediam tolerare possunt; habui, inquit Marcgr. ad duos aut tres menses sine omni cibo & potu, & denique aufugerunt, ita ut judicem sine dubio famem diutius ferre posse. Caroboni est saporis; cocta & diu frixa butyro, & æquè bene sapit ac caro pullorum & cuniculorum. 28. Maij. 1640 mactavi & secui unum, pinguedinem habentem multam instar gallinæ. Partes internas, cor, pulmones, jecur, vesiculam felle, renes, vesicam, genitalia vasa, habet ut alia animalia: amplum jecur, duplicem ventriculum, unum anteriorem, in quem cibum prius recipit, hinc intestinum habet minimi digiti crassitie,

ac

ac decem circiter digitos longum, cui annexitur alter ventriculus, ubi cibus planè concoquitur, hinc cætera intestina usque ad rectum. In anteriori ventriculo magnam copiam farinæ Mandiocæ & Milii Angolensis crudi habebat: Posterior, major, totus semicocto cibo plenus erat, cui multi vermiculi vivi instar eorum qui in caseo generantur, inhærebant. Intestinum ultimum s. rectum sterco continebat. Detracta pelle totianimali, & cauda amputata, hæc adhuc movebatur. Vivax animal, nec si quinque aut sex ictus in capite acceperit, moritur, nisi cervix cultro inflicto vulneretur, tunc n. cum sanguine vitam effundit. Caudæ caro, meris fibris & nervis constat. Mense Decembri 1641. vidi eximi lapidem è ventriculo Senembi, ovi gallinæ mediocris magnitudine & figura, sed compressiorem paulo: exterius glabrum, albicantem, interius compositum è tunicis instar Cepæ, ita ut una ab altera separari posset lapide confuso. Coloris erat interius albicantis s. grysei, duræ substantiæ ut Bezoar. Capiuntur fune, nam arboribus insidere solent, quod Brasilienses, fusti longo adaptabant funem, hoc videns animal, miratur, nec tamen se movet, sed tunc se illaqueari finit, & ita capitur, alias currit velocissimè. Juniores toti sunt viridis coloris, grandiores ætate, variegati fiunt, & cinerei: senes enim ut plurimum sunt fusci vel cinerei coloris. Fr. Ximenes scribit, in capite hujus animantis interdum reperiri lapillos, qui præsentissimo remedio lapides renum comminuunt & dejiciunt, drachmæ pondere è liquore idoneo hausti, aut etiam corpori alligati. An autem qui in ventriculo reperiuntur aliquando eis, dum viribus polleant, mihi non constat, periculum posset capi sine ullo, meo judicio, dis-crimine.

PUNCTUM II.

De Tejugvacu, Taraguira, & Americima.

Marcgrav.
Hist. Brasil.
l. 6. c. 11.

Tejugvacu & Temapara Tupinambis; Lacertus egregius: corporis figura, capitis, oculorum, oris, pedum, caudæ, convenit cum Senembi; in hoc autem differt. Primo totius corporis color est niger, elegantissimis maculis albis inspersis variegatus, & versus extremam caudam, sed quasi aculeos habet albos. Secundo cauda crassior in exortu. Tertio caret illis dentatis aculeis per dorsi longitudinem. Quarto in pedibus posterioribus exterior digitus paulo remotior est à reliquis, & brevior. Quinto, linguam habet bifidam longam, rubram, glabram, quam velocissimè instar serpentis, ad digiti longitudinem protrudit & retrahit. Nullam edit vocem:

patiens est, lubenter vescitur ovis, quæ cruda forbet. Inediæ patientissimum animal: detinebam alligatum; sed cum se vinculis absolvisset, liberum permisi (verba sunt Marcgravii) per cubiculum currere, & interdum dedi haustum aquæ è vitro bibendum, ita adhuc obambulat quando sitit, alias toto die in angulo suo ordinario sedet. Libenter incumbit cineribus calidis: Vigesimo Martii quispiam partem caudæ calcando detraxerat; postea tamen de novo ad duos digitos crevit, primo Julii moriebatur inedia planè tabidus factus, septem enim mensium spacio nihil comederat, tantum aliquando haustum aquæ sumpserat lambendo. Caro ejus comeditur. *Taraguira* Brasiliensibus: Lacertus in- & propè domos, in hortis & ubique frequens: Longitudo ejus circiter pedalis: (quanquam reperiantur & minores) *Corpus* habet teres, totum squamulis triangularibus cinereis seu leucophæis tectum. Caret *ingluvie* sub mento; *dorsum* æquale: nutant velocissime capite quando aliquid vident & celerissime currunt motando corpus. Si videant hominem dormientem cui serpens venenatus, aut aliud venenatum animal lædendi causa appropinquat, illum excitant ne lædatur. *Coire* volens mas leni morfu apprehendit foemellæ cervicem, paulo post ad latus se inclinat, & foemina propriam caudam sursum levando admittit marem, qui pedibus complectitur corpus ejus à tergo. *Americima* Brasiliensibus: Lacertulus tres digitos longus & pennam olorum crassus, ubi crassissimus: crura & pedes similis figuræ & tot digitis, ut Senembi. *Ocellos* habet nigros: *corpus* autem fere quadratum videtur. Totum *dorsum* squamulis vestitur leucophæis, latera autem fuscis; *caput* itidem & crura, cauda vero cæruleis: omnes autem splendent, & ad tactum apprimè sunt læves. *digiti* in pedibus instar setarum porcinarum. Venenosum est animal ut Lusitani affirmant, & cupidum exsugendi sanguinem ex gravidis mulieribus. Referunt foeminam semel tactam ab hoc lacerto, vel solum ejus indumentum, nunquam postea concipere.

PUNCTUM III.

De Caropopeba, Ameiva, Taraguycu, Aycuraba, & Tejunhanã.

Caropopeba Brasiliensibus; Lacertulus tres, quatuor vel quinque digitos longus, venenatus. Figura corporis est ut reliquorum. Quatuor cruribus & pedibus: in anterioribus quinque, in posterioribus quatuor habet digitos. *Corpus* totum hepatici est coloris, cum albis notulis, in cauda autem albis lineolis, hinc inde etiam aliquantum flavi mix-


Marcgrav.
Hist. Brasil.
l. 6. c. 12.

Teiuhana Brasiliensis



Americima Brasiliensisq

Lacertus Tarantula quibusdam



Teinguacu et Temapara Tupinambis



Senembi Brasiliensis



Lacertus aquaticus wasser Cijdex



Lacertus Viridis Grune Cijdex



Salmandra Molch Moll



Salmandra aquatica Wasser molch



Salmandra alia aquatilis Minor prone



Salmandra Terrestris Veranig Maculis Luteis distincta






Salmandra Aquatica



Salmandra Aquatica prona





mixtum; *Oculos* habet splendentes, & quasi vitreos. *Ameiva* Brasiliensibus & Tubi-
nambis; alia species Lacertorum & superius
descriptæ Taraguiræ per omnia similis, ex-
cepto quod caudam furcatam habeat, id
est, desinentem in duo cornua recta. *Tara-
guico Aycuraba* Brasiliensibus; Taraguiræ
alia species, superiori item similis, excepto
quod cauda ab initio ubique habet triangu-
latis squamas parvulas: *Caudæ* extremitas
planis squamulis tecta est, & præterea qua-
tuor maculis fuscis, *dorsum* & præcipue
post caput undatum maculis variis fuscis.
Tejunhana Brasiliensibus; Lacertulus est mi-
nimum digitum crassus; *capite* acuminato
ut Senembi; *oculis* nigris, circello aureo:
crura habet quatuor ut Senembi; Longitu-
do ejus ad posteriora crura & trium digito-
rum; *caudæ* longitudo sex digitorum & se-
mis: estque cauda teres & instar aviculæ
in extremitate acuminata. *Capitulum* tegi-
tur squamosa cute; *dorsum*, latera & crura
superiore latere cute vestiuntur ad tactum
molli instar holoferici; *cauda* autem squa-
mulis quadratis constat minusculis: gut-
tur & infimus venter itidem squamulis qua-
dratis teguntur, majusculis, capitis testa
fuscescit: *Dorsum* & *latera* superius fusca,
vel potius tribus lineis dilutæ umbræ coloris,
& aliquot undis ejusmodi variegatur:
latera inferius viridia; superiora autem in
fusco linea notat viridis secundum longitu-
dinem, à capite ad crura usque postero-
ra: itemque alia linea viridis est, ubi fu-
scum & viride separantur: Inter duas au-
tem lineas ordo est punctorum viridum in
fusco; & sub inferiori linea viridi series est
punctulorum nigrorum in viridi. *Crura*
etiam in lateribus superioribus obscure flavi
seu cerei obsoleti sunt coloris, variegata
maculis parvis fuscis. In inferioribus lateri-
bus sunt alba. Cauda quoque superius co-
loris, cerei obsoleti, inferius cerei cum
albo mixti. *Caput* inferius, guttur & infi-
mus venter, candidi sunt coloris, sangui-
neis notis variegati. Bifidam habet linguam.

CAPUT III.

De Salamandra.

Salamandra, unde nomen fortita sit, in-
certum est. Nam dici vel quasi valin-
cendam, quod contra incendium valeat,
ut Isidorus vult: vel quasi sola amans sit &
πυρὸς, id est ignis; vel quod *σουλαμάνδραν*
id est quietam latibulum teneat; aut quod *σε-
λαμάνδρα* dicatur, id est inter spacia inania
caularum & speluncarum stabulans; aut
denique quod *σέλα μανὰ δερεῖ*, id est,
splendores laxet & pellat, ridiculum ni-
mis est. A Saanbras vel Samabras Arabico
dici, verisimile est esse incertum. Plinius
animal stellatum nominavit: Ætius *Lacer-*

tam venenariam. Duæ ipsius sunt species.
Alia enim est *Terrestis*, *Aquatica* alia. Illa
lacerto viridi est similis; caput & ventrem,
quæ crassiora, si excipias. Breviorem ha-
bet caudam, colorem nigrum maculis lu-
teis inquinatum, sed quâdam levitate pel-
lucidum. Gesnerus unam in Alpibus inve-
nit, totam fuscam, absque splendore, cau-
dâ brevi, succus lacteus à percussâ dima-
nabat. Matthiolus in quibusdam Germa-
niæ sylvis, dorso nigerrimas, ventre ruben-
tes observavit. Vitriacus ei caudam longam
& tortuosam, ungues aduncos & hamatos
adscribit. Nicander *λιπόρρινον* quod splen-
dida, renitente, & quasi pingui delibuta
cute sit, vocavit. *Loca* frigida, humida,
& opaca incolunt. In Germania multæ si-
mul quandoque conglobatæ inveniuntur.
In agro Tridentino & potissimum in valle
Ananiensi conspiciuntur frequenter. Sunt
qui ore aërem haurire credunt. Alii favos,
apes, & lac appetere: ideò alvearia & vac-
cas infestare scribunt. Nihil gignere, reli-
quit Plinius; nec genus masculinum fœmi-
nimumve habere. At Bellonius vidit multos
fœtus sine involucrio enixam. Procreat sci-
licet intus ova, in quibus fœtus ad perfe-
ctam maturitatem nutriuntur. Quantum
ad *Naturam*, an igne vivat, vel eundem
extinguat, in Exercitationibus, DE O VO-
lente, disquiretur. Lactem succum percus-
sam fundere, superius diximus. Cœlo plu-
vio apparet, ideò visâ, tempestatem rusticæ
præfagiunt. Nec æstate, nec hyeme conspi-
citur. Tardè incedit. In Cumana, gallinarum
instar gracillare, Cardanus prodidit. Si viva
gladio in duas partes secetur, pars anterior
progreditur, posterior retrocedit. Instinctu
quodam naturali ranas & testudines odio
prosequitur, cumque illis acerrimè dimicat.
Venenatam esse compertum. Integras fami-
lias periisse tradunt, quæ aquas in quas Sala-
mandra ceciderat, biberant. Sed & fructus
salivæ oris ejus aspersi, lethales creduntur.
Plinius dente Salamandræ percussum, obire
scribit. Ejusdem, Nicander, Aëtius, &
Abensina meminere. Ubi semel partio den-
tem inflexit, nunquam extrahere; si avella-
tur, lethale esse, quidam Gesnero narravere.
At ipse, duas quas domi habuit, nunquam
os ad mordendum, diduxisse, etsi irritatas,
scribit. Nec audivisse quempiam à Salaman-
dra in Germania morsum. In Galliis tamen
morsus lethalis est: & Rethi, ab eadem læ-
sum, tot Medicis indigere, quot maculas
bestia habet, proverbio jactant. *Salivâ* Medi-
ci inter psilothra utuntur. Kiranides cor pelli
nigræ involutum, contra quartanam de bra-
chio suspendit. Quæ de Zona expelle, & aliis
contra incendia sparguntur, quia absurda
hypothesi, ignem nempe extinguere, nitun-
tur, falsa quoque sunt. *Aquatica Salamandra*,
aliis *Lacertus aquaticus*, Bellonio *Cordulus*,

Terrestis.
Descriptio.

Locus.

Vidus.

Generatio.
Plin. H.N.
l. 10. c. 68.
Bellon. obs.
l. 3.

Natura.

Cardan. de-
rer. variet.
l. 7. c. 33.Plin. H.N.
l. 29. c. 4.

Vfus.

Aquatica.
Ambrosi. l. r.
de Digit.
Cypar. c. 9.Ambrosin.
de Digit.
Ovip. l. 1.
c. 8.
Nomen.

Monachis qui in Mesuē commentati sunt, *Scincus aqua*, cum lata caudā dicitur. *Quadruplex* ipsarum genus est. Unum cum caudā, figuræ rhombi, quam Ambrosini, ad distinctionem dicimus. *Lingua* habet brevissimam & latiusculam: dentes exiles, ut visum effugiant. *Caudam* in medio crassiusculam, quæ prona & supina ad instar figuræ rhombi contrahitur: *Pedes* anteriores in quatuor, posteriores in quinque digitos fissos: *Cor* spongiosum, quod dextro lateri incumbit: cuius auricula sinistra maiorem pericardii partem occupat: *lienem* subrubrum: *renes* spongiosos: *hepar* nigerrimum. *Ova* magnitudine pisi in bicorni utero ordine quodam digesta gerit, ex quibus postmodum vivi fetus erumpunt. Bellonius ei tergus tuberculis horridum adscribit; Agricola colorem cinereum, vel in cinereo fuscum. Illa, quam Gesnerus secuit, longitudine erat septem digitorum, colore nigra cum punctis albis in ventre: reliquum corpus nigrum punctis concoloribus asperum; *Alterum* genus est quoque *duplex*, unum majus, semicirculis in dorso albicantibus distinctum: alterum minus. Quartum est Matthioli, Utinensibus frequentissimum, capite terrestribus rotundiore & breviorē, caudā anguillarum modo, dorso nigro luteis maculis insignitō. Lacunis opacis & pingui solo fitis delectantur, aquis inprimis, in quibus limus albus est. Ibi sub petris hærent, & rarō ad superficiem veniunt. In vas aqua plenum coniecta à Gesnero quædam os proferebat. Lento gradu in terrā progrediuntur, & ora tenaciter claudunt, nec aperiunt, nisi violenter exprefferis. In sal coniectæ caudam movent, & moriuntur. Verberatæ diu vivunt. Pellis adeo dura, ut gladio resistat. Ex vulneribus lactea sanies prodit. Irritatæ, intumescunt, & in pedes erectæ sudorem virulentum effundunt, laceissentemque in tuentur. Sues si aliquam comederint, moriuntur.

Agricola
de animal.
subterra-
neis.

CAPUT IV.

De Stellione.

Ambrosin.
de Digit.
Ovip. l. i.
c. 10.
Nomen.

STellio inter genera lacertorum quoque sponitur: nomenque ex eo habet, vel quod maculis, vel quod eminentiis instar stellarum distinctus sit. Ideo quidam *Lacertam stellarem* dicunt: vel quod venenum cibo stillat. Græcis dicitur, *ὀσκαλάς*, seu *ὀσκαλαβός*, forte *ὅθεν τὸ ὀσκαλῶς βαίνειν*, à molli & tacito gressu: vel quasi *κωλοβάτης*, quod artibus suis innixus, per parietes reptat. Unde & Xylobates à Kiranide vocatur: tum *καλεώτης*, quod more mustelæ, quæ *καλῇ* clanculum per quodcunque ascendat: tum *κωλώτης*. Modernis Græcis est *λιαπὸν*, *γαμιάμη*, & *ψαμαμύνη*. Non ausim tamen quicquam certi dicere. Genera stellionum sunt varia. *Stellio Græcorum* quem Coloten

Differentia
Plin. H. N.
l. 29. c. 5.
Plin. H. N.
l. 11. c. 26.

& Ascalaboten dicunt, lentiginosus est, & stridoris acerbi, omnibusque promiscuè vescitur. *Stellio Italorum* Chamæleonum naturam quodammodo imitatur, rore & araneis vescitur, & venenatus esse fertur, ut ille innocuus. Ad Stelliones referri possunt, *bestiola alba*, pusillis lacertis similes, lucido & fragili corpore, ut Gesnero oculatus testis retulit, quæ in agro Romano, Hermolao prodente, reperiuntur, & *Tarantula* nomine veniunt. Sed & *lacertus parvus* coloris lucidi & argentei, quem Græci *λιαπὸν* vocant. Bellonius in Gazara stellionem se observasse scribit, colore nigro, magnitudine mustelæ, crasso capite, & tumidâ alvo. An verò Stelliones magnitudine & figurâ accedant, ad illos lacertos virides majores, quos vulgus apud Italos *ramatos* vel *Ligures* vocat, alibi dicitur. Hic *Stelliones Matthioli*, & *Lacertum facetanum*, qui Tarantula quibusdam, in iconibus exhibemus. In Germania, Gallia, & Anglia non dantur. In Thracia, Sicilia, & Syria, vagantur. Ibi lethales sunt magis quàm in Italia: hic, in caminis commorantur. Plinius in angulis ostiorum & fenestrarum libenter stabulari scripsit, qui etiam prodidit, genus illud quod scorpionibus adversatur, in Italia non nasci: ibidem venenatos esse, reliquit Aristoteles. De *Natura* notandum, mensibus hybernis latere, nec quicquam edere, & latere in angulis ostiorum, fenestrarum, & speluncarum: anguis modo senectutem exuere, eamque protinus devorare; præripientes, comitali morbo remedia: dolose apibus insidiari: araneos & scorpiones persequi: rarō mordere, cum dentes obliquos habeat, quos in vulnere relinquunt, morsu denique hominem stupidum reddere, & raro interimere. Invenere in *Medicina* usum. Caro furculos corpori humano infixos extrahit. Ipse morsui proprio medetur, & in oleo putrefactus, scorpionum ictus sanat. In quartanis, Magi capsulis inclusum, capiti patientis subjiciunt, & in fine paroxysmi dimittunt. De *Cinere* prodit Plinius, sinistra manu detentum, Venem excitare; in dextram translatum, inhibere. *Partes* somnum inducere, & stuporem membris conciliare, creduntur. *Hepar* tritum odontalgiam, si superspergatur, tollit. *Stercus* tritum verrucas delet. *Senecta* in epilepsia maximè prodest. In vino suffocatus, maculas in facie generat, si vinum bibatur. *Fel* in aquâ dissolutum, mustelas congregare dicitur.

Bellon. ob
serv. n. 79.

Locus.

Plin. H. N.
l. 8. c. 31.

Aristot. H.
A. l. 8. c. 29.
Natura.
Plin. H. N.
l. 8. c. 31.

Vjus.

CAPUT V.

De Scinco.

QVem Latini *Scincum* vocant, hic Græcis *σείγγ*, & *σείγκ*, seu à Tinsa Arabum, quo nomine Scincum Abensina vocat, seu aliunde. Dioscorides *Crocodylum*

Ambrosin.
de Digit.
Ovip. l. i.
c. 12.
Nomen.

ter-

terrestrem vocat, Bellonius *Crocodilum minore*, vel quod Crocodilo sit similis, vel quod crocum timeat. *Descriptionem* si species, quadrupes est magnitudine lacerti viridis, aut Salamandræ, ut Bellonius scribit, pollicis crassitiem & longitudinem quadrantem non excedens, caudâ rotunda & squamosâ. Renodeus animal quadrupes esse ponit, *squamis* exiguis, frequentibus, & subluteis, *capite* longo, vix colli crassitiem superante, *ventre* quadantenus alato, *caudâ* rotunda lacertarum ritu, sed brevior, & ad finem incurva. A capite ad caudam differtur linea. Gesnerus vidit digitis quinque cum unguiculis instructum, latitudine fessiquipollicis, longitudine duorum palmorum. Vidit & alius sex palmares. Constantinopoli. In Arabia tantum nasci prodidit Abensina: circa Mecham vagari, Bellonenfis. Versantur circa Nilum, & inde ad nos per Alexandriam & Venetias deferuntur. Inveniuntur & in locis mari rubro vicinis. *Vicitant* odoratis floribus: ideo non est mirum talem sinum excernere. In sicco *pariunt*, & ova terræ gremio committunt. *Caro* scincorum magnis antidotis miscetur; unde quædam contra venena, *Diascincos* appellatur. Rhafis, animal ipsum, supra pulsionem metu somniorum laborantem, cum fructu suspendit. Pulverizatus, ad excitandam Venerem drachmæ unius pondere exhibetur. Eadem caro elephantiscis in India exhibetur, & corpora pinguefacit. *Cor* in lana ovis nigræ, primo partu genitæ portatum, quartanas abigere creditur. *Fel* cum melle mixtum, in suffusionibus decantatum est. *Renes* sperma augent. *Sanguis* cum borrace illitus faciei maculas delet. *Pinguedo* dolorem renum expellit. *Pellis* ustæ cinis super partes secandas spargitur, ne dolorem sentiant. *Ægineta* unguentum *Entaticon* componit, quod caudæ Scincorum ingrediuntur. Ex *intestinis* suffitus paratur, qui hysteris vehementer conducit. Ex *stercore* medicamentum antepilepticum à Serapione componitur. Idem in extergendis oculorum maculis Plinius vehementer laudat. Optimum autem est, candidissimum, friabile, & quod in aqua ampli instar citò liquefcit. Ex eodem, ad faciem erugandam, unguentum meretrices parabant. Dum teritur veteris fermenti aciditatem spirat. Olim stercore sternorum qui oryza alebantur, adulterabatur. De *Differentiis* hæc habet. Maximos Indicum & Arabicum, secundum Plinium esse. In India bestiam nasci scinco specie similem, canis Melitenfis magnitudine, cujus pellis asperis squamis patet, quam Indi Phatagenem dicunt, eandem fortè cum Caudiverbera. In Cypro lacertæ speciem magnam nasci, scincum omnibus notis referentem, cujus imaginem hic exhibemus. In lacu denique Vi-

centino, scincos ab aliis diversos haberi, sed qui ad Salamandras potius referri debent. Ad easdem pertinet & *Scincus Rhafis*, cauda non rotunda, sed circum latera compressa.

CAPUT VI.

De Cordylo quadrupede, & aliis quibusdam lacertis.

DE Cordylo hæc Ambrosinus habet. Hæc lacertæ species Cordyli nomine fortassis insignitur, quoniam Cordyli piscis figuram aliqua ex parte repræsentet. Alioquin à nonnullis recentioribus *crocodilus terrestris* appellatur; cum tamen Scincus verus, Crocodilus terrestris Antiquorum fuerit. Nuperi quidam hoc animal *caudiverberam* nominant, quoniam continua caudæ agitatione diverberet. Græci ad imitationem latini vocabuli *Uromastigen* dicerent. Bellonius prædictam lacertæ speciem depingit, & crocodilum terrestrem nuncupat, quoniam primo aspectu crocodilo Nilotico assimilatur. Verum postea ab ipso discrepare asseverat: quia hoc animal caudam in modum clavæ tuberculis eminentioribus asperam gerat. Quapropter corpora quibus appropinquat, atrocissimè diverberare dicitur. Hinc caudiverberæ nomen sibi vindicavit. An verò habeat branchias, quemadmodum scribit Bellonius, & confirmat Rondeletius, non facile potest exponi. Siquidem in exuviis hujus bestię, quæ in publico Musæo adhuc servantur, duo tantum foramina secus rictum observantur. Quarum meminit Bouffuetus his carminibus:

*Cordylus effigie hic talis depingitur ipsa
Qualis, & in terris, & fere degit aquis.*

*Inter quadrupedes rimam unam, sive foramen
Post oris rictum (respice) solus habet.*

An verò istæ rimæ, vel foramina sint illa, quæ sub branchiis esse solent, aliis considerandum relinquimus, & ad clariorem hujus animalis descriptionem accedemus. Thomas enim Erastus Helyetius Medicus & Philosophus insignis describit hoc animal crocodilo simile, minus tamen, & inferius *labrum* movens, figura *capitis*, & *oris* testudini respondens, cum brevi collo, & in parte inferiori tumido. *Pedes* habet quatuor quinque digitis more lacertarum distinctas. Reliquum corpus non squamigerum, sed pelle duriuscula, instar corii serpentis vestitum, *cauda* illi in est rotunda, in circulos quosdam squamatim divisa, modo feræ inexplicabili. *Squame* sunt durissimæ, videnturque ossæ, & quasi quadrangulæ, cavæ parum sunt, ut caudam rotundam efficiant. Alioquin tanquam tegulæ, quæ domorum culmina cooperiunt, simul junguntur, extermitas cujuslibet squamæ in spinam acutissimam desinit. Amplius tales *squame* pellucidæ, flave-

flavescentes seu pallentes instar cornu videntur. *Venter* hujus animantis magis quam in crocodilo tumescit. *Tergus* denique latum, & quodammodo planum est, ut in icone licet conspiciari. Quid si hoc animal *phatages Indicus* sit *Æliani*? hic enim author prodidit in Regionibus Indicis nasci bestiam, crocodili terrestris speciem gerentem, cujus pellem asperam ad diffecandum adhibent.

CAPUT VII.

De Chamaleonte.

Ambrosin.
de Digit.
quadruped.
l. i. c. 14.
Nomen.

Descriptio.
Plin. H. N.
l. 8. c. 33.

Aristot. H.
A. l. 2. c. 11.
Theophr.
de mutan-
tib. colo-
rem.

DE Chamæleontis ethymo, quæ vox parvum leonem significat, nihil occurrit, præter hoc, ridiculum nimis esse Isidorum, qui à camelo & leone deducit: & recentiores Barbaros, *Gamaleonem*, *Zamaleonem*, *Hamaleonem*, & *Maleonem* eundem vocare. In *Descriptione* variant authores, tam antiqui quam recentiores. Plinium si sequimur, figurâ & magnitudine esset lacertæ, nisi *crura* essent erecta & excelsiora. *Latera* ventri junguntur, ut piscibus, & spina simili modo. Eminent *rostrum*, ut in porco, haud absimile fuillo; *cauda* prælonga, in tenuitatem desinens, & implicans se viperinis orbibus; *ungues* adunci; *corpus* asperum ceu crocodilo; *oculi* in recessu cavo, tenui discrimine prægrandes, & corpori concolores. *Caro* in capite & maxillis & ad commissuram caudæ admodum exigua, nec alibi toto corpore. *Sanguis* in corde & circa oculos tantum. *Viscera* sine splene. Idem ferè apud Aristotelem invenies. Theophrastus addit, parum abesse quin pulmo totum corpus impleat. Aristoteles verò, lacertam planè repræsentare, & rostrum simiæ porcaræ habere. *Ambrosius* ita hoc animal descripsit. Primitus, inquit, si caput meditemur, à medio capite retrorsum ossæ pars triquetra eminet, reliqua pars antrorsum colligitur cava, & quasi canaliculata, eminentibus utrinque ossæis marginibus asperis, & leviter ferratis. *Oculi* in cavo recessu prægrandes, & colori concolores conduntur, cujus pupilla non movetur, sed animal totius oculi motu circumspicit, ore semper hiante, linguam habet longam & terrestri lumbrico similem, in cujus extremitate spongiosus quidam & glutinosus nodus existit. Ideò Johannes Laudius (referente Scalligero) huic animali assignat *linguam* palmi longitudine, & quid tanquam acetabulum in summa ipsius parte cum muco, quo prædam citò tollit. *Dentium*, & *gingivarum* loco, os quoddam continuum, & ferratum habet: nec non superius labium brevius. *Gula* atque *arteria* ex mente Aristotelis in eodem situ ut in lacertæ est. *Pulmo* in comparatione ad molem corporis illi, inest maximus. *Cor* habet magnitudine cordis muris domestici; *hepatis* lobos duos, quorum sinister est major: *folli-*

culus fellis granum hordeaceum æmulans, sinistro jecoris labo adhæret. Denique *intestina* omnia interaneis lacertæ similia esse prodit Aristoteles. *Crura* postea illi insunt recta & longiora, quam lacertæ, quamvis inflexus sit similis. Demum pedes anteriores à posterioribus valdè discrepantes Natura huic animali concessit. Etenim teste Bellonio, priores pedes ternos digitos intra, binos extra, posteriores verò ternos extra & binos extra possident. Itaque ex Gesnero longitudo hujus animalis à summo rostro ad initium caudæ septem, vel octo digitorum est. Altitudo digitorum quinque, medius locus inter imum ventrem, & summum dorsum flexus costarum continet circiter, sexdecim. Et demum maculis distinctus ut pardus conspicitur. At paulò aliter de quibusdam *Gassendus*. Sunt enim secundum hunc Chamæleoni *dentes* eleganter dispositi. Unicum *intestinum* non circumvolutionibus sed curvaturis solum productum. *Excrementum* satis liquidum, nisi quâ parte ad anum accedit. *Hepar* bifidum, & ex gibba parte quidem sanguinem in cor auriculatum infundens, at non superflite ascendente descendenteve caudice venæ: quippe aliunde non porta modò nuncupata, in intestinum; sed venæ quoque aliæ, ad cæteras partes directè procedunt. *Pulmo* inflatus, abiit, inquit, in membranam tenuissimam, toti animali ambitu æqualem. In *imo ventre* nullum peritonæum, sed membrana solum partes dexteras à sinisteris dirimens. Non item *lien*, non *vesica*, non *renes*, sed carunculæ solum observatæ sunt, quæ genitalia fortè fuerunt. *Lingua* est pedalis propè longitudinis. Habentur in Asia, Africa, India, & Madagascar insula. Cairi hortorum sepibus ad Nili ripas insident. Per solum rarò vagantur; quod sibi à cerastis & viperis metuant. Bellonius in fruticibus Rhamni plurimos conspexit. Aëre victitare credidere veteres: muscas, locustas, erucas, scarabæos vorare, observatum à recentioribus; à Peirescio, vermiculis qui ex farinaceis matris colliguntur, vehementer delectari. Linguâ ut promuscide utuntur, quam jaculi instar evibrant, & tantâ quidem celeritate, ut penè visus aciem effugiat. Id præstatur, addit Gassendus, beneficio officuli, quod bifurcatione quadam implantatur utrinque ad extremas fauces, & cætera teres secundum oris longitudinem, deservit implicandæ explicandæque linguæ; cavæ scilicet, intestini instar, nisi quod in summo caruncula est, nonnihil viscida, ut prædam corripit. In foemina una ex illis octo quas Peirescius aluit, ut formationem eruptionemque observaret, fuere ova intra membrulam supra centum, quorum nonnulla exitere magnitudine nuclei olivæ, in quibus visum luteum solum, nihil vero albuminis; cum tamen parva viderentur quan-

Gassend. in
vita Peire-
scii l. 5. p.
325.

Locus.


Bellon. ob-
serv. l. 2. c.
34.
Gibus.
Plin. H. N.
l. 8. c. 33.

Generatio.


Stelliones ex Matthiolo



Stern Eydex




Frembd Eydex




Scincus




Candulus



Lacertus Indicus Cordylo Similis



Cordylus sine Vromastix




Chamæleon niger



Chamæleon Varius



Chamaeleon Cinerens Verus




Chamaeleon



Crocodilus

Crocodyll




Laudiuerh



Fig. 1.



Fig. 2.



Antipathia. quandam lactis speciem referre. *Inimicitias* gerunt cum *accipitre*, *corvo*, *elephante*, & *viperis*. *Accipiter* degustata chamæleontis carne interire creditur. Idem *corvo* accidit, nisi felauri foliis muniat. Ab *Elephante* frondibus concolorem deglutiri fabulatur Solinus, & cum dispendio vitæ, nisi statim oleastro sibi medeatur. Metu viperarum & serpentum, in fruticibus & arboribus degit. Saliva ejus ab ore in caput serpentis demissa, ob viscositatem fili instar, eundem interimit. Circa caprificos ferum, innoxium alioqui Plinius facit. *Naturam* & quædam alia si attendas, nunquam os aperit, inquit Plinius, sed totius oculi vorsione circumspicit. Ipse celsus, hianti semper ore. Defuncto pallor est. Hybernismensibus latet ut lacertæ. Coloris natura mirabilior. Mutat namque cum subinde & oculis, & cauda, & toto corpore, redditque semper quemcunque proxime attingit, præter rubrum candidumque. De pallore, idem Ambrosinus affirmat, & quidem experientiæ innixus. De coloris mutatione addit, & candidum recipere, adducto viri nobilis testimonio, qui sudario seu mucinio inclusum, ideò periisse putabat, quod ejusdem albedinem mentiretur. At Peirescii Chamæleontes, rerum objectarum colores non induebant. Seu virides, seu cinerei sint, inquit *Gassendus*, atrorem solem quandam subeunt, quâ parte ad solem aut ignem obvertuntur. Id rarum & admirabile; non moveri oculos Chamæleonis conjugatos; sed uno aliquorū spectante, reliquum vel stare immotum, vel in aliam partem deflecti. Deflectuntur quoque versum, propter quatuor trochleolas, nullâ ostentata distinctione iridis; sed solâ pupilla, ad quam cornea undique (cum sit ut corpus reliquum radiata, variegata, granulata) terminatur. Incolis Cochinchinæ in cibis esse author relationis illius prodidit. Multi simul colligati venduntur, empti, in ignem conjiciuntur, eidemque ita, vinculo adusto reluctantur, ut incedere conentur: tandem superati torrentur. Pelle abrasâ, caro candidissima remanet, quæ in liquore butyro nostro simili coquitur. Habet & in *Medicina* usum. Ad epilepsiam profligandam Trallianus cum in fictili novo cum oleo decoquit, donec tabescat. Ad podagram verò depellendam, unguentum mirabile componit quod apud ipsum vide. Arnoldus Villanovanus *linguâ* super obliviosum suspensâ, memoriam reddit. Alii ad evitanda puerperii pericula, eandem alligant. Marcellus hypochymata felle tollit. *Cor* Plinius contra quartanam in lana nigra primæ tonsuræ involvit. Decoctum Chamæleontis viridi colore in balneo aspersos inficere: caput & guttur, lignis quernis adusta, imbres & tonitrua ciere; linguâ cum radice herbæ chamæleontis & cynoglossæ homines obmutescere cogi; *hepar* amatoria

dissolvere; *intestina* & excrementa cum fimiæ urina mista; odium hominibus conciliare, si januis illinantur; armum dextrum ad hostes superandos valere; Democriti apud Plinium sunt ineptiæ. Integrum enim de eo scripsit librum. Palamque est, addit *Plinius*, virum aliàs sagacem & vitæ utilissimum, nimio juvandi mortales studio prolapsum. Quantum ad *Differentias*, Bellenius varias ejus species observavit. Pallentes in Ægypto, in Arabia prædictis multo minores, colorisque diversi. Albicantes erant, subfulvi, & rubentibus maculis distincti. Nos hic pallidi, nigri & varii icones damus.

CAPUT VIII.

De Crocodilo.

DE Crocodilo hic agimus, quia ad lacertorum genus refertur, & Palladius hanc bestiam, generis vocabulo *lacertum* appellat. Græcis dicitur *κροκοδειλ* & quandoque *κροκοδειλ* à quibus & Latini sumfere: sine dubio, *ὡς τὸ πρὸς κρόκος φοβεῖσθαι*, quod littora timeat. *δειλὸς* Græcis timidus. Hesyechius *πῶλλω*, & *δεμδρίτω* vocat. Ægyptii *χαμψών*, vel *χαμψών*, à quo Turcarum *Kimsac*, quod eidem indidere. Lexicon Ægyptiacum Kircheri habet *πχαρουν*. Statio est fera Pharia, Alberto Tenchea. In Arsinotica præfectura, teste Strabone, dicebatur Suchus: Indis Cayman. Lacertæ figuram repræsentat. Croceo est colore, ventrem si excipias, qui subalbidus. *Corium* sub ventre molle, ut faciliè fauciari possit, in reliquis partibus tam durum, ut ne bombardæ manuaræ globo cedat. Visus ad viginti quinque, imò viginti sex cubitos excrevisse. Ille ætate Psammetichi, teste Plutarcho; hic, Amasidis, prodente Æliano. Circa urbem Panamam, ultra centum pedes in longitudinem crescunt. *Caput* habet latum, *rostrum* suillum, rictum oris usque ad locum aurium productum, *Oculos* præduros & suillis similes, ut Albertus prodidit. *Palpebram* inferiorem sine ulla nictatione. *Dentium* series pectinatim stipatur, & quidem magnorum, albicantium, robustissimorum. Sexaginta post Ælianum Gesnerus numeravit. Plures superiore maxillam munientes dorsum prominent, ita ut ore etiam clauso conspiciantur. *Linguâ* quia indiscreta, non mirum Plinium post Diodorum Siculum scripsisse, *Unum hoc animal terrestre lingue usu caret*. Unum superiore mobili maxillâ. *Lien* est parvus. *Testes* internis lumbis adherent. *Spina* sexaginta vertebra quas totidem nervi colligant, constat. *Crura* cum pedibus acutissimis unguibus armatis in latera parum flectuntur. *Cauda* longitudine reliquum corpus æquat. Gesnerus in ea pinnam per septem digitos ad postremam usque partem

Plin. H. N.
l. 28. c. 8.

Differentia.

Nomen.

Kircher. p.
172. Lin-
guæ Ægypt.
restituta.
Descriptio.

Arist. H. A.
l. 2. c. ult.

Ælian. H.
A. l. 17. c. 6.

Plin. H. N.
l. 3. c. 25.

Ælian. H.
A. l. 10. c. 21

Arist. H. A.
l. 1. c. 10.

Arist. H. A.
l. 3. c. 1.

Plin. H. N. 1.8. c. 26. observavit. Primus quinque Crocodilos Romæ, Ædilitatis suæ ludis, M. Scaurus temporario Euripo ostendit. Inveniuntur in Africa, Asia, & America. In Nilo inprimis & vicinis ipsi stagnis, Nigro fluvio; Gange circa Bengalam, in Bamboto flumine juxta Atlantem, quod Solinus prodidit; non longe à Chalcedone, sed parvi, quod Strabo. Acofta aquis in America calidis delectari scripsit, sed in Peruana usque ad Pacram non inveniri, inde frequentissimos esse. Quidam luto vivere dixerunt: sed revera piscibus saturantur, & humanæ carnis sunt avidissimi.

Acofta Hist. Ind. Occid. 1. 3. c. 15. *Gibus.*

Martyr. 1. 2. In terris etiam animalibus insidiantur. Petrus Martyr in legatione sua Babylonica, comprehensum qui tres pulsiones devorarat, scribit. In Arsinoitica præfectura olim facer, pane, carne & vino, à Sacerdotibus nutriebatur. Fuere, prodentē Strabone, qui placentas, carnes assas, & mulfum iisdem offerebant. Quantum ad Generationem, masculus foeminam resupinat, cum aliter ob crurum breviteratatem congregredi nequeant. Parit foemina ova sexaginta, quanta anseres: eaque, prædinatione quâdam, extra eum locum semper incubat, ad quem summo auxilio eo anno accessurus est Nilus. Totidem diebus ea parit, & totidem fovet, & tandem partus decursu sexaginta dierum peragitur: Gylius arena obrui, & absque ullo incubatu catulos egredi observavit. *ωοπρία* verum tempus indicat: nec aliud à minori origine in majorem crescit magnitudinem.

Generatio. Plin. H. N. 1.8. c. 25. *Ælian. H. A. 1. 10. c. 21. Plin. H. N. 1.8. c. 25.*

Antipathia. Gerit ex quadrupedibus cum ichneumone, bubalo, tigre; ex avibus cum accipitre; ex piscibus cum hydro, porco pisce, delphino; ex aliis animalibus, cum scorpione, homine, Tentyritis, & plantis quibusdam inimicitiam. *Ichneumon* ova ejus conterit, & in aprico dormientis os illapsus, eundem eviscerare conatur. A bubalo proflernitur. Resupini ventrem, tigris sæpe in America dilaniasse visus est. Propter accipitrum odium, Coptitæ Crocodilorum veneratores, eos sæpe in crucem agunt. Hydro ita est hostis, ut propter fel à venatoribus gestatum, iisdem nocere non possit. A porco pisce quod spina circa caput armetur abstinet, ut Strabo prodidit. Delphini Nilum ingressi, aquis se immergunt, & subeuntium Crocodilorum ventrem dilaniant. Spectaculi testis fuit Ba-

billus, quondam Ægypti præfectus. E-rumpentem ex ovo crocodilum, scorpium fauciare solet. Ad humanum strepitum perhorrescunt, & persequentem fugiunt. De Tentyritis ita Plinius. Quin & gens hominum est huic belluæ adversa, in ipso Nilo, Tentyritæ, ab insula, in qua habitat, appellata. Mensura eorum parva, sed præsentia animi hoc tantum usu mira. Terri-

bilis hæc contra fugaces bellua est, fugax contra insequentes: sed adversum ire, sollihi audent. Quin etiam flumini innatant: dorsoque equitantium modo impositi, hiantibus resupino capite ad morsum, additâ in os clava, dextra ac læva tenentes extrema ejus utrinque, ut frænis in terram agunt captivos: ac voce etiam sola terribitos, cogunt evomerè recentia corpora ad sepulturam. Itaque uniei insulæ Crocodili non adnatant: olfactuque ejus generis hominum, ut Psyllorum serpentes, fugantur. Romam ætate M. Scauri delatos, Tentyritæ custodes sequebantur, illosque à piscinis ad spectacula, à spectaculis ad piscinas ducebant. Ex plantis fabam spinosam, annotante Crescentiensi, vitant. Potamogeton tanquam quoddam contra Crocodilos amuletum, urinatores secum deferre solent. E-

contra cum porco, & trochilo amicitiam colit. Porci circa Nili ripas impumè oberrant. De Trochilo ita Plinius. Dies in terra agit, noctes in aqua, temporis utrinque ratione. Hinc saturum cibo piscium, & semper esculento ore, in littore somno datum, parva avis, quæ trochilos ibi vocatur, rex avium in Italia, invitat ad hiantium pabuli sui gratia, os primum ejus asfultim repurgans, mox dentes, & intus fauces quoque ad hanc scabendi dulcedinem quam maximè hiantes. Leo Africa-

Leo I. 9. Africa. nus, vermes ex continuo piscium esu, inter dentes exortos devorare scribit. Crocodilum ut absumptos percepit, aviculas devorare nisi; sed acuta quam supra caput gerunt spina punctum, os diducere, & ita dimitti. Quantum ad Naturam & Ingenium, è Nilo in terram egressi, per eadem vestigia regrediuntur, si Petro Martyri credimus; ob crurum breviteratatem difficillimè in latus se vertunt: dum gradiuntur, gratum relinquunt odorem, adeo ut foeminam Arabicos odores æquare, Nili accolæ prodant. Quatuor mensibus secundum Aristotelem, quadraginta diebus secundum Suidam, sexaginta secundum Ælianum, latitant, & sine victu morantur. Artemidorum Grammaticum, adeo viso perterritum, ut, læsa mente, literarum memoriam perdidit, & sinistrum crus sibi à fera ablatum crediderit, Cœlius Aurelianus auctor est. Humanum depasti cadaver, ossa capitis lachrymis frangere, ut medulla inexistente vescantur, dicuntur. Nocentiores sunt Nilum ascendentibus, quod illa fluminis, pars à piscatoribus exhauriatur. Ferociiores inde facti, quod piscibus destituantur, homines & jumenta adoriuntur. Nec minus eodem ad proprium alveum post inundationem redeunte sæviunt, propter piscium inopiam, quam aqua in Nili

Sympathia. Plin. H. N. 1.8. c. 25.

Natura & Ingenium. Martyr Legat. Babylon. 1. 3.

Arif. H. A. 1.8. c. 15. Ælian. H. A. 1. 10. c. 21.


Cœlius de furore. Petrus Martyr. 1. c.

fau-


Seneca Natural. quæst. 1. 4. Philo in Iambis.

Plin. H. N. 1.8. c. 25.


Tatus




Testudo *Schildt Krötte*





Testudo *Aquatica*



Testudo *Marina*





faucibus minus profunda facit. Tum, coeno indutus, aequatum venientibus insidiatur: & navigium flumen ascendens secuti, cum nauta conto ad expungendam navem inhæret, celeri caudæ ictu, nautam cum conto dejiciunt. Neminem iisdem diebus Apis natales celebrabantur, læsisse, fabula fortè est. Rediisse, postquam Achmed Ben Tolon signum Crocodili plumbeum, in templorum fundamentis inventum dissolvi jussisset, apud Scaligerum legimus. De divinatione, supra dum de ovis ageremus, diximus. Ejusdem apud Ælianum exemplum legitur. Ptolomæum regem nescio quem, cum ex Crocodilis antiquissimum, *inquit*, & præstantissimum appellaret, exauditum non fuisse, quum cibaria objecisset, rejecisse. Inde sacerdotes morti vicinum collegisse. *Ingenium* indicant, quòd prolis indolem ex prædæ raptu colligunt: cicurati vocem humanam intelligunt; & manu tractati, diducto rictu, mantili, dentes sibi abstergeri patiuntur. Non est ergò mirum in paludibus Ombitarum arte paratis nutritos, domesticos esse, ut Ælianus prodidit, iisdemque hostiarum capita objici. In oppido Anteo aniculam quandam in lecto cum crocodili deprehensam, Gyllius prodidit. Humanam ætatem æquant, si Aristoteli, Plinio, & Diodoro Siculo credimus. Ælianus sexaginta vitæ annos assignat. *Utuntur* iis quidam in *Cibis*. Apollonopolitæ vi legis carnem eam comedere tenebantur, seu quòd Psammeniti Regis filia à Crocodilo devorata fuerit, seu odio Typhonis, quem in Crocodilum vèrsum fabulantur, ut apud Herodotum extat. In partibus Indicis assari, Ferdinandus Lopez vidit: in Florida, alii: imò exsiccantur ibidem, & hyeme mensis apponuntur. *Ova* comesta, in auctoribus novi orbis inveniunt. In Ægypto iisdem quosdam vesci, apud Leonem Afticanum habetur. De *Uso in Medicina* hoc habet. Decoctum demorsis ab araneis opitulari: *Caninis dentibus* thure repletis, typos febrium arceri: quoscunque à vivo animali extractos, ipsoque dimisso, parti dextræ viri, & sinistræ mulieris adaptatos, Venerem stimulare; nisi fabulatur Kiranides. *Sanguis* visui claritatem conciliat, & partibus à serpentibus faucibus, auxiliatur. *Pinguedine*, febricitantes contra horrorem inunguntur. Eadem antiquis vulneribus & carcinomati prodest. *Corium* crematum & cum olei amurcæ mistum, partem mutilandam adeò stupidam reddit, ut ferum secans non sentiat. Apud quosdam Indos olim ad supplicia alebantur, objiciebanturque eis vineti manibus & pedibus fontes. In fossis urbis Pegu habentur, pro-dente Balbo, ne quis per aquam ad urbem accedere audeat. Incolæ, quia eos venerantur, aquam fossarum bibunt: occisi ab

ipsis animam, rectè ad superos evolare credentes. Firmus Ægypti Tyrannus pinguedine Crocodilorum inunctus, impunis inter eos natabat. Circa *Differentiam* pauca occurrunt, Plinius in *Magnos & Parvos*, qui Scinci dividit. Albertus Tencheæ meminit, cui omnia quæ prodidimus, applicari possunt. Ælianus duplices in fluvio Gange ponit, *Noxios* cum cornu in rostro, & *Innoxios*. In provinciâ Xanagarra à vivis crocodilis vagantibus odor moschi spirat.

TITULUS II.

De Digitatis Oviparis crustâ tectis.

CAPUT I.

De Testudine in genere.

Testudo à tegmine testaceo nomen obtinuit, ut Isidoro placet. Græcis *χελύς*, *χελῶς*, *χελῶν*, à *χέω*, capax sum, dicitur: ut & *κλεμμύς*, *σφεγγίς*, *φέροις*, &c. quanquam hoc inter epitheta censeretur debet. Animal est ingratum visu. Tegitur testa figuræ ovalis, & instar scuti concavâ, sub quâ caput, pedes, & caudam recondit. Pacuvius idè capite brevi, cer-vice anguinâ, & aspectu truci scripsit. Testa illa Palladio dicitur *Corium*, Marcello *tegumen*, Plinio *operimentum*, *putamen*, & *superficies*, aliis *operculum testaceum*, Græcis *χελώνιον*, & generali nomina *ὄστρακον*. Loco *dentium* unicum os continuum habet; inde *μονόδους* dici posset: intus prægrandem *pulmonem* eumque exanguem, *jecur* vitiatum, *testes* lumbis adhærentes, *lienem* perexiguum. *Renes* & *vesicam* omnibus tribuit Aristoteles, lutariam si excipias. Unico tamen *excrementorum* exitu referta sunt. Ideo illa semper liquida, & aquea. *Pedes* similes sunt lacertis, quinque digitis unguibus munitis instructi. In cauda Cardanus quandoque unguem gallorum calcaribus similem conspicatus est, qui fortè à callo. Nam in his animalibus veluti & in lacertis, cauda amputata durior renascitur. De *Loco* hoc duntaxat ponimus, reperiri in terra, mari, & lacubus, vel locis cænosis. In mari rubro reperiuntur copiosæ, ut Arrianus prodidit, quæ ad emporium venales deferuntur. In insula quoque Dioscoridis, quæ nunc Socotora, inveniuntur: ut & in insula Mauriti, quam Cernen veterum quidam credunt. *Coeunt* more viviparorum, & mas supervenit foeminam. Hæ quia nullam voluptatem in congressu sentiunt, difficulter admittunt, nec citius, quàm vehementer exagitata fuerint. Pariunt *ova* ovis gallinarum similia, sed minora & oblongiora, putamine, albumine & vitello prædita, ut in

Differentia.

Ambrosin.
l. 2. c. 1.
Nomen.

Descriptio.

Plin. H. N.
l. 9. c. 10.
Idem H. N.
l. 11. c. 37.Aristot. de
partib. ani-
mal. l. 3. c. 8.Cardan. de
variet. rer.
cap. 29.

Locus.

Arrian. in
Periplo
maris ru-
bri.Herbert. in
Itin. p. 349.
Generatio.Aristot. H.
A. l. 5. c. 3.
Ælian. H.
A. l. 13. c. 4. o
Plin. H. N.
l. 9. c. 51.Plin. H. N.
l. 11. c. 4.Scalig. Ex-
erc. 196.Ælian. H.
A. l. 8. c. 4.Ælian. H.
A. l. 9. c. 3.Diodor. Bi-
blioth. l. 9.
c. 1.Vfus in Ci-
bis.Leo Afric.
l. 9.
Vfus in Me-
dicina.Baldus in
Itiner. c. 35.

icone videre est. De *Natura & moribus* habet, testam, quam tam duram habent, ut nec à plaustris currentis rotis conteri possit, non mutare, quod crustacea faciunt: mensibus hybernis sine cibo in cavernis latere: exeuntes, lento gradu incedere, seu quòd onere premantur; seu quòd natura tardæ sint: cum perdicibus perpetuò rixari: Aquilas, quæ in sublimè sublatis ad petras allidunt, unde & Æschylo Tragico Poëtæ, cui caput calvum, & petrae instar, mors, abhorrere: diu secundum Hippocratem vivere: per exiguum sibilum colubrorum paulò altio rem voce edere: denique cum serpentibus & viperis præliaturas, satureja, cunicula, vel origano se munire. Nihil quidem de earum *in cibis* usu apud Galenum vel Apicium. Brujerinus tamen carnes prius elixat, deinde in frustra sectas, in vase frixorio assat. Quo loco habendæ sint, disquiritur inter quosdam. Alii inter piscium carnes reponunt; ut Castor Durantes. Unde tempore jejuni piscium loco conceduntur: alii non item. Habent scilicet testudines ossa & spirant: ne de ovis quicquam dicam. Ut ut sit, apud quosdam Barbaros in America in deliciis esse certum est: nec dubium delicatis ventriculis obesse, & difficulter concoqui, validè tamen, si concoquantur, nutrire. In *Medicina* haud contemnendæ sunt. Hydropicis & phthisicis caro prodest. Coctæ fastidium ex melle natum, prodente Plinio ex Pelope, statim tollunt. Tegminis cremati cinere, in fistulis, capillorum defluxu, Porta; ulceribus pedum cum oleo & vino Marcellus: in suffumigio contra hæmorrhoidas Galenus utitur. *Ipsæ* crematæ cum albumine ovi fissuras mammarum apud Rhafen tollunt: & in herniis feliciter, si Crollio, credimus, ob quandam signaturam adhibentur. Sanguis ex capite resupinatus amputato collectus, & insolatus donec exsicce tur, sacrum ignem extinguit, verrucas abolet, porriginem pellit, & in capitis ulceribus adhibetur. Ova ad tussim infantium commendantur. Adhibentur & ad alia. Mizaldo si credendum, ex ovis formicarum, hyoscyamo, cicuta & testudinis sanguine, egregium paratur psilothrum: tegmen ollæ operculi loco superpositum ebullitionem impedit. Myrepso vinum cum sanguinis modico propinato, abstemios homines reddit. Albertus carne equos obefat: porcos pingues ea evadere, experientia comprobavit. Vegetius ex testudine viva supra famenta combusta, alumine crudo, medulla cervina & vino, medicamentum componit, pro pilis jumentorum citius augendis. Scobs tegminis foeminae in aliquo liquore pota, Venerem inhibere creditur. Majora, ad mensas, vasa & lectos olim usurpabant.

Plin. H. N. *Placuit*, inquit Plinius, *materiam & in mari queri. Testudo in hoc secta. Nuperque por-*

tentosis ingenii principatu Neronis inventum, ut pigmentis perderet se, plurisque veniret, imitata lignum. Testudinum verò putamina secare in laminas, lectosque & repositoria his vestire, Carbilius Pollio instituit, prodigi & sagacis ad luxuriæ instrumenta ingenii. Ideò Seneca. *Vidco elaboratam scrupulosà distinctione testudinem, & sedissimorum pigerrimorumque animalium testas, ingentibus præciis emptas, in quibus illa ipsa quæ placet varietas, subtilis medicamentis, in similitudinem veri coloratur.* Hodie Amazones corticibus se tumentur: quibus & alicubi pro cunabulis infantum utuntur. Quantum ad *Differentias*. Plinio testudinum genera sunt, *terrestres, marina, luctaria*, & quæ in dulci aqua vivunt: quarum has *emycas* vocant. De his omnibus insequentibus agemus. Vifa & in insula à Zambolo reperta, quædam animalia parva, corpore rotundo testudinum instar, duabus lineis invicem per medium transversis, in quarum singula extremitate, auris & oculus conspicitur, ita ut quatuor oculis intueri, & totidem auribus audire videantur. Unico constant ventre, sed pedibus pluribus, quibus innixa in utramque partem gradiuntur. Sanguini singulare aliquid inest. Nam omne corpus faucium, eo dum spirat illitum, cohæret. Gesnerus *Testudinem polypodem* vocat. Videtur ex Diodoro Siculo historia desumpta esse, ni fallor, nam author nunc ad manus non est. In insula Mauritiæ, quæ Zonæ torridæ subjacet, tam validæ inveniuntur, ut homines ferre & transferre possint. Lusitani de quindecim affirmant.

CAPUT II.

De Testudinibus in specie.

ARTICULUS I.

De Testudine terrestri.

Quatuor testudinum genera ex Plinio supra posuimus. Sed hæc ad duo, *Terrestres* nempe & *Aquaticas*, optimè reduci possunt. *Terrestres* alii *montana, sylvestris, campestris, agrestis, & memorialis* dicitur. Græcis *χερσάιναι*, Nicander *σπεῖλος*, Oppianus *σπερσιφοῖλον* vocat. Luteis & nigris maculis instar Salamandræ in tergore distinguitur: cortice superiore marinam valde æmuletur. Foemina à mare in eo differt, quod inferiorem testam planam habet, quæ mari concava; & semper ponderosior observatur. Interiora sic M. Aurelius Severinus describit. Principio, inquit, ablato cortice inferiore statim apparere duo *musculi* anteriores moventes, ut apparent brachia, utrinque unum; quanquam uterque distinctus videtur in duos, quorum major est exterior, minor verò interior. Oblique de-

Ælian. H. A. l. 4. c. 22.

Aristot. H. A. l. 4. c. 6.

Aristot. H. A. l. 9. c. 6.
Plin. H. N. l. 8. c. 16.

Ufus in Cibus.
Brujer. de re cibaria l. 22. c. 7.

Ufus in Medicina.

Galen. Euporist. l. 3.

Cent. 7.

Seneca de Benef. l. 7. c. 9.

Differentie Plin. H. N. l. 32. c. 4.

Ambros. ex Bohemo. l. 2. Ovip. c. 1.

Hebert. in Itin. Persiæ p. 349.

Ambrosin. Ovip. Digit. l. 2. c. 2. Nomen.

Descriptio.

Severin. Zootom. Democrit. par. 4. p. 321.

cedunt quasi ab axillis brachiorum, nascentes à membrana adhærescente cortici, & definentes in tendinem acutum. Figura ipsorum oblonga, rotunda, quasi plantæ manus; infra hos musculos tum parte dextra, tum sinistra sex alii videntur oblongi, flexores fortasse brachiorum; duo totidem apparent musculi deducti ad femora, nascentes ab externa dicta membrana corticis, qui tertio sunt minores brachialibus, neque in tendinem definunt, ut illi, sed carnosiores sunt, quod inferantur femoribus. *Spina* compacta est & validè innexa cortici, per longitudinis medium. Infra *caput* medio lato digito descendunt duo musculi à lateribus positi, ipsum intra trahentes, cum duobus aliis paulo inferioribus, quatuor isti oblongi maximè omnes. *Iecur* parte dextra & sinistra æquali magnitudine bipartitum. Gibbum externè, cavum internè, sed dextra internè inæqualis veluti prærupta rupis, complectens miro artificio ventriculi orificium inferius & portionem duodeni; sinistra complectens majorem ventriculi cavitatem, excavato quodam supercilio similis. *Cystis felle* dextra in fibra hepatis profunde condita; *ventriculus* ad humanum vel suillum maximè accedens: sed postquam in intestina perducitur, tres amplas habet cavitates, in quibus totidem perfici coctiones & transmutationes assumptorum videntur. In prima, herbacea materia, in secunda item, sed elaboratior, & hinc externè adhærebat *lien* rotundior & ater; in tertia materia quædam subliquida & albilissima, similis mansæ castaneæ, sed dilutæ. Aperta est conjectura, servire hanc in locum vesicæ, quæ ejaculatur quandoque humorem album, veluti gallinæ solent. Ampla est hæc & castaneæ figuram æmulatur: tenuissima est & amplo canali, quantum est intestinorum extremum similis, cui correspondet parte inferiore. Hæc validè adhærescit peritonæo atque immediatè illi incumbit. *Intestinum rectum* in fine habet processus illos laterales, qui sunt gallinaceis omnibus, sed divisos tamen & in latera longè productos, usque ad renum viciniam. Cum his ponè sunt *ovorum* utraque parte productiones, *Mesenterium* amplis satis venis intextum. *Cor* rotundæ figuræ, sed non exactæ, ut lenticulam referat; colore subalbidum, intus uno sinu cavum; situm supra jecur statim. *Aspera arteria* (quæ dignissima omnino est observatio) paulo post initium bifida, quorum rami contorti. *Pulmones* parte superiore adhærescentes spinæ, substantiæ admodum raræ, non carnosæ, sed veriùs membranosæ, intextæ arteriæ asperæ, ramis velut rete quoddam implexum, colore subatro. Observanda dispositio ossis hyoidis & cartilaginis scutiformis. *Calvaria* testudinis marinæ septum est, quod supernæ testudini extensum cerebri par-

tes utraq; determinat præter cujuslibet calvæ conformationem.

Vagantur plurimæ in Africæ desertis: ut & in Lybiæ parte quadam, Mauritania fortè, ut Strabo scribit: proveniunt & in sylvis Arcadum, teste Pausania, ex quibus lyræ olim fabricabantur. Sed maximæ in insula Dioscoridis in mari rubro habentur. De insula Mauritii superius diximus.

In desertis quia inveniuntur, roscido duntaxat humore pasci quidam judicavere. Alii, olera germinare inchoantia, melopepones inprimis & sesamum, præcidere dicunt. Nicander *νολωλὼπος*, quod Cytiso, vel cytiniis delectentur, vocavit. Edunt & lumbricos, & cochleas. Domi fursure & farina nutriuntur.

Quantum ad *Generationem*, fabulæ sunt ex Gerano muliere in gruem mutata & Nicodamante natam: imò potius Boei apud Athenæum locus est. *Coëunt* ut superius diximus. *Ova* durioris testæ intusque bicolora enituntur, quæ terra contacta, repetitis vicibus incubant, sætumque sequenti anno ad pascum educunt. Plantibus ventis concipere, quod apud Nicandrum habetur, falsum: Certius, cum scæmina ad Venerem tarda sit, herba quadam à mare concitare, quod apud Elianum invenitur.

A Græcis non comedi, Bellonius auctor est. Hungari quidam cum Clusium carnem unius degustasse vidissent, moriturum putabant. In India frequentissimè mensis inferuntur. Augusto & Septembri, quod tempore segetum pinguiore sint, quidam laudant. Scappius à mense Februario ad Majum scæminas optimas, quod tùm ovorum plenæ sint, scribit: à Junio ad autumnum, mares. Sunt qui ex alliato eas mirum in modum commendant. Hodie, *verba sunt Ambrosini*, Bononiæ, testudo terrestris & præsertim scæmina, decollatur, & toto effuso sanguine elixatur, donec tegmina à carne eximi possint. Postmodum intestina non abjiciuntur, sed ab excrementis absterfa abluuntur, deinde una cum carne testudinis, croco, pulveribus aromaticis, pineis, passulis, in vino malvatico diligenter coquuntur, & mensis inferuntur. Plura apud Scappium & Ambrosinum vide.

De Ufu in Medicina ita Plinius. Terrestrium *caro* suffitionibus propriæ, Magicisque artibus refutandis, & contra venena salutares produntur. In Africa amputato capite pedibusque, pro antidoto dari dicuntur: & ex jure in cibo sumptæ, strumas discutere, ac lienes tollere: item, comitiales morbos. *Sanguis* earum claritatem visus facit, suffusionesque oculorum tollit: & contra serpentina omnium, & araneorum, ac similium, & ranarum venena auxiliatur, servato sanguine in farina pillulis factis,

T

& cum

Locus.
Plin. H. N.
l. 32. c. 4

Pausan. in
Arcadicis.

Vetus.
Brujer. Rei
cib. l. 22. c. 7

Generatio.

Athen. Di-
pno. l. 5.

Elian. H.
A. l. 5. c. 32.
*Vfus in Ci-
bis.*

Scapp. l. 3.
Rei cib. c.
166.

*Vfus in Me-
dicina.*
Plin. H. N.
l. 32. c. 4.

& cum opus sit in vino datis. *Felle* testudinum cum Attica melle glaucomata inungi prodest, & scorpionum plagæ instillari. *Tegumenti* cinis, vino & oleo subactus, pedum rimas ulceraque sanat. *Squamæ* à summa parte derasæ, & in potu datæ, Venerem cohibent. Eo magis hoc mirum, quoniam totius tegumenti farina, accendere traditur in libidinem. *Urinam* earum aliter quam in vesica dissectarum inveniri posse non arbitror. Et interea hoc quoque esse quæ portentosa Magi demonstrant, adversus aspidum ictus singulare, efficacior tamen, ut ajunt, cimicibus admistis. *Ova* durata illinuntur strumis, & hulceribus frigore aut adustione factis. Sorbentur in stomachi doloribus.

Hactenus Plinius. Apud alios invenies, Syrupum ex testudinibus apud Bononienfes haberi, qui phthificis, emaciat, feliciter propinatur: apud Amatam Lusitanum ex eadem decoctum in destillationibus tussis, &c. describi: apud Veckerum, electuarium quoddam ad seminis acris repressionem ex testudine componi. *Jecur* Galenus tritum, in pessa adversus uteri strangulatum propinat.

In India gignuntur maximarum glebarum magnitudine. Testas exuunt, & quemadmodum vermes ex verminosis plantis, lignibus extrahuntur. Pingues & suaves carnes habent. *Iaboti* Brasiliensibus, Testudinis testris species est, Lusitanis *Cagado do terra*. Testa nigra est tecta, cui multæ figuræ hexagonæ sunt insculptæ. *Rostrum* habet ut reliquæ. *Caput* & crura sunt fusca, verum maculis ex umbra variegata. *Jecur* hujus saporis est optimi, & antecellit omnium animalium jecora suo sapore.

ARTICULUS II.

De Testudine Aquatica.

PUNCTUM I.

De Testudine aqua dulcis, & Lutaria.

TESTUDINES aquaticas, in illas quæ in aqua dulci degunt, ad quas Lutariæ benè referri possunt, & illas quæ in mari, dividimus. *Aquaticam* Plinius murem aquaticum & *Emyda* vocavit, quod vocabulum alii ab *a*, alii ab *ω* inchoant, & descendere à Græco *μύς* videtur. Niphus Mydam, quandam testudinem colore luteo dixit. Græci *τετραμύς* vocant.

Locus. Gesner. de quadruped.
Degunt in aquis dulcibus, lacubus, & fluviis. Gesnerus in agro Tigurino, in exiguo lacu, propè Adelsingum inveniri scribit. In balneo aquæ calidæ, Constantinæ vicino, quæ fluens inter rupes longè lateque diffunditur, ingentem copiam haberi, Leo Africanus prodidit. Dæmones à mulieribus illius civitatis appellantur, iisdemque causas mor-

borum adscribunt. Vagantur & in Gange ac Nilo fluviis ut Ælianus scripsit. Respirare etiam tum, apud Aristotelem habes. Tempore sæturæ aquas deferere, & in locis siccis, scrobe effossâ ova ponere, postmodum diem trigesimo detegere, & factum ad aquam continuo ducere, ex eodem habeo.

De hujus usu in Medicina sequentia nobis Plinius reliquit. Ex quarto genere testudinum, quæ sunt in annibus, divulsarum *pinguium* cum aizoo herba tuso admisto unguento & semine lilii, ante accessiones si perungantur ægri, præter caput, mox convoluti calidam aquam bibant, quartanis liberari dicuntur. Hanc testudinem quindécimâ Lunâ capi oportere, ut plus pinguium reperiat. Verum ægrum sextadecima Luna perungi tradunt. Ex eodem genere testudinum *sanguis* instillatus crebros capitis dolores sedat: item strumas. Sunt qui testudinum sanguinem cultro æreo supinarum caputibus præcis, excipi novo fictili jubeant: ignem sacrum cujusunque generis sanguine illini: item capitis hulcera manantia, & verrucas. Iidem promittunt omnium fimo panos discuti. Et licet incredibile dictu sit, aliqui tradunt tardius ire navigia testudinis pedem dextrum vehementia.

Circa *Differentias Aquaticarum* nihil ferè occurrit, hoc unicum si exceperis, Indicæ fluviatilis, non minorem esse testam, quàm justæ magnitudinis scapham. Decem enim leguminum medimnos capit.

De *Lutaria* etiam quædam occurrunt. Videntur eam Græci *χελώνη πηλαγίδα* vocasse, & per aphæresin amyda. Latitudo ei in dorso pectori similis, nec convexo incurva calice, ingrata visu. Stabulatur quidem in locis cænosis, sed verno tempore, ad fluentes quoque aquas proficiscitur. Vesicæ & renibus carere superius diximus, fortè propter tegumentum molliciem, humor enim facile diffuere potest. Circa Ferrariam, in Gallia, Polonia, Hungaria, & alibi multas conspicies. De *Usu* inter cætera hæc habet apud Ambrosium *Mizaldus*. Sunt, inquit, qui instantem grandinem observantes, manu dextra testudinem palustrem supinam circa hortum vel agrum ferant, & reversi unde exierunt, illam humi deponant, eadem figura, ut animal nubem grandine prægnantem intueatur, hæcque ratione eam amoliri conantur. *Plinius* de ea ita. Ex hac quoque tamen aliqua contingunt, auxilia. Tres namque in succensa fæmæta conjectæ, dividitibus se tegumentis rapiuntur: tum evulsæ carnes earum, coquuntur in aquæ congio, sale modicè addito: Ita decoctarum ad tertias partes fucus, paralyfin & articulares morbos sentientibus bibitur. Detrahit item fel pituitas, sanguinemque vitiatum. Sistitur ab eo remedio alyus aquæ frigidæ potu.

PUNCTUM II.

De Testudine Marina.

Ambrosin.
de Digit.
Ovip. l. 2.
c. 4.
Nomen.

Testudo marina, Plinio est *Mus marinus*; Græcis *χέλυδρ* quasi *χέλυσ ἐνυδρ*, *μαλασόνου*, & *χέλων* dicitur, Germaniæ & Flandriæ piscatores, & *Militem* vocant, quod scutum & galeam gestet; & *Barchoram*, prodente Alberto, nomine fortè ab Ostracodermis corrupto. Idem adjicit *Zytyron* maris quoddam animal à Priscis Militem dictum, à capite tute rugosa & dura galeato, & quod de collo quasi scutum suspensum gestaret.

Descriptio.

Terrestribus eas assimilat Pausanias, pedes & magnitudinem si exceperis. Loco *dentium* habet os unum tam durum, ut crassos baculos unico ictu præcidat. Hinc apparet, Oppianum qui ei crebros tribuit, de rostri marginibus potius intelligendum esse. *Oculi* fulgorem procul emittunt, *pupillis* candidissimis & splendidissimis, si Æliano fides, instructæ. *Pedes*, alæ potius videntur, quibus tanquam remis ad natandum utitur. Reliqua in observationibus suis accuratè persecutus est Severinus, dum inquit: Inferiori primum cortice supinæ huic cultro transversim separato atque ablato, visa membrana *peritonea*, totam anteriore parte vestiens, à jugulo ad pubem continua, cortici inhærens, fibris quibusdam carneis, præsertim parte thoracis, *omentum* nullum, nullum *cæcum*, sed *intestina* supernè deorsum gracilescencia, contrà quàm in cæteris quadrupedis. Quin à summo cæphago, qui duplicati pollicis magnitudinem æmulatur, donec ad recti initia pertingit, perpetim minuitur cum tota membri crassitudine, tum tunicarum, quæ tunicæ duplices, externa nervosior, carnosior interna. Sed hæc quoque villosa & lentore quodam pingui madida, haud valdè dissimilis à recto vaccæ intestino benè faginata. Parte priore & primo ductu Oesophagi aculei crebri transversim positi, majores, quam in bovina lingua; quod certè mirabile & à Rondeletio non observatum: Fabricati fortasse hi ad comminuenda alimenta, quæ duriora ab hoc genere ingeri perhibent. *Vesica* cervix recto intestino intrò respondens, ut utriusque recrementum uno ductu exitum habeat. *Lien* rotundus instar ovi, intestino superiori alligatus. *Renes* plani & oblongi, quasi ex parvis pluribus compositi. *Cor* uvidum cum vasis valdè implexis in primo exortu. *Auricula* magnæ & pendulæ tenui membrana præditæ ac nigrescentes. *Pulmones* ampli, multo inferius quam cor descendentes. *Cervix* inflexa cum crebris musculis, sed duo longissimi intro in corticem caput trahunt.

Oppian.
Halient.
l. 1.

Ælian. H.
A. l. 4. c. 28.

Severin.
Zootom.
Democrit.
par. 4. p.
321.

Habitant in falsis aquis, & Pausanias circa Moluridem versari scribit. *Vicant* pisciculis, chochleis, & ad terram delatæ, graminâ depascuntur. Tempore *partus* terram petunt, & ova circiter centum, secundum Aristotelem, in scrobe deponunt, avium cohortalium similia: eaque nonnisi noctu incubant. Postquàm inhumavere, loco pedem imprimunt, ut reduces agnoscant. Hoc *Plinius* ita protulit. In terram egressæ, in herbis pariunt ova, avium ovium similia, & ad centena numero. Eaque defossa extra aquas, & cooperta terrâ, ac pavida pectore & complanata, incubant noctibus. Educare fœtus annuo spacio addit: sed id de terrestri intelligendum. Marina quadraginta diebus excoquantur & rumpuntur. In America parte quâdam ter centena & ultra humo obruta, quæ à sole excocta, absque parentum adjumento pullulant, ut quasi exercitus testudinum fundi videatur, quod apud Petrum Martyrem legimus. Ad Naruram pertinet, quod extra aquam diu vivere non possint: quamvis vitulorum marinorum instar, in terra somnum quandoque capiant: quod, postquam pastum noctu egressæ, a videque saturaræ, lassantur, dum in superficie maris resupinatæ dormiunt, sonum quendam edunt: quod denique, quotiescunque solis radiis mari innatantes siccantur, ita ut in gurgitem deferri nequeant, intereunt. Eadem dum aërem captant, caput exerunt, vitulorum marinorum imitatione: & tantæ sunt audaciæ, ut tres homines adoriantur. Capite amputato non moriuntur confestim, sed oculos movent, & manus si admoveris mordent.

Armeniis olim à Patriarcha Alexandrino prohibita in cibis, sub excommunicationis poenâ. Scappius scriptor Italicus in convivorum apparatu eas commendat, si intra tempus quod à vere ad autumnum decurrit, capiantur. Conficit ex iisdem & artocreata, quæ apud Ambrosinum vide. In Brasilia capta aliquando tam magna, ut sola octuaginta hominibus sufficeret. Carnes lardo distinctas & tostas comedebant: sapor, vitulinæ erat.

De *usu in Medicina* ita *Plinius*. Marina rum carnes admixtæ ranarum carnibus, contra Salamandras præclare auxiliantur. Neque est testudine aliud Salamandræ adversus. *Sanguine* alopeciarum inanitas & porrigio, omniaque capitis hucera curantur. Inarescere autem eum oportet, lentaque ablui. Instillatur & dolori aurium cum lacte mulierum. Adversus comitiales morbos manditur cum polline frumenti. Misceatur autem sanguis heminis tribus aceti, hemina vini addita his, & cum hordeacea farina: aceto quoque admisto, ut sit quod devoretur fabæ magnitudine. Hæc singula & matutina & vespertina dantur,

Locus.

Pausan. in
Atticis.
Generatio.

Aristot. H.
A. l. 5. c. 33.

Plin. H. N.
l. 9. c. 10.

Plutarch. l.
Utra prudent.

Petrus
Martyr l. 9.
dec. 3.

Plin. H. N.
l. 9. c. 10.
Aristot. H.
A. l. 8. c. 25.

Oppian.
Halient.
l. 1.

Ælian. H.
A. l. 4. c. 28.

usus in Ci-
bis.
Bellon. ob-
serv. l. 2.
c. 68.
Scappius
de re. cib. l. 5. c. 180.

usus in Me-
dicina.
Plin. H. N.
l. 32. c. 4.

dein post aliquot dies vespera. Comitiales instillatur ore diducto, his qui modicè corripiantur. Spasmo cum castoreo clystere infunditur. Quod si dentes per annos colluantur testudinum sanguine immunes dolore fiunt. Et anhelitus discutiit, quasque orthopnoeas vocant: ad has in polenta datur. *Fel Testudinum* claritatem oculorum facit: cicatrices extenuat: tonsillas & anginas, & omnia oris vitia. Privatim nomas ibi: item ardentium testium. Naribus illitum, comitiales erigit, attollitque. Idem cum vernatione anguium aceto admisso, unice purulentis auribus prodest. Quidam bubulum fel admiscunt, decoctarumque carniū testudinis succum, addita æquè vernatione anguium. Sed diu in vino testudinum excoquant. Oculorum quoque vitia omnia fel inunctum cum melle emendat: suffusiones etiam marinæ fel cum fluviatilis sanguine & lacte mulierum. Capillus mulierum inficitur felle. Salamandras & succum bibisse satis est. Apud alios invenies, *cerebrum* cum croco & sale Ægyptio benè ad aperiendum uterum supponi. *Pupillas* auro inclusas caliginem oculorum pellere. *Sanguinem* aridum cum cymino sylvestri demorsis à vipera exhiberi. *Hepar* in lacte muliebri tritum, & cum unguento irino & vino subactum; in purgamentis puerperii educendis commendari. Quidam ova in morbo epileptico exhibent.

Est earum & in aliis usus. Nam olim postes teguminibus exornabantur: Taprobanæ insulæ incolæ, iisdem culmina domorum tangebant: Chelonophagi verò, pro navigiis, valis aquaticis, & tentoriis utebantur. Infantes recenter nati in eis lavabantur: Barbaris ad fluviū Gambraë scutorum loco inferviunt. Turcæ denique ex testis pellucidis gladiatorum manubria fabricant.

Differentiæ à magnitudine & figurâ sumuntur. In Taprobana una centum tria pondo pependit: earum quæ in mari rubro, testa amplam alicujus ædificii januam adæquat. Apud Ælianum in India decem leguminum modios capit. *Figuram* si attendas, aliæ sunt oblongiores, quæ pelagiæ: aliæ rotundiores, quæ littorales. Troglodytæ, *verbasunt Plinii*, cornigeras habent, ut in lyra, annexis cornibus latis, sed mobilibus, quorum, in natando, remigio, se adjuvant. Costium id genus vocatur, eximie magnitudinis, sed rarum. Namque scòpuli præacuti Chelonophagos terrent. Troglodytæ autem ad quos adnatant, tam quam sacras adorant. Hermolaus Barbarus *Cheletas* vocari jubet, id est, Equites quòd cornibus non aliter utantur, ac isti calcaribus. Cardanus cujusdam generis meminit, quod corio veluti præparato tegitur, dempsisque cum capite pedibus cheli assimilatur. Dorsum sex veluti tabellis simul

junctis constat, & cauda, inquit Ambrosinus, similis est illi parti citharæ, cui Collopes intrudi solent, ad tendendum & laxandum nervos. Marcgravius duas describit, quarum una *Iurucua* Brasilianis, altera *Iurura*. *Iurucua* loco pedum, inquit ille, habet quasi alas; Anteriorum quidem quamlibet fessipedem circiter longam, posteriores vero breviores; *caudam* acutam conicam: *oculos* nigros magnos, *os* edentulum & instar rostri volucrum. Habui quarum testæ tres pedes erant longæ, duas latæ & supra. *Costis* ipsius inseruntur testæ, ad quodlibet latus octo: anteriores breviores, mediæ longiores, posteriores iterum breviores. *Ova* illarum comeduntur uti & caro. Ponunt autem ova ad littus maris, foveam in arenâ facientes, & dein arena tumulantes. Sæpius inveni vestigia earum, ex mari egredientium, & terra abeuntium. Reperiuntur autem variæ magnitudinis. Habui quarum longitudo erat quattuor pedum, latitudo trium: tantæ molis ut à quatuor robustis viris vix possent moveri. Variis figuris Geometricis, testæ quasi insculptæ videntur. Quædam testam nigram habent splendentem, flavis lineis & figuris, egregie interstinctam: aliæ aliter conformatam. *Iuruta* Cadago d'agoa Lusitanis, minor est reliquis testudinibus: *Testa* superior decem digitorum habet longitudinem, latitudinem autem novem, convexitate considerata. Inferior testa novem digitos longa, quatuor & semis lata & plana. Ellypticam autem figuram habet superior. Infra testam se abscondere potest, & collum rursus ad trium digitorum longitudinem, foras extendere. *Caput* tres digitos crassum, & paulò oblongius; *nasus* elevatus & acuminatus. *Os* amplum: *oculi* nigricantes, *pupilla* nigra. In pedibus quattuor *ungues* oblongi, nigri: *cauda* brevis acuminata; *cutis* rugosa & quasi squamis constaret. *Testa superior* fusca, inferior flavescens. *Ova* ponit subrotunda, dimidii gallinacei magnitudine, testa alba ut ova gallinarum, boni saporis si frixentur. Comedialiquoties. *Tantum Marcgravius.*

APPENDIX.

De quibusdam Exoticis quadrupedibus iisque Dubiis.

CAPUT I.

De Tlacaxolotl, Cabim, & animali maripeto.

Absoluta ita, per Deigratiam, omnium quotquot nunc nota, quadrupedum, historia: visum est hanc de quibusdam Exoticis, & quidem dubiis, Appendicem annexere.

Hippocr.
l. r. de mor-
bis mulier.

Ælian. H.
A. l. 13. c. 28.
Diodor.
Sicul. l. 4.

Differentiæ.
Scalig. Ex.
196.
Bellon. obs.
2. c. 68.

Ælian. H.
A. l. 13.
c. 37.

Plin. H. N.
l. 9. c. 10.

Cardan. de
Rer. variet.
l. 7. c. 37.

Marcgr. d.
l. 6. c. 413.

tere. Dubiis inquam. Nam ad quod genus referri propriè, adhuc mecum delibero. Inter hæc occurrit primò *Tlacaxolotl*, s. animal abrotundæ faciei, bestiam tauro vastiorem, capite magno, prolixo rostro, latis auriculis, atrocibus dentibus, humana pænè facie, unde sumpsit nomen: crasso collo, manibus pedibusque & his taurinis unguibus, sed majoribus, magnis latisque clunibus, caudâ crassâ & prolixa, ac pelle crassâ, fulvo & hispido pilo. Rarum animal, faxorumque & solitudinum incola. Atzacani, Tepotzonotia, & Haquelagani, non procul à regione, quam à situ profundiore vocant De honduras. Vescitur montano cacaotli, quapachtli, & virenti haoli, vastatis passim arvis satisque: cum horum non adfuerit copia, foliis arborum & fruticum. Caro edulis est. Humanum conspectum non reformidat, neque sagittarum ictibus occumbit, tergus n. est impenetrabile. Quamobrem defossa terra, ac desuper ramis frondibusque contexta, & subaggerata capitur, haud aliter ac apud Indos Orientis elephantes.

Animal *Cabim* Maphæo animal *Sionium*, Antonio à S. Romano *Thabal* dicitur. Nascitur in Java. Hujus animalis unam virtutem scio, sed mirificam. Si ejus oscilli extremitatem aliquis gestet, quantumvis mille transverberatus vulneribus ne guttam sanguinis dabit. Experimentis pluribus probatum est: sed illud celebre & notissimum, quod cum Naodabeguea Malacensis infensus Lusitanis, & adversus illos egregiè dimicans, tandem oppressus, multisque confusus ictibus corrueret, ex patulis vulneribus nihil omnino cruoris manaret. Mox inter spoliandum, ut primum detracta ejus brachio est aurea armilla, (mirum dictu) tanquam vase fracto, ita sese cum anima universus repente sanguis effudit. Cujus rei stupore defixi Lusitani, cum de aliis captivis causam quæssissent, cognovere inclusum esse in armillâ os ejus animalis, cujus in sistendo sanguine tam efficax esset vis.

Quantum ad animal *Maripetum*, scribit Aloysius Almeida cum periculo omnis fidei, & multi confirmant, apud Japonès in regno Goto extare sylvam, in quâ tantum gignitur animal canis magnitudine, cruribus brevioribus, ad esum humanum percommodum, aureo colore, præmolli etiam villo. Cum fenuerit hoc animal, dimissa terra, sponte mare ingredi, ibique paulatim transformari in piscem, ac per singulares corporis partes, certo quodam temporis intervallo, verè mutata quadrupedis forma, ac natura transire in piscem. Idque adeo verum esse obtestatur Auctor, ut affirmet aliquando contigisse, piscem hujusmodi captum, inventum nondum omnibus corporis quadrupedis partibus prorsus transformatis, nondum videlicet opportuno elapso tempore, quo

omnia piscis membra effici potuerunt: pars enim adhuc habebat formam quadrupedis, altera jam squamis & pennis formata videbatur. Adicit, fabulosum hoc non esse, sed compertissimum jam fuisse, veritatisque huic adstipulare indigenarum omnium consensum.

CAPUT II.

De Dante & Cappa.

SUI generis animal *danta* est (aliqui Indi *capam* vocant, alii *tapiroussu*, alii *doueanare*, ut Lærius scribit) sed mulis similis. Mulares habet aures, vitulina labra: rostrum superius propendit per palmum superius: attollit, cum irascitur: pænè reliqua membra diversæ bestię similia, sed plerumque vitulo conformiora. Cornu caret. Ungula juvat dolorem cordis, pellis lorice usum supplet, impenetrabilis est ictibus. Duos ventriculos habet, unus alimenta excipit, alter ignoto adhuc sacramento invenitur putrefactis lignis & virgulis plenus. Una auctoritas parsimonie naturæ excuset hinc superfluitatem. Nescitur usus & finis hujus ventriculi. Venator oportet vulneret illam ante ingressum aquæ: ibi enim morsu se defendit, & occidit canes. Didicisse phlebotomiam fertur ex hac bestia, homines doctos, namque cum crassescit, interna crura vulnerat arundine resecta, eadem industria atque Hippopotamus.

Lærius de hac bellua sic narrat: Hanc *tapiroussu* appellant, pilo subrubescenti, atque promisso, vaccam magnitudine ac forma valdè referentem. Atamen cum cornibus careat, sitque contractiore collo, auriculis longioribus & pendulis, siccioribusque tibiis ac gracilioribus, ungula continua, & asini ungulæ persimili, meritò quis eam vaccæ asinique naturæ participem esse diceret. Differt nihilominus ab utroque plurimum quod & brevissimam gerat caudam (Obiterque hic monendus est lector, permulta in America gigni animantia, quæ omnino sine cauda sint) & dentes habeat multo acutiores; nec hominibus propterea quidquam periculi ab ea potest creari, cum in fuga potius, quam in viribus salutem ponere consueverit. Eam barbari sagittis confixam, ut & alias plerasque interficiunt, aut fossa excavata, muscipulis seu aliusmodi ingeniosè fabrefactis venari solent. Cæterum fera illa magno est in pretio apud barbaros, pellis gratia, quam simul atque illi dextra xerint, dorsi corium in orbem circumcidentes, ad solem exsiccant, in parmasque findi mediocris cadi magnitudine conformant, quibus in bello hostium excepta repellunt. Tantam vero duritiem pellis ad solem siccata contrahit, ut nullius ictu teli, quantumvis magno impetu vibrati, transigi posse facile

Nieremb.
Hist. Exot.
t. 1. c. 65.

Nieremb.
Hist. Exot.
t. 1. c. 3.

Nieremb.
Hist. Exot.
t. 1. c. 49.

cile credam. In Galliam duas hujusmodi parmas studiosè afferebam: redeuntibus verò fames ita molesta fuit, ut omni com-
 meatu absumpto, ne cercopithecis & psittacis, ejusdemque generis animantibus excep-
 tis, quæ ex regione illa nobiscum advehe-
 bamus, parmæ illæ duæ carbonibus imposi-
 tæ, fuerint etiam ad depellendam famem co-
 medendæ: quibus reliquæ pelles, quæ, ut
 suo dicam loco, in navi erant, additæ sunt.
 Porro Tapiroussu caro ad bubulæ gustum
 ferè accedit. Appendo quæ *Franciscus Her-*
nandus de dantis scribit. Mediocrum mula-
 rum æquant magnitudinem, fulvo teguntur
 pilo, & firma impenetrabili vestiuntur pelle.
 Capiuntur in canibus, sed diligenter cavend-
 um, ne prius confugiant ad flumina, in
 quibus sese adversus illos vehementiustuen-
 tur. Carnes eorum, ac præcipuè pedum, si
 probè coquantur, gustu suaves sunt, ac bo-
 num alimentum præstant, offenduntur au-
 tem hæc animalia non una in parte conti-
 nentis.

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 9. c. 71.

Cappa dicitur animal asino grandius, ni-
 grum, villosum, ferox, canibus quoque in-
 festum. Obvium quemque raptat, non se-
 cus ac lupo pecudem. Forma pedum in-
 solens. *Ungula* similis est calceo Gallico, à
 fronte lata, rotunda non scissa: à calcari a-
 cuta. Aspectum humanum formidat. For-
 tasse hoc est anonymum animal Francisci
 Hernandi, & ex dantarum genere, de quibus
 jam dixi.

CAPUT III.

De Ejulatore, seu Peva.

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 4. c. 72.

DE *Ejulatore* ita idem Nierembergius.
 Nocentior astus alterius animalis, in-
 fantilem simulantis luctum, edito sono sub
 oppida & villas in prima nocte. Statim mi-
 ferenti accurrentes, affectu quæsituos plo-
 rantem perimit. Sed jam cautè repetito pe-
 riculo oppidani, prodeunt è domibus incen-
 sitionibus structi. Forma & moles hujus
 feræ canem leporarium imitatur.

Idem. l. 9.
c. 74.

Su, id est, aqua, quod juxta fluvios ple-
 runque degat, apud Patagones invenitur.
 Alii *succarath* vocant. Torva est: prima oris
 acie quodammodo leonem æmulatur, aut
 hominem, nam ab aure barbata, haud pro-
 missis valde pilis, pectore propendente: cir-
 ca lumbos nimis constringitur, *cauda* ampla
 & longa sciuri instar. Gigantes ejus regionis,
 quoniam cælo non admodum calido fruun-
 tur, protegunt se hujus feræ pellibus. Cum
 urgetur pellis gratia, catulos in dorsum
 admissos cauda contegit, & fuga elabitur.
 Capitur una cum catulis scrobe effossa &

celata ramusculis. Inclusa, præ rabie aut
 generositate catulos obtruncat, & hor-
 ribili clamore venatores atteret, donec
 sagittis caesa excorietur. Legi (licet autor
 non sit oculatæ fidei) præ charitate ad prata
 portare filios, ubi sertis floridis & odorife-
 ris, comit & coronat illos, tum filios reci-
 comare simili in parentes vetulos pietate,
 eosque portare & alere.

Peva catelli est magnitudine. Hoc ubi
 tygridem conspexit, illius insistit vestigia,
 & allatrat assidue, ut latratu audito, tum
 feræ, tum homines latebras petant, ac sibi
 ab instanti ferâ caveant. Hinc sæpe fieri vi-
 demus, ut præ inediâ, prædæque defectu,
 in agris expirent.

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 9. c. 76.

CAPUT IV.

De animali fætido, Graffa & Caoch.

APud Chiribicenses animale est gestu mi-
 rabile, ait Petrus Martyr, strigosum, Nieremb.
 cubitales loco stercoris emittit colubros. l. 9. c. 80.
 U- num domi suæ se nutrit, & aperto expe-
 rimento rem ita esse deprehendisse, Fratres
 Dominicani asserunt. Quò solutæ tendant
 colubri, interrogati. Ad vicinas, dixerunt,
 sylvas, ubi vitam agunt brevem. Putet ani-
 mal plus, quam quaecunque cadaver fœti-
 dum in sterquilina projectum: Inde putori-
 se ejus impatientes interfici animal Domi-
 nicani jusserunt. Vulpem *rostro*, pilo lupum
 imitatur. Cum in infantum ventribus ver-
 mes passim creari, neque senes ab eâ peste
 esse immunes, atque una cum excrementis,
 emitti vivos didicerim, quos mutato nomi-
 ne vulgus lumbricos appellat, cur & illud
 accidere posse non crediderim, inquit Nie-
 rembergius, talibus præcipuè viris, id affir-
 mantibus.

Graffa in insula Zanzibar, potissimum in-
 venit. Animal est exigui capitis, & lon-
 gissimi colli: anteriora crura oppidò ex-
 cedunt posteriora, colore vario albet, rubet,
 roseisque distinguitur maculis. Mitis be-
 stia est.

Idem l. d.
c. 82.

Caoch animal est tres dodrantes longum,
 pilo vestitum nigrò, promiscue cum can-
 denti, sed ventre fulvo. Claimans noctu,
 humanas imitatur voces. Suis instar edit
 mayzium cum viret, nec dum spicas conco-
 xit Sol.

Idem l. d.
c. 93.

Et tantum de Quadrupedibus sufficiant.
 Si quid interim obvenerit, quod nos hæc-
 tenus latuit, in Paralipomenis, si Deus ita
 voluerit, poterit adjici.

Gratia Tibi, Domine I E S V.

PETRI CASTELLI, ROMANI,
EXETASIS

D E

HYÆNA ODORIFERA,
Zibethum Gignente, quæ Civetta
vulgo appellatur.

CAPUT I.

IN rebus arduis indagandis exacta, & sedula opus esse cogitatione, longaue meditatione, & quo quisque iudicio, & ratione magis pollet, eo facilius obstructa referare, recondita promere, & inaccesfa ascendere, fatis cuique patens est. Unde, cum inquisitur, *an Antiquorum Hyæna nobis innotescant*, & vice versa, *an Zibeth ferax Animal priscis innotuerit*, multis valde arduum omnino videatur: Necessum erit, diligenti peruestigatione nos uti, & magis iudicio, ac ratione, quam sensibus inniti, horum ut voti compotes evadamus, quare à nominis (quod multiplex est) explanatione initium ducentes *Civettam*, Ruellio *Sivettam*, (Animal nunc ita dictum) ex qua Zibethum colligitur, quamque *Catum Zibethicum*, Matthiolus, Scaliger, Renodeus, & alii vocarunt, *Mustelam* verò Historiæ insulæ Virginianæ Auctor censuit, *Zapetion* à Græcis recentioribus dici scripsit Renodeus, & à quibusdam *Cadopleptum* appellatur, HYÆNAM ODORIFERAM nos nuncupabimus.

Porrò huiuscemodi nomenclaturarum quærendi Etymon *Zibeth* Arabicum esse nomen respondere licebit, apud Arabes enim huiusmodi nomen diverso quamvis significato, legitur. Nempe apud Serapionem cap. 121. de *Sedervam* his verbis: *Zebet, & est Algalia habens odorem bonum, & ingreditur in Medicinis ad abscindendum fluxum sanguinis, & ad casum capillorum*. Et addit *Sadervam* esse dictum in lingua Perfica, *& est res nigra cum quatinguntur lina in Haaman, & est herba, vel succus niger ingrediens in medicinis odoriferis*. Citat autem Abenmesuai, Bedigoram, & Rasim, non autem Græcos, & ipse Rasis de eadem te agit lib. 3. ad Almans. sub nomine *Scedram*, vel *Scedeguram*. Et Judæus apud Januensem in Synonymis *Severam* vocavit: ex quibus constat Serapionis *Zebeth* aliud quid à nostro Zibetho esse, nec quid sit, id quod proposuit Serapio, imaginari queo; in mentem tantum venit Arabibus *Zebeth* significare rem odora-

tam, sicut *Galia* & *Algalia*, cum dicat hic Serapio *Zebeth* esse *Algaliam*. unde extant compositiones non paucae *Galliæ* nomine, ut *Gallia moschata*, *Gallia Alephangina*, *Gallia Sebellina*, &c. erit ergo *Gallia*, & *Algalia* odoramentum: unde *Zebeth* nostrum summe odoratum Avorum nostrorum ætate tale fuisse nomen censendum. Ita Simon Januensis *Zebeth* esse *Avicennæ Galiam*, seu *Algaliam*, & *Animalis Arabici fudorem*, (de quo videtur fuisse loquutus *Avicenna* lib. 2. c. 326.) sumpsit: sed *Avic. Zebeth*, & *Algalia* diversa res erit, à *Zebeth*, & *Galia Serapionis*, quæ herbæ succus est, & à *Zebeth* videtur primo Animal i ipsi nomen *Zivetta* seu *Zebetta* fuisse impositum, à quo corrupto *Sivetta*, & *Civetta* nomenclatura ortum duxit. Quod si *Pandectario* fides aliqua est præstanda, quum *Zebet albahar* spumam Maris interpretetur, *Zebet* forte spumam significabit, & non inepte nostro *Zibetho* aptabitur metaphora, siquidem quum colligitur irato Animal i, quasi spumans apparet.

Qui *Catum*, vel *Mustelam* dixere, hoc Animal inter Feles *Silvestres* reposuisse reor. Verum etiam si capitis sit aliqua similitudo, in cæteris tamen plurimum discrepant. Nos *Hyenam odoratam* nuncupare maluimus, idque in sequentibus porbabile ostendemus.

CAPUT II.

An Civetta sit Pardalis Antiquorum?

QUærit Aristot. sect. 13. probl. 4. Cur Animantium nullum bene oleat, præter *Pardalim*, seu *Pantheram*: hæc namque propter suavem quem spirat odorem, ad se feras illicit: quod pluribus exposuit Theophrastus ipsius discipulus libro 6. de cauplant. cap. 5. hisce verbis: *Omnino interbruta, vel nullum, vel certe rarum admodum est, quod odorem persequitur gratia suavitatis, nisi per accidens, cum alimentum est tale. Quippe appetitus ad ipsum pabulum, ejusque causa est. Si quid tamen etiam istiusmodi est, haudquam hominibus constat. Nam, & Pardalim*

Avicennæ
Zebeth.

Cur animalia inodora.

cate

Quæsitum.

Nominum
enumeratio.

Zebet
quid.

Algalia.

ceteris animalibus suaviter olere quidam affirmant, & venari in senecta nimirum bestias alliciendo gratia sui odoris. At nobis nullam odoris affert suavitatem. Nisi verum etiam illud dixeris, ut certe est verum, olfactum homines habere omnium ferme deterrimum. Itaque multi odores, suavitatesque eorum, vel gravitates, latere hominem possunt. & cap. 26. Animal nullum, inquit, penitus odoratum est, nisi quis Pardalim dixerit belluis bene olere, retulit id etiam Plinius lib. 8. cap. 16. ferunt scribens odore earum mire sollicitari quadrupedes cunctas, sed capitis torvitate terri. Quamobrem occultato eo, reliquis dulcedine invitatas corripunt. Dixerat enim Aristot. lib. 9. de Hist. An. cap. 7. Pantheram sese abscondentem venari dicunt, propterea quod suo odore belluas delectari intelligat, propius enim ita accedunt, quas corripit, huiusmodi autem suavem odorem, non bellua tantum sentiunt; sed sui odoris vim ipsa quoque Pardalis sentit. Scriptum etiam reliquit Aelianus lib. 5. de Hist. Anim. cap. 40. Admirabilem quandam, & nobis occultam odoris suavitatem olet Pardalis, quam bene olendi præstantiam divino munere donatam, cum sibi propriam plane tenet, tum verò cetera animalia hanc ejus vim præclare sentiunt. Hæc autem hoc modo venationem capit. Quum horum, quæ ad victum opus sunt, eget, sese vel in loca fructibus densis constitit, vel foliis vestita, ita occultat, ut inventu difficilis, tantum respiret. Tum hinnuli, dorcades, capra silvestres, atque alia ejusmodi animalia quadam suavis odoris illecebra attrahuntur, & proxime accedunt, illarum, quam mox de latebra exiliens ad prædam se rumpit, atque eam comprehendit. Est igitur Pardalis odorata. Addit Plinius: Panthera, & Tigris macularum varietate prope solæ bestiarum spectantur, ceteris unus, ac suus cujusque generis. Pantheris in candido breves macularum oculi. Hæc autem duo, odor nimirum, & maculæ, Petrum Gillium, & alios (ut refert Gesnerus) induxerunt, ut crederent, nostram Civettam esse Pardalim antiquorum. Quæ opinio facile refellitur. Antiquorum enim Panthera vera omnibus hoc ævo est nota, & multum differt à Civetta, immo Septalius in problematibus, Joan. Faber, & alii negant Pantheris suavem inesse odorem: sed bruta alimenti specie odorem istum insequi, hominibus autem neutiquam gratum apparere. Sed, ut verum dicam, multorum animalium excrementa hominibus suaviter odorata videntur, quæ Aristoteli, atque Theophrasto ignota fuerunt. Siquidem Plin. libro 28. de animali Cordylo Crocodilo simili verba faciens, Alter, inquit, illi similis, multum infra magnitudinem, in terra tantum, odoratissimisque floribus vivit: ob id intestina ejus diligenter exquiruntur jucundo nido re facta Crocodileam vocant: Nimirum ipsius excrementum. Murium autem sylvestrium, qui flavo co-

lore, & nostrorum puerorum delicia, (nuncupati Sorci moscaroli) sterus odore moschi præditum est, tale etiam Serpentium quorundam sentitur. Et Renodeus de mat. med. lib. 3. c. 15. Est quoddam genus Mustela majoris, quæ quod martia sit, & pugnax (Gallinas enim etiam grandiores enecat) quibusdam Martes, aliis Martorella, vulgo Fovina dicitur, cujus excrementa Moschum redolent, ut sæpe observavi. Addit Scaliger Exerc. 211 part 2. Cercopithecum nihilo insuavius quam quodvis Moschum fragrare, medicriter tamen, & sine fastidio. Moschum etiam Gazellæ excrementum esse notissimum est. Addam ego me observasse parva quædam Insecta vaginipennia à me picta libro de Insectis, quæ contrectata suavissimum spirabant odorem, qualis in floribus Dipcadi, seu Muschi Græci dicti percipitur. Igitur præter Pantheram, multa etiam animalium sunt genera valde odorata, & hominibus grata, inter quæ est Zibeth: quare mitto tanquam inutilem quæstionem illam inter Cardanum, & Scaligerum de odore animalium, & de naturæ conatu in ejus generatione.

Insecta odorata.

Quidam arbitrati sunt Animal Zibetti (ut refert Dalecampius) esse Plinii Chaum, de quo talia protulit. lib. 8. cap. 19. Pompeji Magni primum ludi ostenderunt Chaum, quem Galli Raphium vocabant, effigie Lupi, Pardorum maculis. Namque hæ notæ adsunt in Civetta. Verum nulla odoris fit mentio; nomen autem, quod habet Gallicum, fortasse à Gallia patria desumpsit. Nec caput Lupi est in Civetta, quamvis adsint magnitudo, pilorumque asperitas, & color: maculæ pellis ipsum præterea distinguunt. An- Thoes. notavit verò Dalecampius, fortasse Thoem pro Chao esse reponendum: vulgo Lupum Cervarium: & qui Genettam nostram esse putant verisimiliora loqui videntur. Sed de Thoë extant Philes versus Græci, qui ita latine sonant:

At quæ pudoris eruditus dogmata,
Hominem veretur Thoë, hominem si viderit?

Quæ jura federationis mutue
Colens opem fert impiger nobis suam,
Hostilis in nos irruat si bellua?

Herodotus lib. 4. Thoës ex Hyæna, & Lupo genitos esse, testatum reliquit.

CAPUT III.

An sit Antiquorum Hyæna?

Civettam veteribus probe fuisse cognitam, & Hyænam ab ipsis fuisse nuncupatam, eorundem auctoritate demonstrare conatur Petrus Bellon. suar. observ. li. 2. c. 20. quamvis odoratum reddere excrementum non observaverint. Ratio autem est, quia Civetta ferum est Animal, quale etiam

Pantheræ odorata.

Venatus Pantheræ.

Error. P. Gillii.

Animalium excrementa odorata.

etiam Hyæna describitur: nec tradita figura differt; siquidem Hyæna ex Arist. colore Lupi propè est; sed hirsutior, & juba per totum dorsum prædita est. Civetta etiam magnitudinem, & colorem Lupi habet, similique modo hirsuta est, verum corpus maculis est aspersum nigris, ita ut sub oculis binæ sint nigræ maculæ, pedes nigro pilo obfiti, crura maculata, cauda oblonga, superior nigra, infima verò parte albis maculis aspersa. Præterea Civetta in cervice, & per dorsum spinam pilos habet nigros, quos surrigit, cum indignatur, non minus quam sus, inde factum, ut Glanis piscis etiam Hyæna nuncupatus sit, & talis forte erit juba illi ab Arist. tributa: accedit, quod omnes antiqui maxime ferum Animal dixerint Hyænam, adeo ut Pantheræ mirum in modum eas timeant: etenim scriptum fuit à Plinio lib. 28. cap. 8. *Præcipue Pantheris terrori esse traduntur, ut ne contentur quidem resistere, & aliquid de corio earum habentem non appeti. Mirumque dictu, si pelles utriusque contrarie suspendantur, decidere pilos Pantheræ.* Hyænam Pardali inimicam esse, Ælianus etiam lib. 6. c. 22. retulit. At Civettam Cardanus X. de subtr. feram adeo judicavit, ut quæ nulla temporis longitudine mirescat.

Potissima autem ratio desumitur ex eo, quod antiqui Hyænam genitale simul & maris & foeminæ habere scripserunt, unde Ovid.

Et quæ sit foemina tergo

Passa marem, nunc esse marem miretur Hyænam.

Et Plinius lib. 8. cit. *Hyænis utramque esse naturam* (ait) *& alternis annis mares, alternis foeminas fieri, parere sine mare vulgus credit;* quod quamvis revera falsum sit, negetque constanter Aristoteles, tamen negligenter aspicienti vas quoddam ori vulvæ simile, foemininus videtur sexus, quæ apparentia forsitan imposuit antiquis, ut crederent utroque sexu donatam fuisse Hyænam. Aristot. 3. de Gener. Anim. cap. 6. voluit stultè, magnoque errore narrari à multis Hyænam duplex genitale habere, maris, & foeminæ, & 6. de Hist. Anim. cap. 32. commentitium id esse asserit.

Sed Hyæna virile similiter, atque in Lupis, & Canibus haberi; quod verò foemineum esse videtur (ἡρενός) *sub cauda positum est, figura simile genitali foemina, sed sine ullo meatu, sub hoc meatu excrementorum est. Quin etiam foemina Hyæna præter suum illud, etiam simile, ut mas habet, sub cauda sine ullo meatu, à quo excrementorum meatu est, atque sub eo genitale verum continetur. Vulvam etiam Hyæna foemina ut ceteræ hujusmodi foeminae animales habent, & lib. de gen. citato scripsit, Hyænas tam mares, quam foeminas habere sub cauda lineam quandam similem genitali foeminino, quæ quidem nota, quamvis communis sit, tamen in maribus potius cernitur, quia mares, quam foeminæ frequentius capiuntur,*

quæ, qui negligentius considerat (refert Arist.) in dictam aberrat opinionem.

Nobis diligentissime considerantibus Civettæ genitalia membra apparuit in ipsis ad amissum quodcumque Hyænae tribuit Aristot. siquidem hæc primo aspectu, & negligenter consideranti duplex videtur habere genitale, at diligenter speculanti nullo modo duplex apparebit; sed unicum tantum, & maris tantummodo in mare, (quale fuit in Cadavere à nobis secto) virile autem perinde ut Lupi, & Canes habet, nimirum osseum, in hoc tamen differt à Canibus, Lupis, & vulpibus, quod horum genitale totum in medio sit osseum, glans vero carnosa solum sine osse: contra Civettæ ossiculum est in sola glande admodum breve, reliqua pars genitalis nervosa osse carens. Vidimus etiam Cuniculum Indicum dictum Romæ *porcelletto d' India* in Genitali continere ossiculum in summo tenue, in basi quadratum, sed depressum.

Quod verò foemineum esse videtur, infra caudam, & genitale positum est, immo inter virile, & testes: figura simile vulvæ foeminæ, & in mare labiis est crassioribus, quam in foemella: verum sine ullo meatu est; sed duæ tantummodo cavitates inspiciuntur, in quibus colligitur excrementum dictum Zibeth; vocavit autem Arist. hanc particulam in libro de Gener. Anim. citato, *lineam similem genitali foeminino*: Græcè ὁμοίαν γυναικῶ τῷ ἡλεῖν αἰδοίῳ nam negligenter aspicienti foeminea apertura, quasi linea videtur; sed meatus non habet penetrantes. In foemina porro Civetta eadem partes eodem sunt dispositæ modo, & ubi in mare est virile, in foemina vulva est: solum modo vascula zibetti in foemina minora sunt; & testes interius latent. Cum igitur tanta appareat Hyænae, & Civettæ genitalium partium similitudo, asse rendum omnino videtur cum Bellonio, idem esse Animal, quamvis Zibeth excrementum non consideraverint antiqui.

Ex altera parte Scaliger de subtr. exer. 117 part. 7. irridet Hyænam existimantes Catum Zibeticum, quam quoque opinionem refellunt etiam Gesnerus, Augerius Busbequius Ep. 1. de legatione sua Turcica; Clusius in addit. ad Bellonium; & Io. Faber Bambergensis in Romano Lyceo, meus olim Collega; Plura namque sunt ab Aristotele, Plinio, Solino, atque Æliano de Hyæna relata, quæ Civettæ nostræ aptari minimè queunt.

Primo quidem callum, & jubam continentate spinæ porrigi, flectique nisi circumactu totius corporis non posse, de Hyæna retulerunt, quod in Civetta nostra falsum vidimus, & ex ossium forma in nostro Scheleto quilibet considerare valet, collum facile verti posse.

Præterea quoque Solinus asseruit, in ore gingivam nullam, sed dentem unum habere, atque

Notæ ab Aristot. aff. signatæ.

Hyænae conveniunt nostræ.

Genitale osseum.

Linea Genitalium.

Opinio Bellonii.

Hyænam non esse Catum Zibeticum.

A Colli inflexione.

Ab uno dente.

Hyæna piscis.

Genitale Hyænae.

Aristot. de genitali Hyænae.

Linea pro Genitali.

atque perpetuum, qui ut nunquam retundatur, naturaliter capfularum modo clauditur: in nostro autem Scheleto dentes plures.

A sermone
humano.

Demum scriptis mandarunt Hyænā sermonem hominum assimilare, pastorum nomina addiscere, ut eos dolo capiat. Item vomitionem hominis imitari ad sollicitandos canes, quos invadat. Nec ullum ex his adhuc observatum est in Civetta etiam maxime cicurata. Sed hæc facile refelleret Bellonius. Namque sicut Lupo, & Leoni falsò tribuit Aristoteles hujuscemodi rigorem colli, ita falsò potuit eundem tribuisse Hyænæ. Deinde Solinus non loquitur de Hyænā, sed de Crocuta, quæ genita fuit ex Hyænā, & Leænā. Quæ demum afferuntur sunt potius admiranda, quam credenda, tum quia, qui ea retulit Plinius pro mirabili proposuit. Ælianus vero lib. 7. c. 22. Crocuta ista tribuit, dubitatque an sit fabulosum, quod confirmari videtur, quia Arist. tanquam falsa ea reticuit, nec Busbequius meminit in sua Hyænā.

Crocuta
quid sit.

Civetta
mansueta.

Addit Scaliger contra Cardanum Exerc. 211. part. 2. tantum abesse, ut Civettæ sint implacabiles, ut eorum unam humeris suis gestaret Nicolinus ab Ancisa Marchionis Mantuæ spurius: immo Bellonius fatetur, quandam Alexandriæ, qui tunc Florentinorum Consulem agebat, Civettam habuisse adeo cicurem, ut cum hominibus colludens illis nasum, aures, & labra sine noxa morsu præhenderet. At levia quidem hæc sunt, natura enim ferum est animal, & foeminam quidem cicuratam scimus, non autem marem.

Atuba.

Majorem vim facit Iuba, quam ex Arist. 8. de Hist. Animal. c. 5. Hyænā habet, quemadmodum equus, sed seta durior longioreque & per totum dorsum porrecta his verbis: *χαλκτὸν δ' ἐχέει ὡς αἰὲρ ἵππου, καὶ ἐπικληροῦσθαι καὶ βαρυτέρας τὰς τρίχας, καὶ οἱ ὅλης τῆς πάχους*: & libro 6. c. 31. Iuba per totum dorsum prædita est, scriptum reliquerat, & quamvis Civetta irata in dorso pilos erigat Apri modo, non tamen longior est equina juba.

Sed respondere probabiliter admodum Bellon. posset; Nequaquam esse intelligendum Hyænā habere jubam longiorem equinā juba; sed cæteris sui corporis pilis, quia equi multi jubam habent ultra tres palmas longam, quod sitalem, & longiorem, ac duriorē, nec non per totum dorsum porrectam haberet Hyænā, quum sit Animal omnium consensu lupi magnitudine, & proinde duob. palmis non altius, proculdubio hujusmodi Iuba longa per terram traheretur, quare rationi consentaneum est dicere Arist. voluisse, Iubam Hyænæ per totum dorsum esse porrectam, non in collo tantum, atque constare ex seta duriorē, & longiore, quam sint reliqui pilis, ut videmus in suis, & in nostra Civetta.

At dices, si hoc est, cur Arist. Hyænæ jubam non assimili lavit potius Aprinæ Iubæ, quam equinæ, quæ in solo est collo? Respond. Arist. fortasse descripsisse formam Hyænæ ex aliquo Indo auctore, qui equum jubatum in collo vidit, non autem Aprum, vel suem, haud enim constat an in India nascantur fues nostris similes: unde Arist. non commutavit inditam jubæ similitudinem.

Genitalium præterea situm diversum esse Hyænæ, & Civettæ, ex Arist. verbis colligunt Scaliger in libro 15. Metamorph. Ovidii, & Io. Faber hoc loco. Namque Aristoteles videtur collocare, tam in mare Hyænā, quam in foemina imperviam vulvam statim sub cauda, sub hac excrementorum exitum, sub quo genitale: ex quibus colligit Scaliger, tum à situ, tum quia impervius est meatus, non esse uterum: absurdum enim esset censere Matricem supra rectum intestinum sub dorso esse. Nam ex Arist. meatus excrementorum inter illam rimam, & veretrum est. Faber autem invenit etiam Scaligerum sibi ipsi contradicentem Exerc. 217. contra Card. par. 7. *Aristotelem*, inquit, *eam rimam, quæ sub excrementorum exitu est, imperviam introrsum esse dixisse, & dicere debuisset, ait Faber, quæ supra excrementorum exitum est, si Aristotelis mentem declarare, nec sibi ipsi contradicere voluisset.* At veritas ipsa coegit Scaligerum recte loqui; eo enim modo intellecta Aristotelis verba rem impossibilem fingere videntur; omnia enim animalia caudata meatum excrementorum immediatè sub cauda habent; unde, vel deceptus fuit Aristoteles falsa relatione: vel error est in textu, & intelligendus, quod dicat, sub cauda quidem esse pseudovulvam, sed non immediatè, aut sub cauda meatum excrementorum, ex altera vero Genitale verum, ipsum vero in medio, & hæc sunt consona rationi, & positui, quem à natura observatum in Civetta videmus, illam autem situationem in nullo animali, nec etiam monstruoso, adhuc vidimus. Sed subtilius hi disputassent, si dixissent. Hyænā habere lineam tantum sine ullo penitus meatu: sed Civettam habere meatus duos, & cavitates, in quibus colligitur Zibethum, verum non ita stricte accipienda sunt Aristotelis verba, sed ut rationi, & experimentis congruant.

Scaligeri
contradictio.

Explicatio


Porro Busbequius, qui legitimam antiquorum Hyænā se vidisse refert, lineæ dictæ situm, & formam si dilucidasset, suas egisset partes: interim dicemus Hyænā non posse habere suum pseudouterum, nisi ea positione, quia spectatur in Civetta, quæ magnitudine suā ferme naturalis talis est in resupinato Animali.

Busbequii
negligentia.

Sed omnium maxime hanc refellit Bellonii opinionem ipse Busbequius, dum narrat se Hyænas duas Constantinopoli vidisse, cui fidem præstamus; describit autem Lupo aliquanto

Figura I.
Descriptio
Hyænæ à
Busbequio.

Hyæna Odorata Africana



Catus Zibethicus Americanus



Tlaquatzin

Mus Aquaticus





quanto humiliorem ; sed nihilo brevior
esse. Pellem habere Lupi similem, nisi quod
pilo sit horridiore, & grandiore ; maculis
quoque nigris distinguatur. Atque Caput
(quod maximum est) dorsi spinæ contiguum
sine ullis vertebis esse, ut cum respicere ve-
lit totam se vertere necesse habeat: plurimas
esse in Galatia Hyænas, & frequentissime
sepulcra suffodere, & ossa congregare ad
suas speluncas, tam humanorum, quam fe-
rinorum cadaverum, & ob id Hyænas facile
inveniri, nimirum ex ossium cumulo, ante
harum speluncas conspecto. Præterea Joan.

Ioan. Leo.

Leo in nova Africæ descriptione, esse, ait,
forma Lupi, habere pedes humanis similes,
humanis maxime cadaveribus delectari, quæ
ex sepulcris auferat. Animal esse minime
astutum, & cum cantu, ac Tympani sono
maxime recreetur, fieri ut interea venatores
adeo ad musicam attento, fure pedes ambos
innodent, atque ita è speluncis suis extra-
hant, occidantque. Sed adhuc dubitare licet,
numne hæc sit vera Hyæna, quum nec Ju-
bæ, nec genitalium partium, nec morum ab
antiquis Hyænae tributorum fiat mentio:
sed diverforum: imo cum veteres maxime
malignam, & callidam descripserint Hyæ-
nam, & Leo dictus minime astutam prædi-
cet: dubitatio augetur, quia nec constat de
nostra Hyæna, quod refert Plin. li. 8. c. 30.
*Hyæna plurimæ gignuntur in Africa, quæ &
Asinorum sylvestrium multitudinem fundit.
Mares in eo genere singuli fœminarum gregibus
imperitant. Timent libidinis amulos, & ideo
gravidas custodiunt: morsuque natos mares ca-
strant. Contra gravida latebras petunt, & pa-
rere furto cupiunt, gaudentque copia libidinis.
Tamen cum dicatur Hyæna libidinosa, &
mas, & fœmina, non differet à nostra, quæ
ob Zibethum, non solum ad coitum prona
est: Sed alios homines utriusque sexus, ob
id ipsum in unctum incitat.*

Dubitatio.

Huc etiam referendi erunt Philes Græci
versus de Animalium proprietate, quibus
quædam Anim. proprietates adnotantur,
non convenientes Cato Zibethico, ut cap.
43. de Hyæna, & terrestri, & marina: qui
ita latinè sunt redditi:

*Hyæna quæ mas pridie videnda erat,
Nunc fœmina est, initque initurque invicem,
Maternus utque fiat avus haud dixeris.
Alvo ferens, ferensque fœtum mutuo.
Si forte quenquam dormientem offenderit,
Pede strepitum non excitante subvolat,
Suamque porrigens dolosè dexteram,
Somno jacentis, admovet eam naribus,
Soporis auctorem, quod ajunt, maxime.
Hinc eruto, quod subitus est caput, solo,
Deponit hoc, nudo, & supino gutture,
Inque illud incumbens feris complexibus,
Somnos trahentem strangulat miserrime.*

*Quod si marina quispiam hyæna pinnula
Dextra sopore tangat oppressum, gravem*

Hyæna
Marina.

*Statim rigorem huic injicit, cum somniis,
Quæ terreant dirajacentem imagine.*

*Astutia canes hyæna irretiens,
Mox pascit horum carnibus jejunia.
Fulgente namque Cynthia sub vesperam,
Umbra sui illos corporis ferit, retro
Lumen tenens vestigiorum callide.
Mutosque reddens percitos formidine,
Instar veneficæ increpantis carmine,
Occidit incautos doli crudeliter.*

Idem refert Ælian. lib. 6. c. 14.

Multa quidem de Hyæna relata videntur
potius fabulosa. Sic etiam Ælianus lib. 15.
de Anim. cap. 14. referre videtur Hyænam
esse cornib. præditam, cum ait: *Denique Hyæ-
na, quod animal Capreis minus esse ajunt, sed
Cervis animosius multo, & cornibus ferociens:*
de quo Æliani loco dubitavit etiam P. Cil-
lius, dum in sua translatione omisit, & Gesne-
rus adnotavit, esse absurdum, cum Lupi cog-
nata quadrupes sit, nihil cū Capreis, aut Cer-
vis commune habens. Sed quicquid sit de hac
Bellua, certum fatemur, multas Hyænae no-
tas adesse in Civetta, non paucas desiderari.

CAPUT IV.

*Sub quo Animalium genere sit
reponenda Civetta.*

QUum clare ex dictis pateat, nostram ^{Quæstum.}
Civettam, neque antiquorum Panthe-
ram, neque Plinii Chaum, neque veram
Hyænam esse, jure adhuc quæritur, ad quod
animalium genus sit referenda: Multis qui-
dem de genere Felium visa est; unde Cato <sup>An sub gê-
nere Fe-
lium.</sup>
appellarunt; sic Alexander Benedictus, Ruel-
lius, Matthiolus, Scaliger, & alii non pauci
Feli silvestri similem faciunt. Et quidem fa-
cies videtur Feli similis, pilos enim in barba,
ut Felis, habet, eodemque modo tres alios
oblongos in genis: Sed præter hæc nihil aliud
commune cum Cato habet: non pellem, quæ
in Fele levis, in Civetta aspera, & oblongis,
crassisque pilis; neque ungues, quæ Feli sunt
aduncæ, Civettæ obtusæ: dissimilia etiam ge-
nitalia, immo Fab. Columna Io. Fabro scri-
bens: *Effigies, ait, ad Canum, quam Felium, aut
potius Vulpium figuram accedit; quod rostrum
non harum ritu obtusum; sed illorum forma ob-
longum habeat.* Renodeus: Animal ferum est,
dentibus ferox, Feli non tam simile, ut multi
scribunt. Majus enim est, sæpe Vulpem ex-
cedens, caput, collum, pedes, atque alias
partes habens illi valde dissimiles. Osci ob-
longum est, ut Meli, seu Taxo animali, cor-
pus longum, maxillæ inferius albæ, ut etiam
barbitium, pedes nigri, laterales ventris par-
tes albicantes, dorsum ex obscuro cinereum,
maculis nigris conspersum. Præterea denti-
bus cani potius, quam Cato assimilatur.

Equidem ad Hyænas refero, & has ad <sup>Genis gê-
nerale.</sup>
genus generale illud, quod continet Lupos,
Canes, & Vulpes, & similia animalia carni-
vora. Genus autem Hyænarum multiplex
cum

cum etiam dicat Herodotus lib. 4. ex Hyæna, & Lupo gigni Thœs. unde si conjunguntur Lupis, aliqua inter ipsos est affinitas naturæ.

Hyænarum
divisio.

Dico autem, Hyæna, velest odorata, vel inodora. Atque Hyæna odorata, vel est Orientalis, & Arabica; vel Occidentalis, & Americana. Hyæna inodora erat antiquorum Hyæna, quæ fortasse duplex est: nam, ut mox dixi, Hyæna Busbequeti desiderat non paucas antiquæ notas, & ad Lupum silvestrem arabicum referri posset.

Hyæna autem odorata, & Zibethum ferens duplex est, Arabica, & Americana, ambque conveniunt in generatione Zibethi: sed forma aliquantulum differunt, ni pictor nos fefellerit in Americana. Namque Zibethicum Animal Americanum, quod pictum ostendit Nardus Antonius Recchius, hanc habet formam:

Figura II.

Describens ipsum Faber: Caput, inquit, non crassum, sed tenue, & acutum habere, ut rostrum Caninum potius quam Felinum esse judicares, quod cum labris suis subrubet. Orbitæ circa oculos, qui minus truces sunt, nec magni admodum albicant. Cæterum subcineritii coloris est caput, & pili in barba vix ulli. Collum quoque longius, quam in Tigre, aut Catopardo, quod pulcro quodam ordine alternis nigriusculis, & albicantibus fasciis, velut totidem torquibus arte adpictis exornatur. A capite ad dorsum, per colli longitudinem supernam similitudinem colorum lineæ excurrunt. Dorsi medium à collo ad caudam lineæ nigricans pilosa valdè distinguit. Maculis in corpore cinereo minus obscuro nigricantibus, rotundis, & ovalibus ordinatim secundum lineam rectam, versus caudam productis, insigniter decoratur. Ita ut superiores, dorso quippe viciniores, sint majores, mediocres paulo inferiores; & quæ in imo sunt ventre sensim evanescant. Caudam gerit alternis similiter, ut in collo dictum, fasciis nigrescentibus, ac cineritiis distinctam, ac satis longam; sub cauda tria foramina eminenter visui se præbent; anus scilicet, locus ille, in quo Zibethum colligitur, & extrahitur, ac vulva: medium tamen cæteris duobus majus apparet.

Figura III.

Hyæna A-
fricana.

Hyæna autem odorata Africana, quæ nostra Civetta est, Lupum potius æmulatur, quam Felem: capite enim est oblongo, & rostrum acuminatum, non obtusum, ut Felis, habet item dentium formam, ut Canum, duorum palmorum altitudine erat à me sectum animal; tantundem erat corpus à scapulis ad caudam: caudæ vero longitudo quanta totius corporis: collum etiam longitudine superabat semi palmam, (corpus sine collo dupla longitudine altitudinem superare visum est Columnæ: sed vidit animal timide, & depresso gradiens, ego vero etiam

Scheletum sum dimensus) capitis longitudo dupla erat *ad latitudinem*. In barba, & genis pilos habebat duos, albos & longos Felium ritu: rostrum pilis denudatum, nares nigricantes, & sub oculis maculæ nigræ: oculi splendentes, & subrubentes Bellonio: Columna autem apud Fabrum, nigriores vidit ex colore castaneo, & flavescente mixto, nec hilares, sed potius tristes, & depresso magis, quam eminentes: Verum ex ambobus oculis nostri Animalis mortui erui gemmas pisi siccati forma, & magnitudine orbiculares, & angulosas, cristallo æmulas, quas etiam nunc servo, quod facit, ut confirmem illi Hyænæ nomen. Nam scripsit Plinius lib. 37. cap. 10. & similiter Albertus de lapidibus ex Enace, & Aarone: *Gemma Hyænæ ex oculis Hyænæ, & ob id in vase inveniri dicunt, & sic credimus, lingua hominis subdite futura prædicere*. Sed haud dico veras esse gemmas, nam etiam si erant hæ gemmæ per duos, vel tres dies manserint cristallinæ, duræ nimirum, & Diaphanæ, processu tamen temporis opacæ fiunt, & scinduntur in tres aut quatuor veluti squammas lapidibus limacum similes. ceterum Alexander 1. probl. 6. proposuit: *Cur feles, Hyæna, & vespertilio* Aures. *nes acute noctu conspiciunt?* Præterea Civettæ aures sunt parvæ, orbiculares ad Melis, seu Taxi formam, in ipsis similis pilus, nec mollis, nec asper. Corpus habet albicans, & cinereum Lupi colore, maculis aspersum nigris: crura, & pedes potius parva, quam magna; breviora, quam alta, & pilo nigro obsita. Pedum digiti, quatuor simul, & insuper parvus pollex internè situs, nec longè distinctus, ut in Fele. Ungues sunt caninæ, nigræ, breves, crassæ, & obtusæ, minimum aduncæ. Circa genitalia, dicemus, sub cauda immediate esse excrementorum meatum, proxime collocari testes in maribus, tum vas Zibethicum, & sub hoc sexum masculinum, vel foemininum. At in resupinato animali pinximus primo virile membrum, foris exertum, licet in Animali vivo sit intus reconditum, quod in media glande officulum habet, sub hoc situata est pseudovulva, sub hac testes, infra quos excrementorum exitus est immediate ad caudam; ut supra pag. 21.

Pinximus autem ea omnia sua ferme naturali magnitudine ad unguem dimensa. Vas autem Zibethi positum est inter genitale, & testes, quos satis magnos, ac evidentes habet, istos secui, & inodoros reperi, & ab his vasa seminaria admodum crassa ferebantur, ad genitalis radicem ad latera pseudouteri sub quo vesica parva erat. Natura autem hujus particulæ paulò post considerabitur. Genitale totum occultatur in corpore Felium modo, dum vivum Animal quiescit, Explicatio apparetque sola glans: at in cadavere ob relaxationem, uti pictum est, totum membrum

Gemmæ
ex oculis
Hyænæ.

Situs vesti-
culæ Zibe-
thi.

brum foris extabat, ut à nobis tractum remanserat, nec intus iterum reductum, quiescebat. Totius præterea corporis pili sunt longi, rudes, & asperi apri modo, & in cervice, ac per dorsi spinam pili ad sunt nigri, prælongi, ac duriores, quos erigit iratum animal, uti sus. Cauda est oblonga, & bene pilosa, usque ad terram pertingens, variis distincta maculis. Icones hujus animalis posita à Matthiolo, Bellonio, Clusio, & Columna inter se differunt: magis placet, quæ est in Matthiolo à Valgrisis impressio.

Hyænæ
nomen u-
niversale.

Hyænarum
proprietas.

His positis concludemus, jure hæc tria animalia à nobis reducta esse ad Hyænæ nomen, nimirum ob proprietatem insignem, quam hæc tria animalia habent nullis alijs animalibus communem: nimirum falsæ vulvæ formam, ob quam utrumque habere sexum ab aliquibus credita sunt: quæ proprietates, ut ab alijs animalibus hæc distinguit, ita eadem inter sese unit generica unitate. Communicant igitur simul Hyæna nostra, & antiquorum Hyæna, pseudovulva, genitali osseo, & oculorum gemmis. Verum quia generis nomen hæc tria animalia continentis nos latet, ab antiquiori specie nomenclaturam mutuari libuit. Fortasse sub eodem innominato Genere continetur Fiber, nam Castoreum, vesicæ sunt in inguinibus humorem apertura stillantes melleum: non autem testes ut dicemus.

CAPUT V.

Ubi Hyæna nascantur?

Ex Syria.

HYÆNAS, scripserunt Herodotus lib. 4. Plinius, atque Solinus, plurimas gigni in Africa. At nostra Hyæna, odorata dicta, à Francisco Alexandri Catus Syriacus vocitata fuit, & Matthiolus Venetiis vidit ex Syria delatas. Cardanus verò scripsit, Hispaniam ipsas mittere, quapropter notatur à Scalig. Clarius autem loquutus est Amatus scribens, Lusitanos eas deferre ab Indiis: sed memoria non excidit mihi, aliquot ab hinc annis à Litvano quodam pharmacopœo Romam ad Henricum Convinum transmissum fuisse vasculum Zibethi, & Ungulam Alcis, qui etiam scripsit, ista esse fructus suæ regionis: unde suspicor etiam in illis frigidis regionibus oriri Civettas.

An in Li-
tuania.

In Indiis.

De Zibethico autem animali Americano scribens Jo. Faber ex F. Gregorio de Bolivar; Hoc animal, inquit, nascitur in multis Indiæ orientalis, atque occidentalis partibus, cujusmodi in orientali sunt provinciæ Bengala, Ceilam, Sumatra, Java major, & minor, Maliput, & plures aliæ.

Nova Hi-
spania.

In nova Hispania verò sunt provinciæ de Quatemala, Campege, Nicaragua, de vera Cruce, Florida, & magna illa Insula S. Dominici, aut Hispaniola, Cuba, Matalino, Guadalupe, & aliæ.

In Regno Peruano animal hoc magna copia reperitur. In Paraguay, Tucamam, Chiraguanas, Sancta Cruce de la Sierra, Yungas, Andes, Chiachiapias, Quizos, Timana, Novo Regno, & in omnibus provinciis magno flumini Maragnone confinis, quæ circa hoc ferme sine numero ad duo Leucarum millia sunt extentæ. Multo adhuc plura ejusmodi animalia nascuntur in Brasilia, ubi mercatura Zibethi exercitatur.

Guineæ.

Magna horum abundantia quoque est in Guinea, in provinciis nimirum de Loango, Congo, Manicongo, circa finem Angolæ, usque ad Cafres, & finem bonæ spei, maxime autem in grandissimis, & extensissimis montibus, qui ibi prostant, quos Fragosas Cuspides appellare solent. Et ex parte quidem Cafres montium de Torea, aut de Luna, ubi maxima Algalia quantitas extat.

CAPUT VI.

De Vasculo Zibethico.

Zibeth, quod ab hoc animali generatur, non ex toto corpore, sed ex determinata particula colligitur, quo, qualis, quanta, & ubi sit, nunc est à nobis investiganda. Turpiter autem erravit Jo. Riolanus, suæ Pathologiæ cap. 11. scribens: *Damarum stercus bene olet, & Gazella cacat Zibethum.*

At Ruellius primo de Nat. stirp. capite 27. *cruidè genitalibus locis* scripsit & subjunxit, *è cujus natura sordes manant, &c.* cui assentiri videntur Matthiolus, & Francisc. Alexandri. Excrementitium genitalium humorem vocavit Deslenius. At Renodeus circum *testes & pudenda* condescere scripsit. Itaque hi videntur censuisse testes esse vasculum Zibethi, sed ridiculum est, quod Everhardus à Mepschen narravit Deslenio de Civetta Alexandri Cardinal. Farnesii, *exectis testibus aperto vulnere sudorem defatigata, & irritata fere colligi.* Nam orificia, quæ cernimus naturalia, ipse censuit arte facta exectis testibus. Columna autem Epist. 1. ad Fabrum, vocat testiculos, sive utriculos, qui medii inter anum, & pudendum prominent, tam in mare, quam in fœmina. *In mare tamen duplo grandiores apparent. Hi utriculi interna sui parte, ubi pili curtiherent, capacem satis cavitatem obtinent, in quam ingressus patet exiguus, & cartilagineus.* deinde subdit: *sub dictis utriculis, folliculis, sive testiculis (nam alij testiculi haud apparent) maris genitale situm est.* Quæ verba fecerunt, ut Faber dubitaret, quid sibi vellet Columna, ex folliculis illis, utriculis, sive testiculis Zibethum colligi. an fœminæ quoque extra prominentes Didymos habent?

Columna.

Clarius profecto loquutus fuit Alexander Benedictus de cur. morbis Fœminæ intra genitale, & alvum: Mari intra genitale membrum, & testes colligi Zibethum, & Columna altera Epistola ad Fabri dubi-

tionem respondens, denuo revisis, & exactius consideratis dictis animalibus: *Testes*, ait, *ex lateribus folliculorum cum manibus e-versi, tam magni eos atterritanti manifestantur, quam ab iisdem folliculis contineri possunt*; & subdit: *folliculis his ad latus foraminum (qua instrumento humorem exempturo ingressus datur) in externa parte testes adherent. In fœmina testes illi perquisiti, non inveniuntur, molliores enim sunt illi utriculi, seu folliculi, nec ut in mâre grumositâs illa, & durities oblonga testium percipitur.* Præterea Frater Grægorius de Bolivar apud eundem Fabrum, *Mares solos*, ait, *foras eductos, & conspicuos testes, intus conclusos fœminas gestare.* Decipi autem omnes affirmabat, qui prominentias illas in fœmina ambas intra vulvam, & anum sitas, testiculos esse sibi persuaderent. Hos enim tumores, solos esse illos folliculos, & utriculos à natura eo loci fabricatos, in quibus Zibethum paulatim colligitur, & inde evacuatur. Et cum duo sint, imponere facile possent, etiam valde gnaris, & Naturæ studiorum non inexpertis, ut testiculos esse ad credendum adducerentur. Et quoniam iidem utriculi in eadem regione, ubi maris testiculi hærent, positi videntur, illosque veluti investiunt, & cooperiunt, hinc fieri posset, ut crederent aliqui testes esse: hæc, si apud eruditos quidem, & oculatos auctores leguntur, quid sperandum ab iis, qui Animal non viderunt? Columna asserere videtur, testes in folliculis contineri, & adhærere in externa parte folliculis ad latus foraminum, quod jure negat Bolivar.

Sed nos cæteris omissis dicemus in resupinato animali mortuo sub ipsis utriculis testes esse, non tactu solum; sed oculis quoque manifestissimos, ut pictura ostendit, erecto animali non ita prominent; cum interius comprimantur, ita etiam in vivo, & bene valente Animali semper testes sunt retracti, ut in homine juvene, & valido accidere dixit Galenus libro 1. de sem. capite 15. secus in sene, nisi morbosè fuerint convulsi, ideo F. Columna in animali inquietissimo, ferocissimo, erecto, & valido non potuit istos benè tangere, & considerare; adeo ut ipsi visum fuerit testes in folliculis ipsi contineri. Sunt autem testes à Zibethi vasculis omnino distincti, & sua habent vasa ferentia semen ad meatum genitalis, valde crassa, ut nos Anatome docuit, & servamus adhuc apud nos hujus Animalis scrotum exiccatum, in quo testes.

Membrum Zibethicum primo aspectu fœminea vulva videtur: lineam enim oblongam habet, & labia crassa, quod si manibus tangatur, tactu sentitur ovi parvi magnitudine, veluti cartilagosum corpus, & duriusculum, in quo, cum parum digitis deducitur, & dilatatur, apparent duo oblonga foramina, iis, quæ sunt in naribus, similia, sub quibus cavitates quædam sunt, sedes Zibe-

thi, Hæc vascula si digitis magis pressa deducantur apertis omnino foraminibus totas cavitates demonstrant, loculique perfecte patent, quorum cavitatis tanta est, quanta sufficeret ad continentum Amygdalæ nucleum, in his loculis nullus porus, nullus meatus apparet: Sed sectione facta, corpus duriusculum ovi magnitudine, quod cartilagosum tactu videbatur, agnovi distingui in duos utriculos olivæ Hispanicæ magnitudine, & nequaquam cartilagosos, sed carnosos, & minutis, albis, duris glandulis, seu granulis insertos; durior autem multum, quam testes, erant substantia: omnino tamen inter se distinguebantur hi folliculi, membranis tamen uniti, & interior quidem communis erat ambobus utriculis, servo adhuc apud me hosce utriculos exiccatos, qui mire redolent Zibethum, cum testes veri exiccati cum scroto nihil oleant: sed quod mirum Animal Hydrope exanimatum putrefactis omnibus visceribus, & maximè fœtidis, vehemens ut nausea fecanti excitaretur: & alioqui fœtidum totum: tamen mire olebat, & nunc etiam optimum spirat odorem, vas Zibethi.

CAPUT VII.

De Castoreo.

Cum autem ad dilucidandum genus, & proprietatem Hyænæ odoratæ plurimum conferat Fibri Historia: ideo dicemus quod Fiber Animal sit, cujus & mas, & fœmina reperitur, ambo in inguinibus conceptacula quædam habent, è quibus, per sua oscula, melleus quidam liquor emanat, quem Fiber ipse delingere solet, Mares autem habent præterea suos testes sub cutè intus ita coclusos, ut tangi nequeant, veluti fues, teste Dioscoride. Rondeletius similes tumores in Leporibus esse dixit, unde factum sit, ut vulgus eos, mares, & fœminas censuerit. Pariter Moscho Animali similes esse censuit, vesiculæ enim Moschi id indicant, sed Rondeletii verba digna sunt, quæ huc transferantur, hic lib. de Amphibiis cap: 8. *Fibri*, inquit, *in inguinibus geminos tumores habent, utrinque unicum membrana sua conclusum, ovi anserini magnitudine, inter hos est mentula in maribus, n fœminis pudendum. Hi tumores testes non sunt, sed folliculi membrana contexti in quorum medio singuli sunt meatus, è quibus exudat liquor pinguis, & cerosus, quem ipse Castor sæpe admoto ore lambit, & exugit, postea hoc veluti oleo, quas potest corporis partes contingere, oblitit. Hos tumores testes non esse hinc maxime colligas, quod ab his nulla sit ad mentulam via, neque ductus, quo humor in mentule meatum derivetur, & foras emittatur. Præterea quod testes intus reperiuntur. Liquor ille, de quo loquimur, quum recens est, oleum refert, quum vetustior mellis liquidi colore est,*

Rondeletius.

Verlor.
sententia.Nostra in-
spectio.Dilucida-
tio.Vas Zibe-
thi.

est, & crassitudine. Idem Leporum exemplo declarare non inutile fuerit. Iis in utroque inguinē tumor est, glandula prominentis modo, intus meatus est. Varicosus, capreoli modo intortus, è quo liquor effluit. Hos tumores cum in omnibus leporibus observasset vulgus, lepores omnes simul mares, & feminas esse credidit. Eosdem tumores Moscho animali esse puto, à quibus odoratum illud pus emanat. Neque sunt audiendi, qui putant tuberculi, vel umbilici inflammati saniem esse. Tumorem esse glandulæ, vel testiculo similem membrana circumdatum norunt, qui adulterant. nam in testiculi formam effingunt, ac testiculum Moschi appellant. Hac, quæ de tumoribus inguinum Castoris, & liquore inde manante à nobis prodita sunt, cum ita se habere doceat ipsa inspectio, & paulò ante dixerat Rondeletius. Testes parvi, substrictique, & adherentes spinæ, qui adimi sine vita animalis non possunt. id prius scripserat Dioscorides, licet censuerit, quod deferretur, bivaſculum esse testes. pariter Plin. lib. 32. cap. 3. ex Sextio Medico diligentissimo. ex quo videtur colligi posse liquoris folliculos non esse testes, & quidem facile, quia testes non sunt liquoris forma in folliculis. Dicendum ergo adesse Animalia multa, ut Hyænas, Zibethica, Castores, Moschifera, Lepores, & alia, quæ inguinibus vascula ferant, in quibus liquores quosdam odoratos proprios deferant, ut inter pisces sepia, loligo, purpura, excrementa odorata continent in Vesiculis.

Quod autem de Moscho ferunt, non videtur verum. Concedimus quidem Animal esse exoticum, & Indicum in regno Pegu, ac potissimum in agro Tumbascorum admodum frequens, capræ non multum dissimile, ac corpore prægandi, *Dorchadem Moschi*, *Gazellam Indicam*, & *Capreolum Moschi* nominatum, ex cujus inferiore maxilla, æque dentes utrinque singuli porcorum instar exeruntur.

At quum narrant, huic cum Veneris cæstro percellitur, furoris vehementia umbiliciregionem intumescere, ibique congesto sanguine multo, & crasso fieri apostema: atque tum ferum illud animal potum, cibumque averſari omnem, & humi sese provolvere, atque lapidibus, & arborum truncis turgentem partem quadam voluptate confricando, disrumpere, ac vomicam aperire, ex qua saniem quandam excerni, quæ verus est Moschus, illam autem saniem (etiam referunt) super arborum truncis, aut faxis relictam, calore solis, ac Cœli bonitate coqui, & elaborari, sic virosum ipsius odorem, si quis est, dissipari, & hanc esse optimum Moschum. Alioqui capta fera venatores partem cum corio simul abscindere, cruorem effluentem exprimere, colligere, exicare, & servare cum utriculis, aut pellibus eorundem animalium, quorum sape sanguinem exicca-

tum, pauculæ recrementi dicti portioni commixtum pro puro Moscho ab institoribus, seu adulteratoribus vendi, &c. Nos si hæc attentè consideraverimus eandem esse naturam Moschiferi Animalis, ac Zibethici aperte cognoscemus, nonne ambo sub umbilico vas excrementi collocatur? nonne ambo ad Venerem irritantur copia sui excrementi? nonne ambo, ut tale excrementum expurgent, se confricant lapidibus, & stirpibus? nonne utrumque excrementum eligitur potius ab Animali expurgatum, quam ab homine extractum? Quare utriusque similis est natura; & ideo si ex Arist. à notioribus nobis ad minus nota procedendum: ex nota natura Zibethi, veniemus in cognitionem Moschi minus nobis noti, & dicemus sicut Zibeth est non ex apostemate, ita neque Moschus: quare Moschiferum Animal habebit etiam particulam determinatam naturaliter ad colligendum excrementum dictum Moschus.

CAPUT VIII.

Quid sit Zibeth.

EX hoc Animali colligitur odoramentum dictum Zibeth à Scaligero, Zibettum, & Zapetion ab Hermolao, & Ruellio: à nonnullis Algalia, ab aliis Civetta. Hujus in Animali ipso, quæ sit materia, non certo apud omnes constat.

Siquidem animalis semen vocavit Cardanus: unde à Scaligero reprehenditur, & jure: verum enim semen non esse, pater manifeste, quia, qui adhærent, subsuntque testes, non eo suos feminales ductus evacuant; sed per penem, ut in Canibus, quod sectione earum partium clarissime vidimus. Nec possumus dicere, quatuor habere testes, duos proli generandæ destinatos, alteros vero apertos ad superflui feminis excretionem, quia hi utriculi exiccati, quos servo, odorem Zibethi spirant, nullum autem testes, quo patet aliam materiam contineri in testibus, aliam in istis folliculis, & verum semen neutiquam esse odorem Zibethi.

Plurimi censuerunt esse Animalis sudorem, ut Scaliger, Matthiolus, Januensis, Renodeus; Jo. Leo in desc. Africae, F. Gregorius de Bolivar, quibus subscripsit Faber, id affirmant, quia defatigato, irritato, & sudante animali plurimum colligitur, imo etiam sub coxis, brachiis, collo, & cauda ex F. Gregorio. Quibus ego assentiri nequeo: nam cum sudor per totum corpus emittatur, non in hominibus tantum, verum etiam in belluis (vidimus enim in equis sudantia dorsum, coxas, collum, & caput) etiam si copiosior à dictis partibus sudor emergat: & ideo totum corpus eodem deberet esse præditum odore. Cum verò soli utriculi, & humor solus in ipsis collectus percipiantur odorata, non autem pellem, carnem, axillas, & totum corpus, odora-

Nomina.

An sit semen?

An sit sudor?

odorata sentiamus, neutiquam dicendus erit fudor: nisi fortè à modo, quo colligitur in ipsis utriculis, hoc nomen sumere voluerimus; videtur enim à corpore glanduloso, & spongioso per invisibiles poros in cavitates folliculorum refudare; unde dicitur, non simpliciter fudor; sed membri Zibethici fudor.

An sit excrementum?

Alii generalius loquentes excrementum dixere, ita Ruellius vocavit sordem odoratissimam genitalium, locorum. Dessenius excrementitium genitalium humorem dixit, Scaligerò & Renodeo placuit etiam appellare strigmentum circa testes, & pudenda concretum. Sed hi non descendunt ad particularem huius excrementi naturam: quare assumpto, omnium auctororum consensu, quod sit Animalis excrementum, considerandum à nobis erit, quale sit excrementum.

Distinctio excrementorum.

Possimus distinguere excrementa, ut aliud sit utile excrementum, ut semen, lac; aliud inutile, ut pus, fudor, sordes, &c. Diximus, non esse semen, neque sudorem, neque erit pus; quianec ulcus adest, nec materia corrupta, vel similis, ex qua pus gignatur. Ego censeo esse excrementum proprium substantiæ glandulosæ dictorum folliculorum, quæ tale gignat insita & propria vi, ac facultate, ut ventriculus chylum generat, Hepar sanguinem, Mammæ lac; testes semen, aures suas sordes, sepia atramentum, Vipera in dentibus Venenum, & similia, immo, & simile omnino Melleo excremento Castorei, & Moschi, & similium Animalium. Sed vereor determinare, an sit excrementum utile ipsi parti, vel Animali gignenti, ut lac, & semen: vel omnino inutile, ut sordes aurium. Nam quum genitum excrementum grave videatur ipsi animali; ab ejus enim acrimonia vellicatur, & cogitur se ipsum eo exonerare. scemina autem, quæ cicur facta est, videtur delectari, dum auriscalpio Zibethum extrahitur, ex quo suspicari, inutile, & nocuum ipsi animanti esse excrementum, possumus. Contra odoris suavitas non indicat concoctionis carentiam, nec putredinem; uti accidit in excrementis præter naturam; sed perfectam concoctionem, & naturæ dominium: unde superante natura, materia concocta à vi specifica membri, dicenda erit naturalis, quamvis copiose excrescens, partem propriam, veluti ad foetum edendum, ad sui excretionem irriter. idem enim accidit abundante in suis vasis femine, & lacte. Erit ergo excrementum utile, alioquin frustra natura tantam vim dedisset illis utriculis, qua gignerent materiam adeo odoratam, & suavem, ut multas alias superet odoratas res. Sed ad quem finem? semen inservit ad generationem animalium, lac ad corundem nutritionem. ad quid proderit hoc excrementum? equidem possem

Excrementum utile.

Finis.

imaginari; vel ut irriterentur animalia ipsa ad coitum; vel ut ad idem remedium sit homini, ejus enim gratia animalia fuerunt creata, ad hoc Castoris mellaginem destinamus, vel denique, ut iste odor inserviat animali ad venandum, & ad se allicienda alia animalia, ut de Pantheræ odore diximus. si quis meliora attulerit, laudabimus ingenium.

CAPUT IX.

De collectione, & electione Zibeth.

Quum repleti fuerint utriculi substantia Zibethi, animal ipsum inquietum est, & semet exonerare satagit: unde videtur dicendum, ab ipsius acri qualitate turgere, vexari, & pungi, atque ad excretionem proritari: delectarique videntur cicurata animalia, dum folliculi ii auriscalpio exinaniantur, scribit Faber ex F. Gregorio citato. In hisce montibus, quos animalia hæc pererrant, omni adhibita diligentia Nigrita, sive Mauri illi perquirunt veteres arborum, aridosque truncos, & ubi aliquas maculas magnas, easque oleosas observaverint, eo se conferunt, & globosam quandam materiam truncis iisdem adhærescentem, nucas, aut castaneas magnitudine æquantem inde auferunt, in aqua ebullire permittunt, id quod supernat at pingue, & oleosum remorvent, mundioribus vasis infundunt, usuique reservant. Atque hæc est omnium optima, ac purissima Algalia. repletis enim folliculis, ob acrimoniam, ut reor, vellicantur, & coguntur animalia se depurare: ideo in silvis arborum truncis se confricant, ut talis materia arboribus adhæreat.

Ea autem Animalia, quæ in caveis magnis domi asservantur, vel cicurata sunt, si abundaverit in eorum utriculis succus iste quasi eo molestata, velociter per caveam ambulant, nec loco stare queunt, & si non extrahatur à nobis excrementum, Animal ipsum, caveæ lateribus, & domus parietibus se confricando, Zibeth à se abstergit, quod ita perit. F. Columna apud Fabrum descripsit modum, quo famuli D. Barnardini de Corduba odoriferum hunc liquorem ex mafculo detrahere parabant. Ex famulis unus

Modus colligendi.

lorum, seu catenulam, qua ligabatur, trahabat. Posteriores alius pedes tenebat: Tertius utriculos revolvebat, qui medii inter anum, ac pudendum, prominent, tam in mare, quam in scemina, in horum cavitate scaturiginem suam liquor ille Zibethicus, consistentia prorsus mellea, sumit. Hic extrahitur immisso auriscalpii majoris simili instrumento, quod per cavitatem quaqua versum sapiuscule revolvitur. Hoc ubi in uno, atque altero folliculo præstitisset, gossypio utriusque pilos, qui curti sunt, abstergebat. Ac ubi sexties forsitan cochleari illo

illo parvo utrumque utriculū emundasset, tantum ferme Zibethi collegit, quantum avellanae nucis cortici implendo satis esset. Addebat idem D. de Corduba æstate liquidiorē, quā hyeme succum colligi, ita ut in caloribus illis, singulis binis diebus semuncia corraderetur: hyberno vero tempore, vix semel in septimana succum illum, nec tantam ejus quantitatem acquiri. Ex femina postea minus Zibethi educebat, quæ ceteris facta nullatenus repugnabat.

Substantia.

Zibethi substantia videtur esse pinguis, & unctiosa: nam in aqua ebulliens superiora petit, & ab heterogeneis separatur: consistentia Mellis, seu Butyri est: liquidius æstate abstractum, vel recenter, temporis processu in crassatur. ego extraxi à folliculis animalis demortui ultra drachmas duas, colore albido, & mellis liquidioris consistentia. Scaliger (& cum hoc Renodeus) dixit esse odoramentum pingue, crassum, nigri saponis facie; sed vidit in superficie, & antiquatum. Amatus vero, quum recens est, inquit, tetri, & horribilis est odoris, postea vero successu temporis gratum spirat odorem. Quadramius Zibetho contrarium accidere, Ambræ, & Moschi, hæc enim quo recentiora, eo præstantiora, Zibethum autem vetustius, melius F. Donatus ab Eremita lib.

Qualitates.

1. Antidotarii cap. 10. optimum, ait, esse leonino, ac sub pallido colore, pingue, moderate liquidum, tempore crassescens, papyro impositum, & confricatum solubile sine corpore, quo distinguitur ab adulterato. Idem Frater Evangelista Quadramius lib. de Theriaca c. 11. scripsit: Masculi Zibethum albido est colore, femellæ vero leonino, post hebdomadam ab Animalis extractum, tempore procedente obscurum apparet, cum tamen & ipsum initio album spectetur, sed citissime fulvescat, præstans sic evadat. feminei Zibethi uncia valet quantum Masculi uncia quatuor: ita admista uncia una feminini, sex masculini uncias ambo perficiuntur, cum masculinum solum absque feminino parum valeat.

Adulteria.

Adulteratur variis modis, admisto Butyro, vel pulpa passularum majorum, seu Zibibi, & aliis rebus. Frater Evangelista Quadramius l. de Theriaca cap. 11. Zibethum adulteratur Adipe rancido, vel Butyro, vel caseo. sed si hujusmodi parum impositum fuerit cochleari argenteo super prunas, adulteratum reddet suæ missionis odorem, vel casei, vel adipis, vel butyri rancidi, legitimum vero suavissimum odorem. Sed legitimumne, an adulteratum sit, ex F. Gregorio scribit Faber, cognosci, quia infusum in vas in quo aqua bullit, statim, quod heterogeneum, & Algaliæ admixtum fuit, fundum petit, Zibethum autem sincerum aquæ superficiem innatat. Nos dicemus admixtum cum Butyro, vel alia re pingui, non posse separari dicto modo: sed percepimus etiam aliquando in ipso odorem Butyri rancidi, butyrum enim veterascens corrumpitur, & odore rancido

Legitimum

femet ipsum manifestat. Solet etiam optimum Zibethum acquirere colorem, veluti telam quandam fuliginē, sed in profundo albescit; quod vero adulteratum fuit, ejusdem est coloris in profundo, ac in superficie. servatur in vitro, non alibi.

CAPUT X.

De usu, & facultatibus Zibethi.

Duplicis est usus Zibethum, vel odoris Cautio. gratia, vel facultatum. odorem tantum respiciunt Myropolæ, Medici facultates.

Cautè dicunt Myropolæ adhibendum esse in compositionibus aromaticis Zibethum; nam suo valido odore alios superat; unde odorata unguenta ex multis conflata Zibethum tantum redolent. *Pulvis Zibethi simplex* Pulvis Zibethi. apud Alexium fit ex saccharo candi, & Zibetho simul in pulverem redactis, qui servatur vase vitreo optime clauso. Rosellus fumit Ovorum cortices lotos, & ficcatos, in tenuissimum pulverem redigit, & cuilibet uncia addit Karaetos iij. Zibethi. Karaetus autem pendet grana iij. vel recipit cortices præparatos ovorum duarum unciarum pondere, infundit in aqua rosacea Moschata 10. vel 12. diebus, eos exiccat, terit, & cribrat in tenuissimum pulverem, addit pulveris sacchari fini unciam unam, tunc Mortarium æneum prunis ardentibus intropositis calefacit, quantum tactu ferre manus possint, inde absterfo mortario imponit pulverem corticum, levigat pistillo, & addit Zibethi Karaetos iij. paulatim miscendo inuncta pistilli summitate, sic levigat spatio unius horæ, postea in vitreo vase bene clauso servat. quo pulvere aspergemus dealbata linteamina, subuculas, & alias vestes.

Sapo odoratus fit ab iisdem auctoribus, accipiendo saponem communem optimum, secant subtiliter, & exiccant ad solem, vel in umbra per 10. dies, tundunt, & cribrant in pulverem tenuem, tunc addunt Zibethi pulverem, & aqua rosacea uniunt in solidam formam. Sapo.

Fiunt etiam ex Zibetho olea, unguenta, & suffumigia, quæ describere supersedebo. Odoramenta.

Quoad vires medicas; F. Gregorius de Bolivar apud Fabrum, Pellis, inquit, ventris Vires Pellis. ipsius est saluberrima in omnibus frigidis affectibus. Ventrículum præcipue roborat, si frustulum ex hac eidem imponatur, & quotidie gestatur. Nigri illi Guinæ, & Brasilienses barbari hujus quoque animalis carnibus vescuntur, utcumque sit pessimi odoris, & digestionis durissima, quam ad venerem tamen præstare maximum stimulum affirmant. Sed Hyenæ pellis ad morsum canis facit ex Scribonio Largo cap. 171 Pervenit ad me opinio, inquit, esse in insula Creta barbarum quendam naufragio appulsum, majorem natu publice mercedem accipientem. Quin etiam

etiam quum liquorem timent, & latratus edunt
 spasmoque vexantur: remedium brachio sinistro
 alligato efficere, ut & potionem accipiant, &
 librentur vitio. Hoc ego cum quaerem ab ho-
 spite meo legato inde misso, nomine Zopyro, Gor-
 diense medico, quod esset pro magno munere, ac-
 cepti. dixit autem Hyena corii particulam esse
 panno inligatam: quod eo adhuc non sum exper-
 tus, quamvis protinus magna cura Hyenam
 invenerim, & pellem paratam habeam: quia
 non incidit ex eo quisquam, & opto quidem ne
 incidat: sed quia id non est in nostra potestate, si
 casu inciderit, remedium habere oportet ad
 rante rei experimentum, & Marcellus Empi-
 ricus cap. 36. Vituli marini, aut quod melius
 est, Hyena pelle facta calcamenta si quis in quo-
 tidiano usu habuerit, efficaciter podagra morbo
 carebit. sic etiam Aëtius ferm. 2. cap. 162. Hye-
 na pellem quidam domi repositam adservant,
 & usu expetente ipsam à rabioso cane commor-
 sis circumdant. Nam proprietate quadam pro-
 hibet, ne commorsus in aque timorem delabatur
 sed etiam illapsis auxiliatur. supra fidem au-
 tem est, quod refert Nonius cap. 259. de
 fulminib. scribens, à fulminibus dictas pelles
 homines tueri, & præservare, his verbis:
*Phocæ pellis, & Hyenæ: Quorum animalium
 pelles etiam imperatorum Naves circumse-*
runt.

Avicenna.

Zibethi autem liquorem equidem affir-
 marem Avicennæ fuisse cognitum, & de eo
 egisse lib. 2. c. 326. nomine Galix & Algaliæ.
 quo loco non potest intelligere Galliam
 Moschatam, quia loquitur de medicamen-
 tis simplicibus, non autem de compositis.
 Alia verò res est Algalia, & Sedervam Se-
 rapionis, quæ succus herbæ frigidus, &
 astringens est, ut Acacia, quod etiam ani-
 madvertit Lusitanus in Dioscoridem. Porto
 Simon Ianuensis Zebeth esse Avicennæ Ga-
 liam censuit, & animalis Arabici fudor m.
 Adde quod vires ab Avicenna Algaliæ tri-
 butæ nulli alteri rei, quam nostro Zibetho
 conveniunt. scribit namque Avicenna: *Galia
 lenit apostemata dura. Dissolvitur in Oleo Ben,
 aut Keiri, & destillatur in aurem dolorosam, &
 ejus odoramentum confert epileptico, & vivi-
 ficat eos, & sedat sodam frigidam, & quando
 datur de eo in vino, inebriat. Odor Galix confor-
 tat cor. Algalia confert doloribus matricis fri-
 gidis supposita, & apostematibus ejus duris, &
 phlegmaticis, & provocat menstrua, & facit
 matricem descendere præfocam, & inclina-
 tam, & mundificat eam, & preparat ipsam
 ad imprægnationem.* quæ omnia Zibethum
 peroptime præstat; non differt Galia,
 ab Algalia, quia al est articulus apud Ara-
 bes.

Tempera-
mentum.

Matthiolus calidæ, & humidæ facultatis
 esse censuit: contra Cardanus animalium
 odorata excrementa valde sicca pronuncia-
 vit. Renodeus, & Amatus Lusitanus odo-
 rem Zibethi Moscho affinem dicunt, sic &

qualitatem, at Moschus ex Avicenna est ca-
 lidus, & siccus in secundo gradu. Quod si
 Animalis sudor est, quum sit Animalis cali-
 dissimi, & tempore calidissimo abundans;
 immo in animali ira, & motu calefacto; di-
 cendum videtur Zibethum esse substantiam
 biliosam, calidam, & siccam, facultate dige-
 rente præditam. sed quia sapor à nemine,
 quod sciam, est degustatus; ideo ex hoc ni-
 hil colligere possumus certi. Galen. 10. de
 simp. med. fac. agens de sudore, illi misceri
 interdum dixit nonnihil bilis, ita ut aliquan-
 do falsus, aliquando amarus appareat sudor,
 unde quum Civetta sudans, & bilefcens co-
 piofiorem reddat Zibethum, huic sudori
 nonnihil misceri bilis opinabimur: quare
 succus erit facultate calidus, & siccus, & for-
 tasse amarus, & acris. Et quum sudantium
 fordes facultatem habere expertus fuerit Ga-
 lenus digerentem, ita ut in phlegmone ube-
 rum fuerint efficax remedium; præterea ad
 Bubonem iisdem usus, celeriter disparuisse
 tumorem, conspexerit. Hinc Avicenna Zi-
 bethum, seu Algaliam dura apostemata leni-
 re scripsit. Sed partium genitalium videtur
 proprium, iisdemque dicatum pharmacum,
 de quo Castor Durantes ita cecinit:

Zibeth ca-
lidum, sic-
cum.Castor Du-
rantes.

Zibethi Veneris crescunt solatia odore,

*Adjuvat hoc uterum ne præfocetur, &
 inde*

*Est adeo vulva gratum, ut proclives ad illud
 Quamvis ad motum irrepat.*

Ruellius vero, si cavernula, inquit, umbi-
 lici admoveatur, tradunt conversum in alteru-
 tram partem uterum in suam resilire sedem:
 aut si sursum versus impulsus opprimat, subdi-
 to eo devocari, tam amans hujus odoramenti
 vulva, ut ad id undecunque admotum irrepat.
 idem tradit Matthiolus, Renodeus, Ama-
 tus, qui etiam pessos adaptat. Hoc etiam u-
 tuntur ad uteri strangulationem L. Marcatus,
 M. Pascalius, G. Bruelius, Schenckius, Hol-
 lerius, Altimar, & Capivaccius. Ad uteri
 prævocationem malignam commendat Jo.
 Colle. eodem etiam utuntur Rafis, & Vale-
 scus Algaliam vocantes. Rod. à Castro lib.
 2. de Morb. Mul. cap. 1. ad strangulatus
 uteri, inungit os vulvæ oleo aliquo odora-
 to, admisso uno, vel altero grano Zibe-
 thi, utitur etiam ejusdem suffitu ad uterum.
 & lib. 3. cap. 1. ad sterilitatem, ex Zibe-
 tho suffitus facit utero. item cap. 2. facit
 linimentum; & cap. 4. os uteri Zibetho in-
 ungit. Hæc autem vis experientia confir-
 mata, signatura videtur esse indicata; quum
 enim gignatur in animalibus particula, quæ
 uteri, seu vulvæ quandam formam habet,
 videtur per id natura nobis indicare voluisse,
 hujusmodi succum ibi genitum habere
 maximam proprietatem cum animalium
 vulvis.

Ad uteri
strangula-
tus.

Et quia Zibethum abundans in folliculis
 Animalis, irritat ipsum ad sui excretionem,
 vide-

Ad coir. m.

videtur per id natura nobis significasse ipsius vim ad coitum incitandum, proinde, inquit Matthiolus, *nec mirum est, si eo viri penicircumlito magnum mulieribus in coitu afferunt solatium*. Sic Amatus Venerem incitari scripsit pudendis illitis. At Cæsalpinus lib. 8. de mor. cap. 9. ad conceptum: *Ut autem avidius (inquit) uterus semen suscipiat, ajunt Zibethum glandi illitum in coitu voluptatem mulieri adaugere, unde alacrius semen admittit*. Gattinaria scripsit, ad præfocationem Matricis valere Zibeth, vel Zebeth, quod applicatur inuncto digito obstetrici, & in vulvam immisso, & subdit: *De quo semel usus fui in muliere quadam patiente præfocationem, cui causavit tantum appetitum coeundi, quod quasi continuè volebat marito suo copulari; deinde rogavit me sibi vellem talem appetitum removere, dixi quod ex se removebitur post aliquot dies. Et nota, quod si vir, quando vult uti cum muliere, ponat in summitate virgæ de dicto Zibeth, & subito utatur, causabit in ea maximam delectationem*. utuntur etiam eo ad delectationem mulieri præstandam Capivaceus, Fumanellus de comp. med. cap. 54. & alii.

Ad impotentiam coeundi, Rod. à Fonseca consult. 10. Zibetho oleo de Ben dissoluto inungit penem, & testes. Fallopius, & Bellocatus apud Trincav. lib. 4. conf. 78. Capivacc. ad Epilepsiam cujusdam fœminæ. Salomon Albertus apud Jo. Philipp. Brendelium conf. 19. cerotaria ex Tacamahaca, cum Zibetho in eorundem meditullio subligare fecit ossi sacro. unum in confinio hujus, & lumborum, & unum è regione sub umbilico. eadem Cerata etiam applicat Hystericæ, conf. 99. sed conf. 98. in suffocatione uteri. Oleum liliorum alborum cum Zibetho, & Moscho subdit mulieri in gossypio. Præterea Felix Platerus apud eundem conf. 102. ad juvandam conceptionem jubet inungi pettinis regionem noctu cubitum ituræ ex quodam linimento, cui Zibethi scrupulum semis miscet, & subdit: hujus magna est utilitas affectibus uterinis, ut sint, qui credant, hoc solum sterilitatem uteri corrigere posse. & Daniel Mylius lib. 1. Antid. Medicochym. in fin. *Zibeth*, inquit, *Colica stercora expellit*. Sed Hollerius ad colicam ab humore frigido. *Æ Civetta gr. iij. aut vj. dissolve oleo rutaceo, inungatur venter*: Greg. Horstius lib. 4. observ. 12. colico linimentum ex Theriaca cum pauxillo Zibethi ad inunctionem umbilici: Solenander sect. 3. conf. 28. in colica pituitosa, *Zibethum*, inquit, *utiliter umbilico infricatur, & inungitur: vis enim ipsius penetrans calorifica promptè se in interna insinuat, & quicquid nebulosum est, discutit, ac dissolvit, quod humidum est, siccatur, & mediocriter ita usurpatum calefacit*. quod repetit ex isto Camerar. de Mirabil. cent. 4. num. 46. Erot. de pass. mul. c. 4. *ad suffocationem, super omnia est inunctio facta ex Zibetho intus, & extra vulvam, quia menstrua at-*

trahuntur, & provocantur. etiam Mercur. de morb. mul. lib. 4. cap. 10. Paræus de hom. gen. cap. 48. Vidiu de cur. membr. lib. 11. c. 21. Capivacc. Hystericis inungit pudenta Zibetho, vel Mariti penem.

De Catti Zibethici felle, pinguedine, & oleo ex ipso incocto, nihil apud recentiores legimus; sed apud antiquos nonnulla extant de Hyæna ipsorum, ut ex Gal. 2. de comp. med. loc. cap. 7. Asclepiades in Collyrio quodam liquido Basilis habet felle Hyænæ. in alio Antonii Musæ, & alio Philoxeni. Sed Ælianus de Hist. Anim. lib. 6. c. 46. Ibis felle, inquit, Hyænæ interimitur & 1. de comp. med. loc. cap. 1. Galenus ad Alopeciam Hyænæ adipem laudat, quia tenuium partium substantiam habet, quæ promptè in cutis profundum penetrare queat, atque ad radices usque capillorum pertingat. denique Ætius serm. 2. cap. 164. *idem facit, & Hyæna tota oleo velut vulpes cocta*. Olei vulpini multas dotes enumerat, quæ Hyænæ oleo etiam convenient. demum cap. 194. *Hyæna viva* inquit, in oleo cocta, velut de Vulpe dictum est, oleum discussorium efficit, arthriticis utilissimum.

CAPUT XI.

De ossibus Civetta.

Restat ultimo loco proponendum de Animalis ejusdem Scheleto à me parato, quod apprime utile erit istius naturam investigantibus; in hoc enim cognoscetur ossium dispositio: unde licebit conferre cum Scheleto Canis, Vulpis, Lupi, Felis, & aliorum animalium, ut percipiatur similitudo, & dissimilitudo cum dictis animalibus.

Quum in omnibus animalibus non idem sit vertebrarum spinæ numerus: in nostra Hyæna odorata 49. numerantur. at Sui, & Erinaceo 4. tantum sunt, Equo 8. Camelo 15. collum enim constat sex vertebris; ut in Canibus. hinc thorax assumit sibi duodecim, more solito, ad sunt in dorso septem alia, ut Cani, & c. at Erinaceo 8. Cuniculo 10. demum Cauda constat viginti quatuor ossiculis. In Cane numeravi 15. tantum. In Maxillis, dentes incisorii sunt sex utrinque, admodum parvi, ut in Catopardo, & Canibus, his proxime accedunt canini dentes magnitudine, & forma, ut in canibus. molares autem utrinque sunt sex, quorum primus prope caninos cæteris minor spectatur, ut penultimus, ex his, major omnibus est.

Effigies potius Cani, & hujus generis similibus, quam alteri generi assimilari videbatur; & hæc breviter dicta sufficiant de Anatome. Excuset autem nos lector, si nihil observavimus interiora secando; quia talis erat viscerum putridorum fœtor, ut nausea excitata in meis discipulis præsentibus nempe in Doctore Dominico Panarolo, secante, & aliis adstantibus, celerrimam sectionem vix permetteret.

INDEX CAPITVM HISTORIÆ

D E

HIÆNA ODORIFERA.

Exetasis, siue Cap. I. De Hyæna Odorifera,
Zibethum gignente, quæ Civetta vulgò ap-
pellatur.

CAP. II.

An Civetta sit Paradalis Antiquorum?

CAP. III.

An sit Antiquorum Hyæna?

CAP. IV.

Sub quo animalium genere sit reponenda Ci-
vetta?

CAP. V.

Ubi Hyæna nascantur?

CAP. VI.

De Vasculo Zibethico.

CAP. VII.

De Castoreo.

CAP. VIII.

Quid sit Zibeth?

CAP. IX.

De collectione & electione Zibethi.


CAP. X.

De usu & facultatibus Zibethi.

CAP. XI. & ult.

De ossibus Civette.





HISTORIÆ NATURALIS
DE INSECTIS
LIBRI III,
DE SERPENTIBUS
ET DRACONIBUS

LIBRI II,
Cum æneis figuris,

JOH. JONSTONVS,
MED. DOCTOR,
consecravit.

AMSTELODAMI,
Apud IOANNEM IACOBI FIL. SCHIPPER. MDCLVII.



ILLUSTRISSIMIS ET CELSISSIMIS
PRINCIPIBUS ET DOMINIS,

DOMINO

GEORGIO,

DOMINO

LUDOVICO,

DOMINO

CHRISTIANO,

D. G. DUCIBUS SILESIAE,

Lignicenfibus, Bregenfibus, Goldber-
genfibus, &c. &c. &c.

DOMINIS ET PRINCIPIBUS SUIS
Gratiffimis:

Hanc HISTORIAE NATURALIS de INSECTIS
partem, fideliffimi obsequii monumentum, offert, utque
sibi & fuis fubditis clementiffimè favere dignentur, demiffè
orat, Illuftriff. Celfitud.

Fideliffimus Client

JOAN. JONSTONUS
Med. D.

* 2.

PRÆ-

FRA-
TRI-
BUS:

P R Æ F A T I O

Ad Libros

DE INSECTIS.

Nomen.



INSECTORUM nomine animalia illa exanguia intelligimus, quæ incisuras parte sui vel supina, vel etiam prona, vel etiam utraque habent, & corpore intus forisque duro constant. Aristoteles *ἐνμα* vocat, ab incisuris, quæ nunc cervicum loco, nunc pectorum, atque alvi procinctu separant membra tenui fistula coherentia. Albertus *annulosa* dixit, quod corpora quibusdam quasi annulis distincta gerant. Imperfecta ad sanguinea si comparaveris dici possunt: nec enim tanto partium apparatu stipantur: si in se considerentur, quia nulla re ad

Plin. H. N. l. 11. c. 1.

Arist. H. A. l. 4. c. 7.

Partes. naturam suam pertinente destituuntur, perfectissima jure dixeris. *Partes* si attendamus, Antennas quædam in *capite* gerunt, quæ in Lucano cornua potius vel forcipes propter duritiem vocantur: nullas alia habent. *Oculi* in omnibus patent, illique duri, ut quasi per membranam vitri modo trans lucidam cernant; mobiles iidem, ut, cum ob duritiem hebetius videant, clarius, splendore recepto videant. Nec *genæ* ipsis, nec *palpebræ*.

Plin. H. N. l. 11. c. 27. 37.

Aristot. de part. lib. 4. c. 5.

Aristot. de gener. l. 4.

Plin. H. N. l. 11. c. 4.

Aristot. de part. lib. 4. c. 6.

Arist. H. A. l. 4. c. 7.

Arist. H. A. l. 8. c. 7.

Plin. H. N. l. 11. c. 48.

Generatio. Arist. de gener. lib. 1. c. 16.

Lingua quibusdam mollis & infirma, dura & valida omnibus, quibus non in alvo aculeus est. *Dentibus* carent, quæ cibo utuntur humido; de quibus ut & aliis cibo accommodatis ita Aristoteles: *Partes quæ cibum administrant, non pari ratione datæ omnibus, sed plurimum differunt. Quibusdam in ore est, quod aculeus appellatur, quasi compositum, ac una lingua & labiorum obtinens potestatem. Quibus autem aculeus non parte priore habetur, iis intra dentes tale sensorium continetur.* Ventrem, nonnulla habere advertit iidem, à quo reliquum intestinum vel simplex vel replicatum proficiscitur. Viscus nullum est, nullum etiam pingue: nec ossa, nec spina: naturam inter carnem & nervum mediam obtinent. Cute omnia circumdantur, sed admodum tenui. Brevissimè hæc Plinius. *Imperfecta ut intelligi potest, non videntur nervos habere, nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pingua, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, ut quædam marina, & quæ jure dicatur cutis: sed mediæ cujusdam inter omnia hæc naturæ, corpus arenti simile, nervo mollius, in quibusdam partibus siccius verius quàm durius.* Pennas quædam habere, quædam non, in textu dicemus, de varietate in differentiis. *Ε'λ'αργον* dicitur crusta quæ pen- nis supervenit, easque vaginæ instar condit. *Caudam* solus scorpio, si Aristotelem sequimur, habet. *Senectam* exuere suetum illis quorum pennæ vagina continentur. *Pedes* quibus sunt in obliquum moventur: quorundam extremi longiores foris curvantur. Quæ verò saliant, vel crura posteriora habent longiora, vel gubernaculis quibusdam saltui accommodatis fulciuntur, retrò curvatis. Causam apud Aristotelem invenies. *Pedes, inquit, priores longiores nonnulla ex illis habent, ut quoniam propter oculorum duritiem non exquisitè cernunt, cruribus illis longioribus incidentem molestiam abstergant & arceant.* De numero sciendum, plures habere quæ pro corporis sui longitudine plurimum frigent; pauciores, quæ volucres. Pennarum adjumento pedum inopia compensatur. Partim spontè partim per coitum generantur. Culices & vermiculos nec coire, nec ex animalibus nasci, Aristoteles habet. Ut mas in coitu foeminæ inferat, visum paucis, nec adeò exploratum habetur: mirumque genitale oblongum foeminis, quo genitalem auram à mafculo hauriant. De illis quæ vermem generant ita Aristoteles: *Generant & vermem insecta, quæ vim obtinent generandi, & quæ non per coitum, sed sponte naturæ oriuntur, ex tali Origine consistunt. Nam & Erucas genus esse vermis censendum est, & fætum araneorum, quanquam propter figuræ orbiculatam speciem, similia ovo, tum eorum nonnulla & alia complura primordia esse videantur. Verum non figura, nec mollitie aut duritie ovum definiendum est. Sunt enim conceptus nonnullorum duri, quamvis ovo diversi, sed quod totum mutetur, nec ex parte animal gignatur, id vermis est. Omne autem hoc vermiculi genus, ubi suæ magnitudinis finem receperit, quasi ovum efficitur. Indurescit enim putamen eorum, & tantisper immota redduntur. Quod in vermiculis apum & vesparum atque etiam in erucis apertum est. Cujus rei causa est, quod Natura pro sui imperfectione quasi maturans antequam tempestivum sit ovum pariat, tanquam hic vermis ad incrementum ovi molli adhuc pergat. Hoc eodem modo in cæteris evenit omnibus quæ non coitu generantur, vel in lanis, vel aliis hujusmodi, atque etiam in aquis. Omnia enim post vermis naturam motu cessant, & putamine obarescunt. Mox rupto putamine exit veluti ex ovo animal, tertia perfectum generatione, idque pennatum quod jure multi mirentur. Erucæ enim quamprimum capiant cibum, mox non capiunt, sed motu cessant, quæ per id tempus Aureliæ à nonnullis vocantur.*

Vesparum

Vesparum etiam vermiculis, & Apum, idem accidit. Post deinde, quæ Nymphæ appellantur, proveniunt, quæ nihil huiusmodi habeant. Ovorum enim natura, adepta suum finem, non insuper accrescit, sed ante augetur & alitur, donec distinguatur, & fiat ovum perfectum. Vermium autem alii hoc intra se habent, unde excrementum ipsis nutriendis accedat, ut Vermes apum & vesparum: alii de foris capiunt, ut Erucæ & ceterorum nonnulli vermium. Diu coitus durat, tardo digressu se junguntur: brevique maxima sui parte pariunt. Emissionne semen incertum est. Quot diebus generatio absolvatur, apud Aristotelem habemus. Maximæ partis ternis septenariis aut quaternis ut in oviparis describitur. Septem ab initu concretionem & consummationem ovi sibi vendicant: reliquis tribus septenis incubant & excludunt, ea scilicet quæ suo procreant foetu, qualis est araneus. Quoad motum nota, repere, ambulare, volare, &c. Omnia pluribus motuum quam sanguinea generibus moveri, utpote quæ in frustra divisa, mutilatis corporibus satis diu vivere possunt. Spirent necne non convenit inter authores. Negat Aristoteles, & perfrigerari duntaxat voluit.

At Plinius. Non video cur non magis possint non trahere animam talia & vivere quam spirare sine visceribus: quod etiam in marinis, (addit) docuimus, quamvis arcente spiritum densitate & altitudine humoris. Pulmone carere, nec refrigerio cum sint frigida indigere, certum. Quorsum itaque respiratio? Murmur quod Apes & Muscæ edunt, interioris spiritus agitato accidit. Quæ canere videntur, membrana septo transverso subdita, ad quam spiritus inclusus atteritur, obstrepunt. Exanimantur sub aquis multa, in cineribus reviviscunt, non quod inspirare non poterant, sed quod interior ille spiritus ab humore suffocatus fuerit, quo per calorem discusso, sibi restituitur. Odoratus quisquis in illis, nativo spiritu ipsorum corporis perficitur. Nec enim sensorio carere, si sensus adest, dicendum est. Vocem edere quis dixerit? sonum ex interioris pelliculæ attritu. Locustæ suis se atterentes gubernaculis sonant. Diverfus tamen is: Murmur edunt apes: cum attritu stridorem Cicadæ. Et quia hoc genus intus sonum habere visitur, hinc Enceladum insecti genus appellari Grammatici adstruunt. Universim Bombycia à bombo diceret. Tenaçorem præ sanguineis sortita vitam non est quod dubites, ea inprimis quibus longum corpus est, & pedes multi, ut in Centipeda videre est. Singulare illud quod in agro Liguriæ Augustinus observavit. Secti per medium vermis partes à vulnere tanta celeritate in contraria discessere, ac si duo diversa animalia fuissent. Causam ad multiplicem principii eorum partem referre videtur Aristoteles. Subito intereunt, & vel solius olei aspersu encantur, quod viscositate huius angustissimis per naturam meatibus occlusis, spiritus intercipiatur.

Differentiæ sunt innumeræ: præcipuæ à loco in quo nascuntur & degunt, quantitate, qualitate, partibus, victu, generatione, coitu & gressu, sumuntur. Locis variis gaudent. In igne oberrat pyrausta ut Plinius vocat: in nive vermes hirti & rubidi: in aquis marinis scolopendra, pulex & alia: in dulcibus hircines, scarabæorum quoddam genus corpore lato, compressoque, quod & in fundo reptat. In terra oriuntur vermes, lumbrici, iuli, &c. Sæpè etiam intra fossilia invenias. Plantæ inprimis diversi generis insecta ferunt. In arborum caudicibus reperies Cossos & Terebines; in ficu Ceraften; in olea plantata ubi effossa quercus, Ranam vel Raucam vermem; in sorbo, vermiculos rufos, pilosos; in vitibus Butyros, ut Tullius vocat; & Ipes, qui verno tempore, Austro spirante orti, oculos vitium erodunt; & Involvulum, qui in pampini foliis intortis se implicat: nihil de Volucella dicam, quæ in vino nascitur. Cupressum & esculum infestant Galbæ, à quibus Sulpitiorum genti cognomen: Evonymum quoddam erucarum genus, quod frondibus absumentis emoritur: vesiculam ulmi psenit: coccum, bestiola Conopi similis, quæ fructu matrescente erumpit: gramen, Crotones: dipsaci fructum, vermis, qui portatus quartanam solvere dicitur: solani folia vermis viridi & croceo colore distinctus, cornu in fronte gerens, digiti longitudine: porrum Prassocurides: brassicam Crambides: Asphodelum vermes in volucres bestiolas flosculorum specie degenerantes: malvam cimices agrestes: rutam perniciosi vermiculi. In frugibus quoque peculiariter oriuntur insecta. In tritico namque occurrunt Curculiones: in farre vermiculus teredini similis, quo cavo dentium cera incliso, vitiati cadere dicuntur: in faba, Mida: in lente & aliis alii. Nec exsortia insectorum animalia. Lendes & pecudiculi caput humanum infestant: in manibus sub cute pedicellus vulgò dictus oritur. Dracunculi Ægypti & Indiæ incolæ, in cruribus & brachiorum musculis infestant. In ovibus sunt Ricini: in bubus & canibus Cynomia: sub lingua littæ. Mullum piscem affligit scolichia: Cyprinum, primo nativitatis anno vermiculus quidam niger circa branchias. In percis fluviatilibus duodecem ceu uniones ervi magnitudine generantur, carnosus, candidi, quibus singulis vermis gracilis, oblongus, & teres inest. Gobius piscis vermibus quos in ventre gestat vitiatur. Leuciscus lumbricis candidis, latis, qui se intestinis & visceribus circumvolvunt. Nonnullis aliis minuta quædam animalcula quæ partum expellunt innascuntur. Carnes sale inveteratæ blattas gignunt. Taceo ipsa insecta, ex quibus generantur alia. In Apum sanè alveis Clerus, qui aliis Pyranas, invenitur. Obnoxia denique huic malo & artificia lia. Terebines inprimis vestibus nasci Plinius as-

firmat.

Plin. H. N.
l. 11. c. 28.

firmat. Tineæ in lanificio producuntur: in libris blattæ: ubi & bestiolam scorpioni similem, chelas brachiave forcipibus bifulcis dentata habentem, invenies. Inter *Qualitates* maximè *Color* occurrit. Alia enim simplici duntaxat tinguntur: alia vario, ut in papilionum & Erucarum inprimis generibus. *Quantitatem* & figuram si attendas, sunt parva, magna, rotunda, ovata, angulosa, hirta, glabra, &c. A *Partibus* plurimæ sumuntur, *alis* inprimis, *pedibus*, *lingua*, *dentibus*; & *aculeis*. Alata sunt quædam, ἀπτερες nonnulla: aliqua mutata forma alata fiunt, ut Erucarum genus, quod postea in alatos Papiliones transit. Ex illis sunt alia Celeoptera, quæ alas velut in vagina recondunt, *vaginipennia* Plinius dixit, ut Scarabæi, Cantharides, &c. alia semper conspicuas & apertas gerunt ut Muscæ, Apes. Εἰς αὐτῶν Philosopho crusta illa dicitur, quæ pennis supervenit. Sunt & alia bipennia, alia quadripennia. De quibus ita eleganter Plinius: *Insectorum quædam binas gerunt pennas, ut Muscæ: quædam quaternas, ut Apes. Membranis & Cicadæ volant, quaternas habent, quæ aculeis in alvo armantur. Nullum cui telum in ore pluribus quam binis advolat pennis. Illis enim ultionis causa datum est, his aviditatis. Nullis eorum pennæ reviviscunt avulsæ. Nullum cui aculeus in alvo bipenne est. Quibusdam pennarum tutelæ crusta supervenit, ut Scarabeis, quorum tenuior fragiliorque penna. His negatus aculeus etiam. Invenias inter ea & ὁλόπτερες totipennia seu totala, quæ alas habent non scissas ut Apes & Vespæ. Papiliones farinaceas habent. Pedum ratione Apodes sunt Lumbrici, Multipedes Centipedæ & Millepedæ. Haud pauciores sex plurima habent. Lingua aliis mollis infirmaque: aliis dura & valida, ut Tabanis, Asylis, &c. Omnibusq; data quibus aculeus in alvo non est. Dentes haud pauca habent: Non habent illa quæ humido cibo vescuntur. Aculeus quibusdam in ore est, linguæ ac labiorum potestatem obtinens: quibusdam in alvo est. Nos Omnia in *Terrestria* & *Aquatica* distinximus, utraque in *Pedata* & *Apada*, prout in Historia videre est. Et hæc sunt quæ de Insectis in genere dicere volui. Usum sub singulis speciebus prosequemur. Historiam Animalium, plantarum excipiet historia, cum figuris æneis, cujus gustum ante quinquennium dederam. Tu Benevole Lector, fave, & felicem successum, cum prospera valetudine nobis apprecare, ut & hoc opusculum, bono literariæ juventutis coeptum, absolvere possimus. Dabam Lesznæ ex Museo 10. Junii, Anno M DC LII.*

ADMONITIO ad Bibliopægum, quo quævis Tabula loco suo sit inferenda.

TABULA I.

	pagina
II.	14
III.	26
IV.	30
V.	37
VI.	38
VII.	38
VIII.	49
IX.	52
X.	58
XI.	63
XII.	65
XIII.	67
XIV.	71
XV.	74
XVI.	83
XVII.	89
XVIII.	98
XIX.	106
XX.	109
XXI.	110
XXII.	114
XXIII.	127
XXIV.	130
XXV.	139
XXVI.	144
XXVII.	144
XXVIII.	146

In prima tabula omnium maxima est, quæ prima depingitur alis clausis & rursus apertis, à capite ad extremum alvi usque commensurata longitudine sex digitos explet, extentis verò pedibus digitos decem. Reperitur in nostris colibus nonnunquam inter herbas in locis ferè incultis. Capta acriter mordet, dolorem inferens haud exiguum. Ova mihi peperit innumera, quæ omnia animari non puto; nam si ita esset, inextinguibilis semper earum esset numerus, omnemque quotannis segetem absumerent. Volat magis, quàm salit, quam obrem pedes natura dedit anteriores nescio ad quem usum, nisi ad hærendum, cui involat, firmiter tenaciusque, crassiores, cum in cæteris posteriores crassitie præcellere soleant, ut iis insistentes facilius salituræ à terra eleventur. Toto corpore pedibusque colore vestitur gramineo viridi, alvus tamen nonnihil per intervalla rubet, potissimum in superiori parte. Differt ab aliis non sola magnitudine & ventris crassitie (crassus est autem pollicem) sed & partium quarundam situ & figura. Capite Perlam vulgò nominatam potius quàm locustas, quæ equinum quodammodo caput habent, exprimit. Dorsum gibbosum est, è priorum pedum regione longius, quàm aliis: pedes anteriores, quos diximus posterioribus esse crassiores, è principio ferè pectoris ortum suum habent, in extremo chelis astacorum more insignes subflavis, nequiquam ferratis, sed ipsi inter primum & secundum articulum insigniter ferrati sunt, ut minus horum exemplo Plinium miremur, qui ex Indicis Serras fieri tradidit. Medii sub alis oriuntur, anterioribus breviores, quibus ferè contigui postremi, omnium longissimi. Alæ intus argento resplendent, albo cinereoque variantes, in extremo virides, viridi includuntur tegmine sive vagina. Antennas è fronte exerit exiles, breviusculas, subflavas.

Ex minimis est tertio loco picta locusta, dorso ac vagina rubicundis, alvo nigra, luteis Zonis distincta, capite planè equum refert. Antennas habet brevissimas, brevissimosque pedes anteriores & medios postremos contra longissimos lutescentes.

Mediocribus adscribenda est quarta, toto corpore flavescens, tæniis quibusdam fuscis transversalibus, pedes ac potissimum postremi albo nigroque distinguuntur. Alvus coloris castanei diluti, respersa multis maculis, exiguis, fuscis. Alæ vaginæ incluse ex cæruleo diluto perpulchre admodum virescunt.

Quinto & sexto loco posita ex maximis est, medium digitorum corporis crassitie æquans, palinum ferè longa, capite vi-

ridi, nec non toto capite continiatio articulo, qui in dorsum deorsum excurrens triangulari cuspede, squamaceis marginibus cuculli cujuscpiam speciem præbet, medio acclivi, & in acumen surgente supercilio à fronte ad alarum principium, quod ipsum integit, disseptus, in cuius lateribus utrinque lacunæ quædam, seu scrobiculi in longum excavati hine ab ipso medio gibberæ, illinc exiguo tuberculo constitutæ uti inter montes valles mediæ jacere solent, colore nigro distinctæ spectantur. Ocelli, ut cancri, immobiles, nigri, minimè sphaerici, sed longiores, quàm latiores. Inter hos medios duæ non ita longæ, nempe digiti tantummodò, antennæ extant; reliquum corpus, nempe pectus latum ac compressum, ac æquabile, alvus novenis coagmentata incisuris, quæ veluti loricarum lamellæ exterius imbricatim sese excipiunt. Petilli item quaterni, nempe antici, & medii coloris cinerei, postici verò longissimi, quibus tanquam remigibus nixa sese vibrans procul salit, versicolores sunt; Femur enim nigris maculis notatur, femur verò viridi & subalbido variat. Tibia ac pediculi instar serræ dentati, dilute punicea sunt. Alæ media sui parte ultra extremam alvum in longum protenduntur quaternæ. Harum binæ superiores fusco & balio maculosæ. Inferiores ex fusco argenti splendore micant, ac à volatus officio cessante insecto, minimè ut illæ simplæ sunt, sed decuplo rugarum ordine in se complicatæ, quomodo mantilia extergendis manibus dicata & puerorum illæ ex charta laterne viæ duces multiplici plicarum serie sibi mutuò incumbentium componi solent, quas, cum ad volatum explicat, in trium digitorum latitudinem distensus est intueri.

Secunda tabula duodecim habet Locustarum diversas species. Prima è majorum genere dorsum habet colore ochræ nigris minutis punctis sive guttulis consperso. Alarum tegmen viridescit, & ejusdem coloris & magnitudinis notatur. Caput, pectus & alvus, item pedes viridi ochroque variant. Alvus in aduncum aculeum, ochræ colore definit, capite Perlis similis est. Antennas habet miræ longitudinis & tenuitatis, rubicundas subrutilas.

Num. 2. locusta capite & antennis Cochleam sive Domiportam æmulatur; capite, nisi oculi id proderent, carere videretur. Antennæ crassæ sunt, & crassæ quoque admodum femora posteriorum pedum. Alas habet corpore protensiores, undique concolor sibi, color est cinereo flavescens.

Num. 3. locusta est è genere vulgarium, unico

unicolor, viridis, præter antennas, quæ lutescunt.

Quarta tricolor Locusta vocari, potest, vulgò Frate, hoc est, Monachus nominatur, non ob colorum diversitatem, sed quod cucullata est. Caput, & collum cucullatum est, pectus & femora posteriorum pedum sunt viridia. Tibiæ verò eorundum pedum sanguinei planè coloris, cætera omnia cinerea, antennæ exiles, sursum erectæ.

Quinta ex aculeatarum sive caudatarum genere, ubique unicolor, viridis; Num. 6. ex atro cinerea, undique sibi concolor est.

Septima *α' νεγ*, Bruchus dici potest fatum illius maximæ, quæ primo loco in prima tabula spectatur, esse puto; Nam etiam gibbosa est, & priores pedes è pectoris initio è gibbi seu tuberculi regione producit, & viridis est tota.

Num. 8. ea videtur, cujus descriptionem suprâ dedimus ex Autore de natura rerum: nam aculeum habet pro cauda, ut ille loquitur, & tota viridis est, caput equino capiti simile. Tales Hollandi, ut audio, Corenmesen vocant. Tales ego pœopriè legitimas Locustas esse putem, hanc cum Cyprio ostenderem, Bruchum vocabat, quod non probo.

Num. 9. ex Atteluborum genere dici potest propter alarum brevitatem. Hæ enim alvo, quæ admodum crassæ est, comparatæ inutiles esse videntur, impotentes scilicet eam de terra attollere. Cucullum quoque habet, eumque viridem, reliquo toto corpore ex viridi, albo, flavo & nigro varia.

Decima insigni ac notabili aculeo sursum reflexo viridi insignis ex vulgariū genere est, sed differens plurimum colore. Tota alvo & dorso coloris est amethystini sive violacei, rostro viridi, fronte, cucullo & antennis, quæ proceræ sunt ac exiles, coloris ochræ, pedibus posterioribus viridibus, alis caret, Bruchus adhuc ac imperfecta Locusta.

Undecimo & postremo numero Locusta seu Attacus cinereus linea in vertice & dorso ferruginea alis exterioribus nigro & cinereo variis, cruribus postremis in femore interno & infimis tibiis phæniceo suave rubentibus, & maculis atris in rubeo colore & poplitibus distinctis.

Tertia tabula tredecim habet Locustas. Prima etiamnum Bruchus est, ejus generis locustarum, quod ceu maximum primò posuimus; nam & chelas habet in anterioribus pedibus, figura corporis, qualem figura ostendit, ubique sibi concolor, tota ex cinereo lutescens.

Num. 2. Locusta ex minimorum genere sive Attacus, sive Attelabus, capite, dorso, pectore aliisque & pedibus

è viridi lutescentibus, alvo miniacea, Zonis distincta atris.

Num. 3. Bruchus viridi & atro varius, alvi extremum habet bifurcatum.

Quarto numero datur Bruchus sive, *α' νεγ* omnium minimū, totum, viride exceptis pediculis, qui flavescent.

Num. 5. Papilionis icon est, quam suprâ dedimus inter Papiliones.

Num. 6. Bruchus est corpore tenui, totus viridis.

Septimo numero ex vulgatis Locustis maximis est aculeo admodum longo, tota viridis, per dorsum verò & alvi Zonas purpurascit.

Num. 8. ex eodem genere, sed minor & alis caret, Bruchus adhuc, supino ventre flavescit, pectore candicat, cætera viridis.

Num. 9. Bruchus est inusitatæ planæ formæ alvo fermè rotunda, sive sphaerica, assulatim compacta tota ex cinereo fuscescens.

Num. 10. Attacus vel Attelabus haud dubio omnium maximæ Locustæ capite, pedibus & dorso subflavis, alarum tegmine ad ferrugineum vergente.

Ududecima tota ferruginei coloris ex majoribus est.

Num. 12. Bruchus alius totus viridis.

Num. 13. Bruchus viridi, albo & atro varius.

Num. 14. Bruchus viridi, luteo & nigro distinctus.

Num. 1. in quarta tabula est omnium minimus, totus ex flavo ad ferrugineum vergit.

Num. 2. & 3. insolentis admodum formæ Bruchum F. Gregorius Capuccinus Regienus, rarioribus stirpibus investigandis intentus, in pratis collium nostrorum inventum ad me detulit, ut eum studiofis curiosisque Lectoribus communem facerem. Cum quiescit, ita sedet, quemadmodum prior icon exprimit, incedit verò, progrediturvé, ut in altera ostenditur. Capite cervum vel equum cristatum refert, item cauda, quæ multifida est, sed surrecta. Sub articulis posteriorum pedum tubercula habet sphaerica, corpore toto fusco, luteo & albo variat. Rarissimum est Insectum, & mihi alias nunquam visum vel observatum.

Num. 4. depictum Insectum locustacèum Bruchus quispiam imperfectus totus fuscus est, & exiguo admodum corpore.

Tres istæ separatim pictæ, cum præcedentes tabulæ eas non caperent, ex minimis sunt. Prior alis, corpore toto & anterioribus pedibus coloris cinerei, dorso viridis, pedibus postrema rubitundis; Altera per superna viridis, cætera cinerea, Postrema tota purpurea.

Aper Bienen immen



Fuci Bombij Humeln




Vespa Wesper et Crabrones Hornausen



Krichart

Cicadae



今此山有樹子者其
命如鳥雀然其木

一也其木葉如

之木其木葉如
之木其木葉如

之木其木葉如

之木其木葉如

之木其木葉如

HISTORIÆ NATURALIS

D E

I N S E C T I S

L I B E R I.

De Insectis terrestribus, pedatis & alatis.

TITULUS I.

De Anelytris, seu Detectipennibus.

CAPUT I.

De Anelytris quadripennibus.

ARTICULUS I.

De Anelytris quadripennibus membranaceis.

PUNCTUM I.

De Apibus.

DIGESSIMUS in præfatione Insecta : jam secundum præmissam seriem de iisdem agemus, de *Anelytris quadripennibus membranaceis* primò dicturi, quorum alia quidem *favificant*, ut *Apis*, *Fucus*, *Fur*, *Vespa* & *Crabro* : alia non *favificant*, ut *Cicada*, *Orsodacna*, *Perla*, & *Cimex sylvestris*.

Ab *APIBUS* incipimus, quibus inter omnia insecta principatus, & jure præcipua admiratio, solis ex eo genere hominum causa genitis. Mella contrahunt, sucumque dulcissimum ac saluberrimum. Favos fingunt & ceras. Illæ ad usus vitæ tolerant, opera conficiunt, rempublicam habent, consilia privatim, & duces gregatim : at quod maximè mirum est, mores habent. Præterea cum sint neque mansueti generis, neque feri: tamen tanta est natura rerum, ut propè ex umbra minimi animalis incomparabile effecerit quiddam. Quos efficacæ industriæque tantæ comparemus nervos? quas vires? quos rationi mediis fidius viros? hoc certè præstantioribus, quo nihil novèrè, nisi commune. Virgilius eis partem divinæ mentis & haustus tribuit. Scripsere de illis præter Aristomachum Solensem, qui duodesexaginta annis nihil aliud egit, & Philiscum Thasium, qui quod in desertis apes coleret Agrius cognominatus est; Hyginus, & quidem diligentissimè; Virgilius or-

natissimè, & Cels. elegantissimè: ut de *Meno* inter Samnites nato taceam. Aristodemum, cujus Augustinus meminit, eundem cum Aristomacho Plinii esse puto.

Latinis *Apis* & *Apes*, hæc insecta dicuntur, seu quod sine pedibus nasci videantur: seu quod examina pedibus mutuo sibi hæreant, ac firmiter sese quasi in botro teneant. Græcis est μέλισσα & μέλιττα vel à μέλι, id est, melle, cujus opifex est; vel à Μελίσσα puella, quæ cum favos melle plenos in Peloponeso reperisset, alias Nymphas ad degustandum invitavit: vel à μελίτη, id est, meditatione & exercitio, quod semper sit in opere. Hesiodo μέλιτα, ὠσμεία, & αὐθόνη legitur; sed hanc Suidas, Aristoteles & alii, crabronem potius faciunt. Apud Rulandum, ἀπὲς, ὁράδων, dicitur: apud Hesychium Φάρεθ. Stephanus μελίδας quoque vocari scripsit. Unde μελίδω, apes alvearibus condo. Epitheta occurrunt plurima. Dicuntur enim à fingendo πλατεῖς; à florum depopulatione αἰθιδωνες; à colore ξανθαί; à natali solo βεβρωῖς; ab obtusioribus aculeis σμυγ; ab alarum in aëre vibrantium sono βομβύλαι, & βομβύλοι; à loco communi ἀερίδωνες; ab aliis ἡγεμονες, ἐργόφοροι, & πλασίδες: quod cum sole & surgant & quiescant, *Solisequæ*. Theocritus λαγίαις dixit, à corporis hirsutie; Aufon. & alii *Cecropias*, quod in Attica regione primum conspectæ credantur: Virgilius, & Martialis ab Hybla monte Siciliæ *Hybleas*. Callimachus, quod omnia florum fastigia pervolitent, πύανες; Varro, quod mel conficiant, *mellis matres*.

Unicolores magis esse quam crabrones aut vespas Aristoteles prodidit: generaliter nigras, Cardanus opinatur. Tenuem earum substantiam, quia leves, facile excoqui, excoctum & humidum velut nigrum evadere. *Pennas* habent quatuor, siccas, ut cuncta volatilia insecta, pellucas, scapulis annexas, quarum postremæ minores ne remigio obessent, linguam prælongam quam foris gerunt: aculeum ventri consertum: dentes, & oculos subcornèos intus conditos, stomachum ex omnium membranarum tenuissima contextum, quo collectam mellaginem, non solum continent, sed etiani concoquunt &

A

depu-

Nomen.

Ruland. in Synonym.

Descriptio.

Cardan. de Rer. variet. l. 7. c. 28.

Mansett. l. 1. de Insect. c. 1.

Arist. H. A. l. 4. c. 7.

Ordo. Plin. H. N. l. 11. c. 5.

Virg. Georg. l. 4.

Pin. H. N. l. 11. c. 9.

depurant. Plinius *Utriculum* dixit. Imis *petiunculis* duo quasi digiti emergunt, quibus procellosis temporibus lapillum ad vibrandum corpusculum ferunt, ne per ventorum impetus abripiantur. Excrementum rubrum est: *εβύλας* Græci vocant. De Ducis seu Regis aculeo non convenit. *Quærat nunc aliquis*, inquit quasi indignabundus Plinius, *unus ne Hercules fuerit, & quod Liberi patris sepulchrum, & reliqua vetustatis situ obruta? Ecce in re parva, villisque nostris annexa, cujus assidua copia est, non constat inter authores: rex nullum ne solus habeat aculeum, majestate tantum armatus: an dederit quidem eum natura, sed usum ejus illi tantum negaverit?* Aristoteles habere, sed non uti scripsit: *Ælianus* dubitavit. At *Columella*, qui pleraque ab experientia scripsit, sine spiculo esse prodidit, *nisi quis fortè*, inquit, *pleniorum quasi capillum, quem in ventre gerunt, aculeum putet.* Ut ut sit, ad unū ictum, hoc infixio, quidam eas quæ utuntur, statim emori putant. Aliqui nonnisi in tantum adacto, ut intestini quippiam sequatur: sed fucos postea esse, nec mella facere velut castratis viribus, pariterque & nocere & prodesse definire. Nullas in novæ Hispaniæ insulis reperiri scribunt quidam: nullas in Scotia *Solinus*, in Hibernia alii, sed falso. De hac *Polydori Virgilio* testimonium habemus. In illa vidimus ipsi, & in horto hospitis nostri *Andreapoli*, summa cum jucunditate tractavimus interdum. In Africa paucas invenias, propter nimium sine dubio solis æstum, qui & flores depascit, & fontes absument. In Mycono non gigni, importatas mori, *Ælianus* author est. Frequentiores sunt in Italia circa *Paduam*, in agro *Nolano*, in *Arcadia*, *Thracia*, *Corfica*, *Sicilia*, *Attica*, *Jucatanæ*, & *Goa*. Hostilia vicus alluitur *Pado*. Hujus inquilini pabulo circa deficiente, imponunt navibus alveos, noctibusque quina millia passuum, contrario amne naves subvehunt. Egressæ luce Apes, pastaque, ad naves quotidie remeant, mutantes locum, donec pondere ipso pressis navibus, pleni alvei intelligantur, reiectisque eximantur mella. In *Nolano* frequentes esse, loci ipsius temperies & benignitas ostendit. Maxima ibi vis *Bacchi*. Oleæ nusquam generosior liquor: pomorum ut omnia genera, ita nullis secunda: æstate aura perpetua, hyme apricitas maxima. In *Arcadia* *Aristæus* *Arcas* primus mellis usum ostendit, in *Peloponēso* *Melissa* virgo. *Corficæ* incolæ longævus ideo *Athenæus* tradit, quod melle assidue vescantur. *Ovidius* ob taxi copiam venenatum facit. In *Sicilia*, *Hyblen* montem inprimis incolunt, thymi & falicum opulentissimum. Abundantia, comparisonem *Ovid.* expressit. In *Attica* in *Hymetto* monte qui & *Cecropius*, ob pascua quæ solis *Halizonis* cedunt, favificant. Hinc *Hymettia* & *Hyblæa* mella. At maximus in Septentrione earum proventus. In

Podolia & *Lithuania*, siccarum terrarum foveas melle repleti, scribit *Olaus*, in quas immanes urfi prolapsi, suffocati sint. In *Moscovia* pinus vacuas eodem abundare, apud scriptores habemus. Historiam in Historia Urfi habebis. Pascuorum fortè ubertas copiam facit, odoris suavitas, florum abundantia, saporque jucundus. Hoc quoque experimento compertum est, in locis montanis mari vicinis, propter solitos maris halitus, & flosculorum copiam, adeo propagari, ut vaga illarum examina, corticibus insidentia, objectis alvearibus, facile capiantur, modo ipsa alvearia sale mariæ & illita fuerint. Tantus illis propagandi appetitus inest, quem visalis multo uberius expleri præsentunt. De sedibus eligendis *Columellam* consule.

Creatas in principio cum *Danæo* & *Dubravio* dicerem: ex alterius corporis corruptione oriri, nullum dubium. Ex tauro, bove, vacca, vituloque putrefactis produci certum: modum *Geoponicor.* author ostendit. Hinc in descriptione *Philonii*, mel *νυκτεριον* *ταυρων* liquor filiarum taurorum, dicitur. Ex cerebro Reges & Duces, ex carnis vulgaris gigni scribunt. Nascuntur & ex spinali medulla illi; sed quos cerebrum dedit, pulchritudine, magnitudine, robore, & prudentia antecellunt. Primæ transformationis indicium, si parva & alba specie immobilia, & imperfecta cadaveri circumfunduntur. Augescunt mox paulatim, alisque sensim excrecentibus, proprium colorem consecutæ, Regem circumvallant; brevisque & tremulis, propter membranarum debilitatem & volandi insuetudinem, utuntur. Fœtus quoniam modo progenerent, magna inter eruditos & subtilis quæstio fuit. Apum coitus visus est nunquam. Alii eas coire & parere negant. Alii semen in floribus foliisque relictum, asportare ad alveos, ibique blanda incubatione perfici. Plinius ex flore *Cerinthi* colligi opinatur, *Aristoteles* ex *calandro*, *Athenæus* ex arundinis, quidam ex oleæ, immittique oculis in favos. Prodire ideo, feracibus horum florum annis plura examina: rarioribus rariore & ipsas videri. Nonnullis ex melle, seu potiore ipsius parte proveniunt. *Taxites* coire existimat, & apes mares, Reges foeminas facit: hos tempore constituto, vermiculos per examina, ut muscæ, excludere, fucos verò more serpentum incubare, & incubando, ad tempus vermiculos fovere. Hinc vermes *αδαυες* dictos melle purissimo vesci, donec in nymphas abeant: aureliarum tunc instar involutos, in cellis manere, nec vesci, nec excrementa reddere. Tandem certo die, ruptis corticibus fieri apes & ad suum quamque munus vix dumalis perfectis sese accingere. *Aristoteles*, nec ex allato semine, nec per coitum gigni opinatur: nec apes esse foeminas, nec fucos mares. Duces & seipfos generare, & aliud genus quod Apum est: ab apibus

Arist. H. A.
l. 1. c. 40.

Plin. H. N.
l. 11. c. 16.

Arist. H. A.
l. 7. c. 21.

Æli. H. A.
l. 1. c. 60.

Colum. R. R.
l. 9. c. 10.

Plin. H. N.
l. 1. c. 17.

Arist. H. A.
l. 3. c. 12.

Locus.

Polyd. Virg.
l. 13. *Hist. Anglicæ.*

Leo Nolan.
probl. 180.

Ælia. H. A.
l. 5. c. 42.

Plin. H. N.
l. 21. c. 12.

Ovid. Trist.
l. 5. *Eleg.* 7.

Mart. Epig.
l. 6.

Olaus Mart.
l. 22. c. 19.

Colum. R. R.
l. 9. c. 7.
Generatio.

Plin. H. A.
l. 11. c. 16.

Arist. H. A.
l. 5. c. 21.

Cardan. de subtil. l. 9.
Mouf. Theor. Insect.
l. 1. c. 3.

Aristot. de gen. anim.
l. 3. c. 10.

bus prodire fucos, hos nihil producere. Hinc & proportio quædam servatur, & discrimen. Duces magnitudine fucos, aculeo apes æmulantur, & vice versa. Néc mirum à paucis Ducibus, tam numerosas prodire. Nam & Leones cum primum quinque genuerint, mox pauciores generare, postremo unum, tandem nullum. Multitudinem primò apum à Ducibus gigni, mox sese paucos: illarum fœtum minorem, auctiorem suum, &c. Plinius ita de ea. *Plurimi existimavere oportere confici floribus compositis atque utiliter* (lege ex Aristotele, confici ex apportatis floribus Cerinthi, salicis alii, alii oleæ.) *Aliqui coitu unius Rex in quoque appellatur examine. Hunc esse solum marem præcipua magnitudine, ne fatiscat. Ideò fœtum sine eo non edit: apesque reliquas tanquam marem fœnas comitari, non tanquam Ducem: quam probabilem aliàs sententiam fucorum proventus coarguit. Quæ enim ratio, ut idem coitus, alios perfectos, imperfectos generet alios? Dum fœtificant, *Κυλίσσῃ* & dicuntur: fœtus *ῥέσση*, & Nympha vocatur. De incubatione, ita ex Aristotele Plinius. Quod certum est, gallinarum modo incubant. Id quod exclusum est, primò vermiculus videtur candidus, jacens transversus: adhærensque ita ut pascere videatur. (lege, deinde ita pascitur, ut adhærescere videatur) Rex statim mellei coloris, ut electo flore ex omni copia factus, neque vermiculus, sed statim penniger. Cætera turba, cum formam capere capit, nymphæ vocantur, ut fuci, sirènes, aut cephenes. Si quis alterutris capite demat, priusquam pennas habeant, pro gratissimò sunt pabulo matribus. Tempore procedente instillant cibos, atq. incubant, maximè murmurantes, calor, ut putant, faciendi gr. necessarii excludendis pullis, donec ruptis membranis quæ singulos cingunt, ovorum modo, universum agmen emergat. Spectatum hoc Romæ consularis cujusdam suburbano, alveis cornu laternæ translucido factis. Fœtus intra XLV diem peragitur. Fit in favis quibusdam, qui vocatur clerus, vel potius *κλῆρς* (vermiculus est in alvearis pavimento nascens) amaræ duritia ceræ, cum fœtum inde non eduxere, morbo, aut ignavia, aut infœcunditate naturali. Hic est abortus apum. Alveus totus arena obducitur, & favus putrescit. Addit Aristoteles, Duces subter ad favum pendentes oriri, separatim sex aut septem: fucos quoque seorsim si Dux superest, si obijt, in Apum loculamentis provenire: cæteras in concavis inisque favorum. Apum vermes dum recentes sunt, & aluntur, & sterco emittunt; donec lineamenta, sub quibus Nymphæ dicuntur receperit. Quiescunt tum contracti, nec ullo pacto se patiuntur moveri, usque dum destinatam speciem referant. Minus fœtificant, vere serotino, aut si squalor vel rubigo incidit. *ῥαδῶν* optimæ fiunt, cum mellifica-*

tur. Scaliger genitale quiddam in cellis ponere existimat, è quo Apiculæ progignantur. Creari è roribus in foliis vermiculos; pluerè ranis: quantò commodius lectum rorem illum, atque calore parentis genitali foram, tanquam ab architecto, in schadonem animari posse. Deprehensam à se cicindulam cum mare in coitu, meridie solutum obivisse. Edita sub vespere à fœmella ova, quæ intra viginti horas vivificata abiire. Visam & è grandioribus Muscis unam, quæ in vola manu aliquandiu retenta, plusculos vermiculos candidos, mobilitate propria insignes edidit. Cur non Apes pauculis horis coire possent: deinde illico parere? Vossius denique ex Belgicorum apiariorum sententia ita de propagatione Apum scribit. *Rex apum singulis in cellis semen emittit. Id est, folliculus albicans, unde prodit vermiculus ejusdem coloris, sem. papav. assimilis. Isti folliculo circumdatur ab apibus viscidus ex rore humor itidem albicans. Nempe album hoc, albumini ovi, regium semen vitello respondet. Folliculo sic viscido rore circumdato, apicula incubat gallinæ instar, ac suo id fovet calore. Ita folliculus turgescit magis & magis; donec talis fiat vermiculus, qualem pinguioribus in caseis nasci videmus. Porro sæpe quidem tardius, interdum tamen die nempe sereno, intra diem 10. vel 12. vermiculi ejus pellicula perrupta, exit apis, eaque perfectus; senis quippe pedibus, alis quaternis; pallidior tamen, & paulò post adultioribus similis. Haftenus Vossius.*

De Victu, de quo ex lege methodi nostræ ante generationem agere debebamus, si quæras, nihil venantur, sed venturæ hyemis memores æstate laborem Experiuntur, & in medium quæsitæ reponunt. Melle ergo, & si hoc nimium subtrahatur, ceragine, cerintho, erythace, sandaraca dicta vescuntur. Deterior hæc & ficum dulcedine æmulatur. His deficientibus Apiarii ficus, faccharata, uvæ passas siccatas, fucostufos, schadonum capita, lanas passò defrutove madidas, & aquam mulfam pro foribus ponunt. Crudas & recentes carnes apponi jubet Plinius. Floribus odoratis & caliculatis delectantur, ex arboribus pomorum cytisi, amygd. tamarisci, casia, ziziphi, pyri, persicæ, therebinthi, lentisci, cedri, tilia, ilicis minoris. Rhamni: ex herbis, thymi albi & rubri, fertulæ campanæ, myrti, viticis, genistæ, phlei, fabæ, serpilli, violæ, myrrhidis, roris marini, conizæ cerinthæ, meliloti, narcisci, asphodeli, citraginis, hederæ, consiliginis, origani, satureiæ, violæ agrestis, amaraci, hyacinthi, iridis, croci, rosæ, lili attractilis, sinap. spondilii, batrachii, &c. De quibus omnib. distinctè Columella agit, quem vide. Bibere easdem certum, & limpida, seu fluviatili seu fontana delectari, in qua ligna & lapides injiciendi, ut

Scalig. Ex
cret. 191.2.

Vossius de i.
dol. l.4. c.
66. p. 151. v.

Victus

Arist. H. N.
19. c.40. l.
4. c.9.

Colum. R. R.
1.9. c.4.
Arist. H. A.
1.9. c.40.
Varro R. R.

commodè & insidere, & sese abluere possint. Hac destitutæ, aliunde humore hausto sitem leniunt, de eoque intus ad Reges & operatrices aliquid deferunt.

Vita ad 6. 7. & ad summum 10. annos producitur: seu ut Plinius, *Vita eis longissima, ut prospere inimica ac fortuita cadant, septenis annis universa. Alveos, nunquam intra decem annos durasse proditur. Sunt qui mortuas si intra tectum hyeme servantur, deinde sole verno torreantur, ac ficulneo cinere toto die foveantur, putent reviviscere. In totum vero amissas, reparari ventribus bubulis recentibus cum fimo obrutis. Virgil. juvencorum corpore exanimato, sicut equor. vespas ac crabrones, sicut asinorum scarabæos, mutante natura ex aliis quædam in alia.* Card. robustior. ad 12. an. pervenire posse, scripsit.

Attollunt sese atque contrahunt cum volant. Rectè non volant, quia cauda destitutæ sunt: ideo etiam parum in volatu perseverant, aut in aëre demorantur. Præstant tamen vaginipennes. Quia exigua pennas habent, nec rectè procedere, nec diu volare possunt.

Vocem non edunt, sed sonum, *βουέειν* id Græcis Latinis bombilare, & bombiffare. Sonus ipse *οὐγγὺς* & *βόυς*, illis murmur & fufurrus his dicitur. Quidam modularis, sed ineptè, dixit. Alii, nocte ea, qua natus est Jesus, magis bombos edere, garriunt. Odoratu plurimum valere in de colligas, quod mel à longinquo sentiant. Visæ ex agris pharmacopolia & qui mel venderent invisisse, revolasseque onustas. Retulit & Clurius, per longum camini tubum, cum mel domi coqueret, superne ingressas, nec aliter quam circa candelam cicindelas & lampyrides solent, circa ahenum volitasse; plerasque in illud decedentes submersas. De instrumento non est quod solliciti simus. *ὀβόμα* illud est, & spiritus innatus, quo & moventur.

Auditu destitui Aquinati visum. Sono vehementi, ob ingentem aëris motum, qui & animal interimere, & lignum scindere valet, terreri & fugere. At plausu æris gaudent, & murmure excitantur ad opus, sonituque quieti sedant, ut postea dicitur. Memoria valere, apud Rhodiginum extat. Visus quod oculi duri, hebetior. Ideo facilè à merope & hirundine capiuntur.

Odore foedos odores proculque fugiunt, sed & infectos. Itaque unguenta redolentes infestant, ipsæ plurimor. animalium injuriis obnoxie. Impugnant eas naturæ ejusdem degeneres vespeæ atque crabrones, & è culicum genere qui vocantur *muliones* (εὐμίδες Arist. qui onustos in via mulos æstate vexant) populantur hirundines & quædam aliæ aves. Insidiantur aquantibus ranæ, quæ maxima est earum operatio, tum, cum sobolem faciunt. Nec hætantum quæ stagnarivofque obsident, verum & *rubetæ* ve-

niant ultro, adrepentesque foribus per eas sufflant: ad hoc provolant, confestimque abripiuntur. (alii legunt, *instantur*, & *provolantes eas confestim abripiunt*) Nec sentire ictus apum ranæ traduntur. Inimicæ & oves, difficile se à lanis earum explicantibus. Cancrorum etiam odore, si quis juxta coquat, exanimantur. Timent quoque ab araneis, lacertis, crocodilis, upupa, merope, noctua, & aliis alvearium depopulatoribus: sed & ab Echo, fulgure, tonitru, & fragore omni.

Huc & morbi pertinent, repletio nempe, inanitio, siccitas, humiditas, frigus, calorque non naturalis. Repletionem nimia satietas infert, quando alvearia non castrantur, scabietum sordibusque diffiunt, strumofæque redduntur. Inanitio è cibi inopia oritur: Ejusdem inopia, malaciam, diarrhæam, *βλακυσίαν*, & talem affert. In malacia adeo morosæ sunt, ut facile aufugiant, nisi tintu, vel rerum gratissimarum suffitu retineantur. *Diarrhæam* ex tithymalli, hellebori, ebuli & sambuci floribus contrahunt. *Tabæ* correptæ pellucescunt. De remediis & quæ huc spectant, vide Authores. De his ita Plin. *Sunt & operis morbi: cum favos non expleant, cleron vocant. Item blapsigoniæ, si sætum non peragant. Inimica est & echo resultanti sono, qui pavidas alterno pulsât ictu: inimica & nebula. Aranei quoque vel maxime hostiles, cum prævalere ut intexant, enecant alveos. Papilio etiam hic ignavus & inhonoratus, luminibus accensis advolitans, pefiser, nec uno modo. Nam & ipse ceras depascitur, & relinquit excrementa, quibus teredines gignuntur: filiis etiam araneosa, quacunque incessit, alarum maxime lanugine obtegit. Nascuntur & in ipso ligno teredines, quæ ceras præcipue appetunt. Infestat & aviditas pastus nimia, florum satietate, verno maxime tempore albo cita. Oleo quidem non apes tantum, sed omnia insecta exanimantur, præcipue si capite sensere eximi, mella avide vorantes. Cetero præparcæ, & quæ alioquin prodigas atque edaces, non secus ac pigras atque ignavas proturbent. Nocent & sua mella ipsis illitæque ab adversa parte moriuntur. Tot hostibus, tot casibus & quota portione eorum commemorata? tam munificum animal expositum est.*

Singulare ingenium regiminis & operis ratio ostendit, in quibus prudentiam, fidem, obedientiam, fortitudinem, & exactæ quasi militiæ exemplum, observare est. Eleganter de iis Plinius. *Ratio, inquit operis hæc, interdum statio ad portas more castrorum, nocte quies in matutinum, donec una excitet gemino aut triplici bombo, ut buccino aliquo. Tunc universæ provolant, si dies mitis futurus est. Prædivinant enim ventos imbresque, & tunc se continent testis. Itaque temperie cæli (& hoc inter*

Etas Arist.
H. A. l. 5. c.
2. Plin. H.
N. l. 11. c. 20.

Civ. lan. de
variet. Rer.
l. 7. c. 22.

Volatus.

Sonus.

Odoratus.
Arist. H. A.
l. 4. c. 8.

Vossius de
Idololat. l.
4. c. 71.

Arist. de
part. anim. l.
2. c. 16.

Auditus.
Plin. H. N.
l. 11. c. 20.

Arist. H. A.
l. 9. c. 40.

Arist. H. A.
l. 4. c. 10.
Antipathia
Plin. H. N.
l. 11. c. 18.
Theophr. C.
P. l. 6. c. 4.

Arist. H. A.
l. 5. c. 19.

El. H. A. l.
8. c. 6. 51. 1.
c. 51.

Morbi.

Plin. H. N.
l. 11. c. 19.

Ingenium.

Plin. H. N. l.
11. c. 10.

inter præscita habent) cum agmen ad opera processit, aliæ flores aggerunt pedibus, aliæ aquam ore, guttasque lanugine totius corporis. Quibus est earum adolescentia ad opera exeunt, & supra dicta convehunt: seniores intus operantur. Quæ flores comportant, prioribus pedibus femina onerant, propter id natura scabra, pedes priores rostro: totæque onustæ remeant sarcina pandatæ. Excipiunt eas ternæ, aut quaternæ atque exonerant. Sunt enim intus quoque officina divisa. Aliæ struunt, aliæ poliunt, aliæ suggerunt, aliæ cibum comparant ex eo quod allatum est. Neque enim separatim vescuntur, ne inæqualitas operis & cibi fiat & temporis. Struunt orsa ea concameratione alvei, texumque vel usque ad summa tecta deducunt, limitibus binis circa singulos arcus, ut aliis intrent, aliis exeant. Favi superiore parte affixi, & paululum etiam lateribus simul hærent & pendent una. Alveum non contingunt, nunc obliqui, nunc rotundi, qualiter poposcit alveus: aliquando & duorum generum: cum duo examina concordibus populis dissimiles habuere ritus. Ruentes ceras fulciunt, pilarum intergerinis à solo fornicatis, ne desit aditus ad sarcinendum. Primi ferè tres versus inanes struuntur, ne promptum sit quod invitet furantem. Novissimè maximè implentur melle: ideoque averso alveo favi eximuntur, Gerula secundos flatus captant. Si cooritur procella, apprehensi pondusculo lapilli se librant. Quidam in humeros eum imponi tradunt. Juxta vero terram volant in adverso flatu vepribus hebetato. Mira observatio operis. Cessantium inertiam notant, castigant mox, & puniunt morte. Mira munditia. Amoliuntur omnia è medio, nullæque inter opera spurciæ jacent. Quin & excrementa operantium intus, ne longius recedant unum congesta in locum, turbidis diebus, & operis otio egerunt. Cum ad vesperam scit, in alveo strepunt minus ac minus, donec una circumvolet eodem, quo excitavit, bombo, ceu quietem capere imperans: & hoc castroꝝ more. Tunc repente omnes conticescunt.

Prima fundamenta Commosin vocant periti, seu gummitionem, (κωμῆτιν vel κωμῆτιν alii legunt) cum alveare tectorio illinunt: secunda pissoceron, tertia propolin, inter coria cerasquæ magni ad medicamina usus. Commasis crusta est prima, saporis amari. Pissoceros super eam venit, pican- tium modo ceu dilutor: ceræ initium, ple- rumque è mitiore gummi. Propolis crassio- ris jam materiæ, (è gutta quam in foliis po- puli ferunt hanc faciunt) additis floribus nondum tamen cera sed favor. stabilimen- tum, quæ omnes frigoris aut injuriæ aditus obstruuntur, odore & ipsa etiam num gravi, ut quæ plerique pro galbano utantur. Dio- scorides ad styracem accedere putat. De Regimine sic idem.

Miraplebi circa Regem (de hoc in Dif- ferentiis) obedientia. Cum procedit una est totum examen, circaque eum conglo- batur, cingit, protegit, cerni non patitur? Reliquo tempore cum populus in labore est, ipse opera intus circuit, similis exhor- tanti, solus immunis. Circa eum satelli- tes quidam, lictoresque, assidui custodes autoritatis. Procedit foras nonnisi mi- graturo eximine. Id multò intelligitur ante, aliquot diebus murmure intus strepente, apparatus indice, diem tempestivum eli- gentium. Si quis alam ei detruncet, non fugiet examen. Cum processere, se quæ- que proximam illi cupit esse, & officio con- spici gaudet. (Id Homerus βοτρυχὸν πῆλιν δὲ dixit,) Fessum humeris sublevant: vali- dius fatigatum ex toto portant. Si qua las- fata deficit, aut forè aberravit, odore per- sequitur. Ubicunque ille confedit, ibi cunctarum castra sunt. Duce prehenso to- tum tenetur agmen: amisso, dilabitur mi- gratque ad alios. Esse utique sine Rege non possunt. Invitæ autem interimunt eos, cum plures fuere, potiusque nascentium domos diruunt, si proventus disponatur: tunc & fucos abigunt. Rege peste consum- to, moeret plebs ignavo dolore, non cibos convehit, non procedit, tristi tantum mur- mure glomeratur circa corpus ejus. Subtra- hitur itaque deductæ multitudini: aliàs spe- ctantes exanimem, luctum non minuunt. Tunc quoq; ni subveniatur, fame moriuntur. Huc latitatio, mundicies, & alia spectant.

Quiescunt ab occasu Vergiliarum usque ad ver, & hyeme conduntur. Alii ultra ex- ortum latere dicunt, prout ratio climatis & tempestatis tulit. Ante fabas florentes non exeunt ad opera & labores.

Stupendum quod ex Clutio Vossius nar- rat, mundicie & amoris simul exemplum. Repererat is in hortis suis apiculam, in molla mellis submersam: alteram item ab imbre sic afflictam, ut & ipsa quasi exanimis jaceret in herba. Utramque igitur manus imposuit: cujus calore sic fotæ planè sunt refocillatæ. Ut vero se mutuo agnovere, utraque alteram osculari & amplecti amicum in modum. Ac illa quidem mundior, quam imber sic stra- verat, membratim purgare cæpit alteram melle sordidatam: inque opera hæc propemodum horam insumisit. Tum quæ be- neficium id acceperat, os admovit alteri; eique grati animi ergo, de pectore suo eduxit mellis aliquid: quod ea hausit, satiataque, in alveare revolvit. Addo de ἀνθορύχῳ & prælagius quædam. Fructibus nullis nocetur, inquit Plinius. Mortuis ne floribus quidem, non modò corporibus insidunt. Operantur intra sexaginta passus. Et sub- indè consumtis in proximo floribus, spe- culatores ad pabula ulteriora mittunt. No- ctu deprehensæ in expeditione, excubant supinè, ut alas à rore protegant. Prælagia

Arist. H. A. l. 8. c. 14. Plin. l. 11. c. 6.

Clut. de A. pib. 1. c. 3. Voss. de Id. 4. c. 72.

Plin. H. N. l. 11. c. 1. Alia H. A. l. 5. c. 49.

ab examinibus tibi confedere sumuntur. Tunc ostenta, *inquit idem*, faciunt privata ac publica, utraque dependente in domibus sive templis, sæpè expiata magnis eventibus. Sedere in ore infantis, Platonis tum etiam, suavitatem illam prædulcis eloquii portendentes. Sedere in castris Drusi Imperatoris, cum prosperrimè pugnatum apud Arbalonem esset, haud quam perpetua aruspicum conjectura, qui dirum id ostentum existimant semper. Aliter apud Dionem Obsequentem legitur. Ille examine apum deterritum, ne ultra Visurgim procederet: hic infelicitè dimicasse scribit.

Ufus,

Interveniunt *usibus* pluribus apes. In *Cibo*, *Medicina*, *bellis*, *præfagiis*, *suppliciis*, etiam adhibentur. Vescabantur eis Cumanæ regionis incolæ. Contusa & cum vino diu-retico exhibitæ, hydropem potenter curant & calculos comminuunt. In melle mortuæ vomicas sanant: Ulcera labiorum emolliunt: dysenterix medentur. Favis immortalæ & cum melle tritæ pilos partibus nudatis restitunt. Sæpè ab obsessis in hostes emittuntur: harumque opera Lupus Barri-ga Lusitanus ab obsidione opidi Xianati-censis in Mauritania, Anno millesimo quingentesimo duodecimo depulsus est. Apud veteres stellionatus reum, melle illitum, & ad solis radios expositum, apibus objiciebant. De *præfagiis* superius dixi. Adde, Pompejo aciem contra Cæsarem instructuro, & Dyrrhachium egredienti, tanta apum examina occurrere, ut signa obscurarent. Victus est. Severo imperante, apes in signis militaribus, in stativis Nigri maximè, favos finxerunt. Ancipites hinc inter Severianos & Nigrianos congressus: sed illi obtinere. In Consulatu L. Pauli & C. Metelli hostem imminem præsignificaverunt. Leopoldo Austro Sempachum cum exercitu tendente, apum examen in oppidum irruit, ut Helvetiorum Historici produnt. Palatino Regiam Pragensem ingrediente, tegulis insedere. Mali rem ominis Anhaltinus dixit. Reliqua prætereo.

Differentiæ
Arist. H. A.
l. 9, c. 40.

Differentiæ Apum sunt varix. Aristoteles in *urbanas* & *feras* dispescit, & ibidem, alias *gregales*, ut Apes, Reges, fucos, vespas annuas, crabrones teredines: alias *solitarias*, ut Sirenem minorem, majorem, & bombycem. Hunc secutus Albertus, novem quoque genera facit, quæ apud Aldrovandum vidè. *Plinio* Apes sunt & *rusticæ sylvestresque*, horridæ aspectu multo iracundiores, sed opere ac labore præstantes, *Urbanarum*, addit, duo genera, optimæ breves varixque, & in rotunditatem compactiles: deteriores longæ, & quibus similitudo vesparum: etiamnum deterrimæ ex iis pilosæ. Optimè in *non operatrices* & *operatrices* distinguuntur. Inter illas sunt *Rex*, *Fucus* & *Fur*. De Rege satis superius

Plin. H. N.
l. 11, c. 26.

Arist. H. A.
l. 1, c. 40.
Plin. H. N.
l. 11, c. 16.

diximus. Duo eorum secundum Aristotelem & Plinium genera. Melior rufus, quam hirsutus niger variusque. Omnibus forma semper egregia, & duplo quam cæteris major, pennæ breviores, crura recta, ingressus celsior, in fronte macula quodam diademate candicans. Multum etiam a nitore vulgò differunt. Varro nullam rufi mentionem facit. De *fusco* in sequentibus agetur. *Fur* est nigrum quid, ventreque ampliore. *Operatrix* differentix, a *corporis figura*, *etate*, *moribus*, *operatione*, *colore* & *aculeo* sumuntur. *Corporis figura*. Sunt aliæ *vasæ* sed glomerosæ, eademque nigra & hirsutæ: aliæ *minores* quidem sed æquè rotundæ, & insulci coloris, horridique pili: aliæ magis *exiguæ*, nec tam rotunde, sed obesæ tamen & latæ, coloris meliusculi: aliæ minimæ gracilesque, & acuti alvei, ex aureolo, varix atque leves. Sic distinguit ex Aristotele Columella & Virgilius: Optimæ parvulæ, oblongæ, leves, nitidæ, auro ardentes, & paribus lita corpora guttis, moribus denique placidis. *Etate*. Sunt quædam *novellæ*, *vetulæ* quædam. Illarum examen quotannis avolare solitum est, nec perinde pungunt: & si anum non excessere, nitescunt, oleique similitudinem & speciem gerunt. Hæ horridulæ evadunt, & rugis obferuntur: mellificandi peritissimæ. Frigora denique & pluvias præsentunt: ideo his ingruentibus non longè ab alvearibus recedunt. *Operatione*. Sunt *inutiles*, ut bombylius: *εργονόροι, τὰ λεία*, ab artifice figmento fortè. Sunt & *inertes*, quæ quidem nec favos corumpunt, nec melli insidantur: id tamen non faciunt. Nonnullæ Regæ cingunt: quædam mortuas ex alveo efferunt: aliæ noctu excubias agunt. Quæ mellificant, vel in alveis, arboribus excavatis, petris, tabulatis, vel sub terra id faciunt. Circa Thermoodontem fluvium (in Themiscyra) duo genera: aliarum quæ in arboribus mellificant: aliarum quæ sub terra, triplici cerarum ordine, uberrimi proventus, inquit Plinius. At Aristoteles illarum duntaxat meminit, hæc alibi ponit. Favus ipse, *addit*, levis, atque æquabilis est, quem non semper, sed hybernis duntaxat mensibus construunt. Copia in eo tractu hederæ, unde mel conficitur. *Colore*. In Ponto enim sunt quædam albæ, quæ bis in mense mella faciunt. *Moribus*. In Æthiopia, si Alvarezio credendum, adeo cicures, ut intra hominum cubilia examina conficiant. Apud Halizones cum hominibus papulatum exire, & opus tam concretum facere, ut mel à cera sejunginequeat, Pausanias auctor est. Destituuntur & aculeo quædam.

Arist. H. A.
l. 9, c. 40.

Colum. R. A.

Alia H. A.
l. 1, c. 11.

Alia H. A.
l. 1, c. 39.

Plin. H. N.
l. 11, c. 17.
Arist. H. A.
l. 5, c. 22.

Pausan. in
Atticis.

Nieremb. H.
Exot. l. 132
c. 1.

ovi instar, quem imbuunt penitus liquido & suavi nectare. Hæc ova copulata simul, & racemata, usque ad viginti vel triginta inveniuntur. Indi truncum cædunt, & deferunt ad usus suos plenum melleis globulis, cæra quoque utilissima. *Aliæ* glandes minores conficiunt: *aliæ* non excedentes nucem avellanam. Hoc genus apum exiguum est & mansuetissimum. *Aliæ* sub humo laborant, quædam 3. aut 2. ulnas, quædam non amplius quam dodrantem profundæ, prout oportunitas illis. Harum quædam mellificant in cereis quasi fistulis oblongis, quædam orbicularibus rotundioribus. Ex his quædam *mites* & innoxie, *aliæ majusculæ* effere, & suos labores acriter tuentur. *Aliæ* quoque sunt *feræ* diversi officii, rotundum conficiunt favum instar mali citrei circulando fistulas suspenduntque ex arborum fronde, imponentes favos alium super alium: aliquando sustinet frons racemum ejusmodi trium dodrantium longum. *Exiguiores* apes suspendunt minores racemos, & tenuioribus ramis, grandiores ex firmioribus (vocant has Indi *Mateecas*) quarum morfus æquat dolore ictus serpentum, & viginti quatuor horis perseverat. *Alia* mitis apum natio est in terris Haimensium, quas industria Europæorum in alvearia conclusit, ubi nec pungunt, nec irritantur, nec inquietes fiunt, recluso alveare. Mirum dictu, nec cessant à labore, tam sunt officio intentæ. Hic curiositas non indigeret vitreis, nec transparentibus vasculis, ut exemplum sedulitatis disceret. Regina & Magistra plurimum à plebe distat. Est quoque apum *nigrum* & *exile* genus, quod in sylvis sine cæra mellificat. Cæra subterranearum apum percommoda ceratis ad dolores ex quavis causa frigida accidentes: tumores resolvit: ad alia medicamenta etiam idonea. Albæ apes sunt in Quatemala, mel quoque album & cæram fabricantes, nec nimis noxiæ.

Nunc ex aliquibus authorib. dabo aliqua. In *Ceyba* vastæ arboris & aliar. interdum cavis nidulantur apes, atque suum mel elaborant, non minus bonum quam in Hispania teste Cicerò: quarum tria sunt genera. *Unum* paulo majusculicibus. Ad favi quem probe communiunt, orificium, tubulum dimidi digiti longitudine aptant ex materia cæra simili, per quem apes, alis eo quod è floribus decerperunt onustis ad suas operas ingrediuntur. Acidiusculum est mel istud, cujus paulo amplius libra præbent singula alvearia. *Aliud* genus paulo majus nigrum superius tamen candidum est. Orificium, quo in arborum cavum ingrediuntur, confectum habent ex cæra alteri materiæ commixta, lapide durius. Harum mel superius bonitate longè superat, illiusque tres mensuræ, sive veterum congius nonnunquam ex unico alveari eximitur.

Tertium genus Hispanicas magnitudine excedit, sed aculeis caret, impetu tamen in eos fertur, qui favos eximere volunt, mireque sese capitis & barbæ pilis implicat. Harum interdum alvearia duodecas aut plures libras mellis, multò quam reliquarum præstantioris, continent.

Americanæ inquit Lærius, apes nostris dissimiles, & exiguas illas muscas quæ æstate, præsertim maturis uvis, nobis infestæ sunt, potius referentes, suum Mel & cæram conficiunt, per sylvas in arborum cavis, unde incolæ utrumque probè eximere norunt. Favum, è quo mel nondum exemptum yrayetic appellant: yra enim illis mel est, yetic cæra. More nostro melle vescuntur: cæram verò, quæ instar picis ferè nigra est, in massas convolvunt brachiali crassitudine. Sed neque funalia neque candelas ex ea parant, (noctu enim nullo alio lumine utuntur, quàm certi ligni fragmentis accensis, quæ lucidam flammam parant) at ingentium cannarum ligneorum tubos (in quibus suas plumas, ne à certo papilionum genere, ipsis travers dicto, corrumpantur conservant) ista præsertim obturant.

Anton. Herrera in Provincia Vetreapacis scribit reperiri *apes sine aculeo* clarum mel conficientes, quarum *aliæ* sint armatæ & noxiæ, quemadmodum nostræ, *aliæ* parvæ ut muscæ, optimè tamen mellificantes, *aliæ* noxii nectaris: quod dementer gustantes. Nullæ favum conficiunt, sed condunt liquorem sub humo, aut in cavis arboribus mel liquidissimum, & acescit non nihil. Ulricus Faber scribit, in terra *Marchkasiorum*, si quis sylvas ingressus in arbore quacunque foramen faciat, posse ex arbore quinque vel sex mensuras mellis accipere, quod instar muli ab exiguis apibus neminem cædentibus conficitur. Hoc mel ad comedendum optimum est, & vinum inde suavissimum preparatur.

Adjiciam hæc ab Aldravando observatas, easque propriis ipsius verbis describam. *Quæ* inquit *priori loco* exhibetur, Apum regulus est ape duplo fermè procerior, sed fucò macilentior: magis etiam lucefcit, & alvum habet in extremo acutior. Alæ sunt longæ, & coloris albi, flavis punctis conspersi. Caput ejusdem cum ventre coloris est. Antennæ sunt brevès, sed parum benè à pictore expressæ. Apis est vulgaris, quæ *secundo loco* ponitur, color ei magis ad cinereum vergit hirta ferè tota, alvò est obtusiori, brevissima, exerit aculeum. Alæ sunt candidæ intercurrentibus lineolis flavis, brevès, breviores, inquam, ipso corpore. Caput magnum, antennæ, ut in ipso regulo. Fucus, qui *tertio loco* exprimitur media est magnitudine inter Regem, & Apem; magis tamen ad regem accedit; Ape duplo major, Rege

Aldrav. Tab.
sect. I. 12. c. 2.

corpulentior, sed brevior, colore etiam magis fusco. Alæ fermè, ut in Rege, pedes breviores, caput majus. Alvi extremum velut in duas appendices definit.

Inter *apes sylvestres*, quarum multa sunt genera, *duæ priores*, una cum suis favis expressæ, domesticis quodammodo accenseri possint. Mel enim quod parant, non omnino spernendum videtur, propter suum dulcorem, & ex favis non contemnenda cera parari possit. Ipsarum verò apum species domesticis nostris multo est pulchrior venustiorque. Differunt autem & magnitudine inter se & colore. Quæ major est, & priori loco pingitur, favos & cellas etiam conficit majores. Has simul cum suis apibus inventas F. Gregorius Regienſis Cappucinatorum ordinis, diligentissimus Pharmacopola, & herbarum etiam apprimè peritus, cum ad montem Paderum vulgo dictum in nostro agro herbarum inspicendarum gratia ivisset, ad me attulit, cum ut gratum mihi faceret, tum verò etiam, ut tam pulchrum naturæ arcum posteris aliquando communicarem. cellarum alæ erant vacuæ, alæ plenæ; plenarum alæ continebant mel, alæ sobolem albam, qualem à latere favorum pictor exhibuit. An vacuis apes quiescere putaverim. Omnium figura non sexangulis terminatur, ut in communibus, sed erant rudes, & rotundæ, neque omnes ejusdem magnitudinis. Apis ipsa aspectu venusta admodum, tota hirsuta capite, antennis, & pedibus aterrimis, aterrima item, ac rotunda macula in tergore insignis: alæ ferrugineæ, cætera modo rubicundo, modo atro colore variat. *Alteræ* quæ plures & minores favos construit, minor est ut dixi, & colore diverso. Caput enim in hæc pedes & tota alvus nigricant, dorsum totum rubicundum est, alæ proceræ, angustæ nigricantes. Utraque favos suos operit quisquilijs, palea & musco ne facile sit invenire. Quid si harum melle D. Joannem Baptistam in deserto vixisse dicamus.

Quæ *duæ deinceps* pinguntur, nostris rusticis *Avoni* vocantur, invicem ferè consimiles. *Prior* capite antennis, & pedibus nigris, toto corpore magis, quam præcedentes hirsuto, & lutescente, minus in dorso, magis in alvo. Sed colorem istum luteum corporis hirsuties facit, non ipsius corpus. *Alteræ* eadem omnino videretur, nisi candidior esset, & paulò minor. Reperiuntur in hoc genere etiam virides, & nigre, & aliorum colorum. Hollandi, ut audio, omnes, nescio cur *Keyfers* hoc est, Imperatores vocant, nisi dicamus propter aculeum, quo acerrimè pungunt, Re-

ges in eo vincentes, qui vel eo carent, vel si habent, non utuntur.

Nigrarum duarum hic iconem etiam dedî, *prior* major est, & brevioribus tamen alis, utraque corpulenta est admodum. *Prior* undique nigra est, præterquam in cervice & superiori alvi parte, ubi macula lutea est, & in extrema ferè, ubi candicat. *Alteræ* easdem habet maculas, sed multo majores, colorque est intensior. *Priori* pedes hirsutiores, & crassiores. Utrique atri. Antennæ in secunda breviores, & exiliores. Quæ *deinceps picta est*, ex earum genere est, quæ propè latrinas, & fœdas cloacas bombos suos edere solent. Aspectu elegans est, alvo crassa, ex nigro, & luteo varia, in extremo acuta, capite & dorso cinereis, oculis magnis, extuberantibus, nigris, pedibus brevibus etiam cinereis, alis proceris angustis ejusdem cum dorso coloris.

Est præterea alia *Apis fera*, quam *aquaticam* vocavi, seu potius amphibiam, quod, & in terrâ, & aqua degat. Sed rarius videtur. Hanc aliquando, ut me exerce-rem, sic descripsi. Api vulgari valdè simile insectum amphibium, extra aquam volans, in aquis natans, quadripenne, sepes. Duos pedes oblongos habet, nimirum anticos, quibus utrinque distentis tanquam temone simul & remigibus ad natatum utitur. Cæteri breviculi, sub ventrem contracti. Caput compressum, oculis nigris, grandiusculis ac splendidis instructum. Corpus alis tectum, prorsus atrum. Alæ superiores simul, & inferiores duriusculæ, ac crustaceæ, nonnihil majori sui parte eaque superiore è luteo colore habent, & nigro maculosæ sunt; sed extrema parte aut proxima subtilissimæ, ac pelluentes, instar inferiorum alarum, quas operiunt ipsæ, appendices duæ sunt raræ observatu, imo in nullo alio Insecto, à me visæ, quarum una alteram incumbens tegit, quæ faciunt, ut laciniosæ interna parte, ac triangulo sinuatæ appareant. Sed & extremo sui erectam seu fissuram levem habent. Rostrum aculeatum est, ut Culicibus. Pedes antea, quibus natat, tribus articulis dissecti sunt. Rustici *Bonon Gualdoso* vocant, forsan quod lucente solè aquæ summa petat, velut apricari cupiens, & nebuloso cœlo non conspiciatur. Aliquando cœlum tuetur, sursum ex aqua exerto ore, aliàs deorsum, & vel levissimo strepitu aut umbra percepta, sagacitate mira statim quovis telo velocius in fundum lancinans subducit, adeo ut captu difficillimum sit.

Ad Caput de Apibus

APPENDIX I.

De Melle.

Nomen.

Mellis apud Latinos nomen; à Græco μέλι deductum videtur, hoc autem vel à μέλα, curæ est, quod cum cura colligatur: vel à μηλέα, pomo, quod ex ejus fructibus, descendisse videtur. Apud Athenæum Alcman. ὁ πάρεσιν κηρήνῳ, cereum fructum, Epicharmus, πόντον ὀρεχον, maritimum mare, quod diluculo ex aëre fluat, appellat. Favus; quod vocabulum à φαγῆν Isidorus derivat, Perottus, à fovendo; quod in favis foetus suos apes foveant; Martinius ab ὄφθ textum; Græcis αἰθεργιον, κέρης, κήρον, μελίδειον, μελικήρης, ὕρον, audit. Cellula est apum sexangula, loculamentum, & fundamentum operis.

Description.
Plin. H. H.
l. 11. c. 12.
Arist. H. A.
l. 6. c. 21.
Mercur.
Var. Leß.
l. 2. c. 24.
Columella
R. R. l. 9.
c. 14.

Quid sit, egregiè ex antiquis exposuit Plinius. *Venit hoc, inquit, ex aëre & maxime Syderum exortu*, (μέλισσα ἐν τῷ τῷ ἀστράϊν ὁ Πτολεμαῖος Aristoteles dixit) *præcipueque ipso Sirio splendescente fit*, (benè hinc Mercurialis in Aristotele pro ἡ ἑρῆς, Celeris legi debere putat) *nec omnino prius Vergiliarum exortu*, (oriuntur, octavo Calend. Aprilis, in octava parte Arietis, ut apud Columellam habetur) *sublucanis temporibus. Itaque tum primâ aurorâ folia arbor. melle roscida inveniuntur: ac si qui matutino sub dio fuere, unctas liquore vestes; capillumque concretum sentiunt. Sive ille est cæli sudor, sive quædam syderum saliva, sive purgans se aeris succus. Utinamque esset & purus ac liquidus, & suæ naturæ, qualis defluit primò: nunc verò è tanta cadens altitudine, multumque dum venit, sor descens, & obvia terræ halitu infectus; præterea è fronde ac pabulis potus & in uterculas congestus apum (ore enim vomunt) adhæc succo florum corruptus, & abveis maceratus totiesque mutatus, magnam tamen naturæ cælestis voluptatem affert. Nec abire in diversa alios videbis. Nam Aristoteles, rorem qui cecidit esse; ex eo demonstrat, quod uno & altero die cellas melle repletas invenient Apiares, nec, autumno, postquam detractum est, reparetur, quamvis tum flores præstent. Galenus in plantarum foliis oriri, & ejusdem cum rore generis esse; recordarique, æstate copiosum in iisdem repertum; postquam per æstatem, temperiem aëris calidam & siccam, benè frigida nox exceperit, scripsit. Scilicet, sublatis à terra & aquis; solis calore, halitus, exacteque tenuati ac cocti, à frigore subsecutæ noctis concreti coaluere. In monte Libano id persæpè quotannis accidere ait. Itaque coria exten-*

dunt, & decussum de arboribus excipiunt.

Ælianus denique mel in Media, ex arboribus stillare prodidit, eodemque in Præfiorum regione in India pluiere. In herbarum & palustrium arundinum comas decidens, ovillo & bubulo pecori tam suave epulum, ut suavissimum lac edant. Seneca dubitat inveniantne ipsum in floribus, an succum tantum quendam, quem *spiritus sui proprietate*, ut loquitur, & adhibito quodam veluti fermento, in melleam substantiam densent & coagulent. Et hæc quidem veterum sententia. Ex recentioribus Senecæ Erasmi in suo Ciceroniano describit: *Fingunt, inquit, ore visceribusque suis liquorem; ac in ipsas transformatum, rursus ex se gignunt*. Moufetus, Chylum apum in ventriculis earum consummatum vocat; idque vomitione ejici, vix hoc nobis probatur. Excrementum esse quo alimur non potest: observatumque à curiosioribus, ore quidem melleum ex floribus succum colligere, sed non implere ventrem. Onerari duntaxat crura & coxas, in quibus pilorum instar eminentia quædam repagula, nè mel decidat; reduces ad alvearia, distenta crurum & onustas melle coxas habere, à quo, à destinatis huic officio apiculis, exonerentur. Deciduum ex vaporibus humorem seu rorem esse, dubito. Non colligunt summo manè, dum flores roscidi; apiculæ, fervens dies placet: nec versus cælum hiantibus insident, sed versus terram pendulis. Induere se & ad medium penetrare videbis, quo ros qui summa duntaxat folia stringit, pervenire non potuit. Hærare intus melleam dulcedinem testantur, quam si leviter fuxeris, gustabis. Et cur, si mel deciduum: festucis quoque & stipulis non adhæret? Cur ex certis duntaxat floribus colligitur? Benè ergò Cabeus, certor, florum succum, illumque internum & medullarem, ab apibus, naturæ genio cum aërea humiditate expressum, & qui vegetabile quid potius ac terrenum, dixit. Inde sanè fit, quod pro diversarum regionum genio, diversæ sunt & mellis sortes. Diversum hæc, floribus sal subministrant; Inde quod aquam gravitate superat, & ad eam se ut 10. ad 1. habet: inde, quod arte Chymica dissolutum, maximam partem in terram facessit: inde, quod suavem quidem sed vehementem saporem, qui salinum & terrestre quid sapit, præ se fert.

De *Electiōe* in Differentiis agatur. Optimum est Galeno, purum, ab omnibus fordibus liberum, pellucidum, flavum, boni odoris, gustu paulum acre, sed suavissimum, & cohærens, ita, ut si attollatur, continuum defluat. Plinius, plenilunio uberiorius capi scribit, sereno die pinguius. *In omni melle, addit, quod per se fluit, ut mustum oleumque, appellatur aceton, maxime laudabile*

Ælian. H.
A. l. 15. c. 7.

Seneca E.
pist. 84.

Cabeus
Meteor. l. 3.
textu 56.
quest. 3.

Plin. H. N.
l. 11. c. 15.

Galen. de
Alim. fa-
cul. l. 3. c. 39.

bile est. Aptissimum existimatur, è thymo, coloris aurei, saporis gratissimi, quod fit palam doliolis (ut mel *πυλῶδες* esse monstrarent, Thymi folia miscebant) pingue, marino è rore spissum. Quod conrescit autem hoc minime laudatur, Thymosum non coit, & tactu prætenua fila mittit: quod primum gravitatis argumentum est. Acaton quid sit, inter authores non convenit. Alii *ακιδν*, *καρπιδν* dicunt, sua sponte fluens. Quidam *ακιδν* legunt, quod statim fluxisset, nec diu in vina ceis, fratribus, favo, jacuisset. Defocatum & sedimenti expers dixeris. Nonnulli, ut Dalechampsius, *ακιδν*, curioso studiosoque nullo labore confectum.

Dalechamp.
ad Plin. H.
N. l. 11. c. 15.

Ufus in cibis.

Lact. in Zenone.

Athen. Diapros. l. 2.

Plin. H. N. l. 23. c. 24.

Varro R. R. l. 3. c. 16.
Tzetzes Chylad. 13. l. 478.

Adul. Miles. l. 10.

Hippocr. l. de Affectib.

Veteribus loco facchari in opere dulcario erat: hoc, saporis, illis quæ acriora, gratia conciliabatur. Erant qui vehementer delectabantur, & vitam credebantur protraxisse. Zeno modicè eo cum pane utebatur. Pythagoram solo sive favo, & pane eodem contentum, quidam autumant. Democritus in annum centesimum & nonum fati diem distulisse, quod eo oblectaretur, creditur. Idem mellis odore vitam per Thesmophoria produxisse putatur: sed Ficinus, vino liquefactum albo calentibus panibus infudisse opinatus est. De Pollione ita Plinius. Corpora auget. Multi senectam longam mulsi tantum nutritu toleraverè, neque alio ullo cibo, celebri Pollionis Romuli exemplo. Centesimum annum excedentem, cum Divus Augustus hospes interrogavit, quam maxime ratione vigorem illum animi corporisque custodisset. At ille respondit, intus mulso, foris oleo. Apud Lacædemonios initium cœnæ fuit, sed & in secundis mensis apponebatur. Placentæ quæ ex eo parabantur, mellita, pyramuntæ & itria dicebantur. Illa in cœnis quas Nero familiaribus indicebat, quadrages fertertium constabant. Pyramuntæ ex tritico & melle constabant: Itria, ex eodem & farina conficiebantur. Mellita scitamenta Apulejus vocavit. Quantum alimenti corporibus largiatur, non convenit inter authores. Hippocrates, per se, attenuare magis & per urinam plus justo purgare; cum aliis sumptum, nutrire & bonum colorem conciliare dixit. Celsus inter valentissima reponit. Dulcedine illectas partes, plus ad se nutrimenti rapere, retinere, & in simile sibi convertere, verisimile. Senibus commendatur. An nosi, Antiochus Medicus, & Telephus Grammaticus fenes: iidem Attico melle sapius cocto pane vel alica excepto vescebantur. Acrimoniam amittit, si aqua diluatur, ac coquatur donec spumare desinat, spuma assiduò deterfa. Urinam sic paratum tollit, & sputa crassa incidit. Edulii illud genus quod Cocetum Festus vocat, ex melle & papavere constabat,

Paratur ex eodem mulsum, medo, melomelites & vinum. Mulsi frequens apud antiquos mentio: nomen à mulcendo, quod vini austeritas ejus dulcedine molliatur. Plinius Aristæum Thracium primum invenisse tradit: quidam cum oinomelide idem censent. Sed Ulpianus dulcissimo vino idem tribuit. Ex vino & melle parabatur, ex vetere utilissimum, & quod facile cum melle concorporatur, ex austero, Massico inprimis, quod mons Gauranus, in Puteolor. Bajazarumque prospectu fundit, nobile. Crassum & turbidum olim fuisse, ex Horatio colligit Mercurialis. Duæ partes uni mellis affunduntur. Aliqui, quo celerius præberi possit, una coquunt, & transfundunt: Alii, utilitatis gratia, ad sex musti ferventis sextarios, unum mellis adjiciunt, & postquam deferbuere recondunt. Adjiciebantur & aromatica, folia malabathri, myrrha, cassia, costus, nardus, de quibus authorem Geoponicor. consule. Medo Septentrionalium potus est, aliquando tam nobilis, ut non nisi lautioribus mensis apponatur. Laudatissimus Covenfis. Moris & aromatibus condire. Per totam ferè Europam devehitur. Idem cum medone *μελιδν*, (malè apud Ethymologum *μελιδν*, in vulgatis quibusdam lexicis *μελιδν* legitur) dicerem, quod *σκούδον πομδινον ον υδαλι εψορδον* Hesychius explicet, nisi & herba accederet. Cum illo convenit, quod *μέλι κώκως* Athenæus vocat, quodque ex vino, melle, & herbis variis conficiebatur. Cambris nunc Metheglin, Hibernis Vsebachedicitur. Vina ex melle redolere, Illyriis quos Taulantinos vocabant, olim suetum. Favus aqua superfusa exprimebatur, ac simul ahenò ad medium usque partem incotta; fistilibus primum infundebatur, jam tum dulcissima: dein vasis ligneis in multa tempora reservabatur. In Græcia parum differebat à vino, quod nascitur. Plinius ita de eo: Quinquennio ad hoc servari cœlestem jubet. Aliqui prudentiores statim ad tertias partes decoquunt, & tertiam veteris mellis adjiciunt, deinde quadraginta diebus. Canis ortu in sole habent. Alii diffusa ita, decima die obturant. Hoc vocato Hydromeli, & vetustate saporem vini assequitur, nunquam laudatius quàm in Phrygia. Dioscorides ex duabus mensuris aquæ coctæ, & sub Caniculæ sydus insolatæ, ac melomelitis ex cotoneis facti unà componit. Plutarchus ante vinum inventum, propinatum fuisse scribit. Melomeli quod & Cydonites quomodo fiat, apud Geoponicorum authorem qui id Hydromelum vocat, habemus, quomodo ex melle vinum, apud Portam. Est & Melittes vinum; quod adjecto ad quinque congios austeri musti mellis congio, & salis cyatho, paratur. Seculis jam fieri non arbitror hoc genus

Geopon. l. c. 24.
Plin. H. N. l. 22. c. 24.

Martial. l. 2.

Mercur. v. n. l. 2.
c. 17.
Dioscor. M. l. 5. c. 16.

Hesychius in Lexico.

Aristot. in mirab. auscult.

Plin. H. N. l. 14. c. 17.

Plutarch. Sympol. l. 4. quest. 5.
Geopon. l. 2. c. 26.

Flin. H. N. l. 22. c. 24. Anson. E. pigr. 83. *genus inflationibus obnoxium, inquit Plinius.* Dodram quoque genus potionis apud Ausonium, à dodrante novem unciarum mensurà ita dictam, ingrediebatur mel, cum jure, aqua, vino, pane, pipere, herba, oleo, & sale. Eodem, puritas vini probatur, si cum lacte infuderis.

Plant. Pseudolo alt. 2. sc. 4. *Ad lapideam duritiem decoctum, & pulverizatum ex albo rubellum reddit, si transfusando misceatur. Mellina Plauti in Pseudolo Hydromeli est.* Descriptiones & compositiones, Galeni, Æginetæ, Plinii, Dioscoridis, Angelorum, qui hordeum torrefactum adjiciunt, & Moscovitarum apud Mosfetum vide; Mauritanorum apud Aldrovandum.

Monf. de Insect. l. 1. c. 5. Usus in Medecina. Auxit & Medicorum contra morbos remedia. Nec hoc tantum *Mulsum Hydromeli*, seu *melicratum*, οζυλλονες, αποmeli, κλινοmeli, Θαλασσοmeli, Ομφακοmeli, & Οξυmeli helleboratum in usum deduximus: spiritum, oleum, & quintam essentiam his adde. Mellis quidem ipsius natura talis est, ut putrescere corpora non sinat, jucundo sapore atque non aspero, alia quam salis natura. Ideo Democritus melle condiri jussit: sicque Alexandri & Agesipolidis, nec non Agesilai corpora conservata, à Statio Papinio, Xenophonte, & Diodoro Siculo proditum. *Hybleo* inquit ille, perfusus nectare durat. Hippocentaurum in Thessaliâ natum eodemque die denatum, principatu Claudii Cæsaris in melle ex Ægypto adlatum, Plinius vidit. Faucibus, tonsillis, angina, omnibusque oris desiderijs utilissimum est, arescentique in febribus linguæ. Jam verò peripneumonici, pleuriticis decoctum, item vulneribus à serpente percussis. Et contra venena fungorum. Auribus sonantibus instillatur cum rosaceo, lendes & fœdacapitis animantia necat. Dysentericis & cæliacis medetur, in quo sint immortuæ apes decoctum. Tale & oculis utilissimum. Usus despumati semper aptior: stomachum tamen inflat, bilem augeat, fastidium creat, alioqui oculorum angulos melle tangi suadent. Eadem apud Dioscoridem invenies. Hippocrates in secunda pleuritidis specie favum in aqua maceratum; in casu ex alto, cremorem ejus decoctum, præscribit: in convulso lingere jubet. Ex apibus quæ in tumulo ejus mellificabant, collectum, ulcusculis oris puerorum medebatur. Cum fructu etiam in dentitione cum butyro gingivis inunctum, in visus hebetudine, & albugine cum primo infantis stercore subactum; in faucium dolore, cum agresti papavere permixtum; in lienis, demortuis apibus appositum, in dysenteria & cæliacâ cum apibus vel caseo recenti coctum; testibus frigidis, cum refinâ temperatum; adhibetur. Cum nitro & lacte bubulo ulcera faciei sanat: cum

corii bubuli cinere, phagedænas & panos curat: spuma cum oleo juglandium, adustionem cutis emendat. Hollerius inter Diaphoretica retulit. Cum lenticula cocta, & contrita, vel myrti foliis viridibus, vel galla, *reduvia*, manuum inprimis prodest. Id apud Oribasium; hoc apud Priscianum legitur. A Nicandro contra Opium laudatur: ab Ovidio, cum ovis & pineis nucibus ad ciendam venerem. Celsus coctum inter alvum stringentia numerat, quod coquendo, acrimonia alvum ciens detrahatur. Minui & alimenti virtutem, addere poteris.

Aque mulsæ duo sunt genera, *subita* & *recentis*, alterum *inveterata* ουσια & *δυσωγής*, conditivæ, quod propriè Hydromelidicitur, *Repentina*, inquit, Plinius, despumato melle præclaram utilitatem habet, in cibo agrotantium levi, hoc est, alicæ elutæ, viribus recreandis, ore stomachoque mulcendo, ardore refrigerando. Frigidam enim utilius dari ventri molliendo, invenio apud auctores. Hunc potum bibendum aliosis: item animi humilis & præparci, quos illi dixerè micropsycho. (τὸ Απορροήν & μίγεσθαι, qui immodico sudore disfluunt, & languidum habent, intelligit.) Est & ratio subtilitatis immensæ à Plutone descendens: corpusculis rerum levibus, scabris, angulosis, rotundis, magis, aut minus, ad aliorum naturam accedentibus: Ideo non eadem omnibus amara aut dulcia esse. Sic & in lassitudine promores esse ad iracundiam, & in siti. Ergo & hæc animi asperitas, seu potius animæ, dulciore succo mitigatur. Lenit transitum spiritus, & molliores facit meatus, ne scindant euntem redeuntemque. Experimenta in se cuique: nullius non ira luctusque tristitia & omnis animi impetus cibo molliatur. Ideoque observanda sunt, quæ non solum corporum medicinam, sed & morum habent. Aqua mulsæ & tussientibus utilis traditur, calefacta invitat vomitiones. Contra venenum psimmythij salutaris addito oleo. Item contra hyoscyamum, cum lacte maxime asinino; & contra halicacabum, ut diximus. Infunditur & auribus & genitalium fistulis. Vulvis imponitur cum pane molli; subitis timoribus, luxatibus, leniendisque omnibus. Inveteratæ usum damnavere posteris, minus innocentem aqua, minusque vino firmum. Longa tamen vetustate transit in vinum, ut constat inter omnes stomacho inutilissimum, nervisque contrarium. Semper mulsum ex veteri vino utilissimum, facillimeque cum melle concorporatur, quod in dulci nunquam evenit. Ex austero factum non implet stomachum, neque ex decocto melle, minusque inflat, quod ferè evenit. Appetendi quoque revocat aviditatem cibi. Alvum molliit frigido potu, pluribus calido sistit. Eadem

Oribas. Synop. l. 7. c. 18. Prisc. Exposit. l. 1. c. 34

Plin. H. N. l. 22. c. 24.

Plin. H. N. l. 7. c. 3.

Plin. H. N. l. 22. c. 24.

Plin. H. N. l. 30. c. ult.

Plin. H. N. l. 29. c. ult.

Dioscor. l. 2. c. 102.

Plin. H. N. l. 30. c. 4.

apud Dioscoridem habentur. Idem & ἔξυ-
γλυκὲς præstat.

F^m. H. N.
2. c. 24.

Mulsum ex austero vino factum, non implet stomachum, neque ex decocto melle, minusque inflat, quod ferè evenit. Appetendi quoque revocat aviditatem cibi. Alvum mollit frigido potu, calido sistit. Corpora auget. Varro regium cognominatum morbum arquatam tradit, quoniam mulso curetur. *Apomeli*, quod ex melle ex favis niveo candore splendentibus cum aqua fontis, prout ab Ætio traditur, decoquebatur, deterget & digerit, urinas ciet, calidioribus naturis inimicum. Confert & ad educendum spiritum. *Chionomeli* cum nive & cum melle commista fiebat, & in febribus propinabatur. De *Omphacomeli*, quod succo uvæ immaturæ & melle fit, nihil singulare occurrit. *Thalassomeli* ex æquis partibus maris, pluvix, & mellis defæcatis, & in picato vase per canis æstum insolatis paratur. Sapore & odore gratum est, clementerque purgat. *Oxymelitis* varix apud authores sunt descriptiones; quas apud Aldrovandum vide. Sumptum humores crassos attenuat, ischiade & arthritide laborantibus prodest: in angina utiliter gargarizatur. De *Scyllitico* oxymelite consule Medicos. *Helleboratum* Gesnero debemus, cujus encomia in epistola ad Occonem persequitur.

Spiritus, qui per retortam exit, & vel albus vel flavus est (aquam quoque vocant) effusiones & albugines oculorum sanat, & ad capillos producendos adhibetur. *Oleum* quod instar aquæ vitæ ardet, si cum spiritu vini circuletur, gratissimi saporis evadit, & non tantum sclopetariis vulneribus & phagedænicis ulceribus convenit: sed & dolores podagricos vehementer mitigat: maculasque faciei cum oleo Camphoræ discutit. Componitur & cum vitriolo calcinato. *Acetum* ex cocto cum aqua fluviali & semine erucæ, quod duntaxat in petra suspenditur, destillatur. Solvit silices, reliquosque lapides: nec est quod calcinationem præmittas. *Quinta essentia*, quæ sale ex fæcibus propriis incineratis acuitur, in colica, calculo renum &c. remedium creditur paratissimum. De *Elixire*, quod Doctissimus Schröderus describit, taceo.

Non permittere ut corpora putrescant, superius ex Plinio dictum: Babyloniosque in melle cadavera servasse dici debuit. Nunc de purpuris, antidotis, & arborum furculis aliqua adjicere placet. Purpuræ Hermonicæ, compositæ quidem ante centum nonaginta annos, sed πρὸς φανὸν τὸ ἀβύθιον, & νεαρόν, recentem adhuc florem & novum servantis, quinque millia talentum, captis ab Alexandro Susis inventa fuisse, Plutarchus author est. De purpuris hoc cum succo in massam redactis, vel flore,

qui Vitruvio ostium, cum vaginula sola, intellige: talentum de pondere potius quam precio sumendum est; Durationis causa, mel, in quo massæ punicearum immergebantur. *Theriaca* & aliis antidotis haud frustra admiscetur. Conservat ea, & excipit. Lentori, consistentia debetur, & nē ambiens aer exhauriat. Servari in melle furculos, nec quicquam propagationi decedere, apud Cardanum habemus: Scalliger eo multa servari, multa vitari reponit. Ille mellis humido quod tenue, dulce, temperatum, non pingue, nec putredini obnoxium adscribit. Hic juglandis naturam in eo incorruptam, propter oleositatem servari; ficus, persica, pyra, tabo fluida fieri, asserit. Tactum à pane corrumpitur, & in formicas similiaque animalcula abit. Fugitivo denique & ex animi vino vitam reddit, suctum œnopolis mangonium.

Differentia mellis sunt varix: *Substantiam* si spectes, habetur *Aereum*, *Terreum*, *Anthinum*, *Galbanarium*, *Thymosinum*, *Cerosum*, *adulteratum*. *Aereum*. Mense enim Maji, Junio & Julio ambrosia quædam cœlestis, liquida, pura, suavissima, plantarum foliis illabitur, ut vulgò creditur: hanc collectam & imbibitam apes in alvearia deferunt. Initio dilutum est, ut aqua & primis diebus ferveret, ut mustum, seque purgat: vicesimo die crassescit, mox obducitur tenui membrana, quæ fervoris ipsius spuma concrevit. *Terreum* rore abeunte ex terræ ipsius sudore, & plantarum dulci parte exugitur, densioris substantiæ; totque differentias, quod plantæ sunt, ex quibus detrahitur, sortitur. De *Anthino* inferius dicemus. *Galbanario* nomen Aphrodisiensis imposuit, à pastu apum, quem galbana vitiant. Prodest ad oculorum claritatem. *Thymosinum* non coit, & tactu prætenui fila mittit: quod primum gravitatis argumentum est. Si planè thymum redolet, consummatum ne dicas: quanquam venditores ab injecto laudem conciliare solent. *Cerosum* crassius est, & in quo crassitudines quædam innatant. Adde hisce *Bithymum*, quod ex utroque thymo, albo & nigro, paratur, oculis & ulceribus aptissimū.

Loci ratione est, *Sylvestre*, *Domesticum*, *Atticum*, *Cycladicum*, *Siculum*, *Cappadocium*, *Scythicum*, *Samogitum*, *Cephalonicum*, *Creticum*, *Cnidium*, *Mysum*, *Halizonum*, *Thracium*, *Lydium*, *Egyptium*, *Medicum*, *Hircanum*, ut alias regiones taceam. De *Sylvestri* in sequentibus agetur, *Atticum*, quod & Hymettium, id in primis, quod in argentifodinis fit, primas inter optima obtinuit. Optima quippe ibi apum indoles, & terra thymo & aliis floribus luxuriat. Vidit Bauhinus Veronæ in phar-

Cardan.
Subril. l. 8.

Scalig. Ex
179.

Differentiæ

Plin. H. N.
11. c. 14.

Alex. App.
2. probl. 74.

Plin. H. N.
11. c. 16.

Hartman. in
Crol.

Agric. in
Poppium T.
2. p. 973.

Schrod.
Pharmacop.
5. p. 316.

Herodotus
Thalia.

Plutarch. in
Menandro.

Macopolio, illudque in vesica elephanti valdè crassa, pondere librarum XXI. longitudine duorum cubitorum, latitudinis sesqui cubiti invenit. Ex Africa allatum fuisse verisimile est. Cycladico secundas Dioscorides tribuit. Urbanum & jucundum est. Siculo seu Hyblæo tertiæ debentur. In Cappadocia sine favis conficitur, & perinde ut oleum crassum est. In Scythia quoque & Samogitia laudatissimum habetur: seu quod flores sint meliores, perflatò à septentrionali vento aere: seu quod ibi robustiores vivant, & mel diligentius elaborent. Ex Cephalonia summæ bonitatis & saccaro suavius devehi, Cardanus author est; ut Aphrodisiensis in insulis & litoralibus optimum esse putat. De Cretico ita Plinius. Aliud in Creta miraculum mellis: Mons est Carina IX. millium passuum ambitu: intra quod spacium muscæ non reperiuntur: natumque ibi mel nusquam attingunt. Hoc experimento singulare medicamenti eligitur. E Cnido advekturi, Thasio & Hymetto proximum est. Ubi consenuit, vini conditiones assumit. De Mysio hæc apud Galenum occurrunt. Nostra, inquit, in Asia, collis quidam inter Pergamum & Eleam urbem maritimam porrigitur, thymo scatens, in quo Apes optimum mel reponunt, quod ibidem totum absumentur. In Mysia quoque, qua parte nostra provincia finitima est, tractus occurrit, quem Britum appellant, in quo mel Attico simile penitus, magnâ cum admiratione conspexi, quanquam deteriora quoque mella ibi proveniant. Extabat ibi quoque monticulus quidam non magnus, saxosus totus, thymo atque origano plenus, ad cujus radices agri cythiso plurimò abundabant. Ex eo, collis dominus mel usque adeò dulce colligebat; ut in hac parte Atticum etiam superaret: acre tamen ut Atticum non erat: idcirco statim nauseam gustantibus excitabat. Apud Halizones ita concretum est, ut à cera seungere nequeas. Thracicum, arenosum erat. In Lydia ex arboribus colligitur. Incolæ pastillos absque cera tantâ duritie conficiunt, ut nisi vehementiore attritu nihil inde demi possit. Egyptium dilutum est quod flores illius tractus, nimia Nili irrigatione humescant. In Hircania multo folia tinguntur. Extinguitur, nisi ortum solis colligentis præverterint, si Curtio credimus. In Medea ex arboribus stillat. Ad Amisum denique proderite Aristotele, convehitur à superioribus locis candidum, crassumque, quod apes in arboribus sine favo, quod & in Ponto fieri notum, faciunt. Brevissimè ista complexus est Plinius. Summa quidem bonitatis natione constat, pluribus modis. Alicubi enim favi cera spectabiles gignuntur, ut in Pelignis, Sicilia: alicubi mellis co-

pia, ut in Creta, Cypro, Africa: alicubi magnitudine, ut in Septentrionalibus, viso jam in Germania octo pedum, favo, in cava parte nigro.

Sumptas à Tempore colligendi differentias recenset eleganter Plinius. In quocunque, inquit, tractu terna sunt mellis genera. Vernum ex floribus constructo favo, quod ideo vocatur anthinum. Hoc quidam attingi vetant, ut largo alimento valida exeat soboles. Alij ex nullo minus apibus relinquunt, quoniam magna sequatur ubertas, magnorum syderum, (Sirii, Caniculæ, Arcturi) exortu. Præterea solstitio cum thymum & urva florere incipiunt, præcipua cellarum materia. Alterum genus est mellis æstivi, quod ideo vocatur horæum, à tempestivitate præcipua, ipso Sirio exsplendescente, post solstitium diebus XXX. fere. Immensa circa hoc subtilitas naturæ mortalibus patefacta est, nisi fraus hominum cuncta pernicie corrumpere. Namque ab exortu syderis cujuscunque, sed nobilissimum maxime, aut cælestis arcus, (de hoc loco consule Marsilium Cagnatum) si non sequantur imbres, sed ros tepe scat, solis radiis medicamenta non mella gignuntur, oculis, ulceribus internisque visceribus dona cælestia. Quod si servetur hoc, Sirio exoriente, casuque congruat in eundem diem, ut sæpe, Veneris, aut Jovis, Mercurique exortus, non alia suavisitas visque, mortali malis à morte vocandis, quam divi nectaris fiat. Rutilum omne tale, ut diebus confectum siccioribus. Æstivâ mellatione decimam partem Thasio Dionysio apibus relinqui placet, si pleni fuerint atsei: sin minus, pro ratâ portione: aut si inanes, omnino non attingi. Huic vindemiæ Attici signum dedere initium, Caprificialem diem Vulcano sacrum. (Incidebatis in Nonas Julii, quæ & Caprotinæ & vulgi fugâ vocabantur.) Tertium genus mellis minime probatum, sylvestre, quod ericæum vocant. Convehitur post primos autumnii imbres, cum erice sola florêt in sylvis, ob id arenoso simile. Athenienses tetralicem appellant, Eubæa sisaram, quam putant apibus esse gratissimam, fortassis quia nullius tunc alius sit copia. Hæc mellatio sine vindemiæ & Virgiliar. occasu, Idib. Novembris fere includitur. Relinqui ex eâ duas partes apibus ratio persuadet, & semper eas partes favorum, quæ habent erithacen.

Dantur & à Qualitatibus differentia. Laudatissimum existimatur è thymo, coloris aurei, saporis gratissimi, quod fit palam doliolis, pingue, marino è rore spissum. Tale nascitur, ubi thymus, cunicula, origanum, violæ, &c. pullulare solent, ut in Achajæ montibus, Hybla, Himetto, & aliis, fieri solet. Tale odoratum, ex dulci acre, glutinosum, perucidum, quod minimum spumæ vomit.

Alian. H.
A. 5. c. 42.

Cardan. de
var. rer. G.
c. 25.

Plin. H. N.
21. c. 14.

Galen. 1. de
Antid. c. 4.

Pausan. in
Atticis.

Aphrodif.
2. Probl. 74.

Mela 3. de
sua orbis.

Plin. H. N.
11. c. 14.

L. c.

Plin. H. N.
11. c. 15.

Plin. H. N.
11. c. 16.

Plin. H. N.
11. c. 15.

APPENDIX II.

De Cera.

Tale Cretensibus Acramaurion, Cypris Chytrium, Cois Calaminium. Tale, si Moufettum sequimur, pingue, lentum glutinosum, grave (unde in fundo optimum) *ἀπὸ χυτρῶν*; clarissimi therebinthini liquoris æmulum, sui ubique simile, & vel nullis vel saltem paucissimis fœcibus impuratum, blandissimo calore liquefactum, & levissimo frigore quasi in lapillos concretum. Tale denique quod Strabo in Attica ad argentarias gigni, & ἀποπνεύον vocari scribit. *Malum* est, quod vel justo crassius, vel justo tenuius, vel diversarum partium est; quod thymum planè redolet; multam spumam egerit. Tale quod quia ex custodia computruit, male olet: quia è cicuta contagium contraxit, graviter; quia acre, nares odore ferit: quia sub vappa vapulat, nihil olet. *Venenatum* in Ponto ex argolethro Dioscoridi, ex Rhododendri floribus Plinio; ex Aconito Aëtio, testibus, colligitur. In Carina, Perside, Mauritania & Getulia, vel obterræ halitus, vel virulentos succos tale evadit: livore deprehenditur. Apud Macronas insaniosum prodente Xenophonte; habetur. Nec stare quidem poterant, qui eo vescabantur. In Heptacometarum urbe contagiosum, & quod stupidos redderet, Strabo reliquit. In Corsica ex cicuta, Ovidius: in Trapezunto Pontica ex buxi floribus gravis odoris, sed quod insaniam curaret, *Ælianus*. Cognoscitur, si non omninò densatur, rutilum est, alieno odore, & ad nigredinem vergit. Duos tali melle gustato in foro Romano obiisse, apud Galenum habemus. In Troglodyticæ parte quæ Balgada dicitur, adeo *Candidum* est, ut ne nivibus quidem cedat; durum quasi lapis, solidum etiam ita, ut sportis contineatur. Meminit talis & Aristoteles, idque ex puro thymo confectum negat. In Tigremahon & Tagodast, Moufetus ponit. *Rutilum* est ericæ. *Nigrum*, *suscum*, *spadiceum*, & *lividum* suspectum esse solet. *Vinosum* apud Galenum habetur. *Amarum* juxta Phasin, & in Ponto. Evadit & vetustate tale. *Dulcissimum* in Myisia superius diximus. *Fœtidum* custodia evadit. Farina milii adulteratur. *Factitium*, ex nuce Indica, & vulgaribus filiquis, quas Græci *κερῖνα* vocant, paratur, qui Troglodyticam Arabiam incolunt, radices zingiberis recentes in eo conservant. Mirum verò quod Eudoxus Cnidius apud Apollonium refert, Gyzanterea Africæ supra Sirtin & Carthaginem gentem, apum more flores colligere, & mellificum exercere, felicitate pari. Diodorus Siculus mellis conficiendi rationem Curetes primos invenisse autore est.

CERÆ nomen à Gæcis sumptum est, *Nomen.* *κηρός* his dicitur, seu à *κερῖναιον*, quod curare est, ut Isidoro placet; seu à *καλεῖσθαι* quod favis ignis calore liquatis fiat; seu ab Arabico *ر* quod ceram Abrabibus, ut murum seu parietem Ebræis significat. Et certè favorum ceræ sunt ut parietes, intra quos *μελισσῶν*, liquidum mel stipatur. Dicitur & *μαλῶν* Galeno testè, quod vocabulum quidam emollitæ tantum attribuant. Potest tamen & duræ imponi.

Ex lachryma arborum ab Apibus confici, Aristot. prodidit. Ex omnium arborum, que floribus confingi Plin. rume & echinopode, seu equinopode, (quidam tribulum, alii echion, nonnulli spinæ quoddam genus intelligunt) excepta. Addit. *Falso excipitur & sparrum*, (genista, iisdem locis quibus & juncus sterilis nascens) quippe cum in Hispania multa in spartariis mella herbam eam sapiunt. *Falso & oleas excipi arbitror*, (alibi verum id esse affirmat) quippe oliuæ proventu plurima examina gigni certum est. De Lampiana apud Columellam habemus. Modus elaborandi apud Aristotelem extat. Perreptant flores primum primis pedibus, quos leviter affingunt; tum in medios sese abstergunt; & affricant: tandem verò tincturam florum aqua vel saliva sua laboratam, & compactam, in cruscula posteriorum pedum dextrè & celeriter deponunt, & magnitudine formaque lentis collectam, onusta ad proprios lares redeunt, ut Moufetus exponit: Quomodo exprimitur Colummella exposuit. *Expressæ*, inquit, *favorum reliquæ, posteaquam diligenter aqua dulci perlutæ sunt; in vas æneum conjiciuntur: adjecta deinde aqua liquantur ignibus; quod ubi factum cera perstramenta & juncos defusa colatur, atque iterum similiter de integro coquitur; & in quas quisque voluit formas, aqua prius adjecta defunditur.* Brevisita Plinius. *Cera fit expressis favis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tenebris sicatis; 4. die liquatis igni in novo fœteli; aqua favos tegente, tunc sporta colatis. Rursus in eadem olla coquitur cera cum eadem aqua, excipiturque alia frigida, vasis melle circumlitis.*

De Loco non est quod multa dicamus. Habetur ubi & apes. Coris olim tam copiosa, ut Romanis tributum loco centum millia, (ducenta posuit Livius) pondo persolverint. Ex Russia & Moscovia in universam ferè Europam deferitur. Ad Mombazzæ urbem ingens ejusdem vis. Livones olim purgamenti instar rejecisse, à Crantzio proditum. Ejusdem usum & flu-

Monf. l. 1.
de Insect. c. 1.
p. 28.

Strab. Geogr. l. 9.

Xenoph. de Cyri expedit. l. 4.

Strab. l. 12.

Scal. Exercit. 132.

Gal. de Antidot. l. c. 2.

Strab. Georg. 11.

Arist. H. A. l. 3. c. 21.
Descriptio

Plin. H. N. l. 11. c. 8.

Plin. H. N. l. 21. c. 12.


Arist. H. A. l. 9. c. 40.

Colu. R. R. l. 9. c. 16.

Plin. H. N. l. 21. c. 14.

Locus.

Crantz. Vand. 16. c. 9.



fluvii Senegæ accolæ ignorant.

Ad Naturam spectat, quod calore Solis candescat, cum caro nigrescat, quod coacta opaca sit, liquida pellucescat: quod facili calore emolliatur, & denique, quod cum oleo facillimè, cum vino & aqua difficulter confundatur. Causas in Aldrovando vide.

Usum nobis præstat eximium, in Medicina, scribendo, pingendo, sigillando, imaginibus, conglutinando, lucem præbendo, & aliis. In medio quodammodo est calefacientium, refrigerantium, humectantium & siccantium. Habet aliquid emplastici & crassarum partium, ut Galenus scribit. Ideo reliquorum medicamentorum materia efficitur, & ad emplastrorum, & cerarum compositionem adhibetur. Præbetur dysentericis cum pomo assato. Nervis & tendonibus denudatis applicatur. Linteo in cera intincto, & calidissime appposito, juncturæ ex frigore dolores tolluntur. In Ictero cum ovi vitello ad duritiem cocto, aliquot granis croci, & syrupo absynthii, pillulæ ex eadem laudatissimæ. Valde sitim excitant. Dat & oleum, in diuresi, & tumorum emolliatione eximium, cujus præparationem apud Chymicos vide. De Adulteratione & Coloratione alibi dicitur, sic & de aliis usibus.

Differentiæ Genera ceræ dantur aliquot. Est *Nativa*, est & *Factitia*. Habuit Aldrovandus *Indicam*, colore flavo, viridi, rubro, & nigro, lapideæ prorsus duritiei, quam ex lacca confici ab Acoſta diſcimus. *Laudatissima* est recens, subpinguis, pura, odorata, halitum melleum referens, Pontica aut Cretica. *Pontica*, si Galenum sequimur, ob flores absynthii amara est. Plinio *optima quæ Punica dicitur*, (candidissimam omnium Dalechampsius facit) *proxima quàm maxime fulva, odorisque mellei*, (hinc Cicero, unguenta gratiora esse quæ ceram quam quæ crocum redolent, scripsit. Sic omnino legendum non terram)

pura, natione Pontica, quam constare, addit, equidem miror inter venenata mella. Deinde Cretica, plurimum enim ex propoli habet. Post has Corsica, quoniam ex buxo fit, habere quandam vim medicaminis putatur. Alba, seu candida, quam quidam virginæam vocant, quomodo fiat Dioscorides & Plinius prodidere. Ventilatur, inquit hic, sub dio sæpe cera fulva. Deinde fervet in aqua marina ex alto petita, addito nitro. Inde ligulis hauriunt florem, id est, candidissima quæque, transfunduntque in vas quod exiguum frigido habeat. Et rursus marina decoquunt separatim: dein vas ipsum refrigerant. Et cum hæc ter fecere, juncea crate, sub dio siccant Sole Lunaque: hæc enim candorem facit. Siccantes, ne liquefaciant, protegunt tenui linteo. Candidissima vero fit post

post insolationem etiam incotta. Scilicet Tollitur ita à cera mel, eaque partes exspirant, quarum tenuitate color conflatur.

ἐξικυαίζεναι mel ab igne, inquit Scaliger. *Scal. Ex. Venetiis candidissima habetur. Talis &* 325.12.

Tarentina fuit. Adulteratur therebinthina. Inalbescit & tractando. Unde *τεῖνον* ἢ *ἀνὰ ἀδονιδεύς* Aëtio dicitur; & *τεῖνον* ἢ *ζῆν* Phavorino inalbescere. Sed & *καυοῖα* tracta dicuntur, quod manibus tractata albescant. Medicis utilissima est, & commendatur à Paulo ad psoram. Ufurpatur & ad excipiendos pulveres in masticatoriis, & quidem factitia, qualis Tyrrhenica fuit. Convenit renibus inflammatis. Paulus *ἀδὸν ἀστεργεύς* meminit. *Flava* ob æream ex melle naturam magis emollit, relaxat, & dolorem solvit. Frequentius liquefacta terrestrem naturam contrahit. Ideo recens & nova adhibenda, *Virginem* vocat Hollerius, à juvene Apum populo elaborata. Actuarius propolia esse dicit. Commendatur ab eodem in ceratis. *Viridis* in Ægyptiacis numerat inter medicamenta purgantia Hollerius, vel mollita oleo imponitur. *Nigrescit* cera, addito chartarum cinere sicut anchusa admista, *rubet*. Colligitur tamen & in Moluccis insulis & America naturaliter nigra. Mimum quod scribit Aristoteles tepefacta junior. boum cornua in cera flecti: nec sentire dolorum pedum, si ea inungantur.

Addere aliquid de *Propoli* & *Erythace* placet. Illa dicitur quasi *suburbana*, quod præ foribus alvei ab apibus ædificetur. Græcis aliàs *σμήνιον*, *σμήνις* & *αἶζαρ*. Scribonius pro cera virginea accepit: pro fæce alvearium Sylvaticus. Bellunenſis ſorditiem parietum vocat, & pro Bdellio adhiberi. Nonnulli ab arboribus stillare contendunt, alii primum esse favum: Dicerem, crassiore quandam esse materiam, inter compositam, quæ Aristoteli *Mitys*, *μασδονεύς* & ceram mediam, flavescentem, odoratam, styracem referentem, & in mastiches modum ductilem. Cordus apud Mousetum, lachrymam esse, arborum gemmantium oculis innascentem scribit. Colectam, circa vestibulum alveorum ab apibus suspendi, contra injurias frigoris munimentum. Quatuor ejus facit species. *Prima* è nigra tantum populo colligitur. *Ægyrinam* vocant. Tractatu est mollis, visci instar, colore flavo, odore jucundo, somnifero, & styracis æmulo: sapore populneis gemmis respondente. *Secunda*, ex betula, eandem redolet, colore inter flavum, cinereum & subviridem medio, ductilis. *Tertia* ex Alpinae populi lachrymis colligitur, eaque rara. *Quarta*, ex his omnibus eaque mixta. Desitum jam est ea uti. Apiarii exemptis favis confundunt: & cera, quæ Avic. *Mum nigrum*, nihi aliud est quàm quodam

Galen. de simp. 4. 7.

Diosc. M. M. 2. c. 76.

Plin. H. N. 12. c. 14.

Plin. l. c.

Holler. Inſtit. Chir. 1. 6. c. 7. Plin. H. N. 12. c. 14. Arist. H. A. 1. 8. c. 7.

Propolis.

Monſit. Theaur. Inſtit. 1. 1. c. 6.

dam post decoctam ceram fundum petens sedimentum. Resolvitur oleo veluti cera, sed preponderat, & fundo illabatur. Syncera & odoratissima optima. Fusione in aquam facile à cera se jungitur. *Cretica* & *Passidica*, quod major illius pars à styracis & ladanii pinguedine colligatur. *Usum* si spectes vitiosam materiam ex alto elicit. Celso inter anastomica recensetur. Aëtio calefacit, discutit, maturat, extergit. Varro propter multiplicem usum, multo carius in sacra via, quam mel ipsum venditam scribit. Inde fortè *Ceræ sanctæ* apud Largum nomen. Veteri tussi suffitu prodest. Guttam rosaceam ex aqua tollit: impetigenes illita extirpat, & ad plurima prodest.

Varro R. R.
l. 3. c. 16.

Erithaca.
Arist. de
plant. l. 2.

Erithacam Aristoteles *Sandaracham* & *Smerion*, alii *Cerinthum* vocant. Doctioribus est *Vernilago*, quibusdam à temperate *Vernix*. Rusticis Lombardis, apud Niphum, *Carbina*. Diximus de eo ex Plinio supra. Varro gluten esse vult, quo favos extremos apes inter se compingunt. Mira ei vis eliciendi examina. Ubi volunt examen confidere, ramum erithace, addito apiastro, oblinunt. Virgilius *gluten* vocat.

CAPUT II.

De Fucis.

Nomen.
Aldr. Hist.
Ins. l. 1. c. 5.

FUCUS à fucō, seu quod sit fucata apis; seu quod fucum faciat, & prætextu alvearia calefaciendi, mellifica absumat, dictus videtur. Α φάγμα qui deducunt, audaces nimis sunt: ut & illi qui à furando, quamvis verum sit furari. Græcis est κηφήν & θρώναξ. κόρυς epitheton est, ωδὲ τὸ κόρυς τὸ ἐαυτῶν ἔργον, quod aculeum, ut aliæ apes non exerat.

Description
Colum. R. R.
l. 9. c. 15.
Plin. H. N.
l. 11. c. 11.

Columella eos genus amplioris incrementi appellat, simillimum apum; atque inter gregalia animalcula collocat. Plinio sunt sine aculeo, velut imperfectæ apes novissimæque, à fessis ac jam emeritis inchoatæ, serotinus foetus, & quasi servitia verarum. Aristoteles quartum genus apum, sed perperam, nec enim mella faciunt, facit. Vulgari ape ferè duplo major est: imò Regem crassiore & compatiore statura æquat. Duces essent, si aculeo instruerentur. Magnitudo ex vitæ instituto obtigit. Nihil superfluitatum laboribus absumitur, & interdiu & noctu sese liquore melleo ingurgitant. Colore splendente nigricant magis quam apes. Qui *Fur*, Aristoteli φῶρ, Hesychio φῶρ, dicitur, minor est. Plin. inter apes grandissimos nominat, nigros, lataque alvo, ita appellatos, quod furtim mella devorent.

Arist. H. A.
l. 9. c. 40.
Plin. H. N.
l. 11. c. 17.

Generatio

De *Generatione*, variæ sunt opiniones. Ex mulis putrescentibus nasci prodidit Isidorus, ex asinis Cardanus, ex equis Plu-

tarchus & Servius. Sunt qui aliunde, ex cerinthi, oleæ, vel arundinis floribus portari credunt. Alii ex apibus degeneratione quadam fieri existimant, posteaquam aculeos perdidere. Nonnulli has ex fucis originem ducere nugantur. Quidem denique in mares & foeminas distinguunt, (sanè Varinus κηφήνας τὰς ἀρρενας τὰς ἀπέρχουσας τὴν μέλισσαν explicat) & coitu propagari contendunt. Aristoteles ex apibus longioribus & porrectioribus prodire tam fucos quam fures affirmat, & quidem annis prosperis, quibus largior mellis copia speratur, abundante humore, quod & ex Plinio superius adduximus. Addit, seorsim gigni si Dux vivat: si obit, in Apum loculamentis, & hos fieri animosiores. Minores verò ipsis cellas confingunt, nec eas sparsim per alveum, sed extimis & velut ejectitiis castris. Sic intra ternarium numerum, ratione generationis, totum Apum genus redeigisse videtur. Duces & seipsos & aliud genus gignunt: Apes fucos: fuci gignendi facultate destituuntur. Foetus autem prout Apum, candidus est: ex eo vermiculi apum vermiculis minores exsurgunt.

Arist. de
gener. lib.
3. c. 10.

Græcis quibusdam αὐτὸν πλῆς, ἀπὸ πλῆς, ἀλειτάρρητος; αὐτὸν μολῶ, μηδὲν εἰς τὴν κωνὴν συμφέρον, fucus est: ideò Virgilius immunem ad aliena pabula sedere dixit. At quibusdam visum magno esse usui. Vivunt quidem, si mellificium attendas perpetuò ociosæ: imò totum diem in mellariis cellulis latent, nocte; sopitis somno apibus opera invadunt & vastant alveos, ut Eliano proditum; sed si nos Bartholomæus Anglicus non fallit, regias mansiones, illasque magnificas, in apice & meditullio favi specioso cooperculo insignes, exstruunt. Tzetzes ὑδρόφορος facit: Colummella feminibus, quibus apes figurantur, insidere scribit. Ad fovendam & educandam novem prolem adhiberi, exclusis proturbari: quæ omnia egregiè Plinius. *Domos*, inquit, *primum plebeis ex ædificant, deinde regibus. Si speratur largior proventus adjiciuntur contubernia & fucis. His cellarum minimæ, sed ipsi majores apibus. Sunt autem fuci sine aculeo, velut imperfectæ apes, novissimæque, à fessis & jam emeritis inchoatæ, serotinus foetus, & quasi servitia verarum apum. Quamobrem imperant iis, primosque in opere expellunt, tardantes sine clementia puniunt. Neque in opere tantum, sed in sætu quoque adjuvant eas, multum ad calorem conferente turba. Certè quod major fuerit multitudo, eo major fiet examinum proventus. Cum mella caperunt maturescere, abigunt eos: multæque singulos aggressæ trucidant. Nec id genus, nisi verè conspicitur. Fucus ademptis aliis in alveum rejectus, ipse cæteris adimit: Velpotius, si Aristotelem sequimur, cæteror. fucor. intus relictorum alas*

Virg. Georg.
l. 4.

Eliad. H. A.
l. 1. c. 10.

Theophr.
Chil. 8.
Hist. 227.
Plin. H. N.
l. 11. c. 11.
Colum. R. R.
l. 9. c. 11.

alas ipsæ apes comedent: ut malè Plinius, & τὸ πρὸ αὐτῶν legerit, & τὸ λοιπὸν ad apes retulerit. Sunt qui ex Aristotele favos in eodem alveo fingeretradunt. Manent enim maxima temporis parte intus, cumque exeunt, efferunt sese fusim, in sublimè, gyroque volitant, & quasi exercitium faciunt, quo peracto, domum redeunt, & epulis perfruuntur. De *Antipathia* quæ occurrunt, ex jam dictis petantur. De *Furibus* hoc adjicere placet, adeò sese aliquando replere, ut vix exire aut resistere possint: sæpè in apum cellulis parere: neque mel colligere, nec ædes erigere: ingressos, verberari & pro foribus semianimes relinqui, sæpè morti affici.

CAPUT III.

De Vespsis.

VESPÆ à Latinis nomen inditum esse puto, non tam quòd vesperi muscas capiat, vel vi petat & adoriatur, quàm quòd vesca, id est, gracili sit pede. Græcis *Φήξ* & *Φηκίον*, aut à *Φίγγω* stringo & gracilem facio, aut *δοτὴς* *Διφθαγγή*, quòd medio ita sit diffecta, ut quasi hiare appareat, dicitur. Nicandri Scholiastæ sunt *ἀνδροειδής*, Suidæ *δελιδής* & *δελιδής*, Hesychio *ἀνδροειδής* & *πρωτοειδής* Gazæ, sed *κατὰ* *ῥησιν* *αὐθρήναι*. Hæ enim potius Crabrones dici debent.

Descriptio. Animal est gregale, annulosum, oblongum, quatuor alis membraneis, (quarum primæ majores) præditum, exangue, intus aculeatum, sex pedibus instructum, colore luteo deaurato, super maculas nigras triangulatim positas, corpore toto transversim variegatum, unde fortè Pollioni *Διφθαγγή* dicebatur. Corpus medio pectori tenuissimo veluti filo alligatur, ut veluti elumbes & hietulæ appareant. Aculeum omnes gerere, Moufet. existimat. Varro eo ab *Apè* distingui putat, quòd *Apis* sit brevior, compactior, pectore ac dorso pilosis, capite oblongiore, acutiorè rostro, minus colorata alvo, annulor. lineis colore ruffis, & nigris ut plurimum distincta, antennis, sub oculorum regione locatas habet: vespa verò longior, veluti quadam fistula medio coherentibus alvo & pectore, glabra tota, rotundiorè & breviorè capite coloratior: & antennis supra oculos gerit.

Locus. Gaudent locis asperis, in iisque magis multiplicantur. Quædam tamen genera quibusdam in locis, ut post dicemus, non reperiuntur. In insula Nicein, Ortelio referente, mortem ictu inferunt. In extremo polari climate frequentissimas Olaus ponit. Condunt & vespera, cellulis & foraminibus plena in quibus nidificant & stabulantur. Reperies ea in sublimi aliquando, tectis ar-

borum truncis, montibus & quercubus: aliquando sub terra, in maceriis, cavernis & speluncis. Aldrovandus & in leguminibus & in humilioribus arbusculis conspexit. Tria nobis idem dedit. Unum ovale sub nucis juglandis arbore, terra ad pedis altitudinem effossa: alterum, subterraneum itidem; sed orbiculatum: tertium phialiforme. Prioris hæc erat constitutio. Antrum, inquit Aldrovand. seu foramen angustum: nempe ea amplitudine, qua singulis pateret aditus in terræ superficie conspicuum erat, à quo iter erat ejusdem amplitudinis tendens ad Vespertum, non quidem rectà, seu perpendiculari linea deorsum tendens, sed ad latera per cuniculos quosdam duorum, plus minus palmarum intervallo; à primo (quod in summam humum desinit) foraminis vestibulo. Hic majori & ampliori finit terra excavata est rotunda propè modum, ac ipsius Vesperti ovali figuræ proportionè respondens, ita tamen, ut inter Vespertum domicilium, & telluris cava latera, tantum sit spaci, quantum ingressuris sua penetralia vespis sufficit, ad transeundum arcum illud ostiolum totius alvearis unicum, ad latera collocatum. Hac scrobe aperta, effosque, vespertum ædificium domiciliumque apparuit, figura ferè ovali, altum ferè dodrantem, duas palmas transversas medio latum, undique ceu ovum testa, ita hoc membrana corticea obductum; eaque subalbida arenosa, simili licheni marino, ejusdem cum favis substantiæ, non ut Apum cerea, sed lignosum quid habentè, filiquisque tenuioribus leguminum, seu lunariæ majoris bulbonaca dictæ pericarpio, aut scabiosæ simillima substantia. Hujus superna pars, tecti vicem gerebat, & veluti tuguria ac mappalia culmine medio in conum fastigiato ab imbre undiquaque (cum fortè incidit) defendebat, inque parietum lateribus omnem hostilem incursum aditumque præcludebat. Infima basis fundamenti viceungebatur, denique undiquaque à sordibus putredine tutas reddebat. Hoc veluti putamine detracto seni favorum sese produnt classes seu orbes, qui sibi mutuò ceu tabulata solaria, aut contignatione superponuntur, ac imminet, iustoque distat intervallo. Sed ne tabulata superiora in inferiora collabantur, foetusque premant, aut suffocent, singula columnis quibusdam sustentuntur, quæ non susque deque formatae sunt, & constitutæ, sed à lata basi incipiunt, & ad concavam, seu pronam superioris tabulati faciem lato, ac protenso epistilio protenduntur, instar clavi utrinque capitati pollicis lati longitudine, ita ut fornices, & hypogæa videantur, infimi ac supremi orbes exigui, & angusti, medii amplissimi, reliqui orbes mediæ amplitudinis.

C

Singuli

Arist. H. A.
l. 9. c. 10.

Aldrov. de
Insect. l. 1. c. 6.
Nomen.

Descriptio.

Mouf. Theat.
Insect. l. 1. c. 8.
Varro R. R.
l. 3. c. 16.

Locus.

Olaus M.
l. 22.

Singuli plurimis cellulis abundant sexangulis, in quarum quibusdam Vespæadulta, in aliis foetus juniores, attamen perfecti, & alati, aliis Vermiculi condebantur, qui omnes posteriori parte sursum siti erant, capite deorsum.

De altero nihil singulare occurrit. *Phialiforme*, erat collo angusto, contra ventre capacissimo, cui latus pediculus appendebat. Materia constabat subtili, membranosa, qua undique circumductum erat. Forfice per longitudinem dissectum, tres membranas, illasque inani spacio distinctas, per quas circumcirca percurrere poterant, exhibebat. Prima membrana, exteriore minor, secunda amplior, tertia omnium minima conspiciebatur. In intimæ medio, septem cellæ eæque sexagonæ erant.

Vicius,

Appollonio ἀπολλόνει, Aristoteli ἀριστοτέλει, quod crudis carnibus malisve maturis vescantur. Sed nec pyris, prunis, uvis, floribus fructibusque variis parcent, nec ulmorum succo, sacharo, aut melli. Muscas etiam grandiores venantur & amputato iis capite, reliquum corpus auferunt, ne apibus quidem parcentes. Serpentibus avidè vesci apud Plin. legimus, eoque alimento mortiferos ictus facere.

Sexum agnoscit Aristoteles. Majores & robustiores mares, instruunturque aculeo: minores imbecillioresque femina, & carent eo. Matrices vocari possent, nisi eas Arist. latiores, ponderosiores, crassiores, & vespis majores poneret. Dari sexus, apud quosdam indicium, quod, si vespam ex pedibus ceperis, & bombilare fiveris, quæ aculeo destituuntur advolent. Coire vifas fuisse, idem ipse scribit: alii ambigunt. Vincentio, agrestes cum domesticis rem habent. De Generatione ita Aristotel. duobus locis. Primo, *Crabrones vespæque favos exædificant pullis suis, si ducem habeant nullum, eumque palantes quærant. Ac crabrones quidem in sublimi loco: vespæ in foramine: quæ ducem habent sub terra. Horum item favæ sexanguli, quemadmodum ut apum, compositi non è cera, sed ex corticea materia & araneosa. Ad cellæ latus deponunt fetus suos guttæ magnitudine, quæ parieti hærent. Non omnibus in cellis tamen simul fetus est: sed in quibusdam adeo grandes, ut etiam volare possint: in aliis nymphæ: in aliis vermiculi adhuc. Quibus solis subest stercus sicuti etiam in apum genere. Ac quandiu nymphæ sunt, neque moventur, & obducuntur folliculo. Altero. Duces ubi ceperè locum conspicuum, ineunte æstate fingunt favos: & constituunt, quæ vespeta vocantur pusilla. Putà, quaternis ostiolis, aut prope modum: in quibus vespæ oriuntur, non autem matrices. Quibus adultis, de integro, præter superiores telas, alias majores consruiunt: atque his adultis*

alias. Adeo ut ad finem Autumni plurimæ & maxima vespæ sint. In quibus dux quem matricem nominavimus, non amplius gignit vespas sed matrices. Oriuntur hæ, grandiorum vermium specie in quatuor aut non multo plurium inter se continuatarum superior: cellar. labris summis. Plin. addit. *Fœtum ipsum inæqualem & barbarum alium evolare, alium in nympha esse, alium in vermiculo. Et autumno non vere omnia ea.* Maximo numero matrices oriuntur, si anno proximo vespæ & imbrum copia præcesserat. Vermiculi antequam in Nympham transeunt oblongi sunt, vermiculis in carne (ἐνλας vocat Hippocrates) & in avellanis nascentibus non dissimiles, albicantes, incisuris notabiles, extremo corpore crassiore, linea nigricantè per dorsum discurrente, sine pedibus non repentes, sed huc, & illuc se volutantes & moventes. Deposito foetu, tenui quadam pellicula cellas obvestiunt, qua, ubi ad perfectionem ducuntur perfracta, egrediuntur in lucem, & à biduo volucres circumvolant. Oriri & ex putri certum. Ex equi cerebro nasci prodidit Pachymerius, ex carnibus, Plinius, Plutarchus, & Antigonus. Nasci ex asini corio, apud Isidorum: ex Crocodili sanguine vel cadavere apud Horum, ex putredine arborum & fructuum apud Albertum legimus. Ex fenis cervi, capitis sub oculo terebrato osse concrevisse, Vincentius Belluacensis, ex vetustissimo quodam authore tradidit.

Vitam quod spectat, matrices bimatum non superant: Operariæ una cum autumno finiunt ætatem. Imò, inquit Moussetus, utrum matrices sive duces anni superioris, novellis jam procreatis ducibus intereant, una cum vespis, novellis, idque simili modo semper eveniat, an amplius etiam temporis possint vivere, multi dubium relinquunt. Agrestes vivaciores habentur. Vitæ brevitatem, tenacitas compensat. Nam si alvos à capite, hoc à pectore sejungas, ferient tamen, & quidem nec levius quàm antehac. Circulariter volant, quia catida destituuntur. Cedunt tinunculis, hirundinibus, noctuis, taxo, & vulpi in cibum. Vulpes caudam in vespem inferit: onustam, ad arbores allidit: & mortuis vespis vescitur. Pseudosphæcem, quam solitariam vocant, sinistra apprehensam atque annexam, (quæ prima eo anno capitur, maximè conducit) contra quartanam laudat Plinius. Mizaldus aquæ ex vespis stillatiæ meminit, quæ tumores absque dolore excitet. Inflativum esse necesse est. Curatur ictus si contusas vulneri imposueris, vel emplastrum ex terra furnorum, aceto, & muscarum capitibus. Alii extra succum citrulli, foliateneriora filiquæ Plinii, salviæ cum aceto,

Plin. H. N. l. 11. c. 21.

Plutar. in Cleomene Antigon. in Mirab. Plin. H. N. l. 11. c. 20.

Ætas.

Usus.

Plin. H. N. l. 30. c. 11.

Plin. H. N. l. 11. c. 21. Arist. H. A. l. 9. c. 41. Plin. H. N. l. 11. c. 53. Arist. N. A. l. 9. c. 41.

Arist. H. A. l. 9. c. 65. Scal. edit.

cujus anterior pars media, fusco colore, & cingulo croceo notatur: posterior, tota crocea videtur, octo fuscis punctulis notata, una cum triangulo parvo, incisuris præterea quibusdam in utraque parte existentibus, quibus se extendere & contrahere pro lubitu possit. Juxta ventrem maculas utrinque quatuor nigras habet, & in *cauda*, aculeo longo, robusto & maxime venenato armatur. Hoc inter crabrones & vespas intercurrit discriminis, quod vespis sint majores, alvum minus gracilem habeant, ejusque pars, quæ tenui ligamento thoraci annectitur, multo sit latior; thoraxque compactior.

Favos (*αὐθέρναια* Suidæ) sub terra, quam formicarum instar egerunt, faciunt: duce ab alveis aberrante, sublimia & arborescunt. Ideo Plinius in cavernis arborum degere scripsit. Nidos ad amissum omnes ferè sexangulares ædificant. Exterior facies candidis ferrugineisque segmentis distinguitur: materia membranacea est, & betulacei corticis per æstum in laminulas fatiscantis peræmula. Lenta quadam falliva, & gummosis foliis, pluribus ob prolem tabulatis adaucti eleganter poliuntur. Duos Aldrovandus observavit, de quibus ita scribit. Inveniuntur quinis aut senis, & ut plurimum sex ordinibus, seu tabulatis constricti, cujusmodi is erat, quam agricola meus, cum quercum per medium serrâ divideret, offendit: cujus cacumen in superna trunci cavi parte situm, tecti loco fungebatur, substantia membranacea betulæ mediano cortici simili, quam ex populi nigræ & falicis ligno putrilaginoso, ac pulverulento ab exedente carie, humore glutinoso iis peculiari, compingere dicuntur: nec ea contigua, & solida est, unica veluti membrana constans, sed pluribus: ita ut lancellæ plures sibi mutuo adherentes videantur, in eo, quod inter ipsas intercedebat interstitio, rotundos quosdam ductus canalium modo seu fistularum continuo ad fundum, seu ultimum orbem via, effinxerant, per quos supernæ deorsum ferri possent, in fundo autem cortex, quo totus alveus circumvestitur, patulo aditu dehiscebat, utpote per quem alvei penetralia subeuntes, ad singula tabulata ascendant, inerant enim, & singulis tabulatis sua foramina satis ampla, per quæ in singulas cellas singulæ se recipere poterant. Observavimus quoque alveum tam prudenter ab his fuisse conditum, quam ab aliis quibusvis, aut apibus aut vespis, nam superna arboris cavæ parte uno latere, in quod nonnihil parte superiore reclinabat, suspensus erat, eo situ, ut cellularum oscula deorsum propenduntia fundum antri arborei spectarent, & crabrones ac eorum Nymphæ, & vermiculi capite deorsum tanquam ruituræ conderentur, nec id aliam

ob causam quam ut ab omni aëris injuria, & quæ desuper in ea arbore incidere poterant, pluvia, aliisque utpote adrepentibus tutiores essent. nam si cellulæ ea parte, qua patent, cælum spectassent, magnis certe incommodis obnoxii fuissent, singula autem tabulata ejusdem erant materiæ, cujus cortex exterior versicoloribus lineis albis dico & ferrugineis, tanquam segmentis interstinctæ. Reperiuntur nonnulli quoque alvei Crabronum majores multo, quam prædicti, & septem tabulatis exornati ejusmodi rure meo in tuto reperi trabi appensum; altitudine duorum dodrantum circumferentia; quinque iisdem lineis aut cum superiori eminentibus albis & ferrugineis, tabulatis rotundis tanquam orbibus cellulis plenis, digitum transversum altis, quæ digitorum duorum latitudine à se invicem distabant; ad facilem singulis ingressum; hæc columnis optimè erant fulta, in superiore hujus nidi parte foramina erant majora, in quibus parentes degebant, in inferiori minora, in quibus filii.

Quia Cibum in favis per hyemem non viant, recondunt, ideo jejuni tum latent, & plurimi moriuntur. Vescuntur muscis majoribus. Captis caput abscindunt. Uvas corrodere vel inde constat, quod autumni tempore frequentes vitæ circumvolitant. Carne quia magna ex parte, Aristotele teste vivunt: ideo in stercorebus sæpissime versantur. Aves ubi caperint, accipitrum ritu, caput primo vulnerant, deinde abscindunt. Pennius in Petropoli, in publico urbis vico, passeri accidisse vidit. In India oleum, butyrum & reliquos cibos infestant, ut nihil intactum ferè relinquant.

Ex equorum cadaveribus oriri, plerique cum Ovidio, sentiunt: ex asini cerebro Landus; ex duriore carniū equi parte, ut vespas ex teneriore Moufetus. De Coitu ita ex Aristotele & Plinio Aldrovandus. Quod (verba sunt Aristotelis) ad generationem, cognatorum iis (Apibus) animalium pertinet, ut Crabronum, Vespasumque, similis quodammodo ratio est: sed defuit his locuples naturæ dotatio merito. Nihil enim apum genus habent divinitatis. Generant quippe matricēs vocatas, primosque favos confingunt. Generatione verò coeundo inter se finguntur. Visus est enim sæpè eorum coitus. Fæturam autem Apum modo instillant ad latus cellularum favi, & parietibus admovent. Sed quemadmodum Vespasum fœtus, ita quoque Crabronum latid est æqualis, nam aliis cellis grandiusculus inest, ut queat volare, aliis Nympha, aliis adhuc vermiculus. Excrementorum vermiculis tantum ut & in Apum genere est. Nam ut ait Aristoteles, Apum & Crabronum &

Arist. H. A.
l. 9. c. 42.
Moufet. l. c.

Generatio.
Ovid. Met.
l. 5.
Landus de
Num. ver.
Aristot. de
Gener. l. 3.
c. 10.

Locus.
Arist. H. A.
l. 5. c. 23.
Plin. H. N.
l. 11. c. 21.

Aldrov. de
Insect. l. 1. c.
7 p. 229.

Vesparum vermes, quamdiu recentes sunt: tantisper & stercus emittere videntur: at cum formæ lineamenta receperint, sub qua facie Nymphæ appellantur; Jam neque cibum præterea coquunt; neque ullum reddunt alvi excrementum, sed coerciti, & contracti quiescunt, nec ullo pacto movere se patiuntur, usque dum ipse species destinata perficiatur, quo pacto evolat proles rupto quo continebatur folliculo. Cæterum quod fœtus inæqualis sit, Plinio quoque traditur. Fœtus (inquit tam de Crabronibus quam de Vespis) ipse inæqualis est & Barbarus (alii legunt ut Barbaris) alius evolat, alius in Nympha est, alius in vermiculo. Et autumno, non Vere omnia ea. Plenilunio maxime crescunt. Mellis quoque paululum quantum gutta, in cellis Crabronum è regione parari scribit Aristoteles, Schadonesque hujus generis non vere, sed autumno fieri, crescereque plurimum plenilunio.

Antipathia
Palla. R. R.
l. 3. m. 7.

Vespis amici sunt. Ideò percussà Scorpionibus, nec à Vespis, nec à Crabronibus feriuntur. Muscis inimicos esse de victu dictum. Inter Caniculæ & Arcturi ortum, apibus prodeuntibus ante alvearia plarumque obsidiantur. Juvencis quoque sunt infestissimi. Melis plenio illorum antra ingreditur, totamque familiam destruit.

Natura.

De *Natura & Moribus* pauca occurrunt. Ducem unum habent, magnitudine corporis majorem, eumque impensè amant. In singulis hic eorum alveariis oritur, contra hostes foris pugnacissimus; facillimus domi erga subditos. Nulla fit examinis, ut inter apes emissio; novella profapia sinu parentum favetur, & ad illius conservationem plures contignationes superstruuntur. Amplificant, inquit Moufetus, majorem in modum favos, & jam ex valentiore quodam grege, quales tres aut quatuor favorum plenos excepimus. In cellis parum mellis quantum gutta è regione prolis paratur. Majorem quam Vespæ inter volandum sonum edunt. Cicurationem non admittunt: & tantæ sunt malignitatis, ut Syrio præfertim orto, ter novenis ictibus, hominem, imò & Equum interficiant. Haud temerè sine febre esse, dixit Plinius. Remedia in Vesparum historia posuimus. Majore duntaxat quantitate, hic exhiberi debent. Si luce crepera, sæpius nidos intraverint, quasi se occultaturi; pluviam & ventos expecta: ferenitatem proximæ diei, si vesperi numerosiores obvolitavere. Jejunos per hyemem latere, superius dixi.

Avien. in
Carmin.

Ufus.

De *Ufu* nihil habeo quod dicam, nisi quod Mizaldus prodit, aqua destillationis eorum, cutim attactam, in tumorem attolli. Mentiri sic imprægnationem coram amasiis meretriculas.

Differētiæ: Nec de Differentiis quicquam occur-

rit. Quæ hic de Tenthredine, Tenthrene, & Pemphredine Moufetus habet, in capite de Vespis allata sunt.

CAPUT V.

De Cicada.

HActenus de Anelytris quadripenni-
bus membranaceis, favificis dictum: Aldrov. de Ins. l. 2. c. 13.
jam de illis quæ non favificant agemus, & primum de *Cicada*. Nomen apud Latinos seu quod cito quasi cadat & evanescat, seu quasi invenit κίκε & ἄδων. Apud Græcos pro regionum, sexus, ætatis, & magnitudinis ratione, varia obtinuit. Generaliter vocatur τέτλιξ, Eleis βέβαν, Sidetis σεργάρ, Põnticis βάτραχ, Cretensibus σύμφυρον, Suidæ popularibus ἔρον, quod rorem exugendo vivat, Fœmina non vocalis Æliano est κερωπή & καλαμαία: Athenæus tamen simile cicadæ animal credit. Novella, κίκε & κίλλ, parva καλαμαία, καλαμίδας & κερωήτας alii dicunt. Τετλιγία etiam Cicadastras significant, ut apud Cælium legimus. Epitheta apud authores plurima invenies. Dicuntur πελαγίδες à volando: τετραπτελίδες, quod quatuor pennis in aere remigent: ἀμήτερι, quod nimio cantu se oblectent: φίλομβροι, quod tempestate pluvia plurimæ nascantur; ἡλιομανείς, quod infano solis amore capiantur: ἀπυλόνες, ὡς τοὶ αἰθέρι ὑπὸ ἡλίου, quod à sole comburantur: κυανόπτεροι, quod alas cyaneas habeant. Virgilius querulas & argutas dixit. Nemesianus æstivas: quidam graciles dixere. Pontanus Choralistriam vocavit, quod alternatim & chori instar canat.

Athen. Di
propos. l. 4.
Hesych. in
Lexic.

Virg. in
Culic.
Nemes. in
Eclog.

Vulgares ita Moufetus descripsit. Vulgarium caput pronum, magnum videtur; & pentagonum imitatur, lateribus inæqualibus finitum. Colore est viridi nigricante; (Aldrovandus superiorem corporis partem nigram ponit, inferiorem ad nigrum vergentem: unde & Martialis nigram fecit.) utrinque tumulos duos obtinens, ejusdem coloris, sed ovalis figuræ, & marginē quadam fusca circumseptos; fusca item linea tumulos secat medios, mediumque caput jota litera nigerrima dividit. Oculos habet ex fusco non multum viridantes, prominentes quidem & magnos pro corporis ratione: (immobiles adde & lucidos, ut mirer Nigidium, qui cicadis oculis negavit, eos non vidisse) Supinum caput sive facies, diluto ex albo viridiusculum apparet. Inter insecta omnino in hoc animalium genere una, ore caret: habet tamen prolixum quid, compactum, indivisumque, intus plerumque conditum, quod veluti promusculis, tum oris, tum lingue usum supplet, denis striis transversis affa-

Description.

Mart. l. 1.
Epig. 116.

Arist. H. A.
l. 4. c. 30.
Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

to, cretam in pulverem redactam, melissophyllon cum oleo, asparagum tritum cum melle, simum denique bubulum laudant: *intus*, succum sampuchi cum bolo Armeno & agresta folia tenuiora lauri cum vino; Althææ decoctum ex posca; rutæ vel melissophylli succum, folia ejusdem commanducata, etiam commendant. Si à *venenatis* ictus est, quod stupor, delirium etiam ostendunt, locus primo scalpello aperiatur; dilatatus fugatur, insequenti cataplasmate ex terræ in qua vespæ nidificant rasura, cum aceto subacta: Inter *præservativa*, malva & althæa palmam tenent. Quomodo capiantur vide apud Mousetum. Interviant & ad *præsentia*. Longam portendunt hyemem, si ante finem Octobris apparuerint: pluviosam ac frigidam, si multis in locis, ante Vergiliarum exortum, subterraneos specus glomeratim ingrediantur: ingentes imbres, si multa autumnus generantur. Scilicet, frigida cum sint animalcula, subterraneos quæ calent specus subeunt: & quia non nisi terra humida & vaporosa procreantur, nimiam humoris copiam, si copiose proveniant indicabunt. Capuæ, ingens earum multitudo quæ in æde Martis confederat, hostium adventum, & urbis incendium quasi præfagebat.

Differentiæ vesparum sunt plurimæ. Aristotel. *sylvestrium, domesticarum, matricum*, seu *Ducum* & *Operariorum* meminit. Apud Plinium sunt *Ichneumones*; & *Pseudosphecæ*. Apud alios occurrunt, *πρόνοτες*, *πυροφίδες*, *βενετικές*, *parva, magna, flavæ, Indæ, spuria, venenata, solitaria, Laerta, Aculeata, non aculeata*. Aldrovandus *duodecim species* quas observavit descripsit, quarum icones damus. Mousetus *duas* ex Hungaria accepit, quæ etiam hic exhibentur.

Ferum illud & *Sylvestre* genus rarum est. In montibus & sylvis nascitur: & non sub terra, sed in quercu nidificat. Grandius est, porrectius, nigrius, varium, longius, fortius, aculeatum, ictuque acerbius. Authores sunt, ter novenis punctis interfici hominem. Vivit toto anno; & hyeme, cæsa arbore, evolat. Hyemem in latebra exigit. Mousetus semel in sylva Essexiensi cum vitæ periculo observavit. A toto examine obrutus fuisset, nisi aliquot genistæ ramulis sese defendisset. Varro pilos magis facit. *Domesticæ*, quæ & *Cicures*, & *placidæ*, seu mitiores, minores sunt. Dividuntur in *Matrices* & *Operarias*; quarum illæ biennio durant, & majores sunt. Plinius clementes facit. Latior earum, addit, species: dubiumque an habeant aculeos, quia non egrediuntur. *Operariæ* in opere versantur, & matres pascunt. *Ichneumones*, minores sunt quàm aliæ, & unum genus ex araneis perimunt phalangium appellatum, & in nidos suos ferunt, deinde illi-

nunt, & ex iis incubando suum genus procreant. Vocantur ita, quod *ἰσχυροί*, exiles nempe & graciles videantur. *Pseudosphecæ* caput, fuscum, duo breviora & gracilia in fronte cornicula; oculi magni, nigri, prominentes; os oblongum, bifurcum pectus crassum ac prominens, quibus tres utrinque pedes affixi; scapulæ densæ, gibbosæ; corpus procerum, gracile, articulatæ; alæ fusæ, duæ; pedes hirsuti, & colorem alarum affecti.

Parnopes uvas tam maturas quam immaturas exsugunt. Unde ita dicantur, nescire me fateor. Noctuarum stridularumque præda sunt. *πυροφίδων*, Nicand. Scholiasti, est animalculum *σφηκώδες*, minus apæ, majus formica, aligerum, albo nigroque colore varium. Montes saltusque incolit, & è fruticum floribus melleos succos carpit, & in cavis quercubus stabulatur. Idem esse cum *πυροφύγη*, aut *πυροφύδων*, non facile dixerim. *βένετις* apud Nicandrum ex vesparum quoque genere insectum, *μέλαν & ἡ χροιά, κέντρον, χροιά, coloris nigri: aculeo utens*: Vocatur, ni fallor, & *βένετις*. Nicander sylvestre & montanum facit. De *parvis* nihil singulare occurrit. *Magnarum*, quædam capita nigra, & aculeos plurimos habent. *Flavæ* Ardoyno *citrina*, in duas divisæ partes, in medio tenuissimi ligamenti beneficio hærent. *Indæ* sunt & domesticæ, quæ innoxia; & sylvestres, quæ virulentæ. Quas Oviedus descripsit, sunt corpore magno, colore luteo, ad album tendente, alis maculatis nigris, extremitate aliquantulum albicante. *Spuriæ* apum aut muscarum figuram obtinent. De *Venenatis* in sylvestribus & Indicis dictum. *Laerta* huc spectant, quia mortiferam plagam, ut laertæ viperæ formicæ inferunt. *Solitariæ* in muris & aggeribus congestis nidificant. Ante ostium foraminis lutosa ponitur porticus. Longitudo ejus duos quasi transversos digitos æquat: intus lævigato luto emplastratur. In *aculeatas* & *non aculeatas* distinxit Aristoteles.

De suis ita Aldrovandus. Quæ à me observatæ sunt vespæ.

Prior vesparum omnium, quotquot observavi maxima est toto corpore atro, præterquam in superna alvo, ubi quatuor sunt maculæ luteæ, illæ scilicet quas albas icon exprimit. Caput minus, quam in plerisque aliis à cervice distinguitur, in quo oculi nonnihil lutescunt. Antennæ sunt magnæ, & latiores, quam in aliis, nigra, nigri quoque pedes, & hirsuti. Alæ argenteo, & aureo obscuro ad castaneum inclinate resplendent.

Secundum genus est vespar. minimarum, alis proportionem latiusculis, & oblongiusculis subflavi coloris. Corpore toto ex nigro ad castaneum vergente, sed zonis

ex

Steph. de Agric. l. 1. c. 8.

Theophrastus de signis tempor. Aratus in Phenom. Theon. in Comment.

Differentiæ Arist. H. A. l. 9. c. 41. Pân. H. N. l. 11. c. 21.

Mouset. de insect. p. 45.

Varro R. R. l. 3. c. 16.

Nicand. in Theriac.

Ardoyn. l. 2. de Venen.

Mouset. l. 6.

Aldrov. de Insect. l. 1. c. 6. p. 202. edit. Bononiens.

ex albo flavis ad croceum inclinantibus distincto. Caput erat exiguum valdè, punctis duobus croceis ferè, supernè insignitum. Oculi nigricabant, antennæ nigerrimæ in extremo obtusæ. Pedes exigui, colore croceo.

Tertia magnitudine Vespæ vulgari compar, vel paulò minor, sed tota atra, antennis, pedibusque longissimis, capite ovali, albo breviori, lineis exiguis transversalibus, subflavis distincta, tenui ligamento pectori annexa. Alæ vero argentæ, splendide, subrubris velut venulis percurrentibus præditæ.

Ex minimarum genere sunt *quarta* & *quinta*: quarum *prima* tota atra est, capite nimirum, pectore & albo, quæ partes ferè æquè magnæ sunt, quod in aliis non observabis: Pedes quoque nigri sunt, & leves, antennæ item nigrae & exiles: Alæ fuscescunt. *Alterà* capite item est nigro, rotundo. Huic antennæ breviores sunt, sed nescio quid velut tricuspidem exerit; pectore est angusto, quæ capiti hæret latiore, ac lutescente, quæ albo angustiore & nigro, albo ferè rotunda, primo lutea, dein modo lutea, modo nigro varia. Alæ ad aureum colorem accedunt.

Allatam ad me eam, quæ *sexto loco* depingitur, propter miram capitis formam. Simiæ quodammodo aspectum æmulantem, Vespam sinuformam nominavi. Tergore est crasso, rubicundo: rubicundo item vertice, oculis nigris, majusculis, infra linea semilunaris, ceu os constituit. Alvus item crassa est, sed tenui pellicula tergori adhæret; Anterius nigricat, in extremo candicat, punctis transversalibus nigris. Alæ fusca, sed perperam duostantum pictor expressit.

Septima inter magnas & parvas ambigit, tota atra, sed maculis undique aureis, aut flavis interstincta, iis autem, quæ in expresso icone albæ apparent. Pedes non ut in aliis Vespis, tenues, sed crassi respectu corporis, quod compactius est, colore subcroceo, antennæ ateriimæ, exiles & breves, Alæ cinereo luteo.

Octava icon, Vespæ est imperfectioris, quam ut posset volare, feminympa adhuc, ut ex nymphæ recens orta. Corpus ex albo ad luteum vergere incipit, nondum maculis distinctum. Est ejus generis, quod decimo subinde loco depingetur, nimirum favis insidens.

Nona pectore est longissimo: albo mediocris longitudinis, ita invicem hærent, ac si duæ diversæ essent Vespæ. Tota flavo & nigro colore alternatim constat, pedes & antennæ sunt longi, sed valdè tenues, coloris ferruginei. Ferrugineæ quoque alæ sunt quatuor, quanquam trinæ tantum sint depictæ. Caput quo-

que luteo, & nigro colore variat.

Decima ejusdem omnino cum novissimè descripta coloris est, sed breviori pectore. Vespeta talia quali insidet, ferè ædificat, vel ad fenestras, vel ad arborum ramos, vel alicubialio in loco.

Undecima elegans genus sylvestrium vespæ est, albo miniaci coloris, sed annulis nigris, & nigra podicis extremitate. Alas habet quatuor, oblongas, sed angustas coloris ferè cinerei. Pectus, & dorsum nigricant, & ad ferrugineum vergunt. Caput ejusdem est coloris, rotundum, exiguum: antennæ verò longiusculæ, nigrae in extremo acutæ.

Duodecima tota est coloris fusci, ad atrum vergentis, pedibus longiusculis, longis item antennis: capite, & alis nonnihil ad ferrugineum accedit.

Decimotertio, ac postremo loco depictum Vespis congener judicavi, quanquam revera nondum didicerim an favificet. Corpore ex procero, nigro, & flavo coloribus vario, tenui. Alas pictor duas expressit, sed nunquid vel duas, vel quatuor habeat, ut quod res est dicam, ignore. Capite interim Vespas potius, quam Muscas refert. Antennæ in extremo obtusæ sunt. Pedes sublutei. Mouseti Hungaricæ, quas Vienna accepit, dorsis erant luteo atroque variè pictis; Corniculis huic pilosis, illi glabris, tertia penè parte vespis vulgaribus majores.

CAPUT IV.

De Crabronibus.

DIVERSUM à Vespis Crabrones genus pono, quod in corpore tantum discriminis appareat. Nec placet ab Aristotele & aliis abire, qui diversis capitibus de iisdem egere. *Nomen* ipsi apud Latinos vel à Crabra in agro Tusculano, ubi perfrequentes sunt; vel à cabo, seu caballo, ex quo creantur, ut Isidoro visum obvenit. Scaliger à craceo deducit, à quo Craber & Crabro: alii à κρέας caro & βόες cibus, quod carnibus vescantur. Græcis est ἀνθρήνη, fortè quod ictu carbunculum excitet.

Duplò vespis sunt majores forma proximè ad easdem accedunt. *Alis* instruuntur quatuor, quarum externæ internis duplò minores, & humeris obscurè fuscis & castaneo colore tinctis, affiguntur. *Pedes* habent sex, ejusdem cum pectore & humeris coloris. *Caput* oblongum, croceum. *Oculi* sunt propenduli, inter quos antennæ duæ oriuntur, falcis æmulæ, ejusdem cum pedibus coloris. *Venter* tenui quasi filo humeris annectitur:

cujus

Nomen.

Isid. l. 12.

Descriptio. Mouset. d. Insect. l. 1. c. 9.

affabrè canaliculatum. (Plinius linguam fortè appellavit: figuræ est triangularis, coloris castanei.) *Corpus capiti brevissimo collo, vel potius nullo annectitur: Scapulae, ex viridi & nigro maculatae; pectus viride magis albicat,* (durum hoc, ideò Martialis vetulas, pectus Cicadæ habere dixit.) *è quo tres utrinque pedes tibiæque erumpunt prassini coloris.* (Aldrovandus subtilissimos, & in fine asperos, ut arbores conscendere possent, addidit) *Venter, in majoribus duos digitos transversos æquat, latitudine unum: interna ventris pars, peltam refert in apicem desinentem, & limbo duodecem tredecemve articulis constante cingitur: intus incisuræ aliquot apparent concolores ventri, caudamque extremam mares, id est, minores, fissam habent; foeminae contrà integram.* *Dorsum nigricat, septem vel octo lineis & incisuris virentibus, transversim ductis ornatum.* *Alæ pulcherrimæ, argento illitæ, navisque fuscis & maculis cum ornatu pictæ, externæ internis duplo longiores sunt, magisque variegatæ.* *Membranæ quia sunt, ideò ὑμενῶνες vocantur. Pennarum illis natura quæ apibus, sed pro corpore amplior, dixit Plinius.*

Non visuntur in septentrionalibus regionibus: quod frigus averfentur. Nec apud Cyrenam in campo ullæ, cum circa oppidum multæ proveniant. In nemoribus umbrosis frustra quæras. Ideo oleas, quia minus opacæ ambiunt. Nullas in Gecala agri Nolani monte, nullas Neapoli proditum: feti Maronis magia id factum, ut Nipho placet, seu incolarum industria qui arcere stiorunt, seu terræ ipsius genio. Scio quid signis & scripturis, quæ συχνα, adscribatur. Copiosas Italia; Narbonensis Gallia, & Ægyptus ferunt. Mirum verò, in Milesia regione paucis esse locis. In Cephalenia amnem quendam penitriam earum & copiam dirimere. In Dulichio maris Jonii insula idem observatum. Vesuvium, qui agrum Nolanum à meridie claudit eas nescire; Abellam, quo monte idem ab Arcto sepitur, plurimas producere. De mutis & vocalibus in Differentiis agemus.

Rore vesci, præter Aristotelem, Theophrastus & Virgilius prodidere. Excitatæ, cum subvolant, inquit Plinius, humorem reddunt, quod solum argumentum est, rore easdem ali. Quia verò ore carent, quiddam aculeatum linguis simile pro eo habent, & hoc in pectore est, quo rorem lambunt, Antonius ab Altomari ex fraxini & Orni præcipuè ramis corticibusque lachrymam fugere dixit. Ex herbis vel de herbis more papilionum id facere, probabile est, tum quod jejuna semper & inanes reperiantur, quòd nihil excernere conspiciantur; nisi fortè ubi plusculum roris

absorpsere; superfluum ejus partem, ut rustici notarunt, removendo ejiciant. Aristoteles tamen alimentum Cicadarum, in ipsa corporis humiditate situm esse, opinari videtur: foramenque se conspexisse dicit, per quem aquosum, qui in ventre continetur, humorem, ejiciunt.

Ex Cuculorum sputo nasci fabulatur Isidorus. Provenire & ex putri, verisimile est. Vidit Baldus Angelus sub quercubus rarioribus, imperfectas, forma solita, albas, & sine alis effossas, cum terra non culta, & ad Orientem obversa fodere. Novimus & Anguillas ex limo nasci, quæ postea more cæterorum animalium generant: & circa Ægyptias Thebas post vehementes in æstibus pluvias, universa arva foricibus impleri, Basilus prodidit. Sed & lutum, si non debito tempore proscindatur, Cicadas proferre, testatur Paracelsus, & ante eum Hesychius.

Ordinariè per coitum generant, Coitus supinis: masque inserit in foeminam, quæ genitali reciso, recipit quod à mare injicitur. Asperitate quæ in dorso, excavant foeturæ locum in terra. Quapropter magna Cicadarum, in agro Cyrenensi copia est. Pariunt & in squillæ caulibus: & in arundinibus quibus vites eriguntur, nidos foeturæ cavant. Ova alva deponunt. Fit primò vermiculus: dein ex eo, quæ vocatur, Tettigometra, (theca est, aureliæ papilionum similis) cujus cortice rupto, circa solstitia evolant, noctu semper: primum nigræ atque duræ. Tettigometra in eo à Chrysalide differt, quod in hac nulla sit partim distinctio: in illa, caput, oculi, pedes, cæteræque partes exceptis alis, apertissimè conspiciantur. Color ei subalbidus; sed qui multis lineis subferrugineis respergitur. Quomodo exeat, Aldrovandi verbis visum exprimere. Cum è Tettigometra egredi cupit, inquit ille, ascendit primum arborem, & illico alicui ramo adhæret, (quamvis scribat Aristoteles, ubi Cicadæ eruperint, oleis & arundinibus insidere) deinde exit parte superiore, in qua rima primum apparet; rupto autem operculo, ut rectè scripsit Philosophus, parum in eo relinquunt humores; nam hoc operculum cum manibus contrèctarem, humore aliquo aquoso digitos illevit. Iam tum simul atque Cicada emerfit, toto ferè corpore viridis est; dein superiore parte aliquantum ad castaneum vergit, quæ spatio unius diei subnigro fit colore, insidettam diu huic exuvio, donec volare incipiat. Imbecilles enim primum sunt alæ pedesque, ut difficulter incedere queat. Exuvium hoc tegm dici Hesychius reliquit: aliis est λευγῆς & ὑμεγς. Lucretius modo tunicam, modo folliculos nominat. Æstate deponi addit.

Hyeme, imò in autumnno perire, apud

Ætas: Ari

Arist. de part. anth. lib. 4. c. 5.

Generatio Isidor. n. Origin.

Basil. in Hexam.

Plin. H. N. l. 11. c. 26.

Plin. H. N. l. 11. c. 26.

Lucret. l. 4. S. 5.

Mart. Epig. l. 3. ep. 93.

Plin. H. N. l. 11. c. 16. 18.

Locus. Arist. H. A. l. 5. c. 30.

Plin. H. N. l. 21. c. 27.

Aldrov. de Inf. 2. c. 13.

Nol. l. 1. c. 1.

Vicius. Arist. H. A. l. 5. c. 30. Virg. Ecl. 5.

Altom. l. de Manna.

Arist. H. A. l. 4. c. 7.

Aristotelem & Plinium habetur: in montium antris aut terra se condere, ex Aristophane quidam evincere conantur. Temperamentum in causa, quod quam aliis infectis frigidius.

Cantus.

Cuculo infestas esse, eumque audita voce invadere, creditum quibusdam. Ideo sub exortum caniculæ cuculare desinunt.

Quia sonoram vocem edunt inter infecta ἐγκέλαδα numerantur, πηλίζω id Græcis, fritinnire Latinis. Theocrito à sonο πηλίζες λαλαγέωντες dicuntur. Ambrosius *dulcem in exiguo gutture Cicadæ cantilenam* dixit. Platonis eloquentiam Simon Sillographus, Cicadarum cantilenis comparavit: eundemque sonum & citharæ & harum veteres ἑπερσμάτω nomine vocabant.

Ambros.
Hex. c. 22.

Incipiunt autem æstate canere; minores citius, quod citius è Tettigometra exeunt. Achetas sub Syrio astro canere, cum capræ & vinum optima sunt, apud Hesiodum habemus. Plinius cantus acerrimi facit, quo tempore Scolymus floret: floret autem serò, diu, & æstate. Alibi solstitium, æstivum scilicet, ponit. Aliquot post auroram horis, cum sol validius ferit, canere, vex Poetis colligi potest.

Virg. Ecl. 5.

Hinc Virgilius.
Sole sub ardenti resonant arbuscula Cicadæ.
Quam diu canant sciri non potest: autumnosilere cognitum.

De modo non convenit. Ægyptii per aculeum emodulari, & motu suo stridorem ciere, veluti plectrum quo citharæ pulsantur, opinati sunt. Basilio, aëris respiratione id fieri visum. At quia & pulmonibus carent; & capite, cui illa fistula inhaeret orbæ, canunt, nihil horum est. Multo minus verum, vel dentes inter se atterendo, quos in commissura Scapularum haberent, id facere, vel alarum attritu, (hæc Procli Diadochis sententia) quod locustis fuetum. Membranulæ sub flabelis (sic vocant operimenta illa duo, post postrema crura ventri adhærentia) reversioni id adscribendum. Sonant quippe, ut brevissimè Aristoteles, alliso ad membranam septo transverso subditam spiritu. Nam dum illa eo pacto distenditur ac remittitur, sursumque ac deorsum impellitur, sonus erumpit stridulus, non secus quàm in puerorum arundineis fistulis pellicula tenui constantibus; qua depressa, intentâ, vel vibrata, sonitum fieri necesse est. *Ælianus* τὸ ἐν λαλεσέτης esse dixit. Pierius Valerianus, colliso, attrito, agitatoque cavo utero. Quia verò hæ partes sub alis, haud improprie veteres Poetæ Cicadas sub alis canere dixerunt.

Bas. Hexa.
Hom. 8.
Cardan. de
variet. Rev.
l. 7. c. 28.Arist. H. A.
l. 4. c. 9.Arist. H. A.
l. 1. c. 20.
Pier. Hieroglyph.
l. 26.Natura.
Mousen. de
Insect. l. 1.
c. 17.

audiverint, maximo laterum cantu, πολυφωνοὶ καὶ ἐξυφωνοὶ adstrideant. Æstatem certo prælagiunt, nec unquam post Cicadæ adventum frigus rediisse visum est. Quod si citius solito aliqua die cecinerint, æstum majorem expecta. Tempestuosum tempus, si ab austro venerint: morbidum & pestilentem annum, si frequentes appareant. Raræ tamen Anno. MDLXXV. grassante in Italia peste visæ, quod rore destituerentur.

Mercuriat.
de peste c. 6.

Vescebantur Athenienses assis, quales & in Cotii convivio appositæ Athenæus author est. Ante coitum Parthi mares præferunt; à coitu foeminas, ovis earum correpti, quæ candida, suavissima eadem antequam cortex cadit, si Aristoteli credimus. Carabi Americæ juxta sinum Darienem populi, siccas vel salitas apponunt. Pro aliis mercibus commutari, Oviedus prodidit. Cedunt & canibus in escam: idque canis Aldrovandi exemplo.

Ufus.
Aristoph. in
Holis A-
then. Di-
nos. l. 4. c. 2.
Plin. H. N.
l. 11. c. 26.
Arist. H. A.
l. 5. c. 30.

Habent & in Medicina locum. Trallianus exsiccatas, & contritas alis ac pedibus abjectis, in balneo cum mulso, contra calculum exhibere jubet. Galenus à quibusdam, tres, quinque aut septem cum paribus piperis granis, in Colica laudari scribit. Apud Æginetam, compositio diatettigon occurrit: quam & apud Myrepsum invenies. Quidam ad urinam cendam cantharidibus substituunt. Ætius, tres ex vino exhibet. Utilissimum eadem apud Aretæum contra vesicæ laxamentum remedium. Aridæ & tritæ cum aqua & radicis nardi paxillo elixantur. In iisdem æger, loco balnei, ad vesicæ laxamentum, desiderare jubetur. Lanfrancus ad frangendum calculum Cicadarum spodium, ex aqua raphani vel cicer. decocto magni facit. Merum an aqua dilutum vinum fit, Cicada cognoscitur. Natat si illud: si hoc mergitur, si Gaudenzio Merulæ fides.

Cicadarum plura sunt genera, quorum quædam, quod solo nomine ab antiquis prodita sint, difficulter cognoscuntur. *Ælianus*, *Membracis*, *Lachetarum*, *Cercopis*, *Acheto*, & *Acanthiæ* meminit. Quid sibi per priores velit, non intelligo: *Cercopæ* Dalechamio, foeminae, mutæ, pusillæ, oblongæ. *Acanthias* epitheton potius est quam generis nomen, seu ab acantho seu spina in qua habitare solent; vel ab Acantho Athamantum urbe in Ætolia, ut Stephanus prodidit, quæ quoniam ferè consulescunt, inde receptum, ut qui non loquuntur, eo insigniantur nomine. *Achetæ* majore est Cicada. Apud Aristotelem, quoque & Plinium, *Achetarum*, *Tettigoniæ*, *Minorum*, *Majorum*, *Subulariarum*, *Fruentariarum*, & *Avenariarum* mentio. *Achetæ* sunt, ut dixi majores, quorum corpus, sub septo trans-

Differentiæ

Arist. H. A.
l. 10. c. 44.Arist. H. A.
l. 5. c. 36. 5
l. 4. c. 7.

verso

verso præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex his Hesychii *κόλας*, quam *μυρδάλω πήλη* exponit, esse videtur. *Tettigoniæ* minores, & quia minus vocales, idcirco Aristoteles *ἀφώρες* dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ pereunt. Gaza Cicadastras vocavit. *Surculariæ* grandiores sunt, & virides. *Frumentariis* nomen, quod simul cum frumentis arefcentibus appareant. *Avenariæ* cum istis eadem. Fit apud autores, & *Marium*, *Fæminarum*, *Locrensiarum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio. Mares vocales sunt, nisi natura soli impediatur, fœminæ mutæ, quod *ἀλγώμα* illud cuius figura fructui *Thlaspi* parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeant. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translata garriunt. Uterque ager fluvio Alexæ qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*, Ptolomæo *Locanus*, modernis *Alessio* dicitur. Idem de Seripho insula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, si alio transferantur, strident. Idem dixit in Rhegino agro filere omnes; ultra flumen in Locrensi canere: quod & Pausaniæ placuit. Umbrosa ibi opacaque regio in causa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Arescunt eadem in Locrensi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde stridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem scribunt. Ex *Guinea* delata *fusca* est, eamque Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omnino coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarum sex alia genera observavit, de quibus ipse ita: 2.5. Cicada lineis in alvo rufescentibus, cum ejusdem tettigometra. Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis diriusculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire cœpit; posteriores pedes quatuor in extremitates asperi sunt, quibus & ascendit & se sustinet, ne in eundem locum recidat: sunt & hi aliquantulum hirsuti, chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera insecta pedes adipiscitur, habet & mediocres antennis *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto vicinior est ei tempori, quo tettigometram exiit, eo apparet nigrior. *Tettigometram*, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involucre egressa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* prona, & supina.

CAPUT VI.

De Orsodacna, & Cimicibus sylvestribus.

ORSODACNA, Gazæ *Mordolla* est, quasi ad mordendum concitetur. Constat 4. pennis, ore largo, & penè denticulato pustulasque puerorum appetit. Nascitur secundum Aristotelem ex vermiculis immutatis, qui in brassicæ caule generantur.

Ex alatis sunt & *Cimices sylvestres*, iisque quadripennis & membranaceis. Lectulariis sunt majores textuploque eos superant, æque ac illi foetidi. In malvis sæpius; in aliis plantis arboribusque confertis, in ulmo & salice quandoque, reperiuntur. In Dariene quoque provincia reperiri, Cardanus scripsit. Coeunt mense maio avertis caudis, & finem Veneri per diem integrum vix faciunt. Mas minor, fœmina major & latior. Volant sole exastuante satis celeriter, sed nec diu, nec longè.

Genera sunt varia. Moufetus tres fupinos & pronos, quos inter vaginipennes ponit, representat. *Primæ*: inquit, dorsum, collum, antennulæ, atque elytra porrum referunt; alæ elytris longiores ex viridi flavescunt, uti etiam oculi & pedes. *Serundus* undique infuscatur. *Tertio* corpus nigro rubroque varium, antennæ pedesque anthracini. Omnes aureo fulgore hic illinc micant. Quickelbergius ex agro Viennensi duas alias species ad Pennium miserat, aureo nigroque undulatas. De suis ita Aldrovandus: Ii, quos ego diversis temporibus observavi, differunt invicem colore magnitudineque & latitudine, sed piestor deceptus nominis vicinitate exituum quandam silicem, in quo humana facies expressa est, pro Cimice primo & secundo loco depinxit. *Numer.* 3. Cantharidis potius quam Cimicis species. Pedibus enim est longioribus, quam Cimices habere solent. Undiquaque colore est miniaceo, sed maculis nonnullis atris respergitur. *Num.* 4. Cimex lectularius, nulli non notus. *Num.* 5. Cimex sylvestris non foetens, undique subflavus, lineis fuscis. *Num.* 6. Colore flavo. Aliter versus caudam albescens. *Num.* 7. 8. 9. etiam flavescunt, sed veluti humanam ferè faciem per alas expressam gerunt. *Num.* 10. Colore ferme est castaneo, & alterius ferme generis, vel Cantharides vel Scarabæorum. *Num.* 11. Cimex sylvestris minor undique cinereus. 12. *Num.* Ex Scarabæis videtur, aut Ricino congener, si alati vultus, quod nondum observavi, ex cinereo ad castaneum vergit. *Num.* 13. Totus est coloris Castanei, lineis nigris in longum sectis. *Num.* 14. Cimex

Aldrov. de Insect. l. 2. c. 13.

Arist. H. A. l. 5. c. 19. Plin. H. N. l. 27. c. 4.

Mouf. Theatr. Insect. l. 1. c. 29. Cardan. de Rer. variet. l. 7. c. 28.

Aldrov. de Insect. l. 5. c. 3.

atro-cœruleus propè caudam tribus notis albis respersus. *Num.* 15. Colore est castaneo, macula in extremis alis cinerea. *Num.* 16. Luteus nigro & albo conspersus. *Num.* 17. Cinereus macula argentea. *Num.* 18. Cimex oleraceus atrorubeus, macula circa anum cinerea, Mordella vulgò. *Num.* 19. Mordella sive Orfodacne alia oblonga. *Num.* 20. Cimici & Rampreno simile insectum. *Num.* 21. Cimex Cinnabrinus cruciger. *Num.* 22. Cimex viridis. *Num.* 23. Cimex non foetens, atroviridis, guttis albis plurimis ornatus. *N.* 24. Cimici simile insectum cinereum ferè anelytrum. *Num.* 25. Cimici simile anelytrum aliud pedibus longis locustæ. *Num.* 29. Cimex ruber lineis nigris in longum insignitus.

De *Usu* si quæras, Matthiolus iis omnes vires demit. Plinius, hortenses in cinerem redactos, & cum oleo rosaceo infusos, contra dolores aurium variè commendat. Palladius, cum amurca, felle bubulo, foliis hederæ, & oleo, ad sanguifugarum virulentarum vulnera inungit. Arnoldus Villanovanus, contra disuriam, caput virgæ in oleum camomillæ calidum, in quo Cimices bullierint, mitti, & mox cum allio pistato inungi jubet.

CAPUT VII.

De Perlis vulgò dictis.

Aldr. Hist.
Insect. 2.
c. 10.

Mouset. de
Insect. 1. c.
§ 1. p. 65.

Perlarum apud Italos nomen, huic quod descripturi sumus insecto, vel à rotunditate capitis, quæ perlam seu unionem æmulatur, vel à splendore inditum est. Quatuor omnes *alas* habent longas, robustas, cartilagineas. *Alvum* admodum proceram, quæ in volatu non incurvatur. Mousetus, qui *Libellas* vocat, ita describit. Corporis forma aut nihil discrepant, sed tantum coloribus. Corpora enim habent duas nonnullæ uncias oblonga & teretia, quæ in tres præcipuè partes dividuntur, caput, pectus, & reliquum corpus, quod caudæ vicem supplet. Caput cum oculis magnis emissitijs, ejusdem cum reliquo corpore coloris, collo est affixum brevissimo, cui priores duo pedes adhærent, reliquis pectori annexis. Pedes item posteriores longissimi sunt, ut sese melius erigant, atque sustentent. Omnibus bifurcæ caudæ, quibus adversis coeunt, ac in coitu diutissime hærent. Maxima rusticorum pars ex majoris junci aquatici putrescentibus vermibus oriri autumant: quod ut verum esse concederem, coitum tamen non tollit, & vermium ex seipsis depositionem; ut hoc modo & medio æternum crescentes, sobolem propagarent. Tarde admodum volant minores, majores celerrimè, æstate concalescente solum conspicuæ. *Coeunt* more muscarum. Mas-

foeminæ insidet, ejusdemque fursum immittentis membrum recipit. Tenacissimè in congressu coherent, & hærentes per agros volare visæ. Æstate & autumnò ceruntur, hyeme latent. Volant velocissimè sæpè solæ, plerumque gregatim, rarò altè. Meridie stipiti alicui insidentes quiescunt. Unde proverbium prandendi tempus indicans, *la perla va à sticchi*.

Differunt variè. *Antennas* quædam habent, quædam non. *Caudam* bifurcatam quædam, obtusam & bifurcatione carentem aliæ. Propè aquas quæ occurrunt, cœruleo ferè sunt corpore. Aldrovand. viginti & ultra descripsit.

Prima ex mediocribus est, capite & toto corpore rufis, alis candidis, extremo macula nigra notatis, pedibus nigris.

Secunda capite perlam, sive unionem nequaquam refert, non enim rotundum est, sed acutum. Oculos habet enormis magnitudinis, subcœruleos. Pectus admodum crassum: alvum proceram, tenuem, tota lutescit, nigroque ut pictura expressit, maculatur, alæ sunt subcœruleæ.

Tertia alas habet breves, ad subcœruleum inclinantes, alvum longissimam, tam subtilem ut mirum sit, quomodo eam regere possit. Oculi quoque ut in proximo, maximi, sed caput orbiculatum, infra candicat, per dorsum superne ad latera lutescit, in medio ferrugineo colore est. Antennas habet admodum breves subflavas.

Quarta ex mediocrium genere est corpore toto purpureo, aureis zonis undique interstincto, alis planè argenteis, nigro maculatis.

Quinta alas quoque habet argenteas, sed non tam resplendentes. Maculam in extremo singulæ habent nigricantem. Corpus totum aurei ferè coloris est, nigricantibus zonis interstinctum. Pedes sunt atrii.

Ex maximis est, quæ *Sexta* in hoc ordine depingitur speciosa ac elegans Perla, capite, pectore, ac dorso viridis, alvo tota cœrulea, per quam lineæ fertur à dorso ad extremum usque aterrima. Alæ cinereæ sunt, pedes nigri.

Septima oculos habet virides, tota lutea, nigro maculosa.

Minimarum generis est *Octava* alas habens argenteas, corpus viridescens.

Nona ex maximis est, capite dorsoque viridis, alvo dilutè flava, primum crassa, dein tenui, alis sine maculis.


Decima toto corpore est flavo, nigro interstincto, pedibus etiam flavis, alis cinereis splendidis.

Undecima alas habet subflavas, & corpore toto flavo est, vexceptis zonis, quæ sunt ferrugineæ.

Duodecima tota viridis est, maculis quatuor candidis, in alarum extremitatibus.

Deci-

Differentiæ



Decimatertia Alas habet breves, & latas, primum virides, deinde cœruleas, cujus coloris quoque totum est corpus à capite ad anum usque præter oculos & pedes, qui atrii sunt. Oculos autem habet enormiter magnos, ac prominentes. Alvus in exilem acutiem velut acum definit.

Decimaquarta, etiam aquas prosequitur, toto corpore viridi, nigris, exiguis zonis distincto. Oculi protuberant. Alæ quæ corpori hærent argenteo colore, & splendore micant, dein cœruleæ sunt, argenteis venis refertæ.

Decimaquinta minimarum generis pedes habes longissimos. Aranearum pedibus non dissimiles, sed admodum exiles. Corpore, alisque ex luteo subalbidis est, cauda simplici.

Decimasexta ex minimis est, tota fere viridis, sed à lateribus tergoris lutea. Oculi candicant, pedes nigri sunt.

Decimasextima cum decima quarta admodum similis, pariter aquas petit, alvò cœrulea, pectore viridi, alis primum argenteis, deinde cœruleis.

Decima octava, ex maximis, capite & pectore viridibus, dorso lateribus, ubi alæ enascuntur, nigris, alvò longa, cœrulea, quam nigra linea lata coloris aterrimi mediam dissecat. Pedes atrii sunt.

Decima nona mediocrium generis toto corpore viridi, aurum resplendente. In dorso nigricat: alæ cineræ sunt, & argenteo micant.

Vigesima alvum habet obtusam, ac minimè bifurcatam, toto corpore ferrugineo, alis candidis, à latere ferrugineis.

Vigesima prima, ac pestrema alvò est crassa, & brevi, lutea, nigris circumdata zonis, capite, pedibus, dorso, & alarum principiis ferrugineis. Alarum cætera candicant.

Moufetus in *Maximas Medioximas*, & *Minimas* dividit. De quibus idem ita. *Libellas maximas*, Angli quidam Brises appellant. Cujus generis octo tantum vidimus.

Primam virescentem, maculæ item in collo summisque lateribus ex fusco virides ornabant, alæ argenteæ, veloces & motu impetum permagnum facientes. Septem illi nigræ lineæ transversim in dorso erant protractæ; muscis exilioribus inter volandum vescitur, hirundinum more.

Secunda huic est similis, sed obscuro magis colore.

Tertia oculos margaritis similes obtinet, alas item argentas, quarum extremam fimbriam macula fusca inficit; corpus luteo, nigroque colore varium, cauda bifurca nigra, duabus quasi plumis ornata.

Quarta, luteo est colore, latera habens

quasi divisa in sex partes: juxta alarum argentearum exortum macula lata nigra conspicitur; medio lineis luteis distincta: in caudæ extremitate quatuor vel quinque spinulæ apparent.

Quinta, corpore & capite castio, ore nigro, alis argenteis una macula notatis: in caudâ ultima tres spinulæ tridentem referentes conspiciuntur.

Sexta alæ adnascuntur argenteæ, medio ipsarum nigrâ insignitæ: totum corpus nigrum, sed rariis, item in dorso atque ventre lutescens: Pectus scapulæque ex nigro flavoque æque mixtæ. Subter caudam, duas spinulas recurvas trahit: in fine ejus quinque apparent, sed admodum exiguæ.

Septima caput collum & scapulæ fusco sunt colore; reliquum corpus rubet: in Museo Pennii procreata fuit, ex vermiculo plane illi mihiq; ignoto.

Octava adhuc brevior, oculis margaritis similibus, toto corpore luteo, nisi ubi lineis transversim ductis notatur. Cauda illi quasi abscissa, in fine latuscula & obtusa: argentearum alarum summities nigra maculâ infuscatur. inter segetes plerumque reperiuntur.

Libellæ mediæ maximam naturæ elegantiam commendant, omni arte majorem.

Prima colore est elegantissimo, corpore cœruleo, alis violaceo colore saturato: Inter scapulare spatium gemmis quatuor aureis, ceu in nigricante pala fixis ornatur.

Secunda corpore capite castio apparet: alæ albescentes, castis item lineis in longum ductis ornantur; medio purpurascetes.

Tertia corpus atque caput subviride; alarum lineæ sanguinis veluti striis notatæ, versus extremitates obscuram purpuram imitantes.

Quarta ejusdem ubique coloris videtur, fusci nimirum fatifcente viriditate commixti.

Quinta oculi cœrulei in capite virescenti: corpus totum viridi cœruleo mixtum; dempris alis argento nigrefacto accuratissimè laboratis, & medio obscuratâ purpura obfuscatis.

Sexta viridi est omnino corpore: imò & alæ illi virescunt, sed leviter.

Libellas minimas, quatuor vidimus.

Prima corpore toto Cyaneo.

Secunda rubro, alæ utrique pares, colore argenteo.

Tertia corpus totum croceum colorem æmulatur. Sed cauda magis protuberat, & sanguinea macula alarum extremitates, uti & omnes fibræ, rubescunt.

Quarta quæ omnium minima, caudam longam habet exilem, caput magnum,

oculos cœruleos prominentes duabus antennulis præmunitos: corpus oblongum tenue, subtus virens, supra nigricans; in dorso duas lineas virentes à capite ad alarum exortum protractas habet: caudam quinque juncturis colligatam, in cuius extremitate annulus subcœruleus. Ex harum numero una est, quæ quasdam ex majoribus citissimè interficit. Corpore gracili & griseo, alis item politis, nam ne vestigium quidem foraminis ullius apparet, per quod intrare possit. Pomo ipso ac seminibus vescitur. Hanc muscam, Guilielmus Bruerus, vir doctissimus & rerum naturalium indagator acerrimus, ad Pennium misit.

ARTICULUS II.

De Aneletris quadripennibus farinaceis.

PUNCTUM I.

De Papilionibus vulgaribus in genere.

Tantum de Aneletris quadripennibus membranaceis, sequuntur *farinaceæ* seu *Papiliones*, qui vel *vulgares*, vel *Bombycum*. Nomen videntur à pappo, seu fugo, quod ceras & olera exfugat & comedat, sortiti: nisi fortè, quasi papyriones dici malis, quod similitudinem papyri habeant. Græci generaliter *ψυχον*, seu oxytonas, seu paroxytonas vocant, *ὄπὸ τῆς ψυχῆς* sine dubio, seu vento. Dicuntur & *σποδοβίδες*, *πεμφίδες*, *πομφάλορες*, *κυῖνες*, *ψάλλορες*. Invenies & *πέφθ* dici. In Glosfario Benedicti Abbatis Floriacensis *εσπινίς*, exponitur Papilio.

Nomen.

Descriptio.

Habent pedes sex, oculos prominentes duos, ante quos totidem cornicula ignava, ut Plinius vocat, enascuntur, rostrum bifurcum, rostellum longum intra furcas absconditum, quo rorem, aliæ diurnum, aliæ nocturnum fugunt. Colorem erucarum, ex quibus ortæ sunt, fervant.

Locus.

Amænis & apertis locis gaudent, qui levissimo volatu feruntur: qui gravius corpus gerunt, arborum truncis, parietibus & fenestris adherent. Ex malvæ floribus succum sugunt. Idèd florentibus illis maximè abundant. Sed si de sylvestribus malis id accipiendum est, de nocturnis quoque papilionibus fumendum hoc erit: quod & Isidorus innuit.

Vitus, Columella R. R. 9. c. 12

Isidor. Origin. 15. c. 10. Generatio.

Mensibus Maio, Junio, & Julio coeunt, averfis caudis, reflexis quandoque, & in coitum diu hærent. Author de Naturarum, post Augustum congregi scripsit

Vermiculos deponere falsò Aristoteles credidit. Ova edunt, tam supra quàm subtus, illaque magna, parva, nigricantia, alba, viridia, cœrulea, flava: quædam seminibus milii minora, quædam duplo majora, nonnulla æqualia. Reponuntur sæpè in corticum arborum cavitatibus, sæpissimè in foliis. Aldrovandus Chamæ fici observavit: rusticia seminibus papilionum grava cum ferrum vomere scinderent, se invenisse dixere. In brassica nasci, apud Aristotelem leges, ita eam plicant, ut quasi tecto includantur, ne ipsis aliquod ab imbribus damnum. Quæ Aldrovandus observavit, tenui lanugine involuta erant. Ex ovis loco tepido, repositis, vel solariis radiis vegetatis, aliquando post quadriduum, aliquando decimo quarto die, erucæ excluduntur. Idèd malè Albertus, alios ex iis papiliones, longis & flexuosis promuscicibus instructos, hyeme prodire scripsit. Ex erucis Chrysalides, seu aureliæ fiunt, quæ in papiliones abeunt. Observatum, Erucam primò parere ova lutea, tenui lanugine involuta, iisque editis, in Chrysalidem abivisse, coloris lutei, viridis & nigri. Ex ovis erupere tam exigua quadripennia volucra, ut visum ferè subterfugerent qualia in ulmorum vesicis reperiuntur. Errat ergò in quibusdam Plinius cum scribit. *Multa insecta & aliter nascuntur, atque imprimis ex rore. In sedet hic raphani folio primo vere & spissatus sole in magnitudinem milii cogitur. Inde porrigitur vermiculus parvus, & triduo eruca, quæ adjectis diebus accrescit, immobilis duro cortice, ad tactum tantum movetur. Aranei. Hæc Eruca, quam Chrysalidem appellant, raptò deinde cortice volat Papilio.* Infestant sæpè brassicam simul & erucæ & vermes: nec *ιδαν* raphanum apud Aristotelem, sed brassicam significat. Non negaverim tamen quasdam & ex vermibus nasci. Frumentum certè humidius vermes producit, hi Chrysalides, ex quibus Papiliones prodeunt. *Exire vidi Papiliones*, inquit Aldrovandus, *ex arborum, maxime salicis cavis, suo spolio denudatos. Papiliones, addit, ejusmodi cum cavitatibus crassitie, in quibus sanè ova fuisse nemo dixerit. Ex singulis enim cavis, singuli exeunt Papiliones, cum qui semen in quodam loco edunt, id non nisi admodum numerosè pariant. Sunt id genus Papiliones corpore admodum crasso, alis plurima lanugine obsitis, colore plerumque fusco ad castaneum vergente.* Sed & visa eruca, à qua, cum expectaretur Papilio, ova quadraginta, grani tritici magnitudine, luteo colore, tenui obducta lanugine, in quorum singulo vermiculus prodire. Licet quoque sentire ex putredine nasci. Bis terve erucis Bononiæ pluit, quæ in Chrysalides & Papiliones abivere. Un-

Arist. H. A. 5. c. 19.

Aldrov. de Insectis 2. c. 1.

Arist. H. A. 5. c. 19.

Plin. H. N. 11. c. 32.

Aldrov. l. c.

Plin. H. N. 27. c. 24.

de

de hoc malum in Miletu tempore humido & lento nasci, Plinius reliquit.

Natura.

Post coitum sensim tabescentes vivunt, ad hyemem usque, quidam ad hybernū solstitium. Sæpè in domibus per hyemem quasi torpentes conspiciuntur: plærumque intenso gelu pereunt. *Sunt qui*

Plin. H. N. 18. c. 25.

certissimum veris indicium arbitrentur, ob infirmitatem animalis, Papilionis proventum. In ipso anno, cum commentaremur hæc, (verba sunt Plinii) notatum est, proventum eorum, ter repetito frigore extinctum, advenasque volucres, ad VI. Calend. Februarii spem veris attulisse, mox sævissimā hyemē conflictas. In Anglia novum eorundem bis Autumno exortum, memorat Pennius. Observatum & Pestis præfagia tradidisse, quod apud Gemmam habemus. Volabant Anno M. D. LXII. circa 15. Augusti ad aquas tantā copiam, ut fluminis cursum obscurarent: sub noctem, velut instructis copiis, per vicos vagabantur. Anno MC. IV. turbavere aciem, intercepto etiam solis lumine. A. M. D. XLIII. omnem melleum succum absumere; gramen ipsum, arido stercore ubique torrefactum, exustum est. A. M. D. LIII. cruentis in Germania guttis, herbas, tecta, vestes, & homines aspergebant, & ingens tum eorundem copia.

Usus.

Urinas movere creduntur, & minorem cum periculo. Tinunculis & aliis aviculis in cibum cedunt: sed & morsulorum compositionem, quibus pisces allici creduntur, ingrediuntur.

Differentiæ

Differentias speciales frequentibus punctis apponemus. Nunc eas in Diurnas & Nocturnas distinguere placet. Nocturnæ dicuntur φαλαίνας phalaenæ ὡς τὸ εἰς φῶς ἀλλεῖν, quod ad lucernas advolent. Lycophroni & Nicolao καυδολοεῖται sunt, quod candelas alarum motu sæpè extinguant: ψώρα aliis, quod scabritie & fursure quodam diffluant.

Quia verò aliquando lucis amore in ignem se præcipitant, pyraustarum apud nonnullos Zenodetum nempe & Æschylum obtinere nomen.

Aristoteles ἡπιαλον dixit: quidem πωρεσµεον: distinguique debent à Papilionibus qui apibus in alveis obsunt. Harum ova Aldrovandus, in tecto alvearis, in unam veluti massam conglomerata, tenui quadam lanugine vestita; obruta invenit. Subnigra, splendida, dura, & numerosa fuerunt. *Erucas etiam, addit idem, albicantes exiguas, quæ mihi in sequenti nocte folliculos fecerunt, quales in alveo quoque observaveram, magnitudine pistachii invicem numerosè admodum coherentes, & in singulis suas Chrysalides, quæ denique mihi dissectæ, Papilioes pepererunt, quales quoque in alveis videram, Papilionibus qui in trico oriuntur non dissimiles.*

Aldrov. de Insectis 1. c. 2.

Hirsuto sunt corpore, & alis velut cinere quodam conspersæ.

Rarè aut nunquam, nisi erectis in dorsum alis provolant. Interdum subter folia vel obscurè quodam in loco latitant. Antennas maxima ex parte vel hirtas & latiores, vel exiguas admodum & breves habent. Ex erucarum thecis terra obrutis proveniunt.

Monsi. de Insectis 1. c. 14. p. 5. 1.

Et quia pulverulentæ sunt, diurno tempore ante advenientem vespem, ne pulvis solis calore arefactus excutiat, apparent. *Diurnæ, quæ ἡμερῆσιοι, antennis longioribus & in extremo tuberosis gaudent.*

Semper juxta latera expansis alis provolant. Ex aureliis pendulis, vel arborum ramis affixis proveniunt. Planæ sunt, læves, plabræ, duriusculæ. Noctu volare nequeunt, neros nocturnus medullas madefaciat. Differentias earum speciales inferius vide.

Nierembergius meminit ex Indicis *Hoitzitzil Papalotl*, seu papilionis similis *Hoitzitzillin*, unde nomen meruit. Oblongo, inquit, est corpore desinente in tenuitatem, & transversis quibusdam lineis, auricolaris distincto, sed maculis nigris intersertis alarum superiora eodem colore distincta sunt, sed inferiora rubescunt; lineis haud absimiliter per transversum discurrentibus. Cætera papilionum reliquo generi consona. Sunt & aliarum innumeræ apud novam Hispaniam differentiarum admirandis variatarum coloribus pulcherrimarum. Illud hic obiter monebo, in quibusdam papilionibus magnis hujus novi mundi pro lingua esse filum sanguineum oblongum excedens reliquum corpus, quod convolvit ut in bucca recipiatur, quam habet, ut illud commodius extrahere possit, sectam à superiore parte capitis usque ad inferiorem, ut pæne totum caput scissum sit.

Nieremb. H. E. 13. c. 29.

PUNCTUM II.

De Papilionibus in specie, & primò de Papilionibus Aldrovandi primæ tabulæ.

Papilioes in specie, partim ab Aldrovando, partim à Moufeto descriptas habemus: Coincidere hujus & illius aliquas, concedi potest facile: malumus tamen in tanta varietate omnes ponere, ne quicquam desideretur. Aldrovandus suos in decem tabulas dispefcuit, quarum prima quinque habet, qui à nobis ipsius Aldrovandi verbis describentur.

Primus, inquit ille, non incongruè ἡνωψύχην dicitur, Est enim Papilionum

Aldrov. de Insectis 2. c. 1.

max.

maximus. Vespere potissimum cernitur, interdum latet. Latus est palmum, & amplius. Alæ singulæ rotundam habent ac notabilem maculam, oculum diceris nigrum, sed primo miniaceo, dein candido circulo obductum, cætero subnigræ, aut fuscæ, molles, lanuginosæ, farinaceæ, in extremo candicant; corpus primum ad castaneum vergit, supinum non-nihil albicat, corniculæ sive antennæ plumarum instar molles, satis proceræ; femora quoque mollia, sed tibiæ duræ, oculi nigricant.

Quartus in hoc ordine similis ferè proximo, sed corniculis latoribus, & filicis ramulum figura quodammodo æmulantibus, luteis: corpore etiam magis lutescente, denique oculis longè pulchrioribus: miniaceus enim circulus longè in hoc major est, minorque niger, qui velut pupilam constituit.

Secundus totus erat viridis, annulis candidis. Alæ etiam lineas habebant roseas deorsum descendentes, item maculas transversales albas; rostrum erat longum, trigonum, oculi magni, nigri: corpus procerum admodum, crassumque, in extremo acutum. Alæ pro cuius portione sunt exiguæ. Ex hoc genere alium mihi describendum ac depingendum tradidit F. Gregorius Regienſis Capuccinus, illius insolenti formæ ac colore captus, sed in quo annuli essent lutei, alæque maculis subflavis, castaneis, subcœruleis & nigricantibus destingerentur. Longitudo huic papilionis palmaris est. Quid si sexu distinguamus, priorem fœminam esse ex editis mihi ovis comperi.

Tertium ex Eruca nasci observavi sub finem Augusti anno superiori, eaque caudata & imminensæ magnitudinis suo postmodum loco depingenda. Folliculum non textit, sed in Aureliam mutata: Papilionem hunc generavit decem ferè dierum intervallo, corpore crasso ejusdem cum alis coloris, nimirum ex luteo & fusco variantis. In tergore notabilis macula est candicans, humanum quodammodo caput antèrius exprimens. Caput totum nigricat, pedesque & antennæ, quæ latiusculæ sunt. Alæ internæ totæ ferè lutescunt.

Postremum in hoc ordine depictum pro-na & supina parte anno 1592. mense verò Julio; hujusque die vigesima sexta gigni adverti ex parva quadam Eruca, hirsuta, colore ex rubro, albo & nigro variante. Hanc enim cum cepissem in tamarisco sive myrica sub meridiem, subsequenti nocte versa erat in Aureliam viridem, quæ filo sese capsulæ, cui inclusa erat, ex alvi extremitate edito appenderat, atque ita quindecim diebus continuis adherens in eodem colore perseveraverat, deinde mutato eo lutea partim, partim nigra facta erat; qua-

re jam jam in Papilionem abituram conjecti, cujus scilicet colores per senectam, quam mutando relinquunt exeuntes, transplenderent. Quod cum viperinis fœtibus commune hisce Papilionibus fuerit, eos enim supernè in ovo conspici testatur Aristoteles. Cum itaque erupisset Papilio, alis se fecit conspicuum iis, quos diximus, coloribus pronè & supinè. Color niger luteusque in primis alis intensior est, in supinis remissior. Alæ internæ, quæ aliàs minores esse solent, in hoc animali proceriores sunt, infraque serrata ferris eisdem coloribus distinctis, ex quibus ferè media ceu cauda quædam dependet. Corpus totum primum atrum est, ad latera & supinè luteum, estque pro alarum longitudine admodum exile. Oculi magni nigerrimi, nigerrimæ item antennæ, quæ in extremo obtusæ sunt, totæ subtilissimæ. In alarum internarum externis lateribus macula rubra sive rosea conspicitur, rotunda internè, semi-circularis externè. In summa, elegans est Papilio, conspicitur passim per agros & hortos.

PUNCTUM III.


De Papilionibus Aldrovandineis tabula secunda.

IN secunda tabella sex Papiones posuit Aldrovandus, eisdemque ita descripsit. *Aldr. l. 6.*

Primo & secundo loco supinè nimirum & pronè depictus Papilio, expansis alis, coloribus quatuor potissimum variat, miniaceo, nigro, albo & cinereo ad cœruleum non-nihil vergente: Suntque colores in extimis alis intensiores, ut remissiores in intimis. Capite, dorso, alvoque est cinereis, sed albis striis subtilissimis deorsum recta tendentibus color ille cinereus insignis est. Corpus obrinet crassum, latumque, parte supina candicans, annuli coloris sunt, castanei, oculi ejusdem coloris; magni & prominentes. Alæ pariter amplæ sunt quarum externæ maxima sui parte cinereæ videntur, sed explicatæ quatuor, quos dixi, coloribus ita evariant, ut descriptu admodum sint difficiles; septem velut venæ rubicundæ eas percurrunt, inter quas in extremo totidem sunt, velut columnæ nigræ albis circulis notatæ ac supra hæc septem etiam maculæ nigræ V. literam exactissime exprimunt; sed in dextra tantum, sinistra enim neque columnas eas, neque literas habet, in qua re mirus naturæ lusus conspicitur, coloresque omnes in hac sunt dilutiores, pallidioresque; Dextra etiam punctis exiguis nigris erat notata, quæ in sinistra quoque non sunt, nisi quæ corpori ne-

ctitur;

Tab. 1



Tab. 2



Tab. 3



Tab. 4



Tab. 5



Tab. 6



Tab. 7



Tab. 8



Papilio Indica.





ditur, nam deinceps in strias oblongiusculas mutantur. Postremo dextra in extremo candicat, striisque in signis est nigris descendantibus, cum sinistra nigrescit eo loco, neque striarum aliquod habet rudimentum; Internæ verò alæ totæ sunt coloris miniaciei, præterquam, ubi duæ illæ fasciæ apparent; nam hæ nigerrimæ sunt. Alæ externæ inversæ modò albicantis, modò nigricantis coloris areas obtinent, internæ loco albedinis habent colorem miniaceum, sed dilutiorem, quàm externæ. Antennæ erant nigricantes, proceræ, leves, in extremo obtusæ.

Tertium in hoc ordine Leucomelanum nominavi, quod præter colorem alarum, album, ad subflavum nonnihil vergentem, totum corpus per tergus nigrum ac exile habeat. Alæ internæ in extremo sunt ferratæ, habentque longas appendices, ut icon ipsa declarat. Supra feras, quæ semicirculum constituunt, maculæ quoque sunt semicirculares, candidæ, atque in his maculæ rotundæ, ferè cœruleæ quæ simul omnes egregiam speciem ac venustatem Papilionis præbent. Cetera, ut dixi, Leucomelanus est excepto ventre, qui candicat, antennæ in extremitate, quàm in plerisque obtusiores.

Talis est in quarta serie positus, qui totis alis nigricat, & quatuor habet in hisce oculorum specie maculas rotundas nigerimas, cœruleâ velut pupilla decoratas; Alæ internæ longiores sunt externis & ferratæ, sed aliter ac in præcedentibus, hujus enim ferræ obtusæ sunt & rotundæ.

Quintus ex maximorum est genere, sed eorum, qui interdum per hortos obvolitant, corpore est procerò, mediocris crassitudinis, coloris fumati, annulis per alvum lutescentibus, alis ejusdem coloris in medio, infra candidis, & nonnihil ferratis, deinde nigris, & in ipsa nigredine maculas habentibus candidas ad latera, infra verò ad cœruleum vergentes. Antennæ longissimæ, obtusæ sunt & nigre.

Sextus à macularum multarum serie, quæ in alis internis tam foris, quàm intus cernuntur, *πυροσθαλι* nominatur. Oculi nigri sunt, pupilla candida, circulus ambiens luteus, suntque, ut dixi, in internis alis tantum, nam quæ in externis apparent maculæ rotundæ, totæ candidæ sunt; Habent tamen etiam hæ unicum oculum eisdem, quibus internæ, coloribus ad externa latera, cetero alæ totæ ex luteo ad castaneum vergunt. Per superiora corporis ater est, alvò supina ex cinereo ad fuscum vergit; alæ internæ, item pectus longa quadam lanugine viridi, plendente vestiuntur.

-

PUNCTUM IV.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula tertia.

IN tabula tertia novem habentur. *Primus*, inquit *Aldrovandus*, ex mediocrium genere natus mihi ex Eruca, quam olim Bononiæ pluit; capite est, tergo alvòque coloris aurei, ad latera nigri. Alæ internæ ferratæ sunt, totæ ex aureo miniacæ, & nigris punctis conspersæ, & in extremo nigre. Alas externas venæ percurrunt deorsum descendentes, nigre in area aurea, seu potius miniacæ, item maculæ magnæ transversales ejusdem coloris, ipsæque alæ in extremitate undique nigre sunt, & ibi maculas habent candidas. Pedes & antennæ lutescunt, & instar pedum polypi cirris præditi sunt, ut ad ea, quibus insiliunt, fortius adhæreant.

Secundus, qui numero *secundo* & *tertio* pronè & supinè depictus est, ex eodem est genere. Corpus enim habet mediocre, nigricans, alvum ferè auream, nigris annulis distinctam. Oculi candicant, alæ externæ in extremo nigre sunt, & albis maculis insignes, cætera aureæ, venisque nigris, & tribus aliis nigris maculis incertæ figuræ speciosæ. Internæ in ejusdem aurei coloris area duplicem habent ordinem majorum macularum nigrarum, velut oculorum, sicut in iconè exprimuntur. Colores omnes supina parte variant; In internis etiam alis (ita voco, quæ corpori sunt viciniores) qui extra erat aureus, nunc ferè est amethystinus ad cinereum vergens, adeò, ut lutescere videatur, estque unus tantum oculorum ordo nigrorum, majorumque, hos circulus ambit candidus. Corpus etiam supinum totum lutescit, pedes cinerei sunt, alæ externæ prope caput cinereæ, nigrisque guttulis oblongis notatæ, dein majori parte coloris sunt miniaciei, & nigris maximas maculas habent, denique in extremo sunt rursus cinereæ.

Tertius, qui quarto loco depictus est, toto corpore pronè aterrimus, aterrimæ item alæ externæ, sed fasciæ ferè transversali coloris miniaciei decoratæ, nec non alterius fasciæ candidæ rudimento, & punctulis aliquot rotundis, candidis. Internæ totæ ferè extrâ miniacæ sunt punctulisque nigris admodum exilibus insignes.

Quartus, in iconè quintus, cum hoc idem est, sed supino corpore pictus, alæ externæ hic plus habent ex miniacæo & albo colore, quàm in prona parte, atque color remissior est. Interne in extremitatibus

tibus ad miniatum vergunt, cætera cinereæ, fuscis maculis resperſæ, & alba ad latera externa macula conſpicuæ, toto corpore ad cinereum vergit.

Quinto, in icone ſexto: color totus miniatum, notis diverſis, lineisq; nigris, alis anguloſis, & leviter ſerratis. Promuſcidem habet longiſſimam, ac, dum vult, recurvam ejuſdem cum pedibus coloris, nempe ex cinereo ad luteum vergentis.

Ex hoc genere *Sextus*, in icone ſeptimus, eſſe videtur, longa item armatus proboscide, alisque præditus anguloſis. Supra caput, præter antennas, etiam bina alia habet cornua, quæ in aliis plerisque non videas, corpore, alisque colore ferrugineo, albo, cœruleo, viridique varius eſt. In ſupremis præterea alis puncta quædam habet viridia in alba area, in dorſo item virideſcit.

Septimus, in figura *Octavus*, totus luteuſ eſt, verſus caput tamen alæ ad ferrugineum vergunt, nimirum ubi maculas non habent, ſuntque hæ numeroſæ admodum, ac incerti ordinis, omnes aterimæ.

Octavus, in tabula *nonus*, idem eſt ſupinè ſculptus, quod colorem mutet, interne enim alæ partim virideſcunt, partim candicant, & maculæ illæ atræ vix hic conſpicuæ; externæ ſerè palearis ſunt coloris, in quæ hiſ maculæ evidentiores, corpus etiam flavescit, pedes habet luteo, antennas caſtaneo colore, alæ utraq; leviter anguloſæ.

Poſtremus in hac ſerie corpore nigroque capite & hirsuto, proboscide procerâ admodum, alis intus candidis, amethiſtinis ſtriis ornatus, extrâ nigricantibus, ſuntque anguſtæ, laciniatæ & longiſculæ.

PUNCTUM V.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula quarta.

Tabula quarta Papiliones mediocres ſunt, iique duodecim iconibus exhibentur.

Primus complicatis alis literam A quodammodo exprimit, corpore eſt prono, fulco, pedibus hirsutis, antennas admodum exilibus, alæ externæ ex candido & a terriſimo ſplendentibus coloribus variant, internæ totæ ſunt miniatæ.

Idem ſupinus exhibetur *tertia* ſerie, in quo color ille miniatum dilutior eſt, externæque alæ totæ candicant, venis decoratæ miniatæ & maculis nigris, magnis, & corpus totum ex albo luteſcit, alvus nigris punctis ſive guttis exiguis conſparſa eſt.

Secundus eſt hirsutus & craſſus, alis ſu-

pernè cinereis, infernè miniatæ, lineis tranſverſim nigris diſſectis.

Quartus corpore eſt exiguo, nigro, luteis circulis diſtincto, oculis magnis luteis & ejuſdem coloris antennis, alas habet tam internas, quàm externas etiam luteas, in extremo nigras, verſus corpus ad caſtaneum vergunt, verſus nigram verò ambientem faſciam planè eſt color ochros. Externæ prope exteriora latera maculam habent rotundam, nigram.

Quintus totus eſt ferrugineus ſive caſtaneus, corpore intenſius, alis remiſſius, alæ externæ unico tantum oculo, pluribus internæ exornantur nigris, intus albis, utraq; faſcias habent nigras tranſverſales incurvas, quæ anguſtæ ſunt, rectæque, quæ latæ ſunt & extremæ.

Sexto caput eſt luteum, oculi lutei, luteique pedes & antennæ, corpus nigricat, alæ utraq; ſerè aureæ in extremo, ut icon oſtendit, aterimæ, externæ ad latera externa maculam habent rotundam, nigram, exiguam.

Septimus ex luteo totus ad viridem colorem vergit, minus in exterioribus, magis verò in interioribus, hoc eſt, interiores exterioribus magis virideſcunt. Externæ maculam habent nigram, rotundam, internæ albam, caput quoque nigra macula inſignitum eſt.

Octavus antennas habet proceras, in fine obtuſas, caput exiguum, oculos magnos. Corpore eſt luteo & nigro diſtincto, alæ quoque luteæ ſunt, ſed magis ad caſtaneum vergunt, externæ nigris punctis maculantur, quibus internæ carent, utraq; dentatæ ſunt.

Nonus ex eorum genere eſt, qui proceras habent proboscides, alis eſt primum verſus caput luteis, nigris modò punctis, modò maculis, hiſque & rotundis & longis maculatis, dein cœruleis, in extremo nigricantibus & dentatis.

Decimus propter inſolentem vultum, quo Satyrum quàm exactè æmulatur, *Satyrus* dici poteſt. Corpore toto eſt flavo, rubro diſtincto, albo bifurcata, alis nigricantibus, & velut ſtellis candidis elegantiffimè exornatur.

Undecimus corpore eſt nigro, albo annulis albicantibus, alæ ejus ex albo ad luteum vergunt, ſed maculæ ferrugineæ & nigræ alternatim huc illucque conſperſæ luteum illum colorem ſerè extinguunt ſua copiâ.

Poſtremum corpore etiam atro eſt, ſed tenuiori, habetque alas internas dentatas & exterioribus proceriores, utraq; a terriſimo & luteſcente coloribus

variæ, habent tamen in fine aliquid candi-

cantis.

+

PUNC-

PUNCTUM VI.

*De Papilionibus Aldrovandinis
tabula quinta.*

Aldrov. l. 2. **H**abet & quinta tabula mediocres, quorum sex icones Autor ponit.

Primus corpore est nigricante, alvo extrema & dorso cinereis. Alæ externæ internis sunt angustiores, ex albo ad viridem nonihil inclinant, magis tamen viridescunt internæ, utraq; in extremo circumcirca rosei coloris velut circulo ambiuntur, externæ prope finem nigrescunt, habentque in medio ferè maculam nigram. Antennæ purpureæ sunt, in extremo obtusæ & albæ.

Idem *secundo loco* datur supinus, in quo, quod in externis alis prope finem erat, nigricat, hic viridescit, sed macula tamen nigra colorem retinuit nigrum, internæ prope corpus prorsus virides, in fine ad luteum vergant, cingunturque eodem circulo roseo. Estque hoc observatu dignum in internis, quod maculam habeant albam cum circulo ferrugineo, quæ extrinsecus non est.

Qui sequitur pronè & supinè pictus, à potioribus coloribus λευκοχλωρο dici potest, sed hunc, quia admodum maculosus est, λευκοχλωρον variègatum nuncupavi. Prono corpore leucophæo est, capite nigricante, oculis instar saphiri viridibus, antennis nigris cum appendicibus in summitate albicantibus, pectore hirsuto, alis candidis, suprâ prope caput ad cœruleum vergentibus, maculis magis nigricantibus, inferius respersis, dico inferius, nam, ubi cœruleæ sunt, nullam cernere est maculam, supinò corpore magis candidat. Alæ externæ sunt candidæ & nigro variæ, internæ ex albo & viridi eleganter admodum decoratæ.

Quintum Papilionem *crucigerum* nominavi, quod externis alis complicatis, albis tæniis, quibus ornatus cernitur, crucem, vel potius literam X. exprimat, quanquam id in iconè pictor non expresserit. Sunt itaque alæ illæ nigræ, fasciis seu tæniis albis insignes, & venis rubicundis deorsum descendentibus. Interiores sunt totæ miniacæ, maculis nigris rotundis illustres. *Sextus* idem est parte supina exsculptus, in cujus internis alis maculas illas nigras non videas, & fasciæ quæ in externis alis pronâ parte albæ erant, hic auræ sunt. Corpore est iste Papilio pronè luteo toto, supino ventre albo, nigris guttis triplicis ordinis consperso, oculi nigri sunt & exigui, exiguæ exilesque antennæ.

Sextus ac postremus alas externas ac internas exterius rubicundas, ad castaneum vergentes habet nigris guttis conspersas. Supinâ parte alæ internæ candidant, exteriores colorem eundem ferè, quem prona earum pars, conservant. Corpus pronum atrum est, supinum cinereum, cinerei quoque pedes, antennæ nigræ, oculi lutei prominentes.

PUNCTUM VII.

*De Papilionibus Aldrovandinis
tabula sexta.*

Papilionem, qui in tabula sexta *primo* depingitur ordine, πολυφθαλμον nuncupavi, quod in internis alis intus ac extra multis notaretur oculis, qui tamen, licet duo tantum, in externis exterius & interiorius elegantiores sunt. In his enim iris est nigerrima, pupilla alba. Alæ supinè ex luteo & castaneo variant, internæ intus prope corpus primum cœruleæ, dein ferè amethëstinæ, in quo colore cernere erat lineas duas transversales, flexuosas, castanei coloris, sub quarum postrema color subsequitur luteus, deinde rursus amethëstinus, quem lineæ percurrunt castaneo colore, atque intra has siti sunt, quos dixi oculi, quos subcœruleus cingit circulus. Corpus animantis nigricat, pedes & antennæ lutei, oculi nigri.

Alter alas habet dentatas, rubicundas, ad ferrugineum accedentes, & maculis respersas nigris, in medio rotundis, ad latera oblongis ac magnis. Alæ supinè nigricant, & albam fasciam habent, quæ vel currentes æmulator fluminis undas. Corpus supinum cinereum est, pronum nigricat.

Separatim in Bononiensi editione depictus ex iis est, qui in arborum truncis nascuntur, capite admodum exiguo, albo, antennis ferrugineis, latis & quodammodo ferratis, dorso ferrugineo & albo, alis alvoque luteis, zonis castaneis.

PUNCTUM VIII.

*De Papilionibus Aldrovandinis
tabula septima.*

Sed & illi, qui in tabula septima dantur, sex mediocribus sunt, quorum tredecim figuræ dantur.

Primus corpore toto niger est, annulos verò habet luteos, alæ omnes candidant, & venis distinguuntur nigricantibus.

Tertius & Secundus *Bombylij* sunt, ex erucis bombycivomis orti, vulgò noti, undique candidissimi, exceptis antennis, quæ nigrae sunt & hirsutæ, invicem coeunt, mas est tenuiori corpore, secundo scilicet loco pictus. Inter utrumque ova appinimus exigua, coloris ferè crocei alas habent breves, & ad volandum velut ineptas.

Quartus in hac serie totus quoque candidat per alas, per quas venis habet subcœruleas, deorsum descendentes, & punctorum rubicundorum triplicem ordinem, quæ transversalia sunt. Externæ duobus velut oculis nigricantibus decorantur, in extremo ad luteum vergunt oculi & deorsum lutescunt.

Quintus corpore ex crasso, castaneo, luteis zonis, antennis habet ferrugineas, latas & hirsutas vel plumosas, in capite & cervice candidat. Alæ etiam albæ sunt, ferrugineas habentes venas, & ubi corpori hærent, striarum nigrarum rudimenta.

Sextus totus est candidus, corpore scilicet ac alis, quæ venas habent nigras, nigros item pedes & antennis.

Septimus *μολύχλας* dici potest propter colorum diversitatem, corpore toto nigricat, nonnihil tamen ad ferrugineum vergit, sicut item pedes, proboscides & antennæ, quæ admodum tenues sunt & obrusæ. Alæ internæ totæ sunt miniacei coloris, sed nigris lineis flexuosis distinctæ, externæ, quæ corpori annectuntur, atræ, dein miniaceæ, dein rursus atræ, mox albæ, postremò iterum nigrae, majorem tamen aream albus color occupat, eumque percurrunt venæ ferrugineæ, rubescentes, notandumque est, album illum colorem infra versus corpus in luteum commutari, & guttis modò rotundis ac exiguis, modò oblongis distingui.

Octavus superioribus omnibus minor est, corpore prono nigricante, alis ex luteo ferrugineis maculis nigris refertis.

Nonus idem est, at supinè pictus corpore, quod candidum est. Alæ externæ colorem retinent, internæ planè mutant, ut potè quæ maculosæ sunt argenteo splendidissimo, & ferrugineo.

Decimo alæ externæ ac internæ nigerimæ, maculosas habent alas, uti pictura indicat, corpus etiam nigrum est.

Undecimus corpore ex luteo ad ferrugineum vergit, & nigro distinguitur, Alæ exteriores ex albo & nigro variant, internæ luteæ sunt, & quatuor nigris maculis insigniuntur. Externæ supinò corpore pictæ, ut *duodecima icon ostendit*, etiam ex albo & nigro variant quidem, sed ad latera sunt ferrugineæ, internæ colorem retinuerunt, sed nigra illæ maculæ minores sunt, in extremo tam hæc, quam illæ nigrae sunt.

Decimus tertius, qui in hac tabula positemus est, totus est ferrugineus, alæ externæ in medio oculum habent, cujus pupilla alba est, nigrum, internæ denticulatæ sunt, utraque in extremo nigricant.

PUNCTUM IX.

De Papilionibus *Aldrovandinis*
tabula octava.

Minimi sunt, qui in tabula octava depinguntur, inter quos qui *tertio loco datur* non invenustus est, triplici nimirum colore, albo, ruffo & luteo varians per alas. Nam lineæ, quæ in his cernuntur, & transversales & descendentes ruffæ sunt, cætera vel candida vel lutea, punctis etiam notata ruffis, corpore angusto, exili & nigricante, albo bifurcata, pedibus exilibus & proceris.

Huic consimilis est quodammodo *secundus*, corpore item nigricante, sed crassiori, crassiori item capite. Alæ externæ luteæ sunt, supernè magis, minus verò infernè, utrumque transversalis linea nigra distinguit, totæ maculis, seu punctis exiguis nigris sunt distinctæ, internæ nigricant, & in extremo fascias angustas habent luteas.

Primus toto corpore niger est, albo in extremo acuta, alis rotundis, candidis.

Quartus corpore quoque nigricat, oculos habens luteos, alas ex luteo ferrugineas, ubique nigerimis decoratas notis.

Quintus lutescit, punctis, insignis cinereis, quæ totas ferè alas occupant. In externis alis macula conspicitur nigra, neque aliud in hoc notatu dignum, ut in præcedenti, maculas habent cinereas in area lutea.

Septimus corpore & alis totis subalbidis est, pedibus & antennis nigris, in medio externarum macula est nigra.

Octavus albo est rubrâ, nigris punctis notata, pectore & externis alis nigris quidem, sed nescio quid cœrulei etiam demonstrantibus. Alæ internæ luteæ sunt, striis plenè nigris, deorsum descendentibus.

Nonus corpore est admodum brevi & exili candicante, alis item candidis, ad latera subluteis, undique nigris guttulis refertis. In medio duæ tæniæ sunt coloris aurei, tortuosæ, in singulis gyris punctum habentes nigrum.

Decimus toto corpore candidus est, & nigris punctis variat, alas verò habet pulcherrimas, majori areæ parte ferruginei coloris, in quo mirum est, quàm luserit natura. Primum enim in eo fecit fasciam ex maculis rotundis, literam O. exprimentibus, dein parva addidit ejusdem coloris pun-

puncta; postmodum alias duas ténias tortuosas, tum denique albam cum punctis intus nigris.

Undecimus niger est, alas verò habet ex ferrugineo ad luteum vergentes, totas nigris, ut icon ostendit, maculis distinctas.

Duodecimus crassam admodum habet alvum, coloris propè cœrulei, luteâ faciâ sive circulo insignem. Tergus nigricat, ut & caput, & oculi, pedes & antennæ, quæ admodum sunt proceræ. Alæ versus corpus cœruleæ, deinde nigricant, suprâ duabus maculis rotundis luteis, infrâ tribus albis conspicuæ.

Decimo tertio corpus est nigrum, præterquam in dorso, ubi cinereum est. Alæ luteæ, auro resplendentes, oculis innumeris nigris, quos circulus ambit candidus, cohonestatæ.

Decimus quartus hirsutus est, a alis totis cœruleis parte externa, interna cinereis, maculis albicantibus (in quibus mediis punctum est atrum) ordine pictis, in extremo margine notis rubicundis oblongis, oculis caudæ pavonum similibus, albo ac nigro utrinque clausis dispositis, lineæque nigra in latitudinem alæ discurrente terminatis. Totum corpus nigerimum, item pedes, oculi, & antennæ. Alæ in fine albæ sunt, cætera, ut dixi, exterius cœruleæ.

PUNCTUM X.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula nona.

NOna tabula viginti quatuor habet Papiliones exiguos, quorum equidem infinitus est numerus, infinitaque diversitas.

Primus in hac serie corpore pronò nigricat, pedes & antennæ sunt cinerei. Alæ prius nonnihil ad ferrugineum vergunt, mox candicant, punctis & lineis ubique atris conspicuæ.

Secundus corporis mole vix culicem vincit, quin, nî alas Papilionis haberet, culex omninò foret. Alvus ei cinereus, pectus nonnihil ex cœruleo possidet, alæ albæ sunt, ita tamen, ut nonnihil etiam fuscescant, habentque puncta minutissima nigra cum circulis ambientibus ea candidissimis.

Tertius *αλυχλωρ* minimus dici poterit propter alas albo, nigro, rubro & subcœruleo maculosas; Externæ in notabilem acutiem desinunt, corpus ei totum subatrum est, proboscis & antennæ lutescunt.

Quartus alas habet aureas, in margi-

ne ferè castaneæ colorem imitantur, prope extremitatem est macula ferruginea; alvus argenteo micat, pectus superna nigricat, in capite duo sunt puncta coloris argentei.

Quintus ex iis est, qui ad ignem candelarum advolant, corpore subcinereo, alis totis candidis, lineis sive venis ad ferrugineum inclinantibus.

Sextus alas habet infrâ nigras, cætera coloris rutili. Corpus cum antennis & pedibus nigrum est.

Septimus quoque niger est, sed circulis sive annulis duobus per alvum luteis distinctus, oculi quoque lutei sunt, alæ supernè magis, infernè minus nigricant, & maculis ubique insigniuntur candidis.

Octavus ex advolantibus etiam ad lucernas est, alvo coloris flavi, nigris, ut in iconè apparet, punctis rectâ deorsum vergentibus insignis, reliquo corpore candidissimis, sed quæ exiguis admodum ferrugineis ferè punctulis insigniuntur, & in fine nigricant.

Nonus septimo similis, sed corpore major est, minoribusque contrâ alis, & in quibus majores maculæ albæ sunt, & velut argento resplendent.

Decimus alas pro corporis portione breves habet angustasque, alvum admodum proceram, nigricantem; annulis candicantibus distinctam, alæ leviter pallidæque lutescunt.

Undecimo caput magnum ac nigrum, corpus & internæ alæ miniaci coloris, lineis transversalibus nigris in extremo insignitæ, externæ totæ sunt coloris castanearum, pedes brevissimi.

Duodecimus corpore est flavescente, proceròque, dorso crassiusculo, in quo color ille flavus paulò est intensior, capite exiguo ac rotundo, pedibus brevioribus, alis candicantibus, vel pallidè lutescentibus.

Decimus tertius vulgatissimus ille est, qui candelarum lumini infestus est; Corpore est admodum exiguo nigricante, alis & antennis flavis.

Decimus quartus internas alas totas habet rubras, supernasque ejusdem coloris, sed ad internos margines cinereas. Corpus totum atrum, præterquam in cervice, ubi circulus aureus est, pedes sunt rubicundi, antennæ nigræ in extremo obtusæ.

Decimus quintus idem est supino pictus corpore, ut alvi crassities magis apparet. Nam alioqui nihil, vel parum differt. Foemina erat, & ova mihi peperit rubicunda.

Decimo sexto corpus est oblongum, & fuscescit infernè, supernè argenteo micat. Alæ ejusdem sunt coloris fusci, & argento auroque micantis.

Decimus septimus toto corpore nigricat, alas habet ferrugineas, sed elegantissimè aureo colore resplendentes.

Idem *decimo octavo* loco exhibetur supinus, quia variat admodum. Nam corpore toto candicat, alæque minus sunt ferrugineæ, minùsque resplendent auro, sed contrà innumeris punctis atris maculantur, quas circuli sui ambiunt candidi. Habent verò eandem fasciam auream, prope extremum marginem.

Decimus nonus alvo admodum est procæra, tota lutea, cervice nigra, pedibus, antennis & summo capite candidissimis, alæ quoque candidissimæ sunt, sed striis sive lineis nigris interstinguuntur, suntque adeò breves, ut ad volandum videantur esse inutiles. Nam hoc in eo observavi, quod continuò foliis, velut zoophyton quoddam, adhæreat.

Vigesimus, nisi alas haberet latiores, ex muscarum potius, quàm Papilionum genere videretur. Corpore enim est admodum compacto, nigricante, alis ex cinereo ad castaneum inclinantibus, & aurum resplendentibus.

Vigesimus primus ab alis tam internis, quàm externis prorsus argenteo splendore emicantibus, argenteus dici potest. Corpore præterea toto condido est, præter oculos, qui nigri sunt, & antennis, quæ sunt luteæ.

Vigesimus secundus toto corpore aterrimo, alas habet nigras colore ruberrimo distinctas, pedes & antennis longiusculos, nigros.

Vigesimus tertius antennis habet latissimas, hirsutas ac velut plumosas, coloris flavescentis, caput & alas candidissimas, has tamen fuscae transeunt lineæ subtilissimæ. Alvus tota crassa est & gravis colore luteo, nihil, vel partim volat, foliis semper adhærens.

Postremus omnium minimus, brevioribus tamen, quàm par est, ac latioribus alis pictus. Sunt enim angustiores ac oblongiores, totæ albicant. Triticiarius dici potest. Nam tritico infestus est, utpotè ex tritico prognatus.

PUNCTUM XI.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula decima.

DE istis etiam ita Aldrovandus: Papilio *primo ordine* in hac decima tabula depictus figura corporis est admodum insolenti. Habet enim in alvo seriem quandam velut plumarum subtilissimarum, penicillos pictorum exactè exprimentium, coloris partim albi, partim nigri. Corpore toto

admodum crasso est, dorso & vertice summo cinereis, alvo luteo, annulis distincta atris. Inter quintum & sextum annulum ab utroque alvi margine macula est candidissima, inter sextum verò & septimum aterrima. Alæ exterius ex cinereo fuscescunt, intus sunt rubicundæ corpore supino, sicuti etiam, qui *secundo loco* depictus est, candicat. Antennæ latæ sunt, & ex cinereo fuscae. Alvus supina nigra est, in medio candida. Ad mediocres pertineret, nisi tam crassus esset.

Tertius ex minoribus est, alvum habet luteam nigris zonis distinctam. Alæ quoque flavescent, tergus ferrugineum est, ejusdemque coloris antennæ, quæ latæ sunt & hirsutæ, supino ventre albicat.

Quartus alvo quoque lutea est, sed magis ad croceum accedit, & punctis notatur in medio deorsum descendantibus aterrimis. Alæ internæ ejusdem cum alvo sunt coloris, & similibus quoque punctis maculantur, exteriores leviter pallideque lutescunt, tergus & antennæ colore sunt ferrugineo, pedes croceo. Habes eundem alis complicatis, prout ex sua chrysalide erumpit.

Sextus valde est exiguus, corpore superno fermè ferrugineo, inferno planè aureo, alas habet luteas ad croceum vergentes, admodum parvas.

Septimus corpore nigricat, alas habens luteas ad ferrugineum nonnihil vergentes, & ferrugineis venis distinctas. In exterioribus macula est nigra, rotunda, puncto intus albo.

Idem est, qui *octavo loco* depingitur erectis alis, quæ eundem plane colorem retinent, præterquam ubi corpori junguntur, quâ parte ad cœruleum vergunt, habentque lineam albam, quæ medias percurrit.

Ex minimorum genere est, qui *nono loco* exhibetur, corpore cinereo, nigrescente, alis cinereis admodum obscuris, internis luteis. In externis macula est candida, literam V. exactè exprimens, item altera figura semicirculi.

Decimus alas habet longas & angustas, colore flavescente, fasciis sive tæneis ornatas tribus atris. Pedes & antennæ flavescent, oculi admodum exigui sunt & nigri.

Postremus omnium minimus Papilio est triticiarius rectius, quàm in præcedenti tabula exaratus, simul cum sua chrysalide, & vermiculo sui ortus. Alas habet, ut cæteri, quaternas, albidus totus,

cinereusve, corpore levi in acutum alvo desinente, argenteo splendore. Vermiculus iste Circulio vocatur.

†

*

PUNCTUM



PUNCTUM XII.

*De Papilionibus Aldrovandinis
tabula undecima.*

Rariores sunt & formæ insolentioris, qui in undecima tabella depinguntur. Ex quibus *primus* alvo est crassissima, supernè candida, infernè nigrescente, seu potius ad cœruleum inclinante, annulis & punctis distincta nigricantibus. Tergus ac caput candicant, admodum hirsuta. Antennæ latissimæ ac villosæ, coloris ferè amethystini. Alæ ex amethysto & cyaneo mediæ, venas habent rutilas primum, post nigras: In extremo candicant, ubi punctis maculantur exiguis, aterrimis. Pedes robusti, ejusdem cum antennis coloris. In alvo notatu dignum est, quod in extremo longè crassior sit, quam ubi corpori jungitur.

Secundus ex eodem vel consimili genere, licet minor, corpore est fusco, capite acuto, oculis protuberantibus, per tergus & summo vertice cinereis, alis brevibus pariter cinereis internè prope alvum rubicundis. Antennas non rectâ, ut cæteri, erigit, sed ad latera extendit.

Tertius ex eodem quoque est genere, & ipse acuto capite, & ad latera emittens antennas suas. Corpulentus est, crassiori tamen thorace, quam alvo, quæ nigris extenditur annulis. Toto corpore superio leucophæus est, infernè candicat. Alæ totæ fuscæ sunt, internæ, quæ ventrem spectant, nonnihil possident rubicundi.

Quartus totus ex cinereo fuscus est, alas habens longiusculas & angustas. Alvo est crassa & bifurcata. Hæc annulis, alæ venis insigniuntur ferrugineis. Caput admodum breve est, antennæ minutissimæ, ac vix apparentes.

Quintus insolentis formæ caput obtinet, à cuius lateribus duo sunt tubercula, rotunda, nigra multis capillamentis nigris hirta, & in extremo alia duo, sed quæ ejusdem cum capite sunt coloris, nimirum ruberrimi, qui quoque color communis est tergo, à cuius quoque lateribus duo alia sunt tubercula nigra, ut priora. Alæ ex infima tergoris parte exoriuntur, colore ferè nigricante, luteis aureisque lineis & guttis refertæ. Alvus est bifurcata, tota lutea, rubris zonis interstincta. Pedes & antennæ nigricant.

Sextus tota alvo rubra est, aureis prope finem lineis notata, in quibus puncta sunt rubra. Alæ primum luteæ sunt, deintotæ nigræ, albis conspersæ punctis, & lineis distinctæ aureis. Caput villosum est & nigrum, tribus antennis instructum, ut pictor pinxit.

Septimus minimorum generis alis est denticulatis lutescentibus, nigris lineis & punctis rubris insignibus; alvus albida est bifurcata, nigris lineis ornata ambientibus, pedes nigricant.

Octavus alvum item habet bifurcatam, sed crassiorem, ejusdem prorsus cum præcedente coloris, sicut & ipsæ alæ, sed quæ loco punctorum in extremitatibus infernis rubescebant.

Nonus crassissimam habet alvum rubram, supernè luteo distinctam, alas angustas, ferrugineas, nigris lineis refertas, dorsum candicat.

Postremus alvo est crassiuscula, alis & toto corpore cinereis, pedibus nigris.

PUNCTUM XIII.

*De Papilionibus Moufeti, & primo quidem de Phalænis
magnis.*

NON cedit Aldrovando Moufetus. Plurimas enim tam nocturnarum, quas Phalænas vocari diximus, quam diurnarum species, easque in magnas, medias & minimas distinctas dedit, quas hic etiam exhibere placuit. Et magnarum quidem octodecem species habet.

*Moufet. de
Insectis i. c.
14. ap. 89.
ad 94.*

Maximæ Phalæna venter arenosi admodum coloris est, uti & interna alarum pars; oculi cœrulei videntur, caput verò lividum; inter oculos antennæ duæ emergunt subfusce, aquilinum referentes fucum, & nigris transversim lineis funem contortum imitantes. Scapulis veluti pannus quidam adhæret arenosus, sordidus, à quo macula nigra decussati tracta scapulas finit. Cæterum corpus, si dorsum spectes, cyaneum, si ventrem, arenosi coloris est. Alæ duæ exteriores permagnæ, aquilinas colore æmulantur, maculis albisque orbibus variè distinctæ; internæ, multò sunt minores, atque intus furvis striis & maculis quibusdam insignes: Crura habet lacertosa & valida, furvi singula coloris, & in extremo duobus nigris digitis forcipata. Volat magno cum strepitu, & nocte exoculata, quemcunque splendorem ex ligno putrido, squamis piscium, aliisve rebus ortum avidè consequatur. Sicut magni Tyranni minorum gentium nobiles devorant & hauriunt; ita hæ nocturnæ diurnas Papiliones sub foliis latitantes alis diverberant atque occidunt.

Secunda primæ magnitudinis phalæna, ut mole corporis nonnihil superatur: ita primam colorum harmagoge, tono & elegantia longè vincit: ac si natura in hac ornanda pigmentariam suam omnem officinam exhausisset, atque illam primam Re-

gem Papilionum, id est, fortem, strenuum, nigellum, lentiginosum, hanc verò Reginam, mollem, tenellam, comptam, unionibus, gemmisque confitam, opere plumato & Phrygio superbientem fecisset. Corpus lana quasi anserina, nonnihil lævigatum & hirtum. Martis, vel Sabellionis potius pellem mentitur, capite est parvo, oculis magnis prominentibus, antennis plumiformibus duabus, buxeum colorem referentibus. Alas habet quatuor magnas singulas multicolore oculo donatas, quorum pupilla nigra, iris *μολχεῖ*, circulis & semicirculis mellinis, flammeis, albis & nigris pulcherrimè distincta. Externæ alæ ab exortu ad oras albicant, nigris quibusdam venulis punctulisque insignes. Oram ipsam peniculantem cum limbo ornat, exortu surdè fuscum, sive subflavum. Internæ alæ fuscæ videntur, uno quoque oculo superioribus conformi præditæ, tribusque infitis ornata: harum prima plana est, media opere dentato excurrens (ignei utraq; coloris) extrema verò subalbida, & veluti à pelliionibus assuta, cruribus incedit validis, hirsutis, lacertosis, ejusdem cum reliquo corpore coloris. Hanc Carolus Clusius Vienna misit tam elegantî forma notabilem, ut suspicere potius admirarique eam quàm verbis aptis describere facilius sit.

Tertia est corpore magno, hirsuto, nigricante; singulæ alæ uno oculo notantur, cujus pupilla nigra, circulus fuscus, semicirculus albus. Varii quasi panni in alis conspiciuntur dilutò amethystini, fimbriæ verò alarum extremæ primùm cinerei, deinde aquilini coloris videntur. Caput valdè breve & exiguum, unum utrinque oculum coracinum emittit, pupilla albißima insignem. Inter hos duæ antennæ valdè breves & exiles fusci coloris erumpunt. Ex pilosa eruca oritur, non glabra.

Quarta caput habet magnum fusci coloris, è quo duæ antennæ rectæ & subnigræ surgunt. Collum miniata macula ornatum, pectus hirsutum quadratum, fuscum. Scapularum pars anthracina, venter amethystinus quinque vel sex orbibus nigris dividitur. Pedes picei videntur, alæ leviter fuscæ, subnigris in longum venulis satis conspersæ.

Quinta caput albescit, oculi nigrescunt, cornicula aliquantum flavescunt, alæ exteriores longæ ex fusco atque albo furdescunt, interiores leviter & quasi obiter pictæ rubescunt. Scapulæ nigerrimæ conspiciuntur, reliquum verò corpus subroseum, septem nigris circulis linea albescente per medium totum ventrem currente alligatis ornatum.

Sexta caput scapulæque, atque exteriores alæ, sanguineis venulis linearæ ex fusco albescunt: Capitis oculi propen-

duli, hyacinthini videntur, vel potius cyanei. Internæ alæ nonnihil incarnatæ oculum media sua parte repræsentant, pupilla corvina, circulo hiacynthinolucentem. Corpus carnem arefcentem, & leviter infumatam refert, sex quidem orbiculis ex nigro atratis notatum.

Septima alas habet exteriores albas, fuscis quibusdam maculis undulatis variegatis insignes; collum miniata quasi pellis circumcingit, ad totas deinde scapulas caputis instar decurrens: caput rubrum, oculi margaritei, antennæ flammeæ videntur. Alæ internæ rutilæ, tribus nigris maculis lentiginosæ, pedes rubri, venterque totus concolor, incisuris septem plenius miniatis & transversim ductis conspicuus.

Octava tota ferè Bætica coloris est, nisi quod omnium alarum extremitates buxæ videantur, uti etiam media antennarum pars.

Nona illi ferè est similis, sed extrema alarum pars arenam nigriorem refert. Cornicula verò lata habet & repanda, ex fusco albicantia, mediam externarum alarum partem candida rotunda macula adornat.

Decima parilem præ se fert magnitudinem, ex albo tota furvescens, nisi quod media alarum extremarum pars puncto admodum albo, oculus verò pupilla valde nigra conspiciatur.


Undecima caput tuberosum, cornicula exilia, corpus atque extrema alarum pars lutum subactum æmulantur, alias verò alæ totæ obscuræ argenteæ fuissent.

Duodecima videtur subcinerea, alis nigris quibusdam maculis infestis, oculos item habet nigerrimos, pupilla candida lutescentes.

Decima tertia antennulas vix ostendit exiguas, toto corpore flavescit, præter oculos (qui exigui & nigri) atque alas, quæ albidæ videntur.

Decima quarta variî coloris videtur, cornicula tuberosa nigra habet, uti & ocellos & pedes. Scapulæ albis quinque veluti plumis ornantur, quarum utramque mediam tres nigræ maculæ occupant. Alæ nixæ nigris, luteis & cœruleis hic illic maculis pinguntur. Corpus illi nigro-cœruleum, articulatam, & juxta latera albicans, caudam pro arbitrio exerit vel recondit, mucronatam, subluteam, articulatam: totum corpus pulvere quasi conspersum; alias enim corniculorum tuberantium gratia in papilionum classem venisset. Ova numerosa ponit, sublutea, ac inter excludendum caudam exilem exerit, ac deinde prohibitu recondit.

Decima quinta cornicula duo habet nigra, exilia, caput atque scapulæ hirsutæ, fusci coloris, cullum miniato torque decoratur, femora rubescunt. Alæ extremæ ex fusco & albo scutulatæ vel undan-





tes potius. Intimæ verò exactè rubent, maculis piceis infectæ. Corpus leviter miniatum institæ sex nigræ orbiculatim circumcumeunt.

Decima sexta mira admodum videtur, si supinam videris ubique, Xerampelinam dixeris, si pronam, ex viridi lutescentem. Scapulas autem pronas quinque ruberrimæ lineæ deductæ ornant, sicuti & septem medio dorso puncta affixa reliquum corpus. Alæ item Xerampelinis transversim maculis vel umbris potius visuntur, quarum exortus à capite ad pectus usque infimum albescente linea terminatur.

Decima septima, si compressis eam alis incedentem videris, fusca videtur, si verò expansis volitantem, alas interiores explicat coloris incarnati, sed nigricanti limbo juxta oras distinctas. Corniculis donatur oblongis, & involuta quasi promiscide, canescentes scapulas macula arenosa rotunda inficit, latera item & corporis omnes articuli ceu canis confiti & fimbriati videntur.

Decima octava. Clusius misit perpulchram: Antennæ illi albo-nigræ, caput piceum, nasus aduncus, oculi circulus candidans, collum coccineum, scapulæ hirsutæ, nigro quasi pallio vestitæ. Alæ exteriores nigris albisque institis interpolatæ, interiores rubræ, nigris hic illic maculis ornata. Corpus habet piceum, sicut & pedes, sed latera corporis septem utrinque maculæ ornant sanguineæ.

Huic *affinis* illa, quæ est antennis omnino coracinis, mediisque scapulis instita candidissima, ceu margaritarum linea ornata.

PUNCTUM XIV.

De Phalanis mediocribus Mouseti.

MEDIÆ molis Phalanarum septemdecem exhibentur species.

Prima ferè albescit tota, nisi quod alæ exteriores nigris nonnullis maculis & lentiginibus; interiores verò quasi variolis & morbillis ruberrimis medio albescentibus sædantur: oculos item nigerrimos; pedes, antennas subluteas habet. Nasi loco capillus provenit hirsutus, veluti in spiram sæpius involutus.

Secunda corpus totum habet hirsutum atque spadiceum, cuiusmodi alæ exteriores, (absque maculis fimbriisque albicantibus & oculo luteo fuisset) Antennas flavas nigra punctula adornant; internæ alæ calendularem colorem referunt, sed ocellis quibusdam & fimbriis uti exteriores nitent.

Tertia alas habet quatuor albas; exteriores autem cœruleæ quædam venulæ affluentiùs sparæ infuscant, duæque in medio rotundæ; nigricantes maculæ adornant; linea circum alas ducta mellina videtur, qualis antennarum color, corpus caputque nigricant, oculos habet albissimos, scapularumque latera quatuor utrinque lineæ albissimæ obliquæ decorant.

Quarta cornua gerit repanda gruini coloris, corporis nigri latera canescunt. Alæ subluteæ nigris multis maculis serpentariam æmulantibus inficiuntur, superius latis, inferius orbicularibus: fimbria alarum Vespertilionum more dentata & veluti spinosa nigerrima est tota, quam intus sex utrinque margaritæ positæ commendant.

Quinta tota est anthracina, nisi quod maculæ ex albo rubescentes alarum faciem adornant.

Sexta corpore & antennis nigerrima oculos albos obtinuit. Alæ illi subtus coracinæ, extrà aureis villis atque maculis conspicuæ, quibus vicissim lati clavi nigri coloris & argenteo quasi filo transfixi adherescunt: extimas quoque alas mæander quidam ornat nigerrimus, auro subtus fuso & quasi striatim acupictio.

Septima laticornis, corpus nigrum canescens, nescio an dedecori sit magis, quam decori. Alarum primordia rubent, reliqua flavescit pars; utramque verò partem nigræ tessere laminatim positæ inficiunt; quarum extremitas linea una aurea splendet.

Octava quatuor cornicula habet racemosa, cinerea, duo autem prælonga, & extremitate latiora: corpus aliquale septimæ alas subcinereas obtinet, nigro tessellatas, & circa extimam oram guttis ejusdem coloris æqualiter pictas.

Nonæ caput, oculi, antennæ, corpus, internæque alæ arenam illam auriferam representant; scapulæ externæque alæ nigrescunt, nisi quod instita quadam nigerrima lineis utrinque cinereis decorata ornantur.

Decima corpus habet luteum, nigris quibusdam guttis à collo ad caudam usque lateribus & dorso insignitum; oculi, antennæ, pedes nigerrimi; alæ exteriores candidæ, sed limbis flavis, clavis angustis nigris, maculis quoque nigris distinctæ.

Undecimæ alas si videris, niveam dixeris vel lacteam, nisi illam minimæ hic illic nigerrimæque maculæ inficerent vel orna- rent potius; scapulæ item papposæ albicant: dorsum corpusque luteum, & articulatum octo nigra punctula commendant: oculi prominent magni, inter quos antennæ emergunt nigræ atque hirsutæ. Noctu in pratis & pascuis volant.

Duodecima alas habet adeò productas,

ut volare commodè non possit; brevissimas antennis gerit, oculos parvos nigerimos, totum alioquin corpus albescit, lutescentibus quibusdam venulis atque vilulis rariis conspersum.

Decima tertia corpus totum (oculis demptis nigerrimis) gruinum colorem subnigricantem æmulator: antennis habet productiores, corpus hirsutum, alas corpori concolores, sed juxta oras tonò quodam virescente & vitreo coruscantes.

Decima quarta pulchra quidem est, quamvis tota propemodum arenosa: cornua gestat pro mole corporis valida, nigra & taurorum more curvata; oculi nigri & magni, caput breve, collum crassum. Alas externas nigri quidam clavilli gratiores reddunt. Spinam veluti supremam quinque nigra ceu caryophyllorum capitatrifurcata insigniunt.

Decima quinta alæ ferè sunt subcinereæ totæ, antennis sola ex omnibus destituta est, oculos habet subnigros, dorsum subluteum & quinque fuscis punctulis distinctum.

Decima sexta ejusdem penè coloris videtur, nisi quod illius exteriores alæ macula pulla transversim ducta ornabantur; hæc verò ubique unius coloris (oculos nigellos dempseris) conspicitur: corpus habet longum, articulatam; alas quatuor longas atque angustas, pedes sex, quorum postremi prioribus duplo longiores sunt; cornicula item habet exilia, sed longè excrefcentia.

Decima septima ex cruce bombycina originem ducit, tota albescens præter oculos nigricantes, & venulas quasdam subluteas rectè per alas & transversim per corporis articulos currentes. A nobis Phalæna Bombycina nominatur.

PUNCTUM XV.

De Phalanis minimis Moufeti.

*Moufet. l. c.
p. 97.*

DE iisdem ita Moufetus. Minimorum in classem unam primam faciemus mirabilem, quatuor tantum pedibus piceis incedentem; externas quoque alas cœruleas, habet; internas luteas & externis (præter morem) minores: corpus item luteum adeo magnum est, ut ab alis regi vix possit: cornicula punctis plena, atque oculi (dempta pupilla albida) nigrescunt: caput atque promusculis (longa, exilis, involuta) flevascent.

*Alter*a ex cœruleo viridis videtur: corpus exiguum habet, pedes & antennis nigricantes.

Tertia scapulas atque alas habet porraceas, corpus ex subluteo fuscum apparet: alas extimas limbus ornat albis fuscisque

maculis notatus: caput perpusillum habet, pedes & antennis cineri similes. *Quinta* etiam in ædibus parvæ aliquot Phalænæ argenteis maculis notatæ ad lucernas advolant, quæ lanceas & linteas vestes depascunt & ova deponunt, è quibus tineæ, & ex tincis vicissim hæ Phalænæ oriuntur: feruntur autem primum ex rosarum foliis, aliisque herbis putrescentibus originem cepisse.

Tres alias minores in pascuis & pratis observavi, quarum *Prima* alas externas nigras obtinet, singulas quinque maculis quasi sanguine perfusis notatas: alæ interiores totæ rubent, corpus fuscum videtur, caput, antennæ breviusculæ, & pedes nigricant.

Secunda similis videtur, nisi quod quatuor tantum sanguineas maculas in alis exterioribus habet, corporeque constat graciliore.

Tertia ferè parilis est formæ, absque antennis esset multo longioribus & sanguineis maculis alio modo aspersis, nam circa extremitatem alarum guttæ sanguineæ duæ tantum apparent, ab exortu verò maculæ duæ longius tractæ conspiciuntur.

PUNCTUM XVI.

De Papilionibus Moufeti diurnis, magnis.

DIURNÆ Papiliones quoque in *magnas*, *mediocres*, & *parvas* distinguuntur. *Magnarum* sedecim sunt species. *Moufet. l. c.
p. 98. ad
p. 102.*

Prima, omnium maxima, maximam partem flavescit iis locis partibusque exceptis, quæ hic atramento denigrantur. *Quinta* etiam extremi illi internarum alarum globuli cœli colorem spirant, ut genuinis saphyris confitum putares. Oculi chrysolithum referunt, magnitudinem formamque adeo exsculptam hic exhibemus, ut plura de iis attexere non sit necessum.

Secunda præter magnitudinem parum differt à prima, oculos habet nihilominus nigerrimos atque porrectiores antennis: ubi album colorem vides, ibi melinum sufficito, exceptis illis quasi oculis majoribus juxta finem alarum interiorum positis, quorum pupillam flammeam, semicirculum verò Xerampelinum reddere oportet.

Tertia non multum colore abludit, nisi quod internarum alarum exphyfes, totaque ipfarum extima lacinia glastiva sit, uti & tres illi spintheres, quos sub concava illarum parte vides depictos.

Quarta omnium Regina dici potest, Nam extremis alis, veluti Adamantes quatuor in pala Hyacinthina radiantes, miras opulentias ostendunt, imò ferè adaman-

ti & Hyacintho oculum effodiunt. Lucent enim pulcherrimè (ut stellæ) scintillasque iricolores circumfundunt; his notis ita dignoscitur, ut reliquum corpus describere (licet variis pictum coloribus) supervacaneum esset.

Quinta caput, pedes, cornicula Xerampelini coloris obtinet, oculos verò hyacinthinos, dorsum atrocoeruleum videtur, venter subflavus; alæ juxta basin luteo hilari, deinde tristiori nitent: extimas verò partes rubiginosas & inamœna fuscædine nigrescentes tres luteolæ maculæ adornant, internis rubigine conspersis duæ, primæ luteæ, deinde tres ex luteo pallescentes maculæ adhærent. Si autem supinam faciem confideres, alæ superiores ex luteo in viridem languescunt, senis octonive maculis insignes: internæ autem leviter herbidae & virentes duabus quasi lenticulis albis inficiuntur. Venter vultusque totus subflavus, ex aurelia prode albicante, fuscis spinulis notata.

Sextæ alæ superiores extrâ nigrescunt, per mediam partem limbo quodam obsoletius rubido currente, extremitates ipsarum panno, guttisve niveis micant, obscuris per ambitum crenulis asperatæ; intus autem limbus ille puriorem atque saturiorem exprimit colorem, & juxta radicem coeruleæ videntur. Inferiores alæ alteram intus, alteram foris faciem ostendunt, foris fuscae sunt totæ, excepta spinosa infita subrubente limbo perpusillis nigris quatuor punctulis & opalis duobus polychrois simul positis notata, intus autem nihil tale monstrant, sed ex nigro purpureo vermiculato in Xerampelinum tristius languentes desinunt; corpus illi nigrum, oculi, antennæ, pedes concoloris, fusci.

Septima corpore tota picea, in singulis dorsi tamen incisuris punctulos duos gerit albissimos, alas ex flavo rubescentes maculæ nigrae, candidæque albæ adornant. Verum munifica rerum parens natura extremam alarum oram potissimum decoravit, quæ nonnullis denticellis serratim æquò intervallo distantibus donatur, in quarum fimbria viginti clavi coerulei filo nigro transfixi mirificum edunt splendorem.

Octavam veste undulata & mixta peperit natura, sed vegetis coloribus destituta: constant enim alæ ex nigro, minio, flavo, & fusco fatiscente, magisque vellere mollicula, quam ornatu splendida videtur.

Nona maximam ferè partem cinerea conspicitur; si verò internam interiorum alarum faciem intuearis, vix aliquid Indici galli alas signantius exprimit: nam pennas remiges alæ quasi vestitricis &

squamæ tegunt; oculus coracinus est, cujusmodi & tuberosa typhamque amulantes antennæ.

Decimæ corpus piceum, scapulæ flava quadam lanugine, (uti & totum caput) vestitæ, antennæ item flavescunt caput tenus, quod macula ex sanguineo atrata tristius occurrit, externam omnium alarum fimbriam circinatam plurimæ ovales margaritæ æquis distinctæ intervallis gratiorem reddunt, intus verò maculis nigerrimis, lentis effigiem imitantibus scedantur. Verum sicut foris minus speciosa, ita interior internarum alarum pars, albo virore nitens, guttulis verò argenteis superinductis resplendet, & quæ extra ovales margaritæ videbantur, intus argentum purum putum non mentiuntur.

Undecima speciosam radiantium in-cœrulo margaritarum institam ostentat, alæ superiores ex flammeo flavescences ignem referunt, sex nigerrimis pannis infectæ: internarum radix anthracina, deinde flavo in igneum coruscant: corpus fuscis capillamentis hirsutum, quem colorem cornicula cum pedibus imitantur.

Duodecima eximie est pulchritudinis, alæ leviter cruentæ & maculis nigris tinctæ, radiolis micant auratis filatim ad lacinia usque ambitum dispersis. Hæc verò Xerampelina ferratim desinens intus aureis lineis lunatim ductis ornatur. Corpus ex nigro purpurascit, oculi aurei videntur, pedes & cornicula nigricant.

Decima tertiæ corpus & alæ nigredinem referunt, alis autem nigris & ambitu pinnatis primum capilli, deinde panni, ultimo clavi aurei medio atri inducuntur; oculi item exigui piceo in capite auro illiti; antennæ verò punctulis nigro candidis excrescunt, & in tuberculum nigrissimum finiunt.

Decima quarta culturæ lenociniis mirè arridet, corpus habet hirtum, ex albo nigricans, oculus niger pupilla albicante: circa oculum glabrum circulum videas ferè niveum, antennæ cum priore communes; extera majoris alæ facies ex flammeo aureis lineis productis dignoscitur, quas nigri quatuor limbi dentatim ducti inficiunt; circa finem verò tres numuli argentei ferè triangulariter positi commendant. Interna autem facies pulcherrima videtur, variis auratis squamulis & clavis lorica tim & imbricatim positis insignis. Extremam alarum partem aurea quoque linea adornat. Pavonem nonnihil alis refert, ejusque ritu corpus gloriosum & elegans, pedem autem & tibias aliquantum nigricantes (ne forma superbiam aleret) obtinuit. Promuscis helicam refert lineam, veluti in labyrinthos convoluta.

Decima quinta quoque proboscidem habet capillarem, viminei instar viticelli, sese torquentem. Est cinerea intus, forisque dilutè cæsia videtur: alas habet spiniformes, vespertilionum more crenatas, has extra fuscæ aliquot lineæ interfecant, intus sex clavinigricantes multum commendant.

Decima sexta alis superioribus exterius obscurius virefcit, quas maculæ pannique albescentes flaventesque aliquot adornant: interiores exactè rubidæ maculis decem scatent nigerrimis. Venter octo flavis squamis splendescit: dorsum ex rubro in flavum vergens caudæ hordeolum ostendit quasi-venetum. Hirtas scapulas citrina lunula deorsum ducta commendat; oculos rubentes pupilla acutiores reddit argentea.

PUNCTUM XVII.

De Papilionibus diurnis Mouseti mediis.

*Mouset. l.c.
p. 103. ad
pag. 105.*

MEdiarum diurnarum tredecim species occurrunt.

Prima oculi subflavi videntur, cornua obsoletè pulla, alæ reliquumque totum corpus ex pallido flavescunt, interiores alæ extrà una tantum macula saturiore lutea notantur; intus autem caducæ herbidæ fusca quadam variola inficiuntur, dorsum ex cœrulo nigricat, venter subflavit. Ex chrysalide oritur auro illita.

Secunda minus grati coloris videtur: alæ interiores tristi in gruinum fatiscunt cœrulo, & quasi in plumbeum desinunt; externas nigriores habet, fuscis hic illic maculis notatas; tale item corpus videtur. Serratis alis summaque ora crenatis, & veluti aculeatis horridiuscula volitat, & quasi suæ gentis præfica nunquam; nisi funerali habitu tristius incedit.

Tertiam depinximus rigidulam, erectis alis sese veluti tollentem; est etiam spinosis crenis, sed exterior ala ex pallidior flavo tribus pannis nigris maculatur; internæ verò proxima à radice pars furvescit, media pallefcit ultima rectis, transversisque fibris cancellata subalbescit. Corpus fuscum videtur, oculus picem refert, typhæ nigricant.

Quarta duplici modo distinguitur. Nam quando passis alis se librat, corpus nigrum ostendat, atque fuscas quatuor alas nigricante peniculo veluti liras, & in rubiginosum fulgentem desinentes eidem affixas. Quum autem floribus insidens alas atollit, prima ala luteola eleganti clypeo ornata conspicitur, cujus centrum pallidum, umbo piceus, circulus exterior citrinus. Venter atque thorax, nec non

totus vultus albicant; antennæ nigricantes in flavum divergunt.

Quinta intus forisque sui similis videtur: caput alæque pallorem monstrant, corpus livefcit, veluti etiam antennæ; oculi ex flammeo rutilant, scapulæ pallenti quadam lanugine hispidæ.

Sexta dum adversas alas expandit, arenosum æmulatur splendentem, nigricantibus maculis modo Dracontii varium: corpus item, si dorsum videas, aquilinæ nigredinis videtur; venter nonnihil fuscior, oculus niger, albida, vel potius candida pupilla clarus, antennæ coracinæ; alæ aversæ ingrati bætici coloris, & obsoletioris mustellini.

Septimi generis crenulatæ alæ pyritem imitantur, areis micantes venulis, & fimbria maculisque nigris conspersæ: corpus totum nigro colore splendescente, nisi quod antennas punctuli albi interfecant, & in picea fronte aureoli quodam modo oculi scintillant.

Octava ejusmodi corpus obtinuit, sed ex luteo rubescunt antennæ; alæ polymitæ conspiciuntur, variis plicis, liris, fimbriis, limbisque multicoloribus insignes: furdi illi autem omnes colores atque hebetes videntur, vacui splendore omni & tono, solaque mixtione, positione & numero amoeni; alicubi flammam fuliginosam, alibi ingratum fuscum, languentem rubidum præ sese ferunt, rubinique ultima fimbria albis semicirculis inclusi nihil vividi spirant.

Nonæ alæ exteriores fordidis luteolis maculis affectæ atque infectæ, ultima ferè parte clypeolo nigro (quem medium punctus ornat eburneus) ornantur. Internæ verò quatuor ejusmodi gestant clypeolos, sed circulo insuper flavescente auctos, quorum duo medii justæ magnitudinis, laterales pusilli admodum videntur. Corpus huic ex fusco candicat; oculi prominentes nigricant. Si verò internam interioris alæ partem inspicias, fuliginosæ videntur, & è sex pulcherrimis bracteolis affabrè collocatis elegantiam habent.

Decimæ caput intaminato floret cando-re; lacteolas verò alas maculæ quadam fuscæ & nigricantes ornant, dorsum lateraque ex flavo subrubentia novem decemve nigræ labes sub incisuris positæ decorant.

Undecima proportionem & fermè colore formaque corporis nifum refert avicularum prædaticum. Alas habet ac reliquæ Papiliones arctiores, caudam latam & quasi plumosam; internæ alæ non ut reliquum corpus aquilinæ, sed ex luteo rubentes & ferè flammeæ, nasus illi avicularum more aduncus, venter veluti inanis, antennæ validæ, magnæ, ejusdem cum

cum alis superioribus coloris, oculi satis exerti nigri, pupilla nivescente.

Duodecima forma eadem est, differt tantum colore; corpus cinerem refert, cauda nigrescit, atque dorsum nonnihil argentum mentitur: productiores alæ fuscæ labeculis nigris polluantur; inferiores, subluteæ, surdæ videntur. Miræ velocitatis sunt hæ ambæ papilionum species & pernecitate nifum provocant.

Decima tertia omnium velocissima scapulis flavomuscidis apparet, alæ quidem lacteæ, in extremitatibus fuscis quinque sexve pennis notatæ, medium dorsum subflavescens macula ornat nigerrima, ex lateribus tubercula utrinque duo papposa prominent: uropygium nigra quadam lanugine circumscribitur, de volatu hirundinum non metuit, atque omnes revera alites superat.

PUNCTUM XVIII.

De Papilionibus Mouseti, diurnis, minimis.

Mouset. I. c.
p. 105. &
106.

HARUM decem exhibet. *Primæ* alæ internæ, vegeto, nitidoque coccine saturatæ, suave rubent; exteriores vero luculentam purpuram ex rubro nigroque mixtam, & niveis quibusdam nervulis obductam repræsentant; reliquum corpus nigrescit, etiam racemosæ antennæ.

Secunda juxta alarum basin deargentata conspicitur, quæ deinceps ex cæruleo purpurascens finiunt, superiores interius clavi duo albo nigri adornant; corpus fuscis plenum punctulis, purpureolos pedes emittit utrinque tres, rostrum habet aduncum, è capite quatuor antennulæ, præter duas longas, erumpunt.

Tertiam si volantem videris, alas purpurei exoleti coloris in cæruleum vivaceum abeuntes esse dixeris, variis plicis donatas: intus autem anulis oculois præditæ, cæsiæ magis videntur atque æruginosæ. Caput ex viridi cæruleum splendet; corpus fuscis albisque institis ornatur, oculi nigerrimi, pupillæ albissimæ videntur.

Quarta lætiore aspectu prodit, alis oculatis, cyanum cœlestem atque incomparabilem spirantibus. Fecit illam Dædalorum artifex natura totam oculæam, adeo ut *myndalus* illum in Mythologo Arctoris filium, non pavonis caudæ insertum, sed in hujus alis habitantem haud ineptè fingeres: quas quidem non minori superbia adverso sole expandit, atque illa avis Junonia, quam (præ cœlesti, quo excelsit, colore) ferè in ruborem dat.

Quintæ corpus gruinum, alæ superiores in caule albo virentes, medio luteæ ci-

neritiæ, inferiores exortu atro virentes sunt, reliquum albidæ: intus autem maculis in amœno virore pictis frequentius conspersæ: oculi nigricant, veluti & capita antennarum.

Sexta globosis scapulis atque gibbosis planis cernitur, quæ cinerem atramento mixtum imitantur, corpus incisuris plenum, subcinereum: alas item angustas, & gruini coloris extrimas stillicidiis quibusdam sanguineis intensè rutilantes habet: pedes, capitulum, antennæ corpori concolores sunt.

Septimam ex filiquastro natam illi affinem dixeris; & præter molem corporis minorem & majorem nigredinem, primumque alarum deargenturam vix discrepat.

Octavæ alæ omnes languidæ luteæ, vel potius pallescente flavo nitentes, punctulis quibusdam fuscis, & aliis annosam æruginem referentibus inficiuntur, ocelli huic nigerrimi, aliàs flavescit tota.

Nonæ alæ omnes conchis marinis ex albo fuscis pictæ videntur; extremitatibus circinatæ, & in medio albis quibusdam lineis crenulatim currentibus ornata.

Decima item conchatis & clavatis alis donata, ex albo & obscuro rubente variè miscetur, nobisque inenarrabilem magis Dei potentiam, quàm narrabiles suo nomine colores ostendit.

PUNCTUM XIX.

De Papilione Bombycum.

BOMBYCUM Papilio, Bombylius quoque vocatur, ex eruca staminis ferici textiici provenit. Meminit ejus & Aristoteles, si Aldrovando accedimus, cujus verbis historiam ejus ideò describere placeat, quod brevioribus clarè describi non possit. Ait ergo. Hujus generis papilionum generationem paulo aliter, quam apud nos nunc fit, describit Aristoteles his verbis. *Ex quodam magno Verme, qui cornua habet, & ab aliis differt: primum quidem cum is mutatus est, nascitur Eruca, deinde Bombylius atque ex eo Necydalus. Sex porro mensibus in has omnes formas mutatur.* Sic ille paulo aliter, ut dixi de Bombylii ortu tradens, quam nunc fieri videmus. Non enim nostræ Erucæ sive Bombyces ex vermibus fiunt, sed ex ovis Bombyliorum. Notandumque præterea ibi textum Philosophi à quopiam esse corruptum, ac inversum, & debere legi, nascitur Eruca, dein Necydalus, atque ex hoc Bombylius, quanquam mendosam illam lectionem secutus sit Plinius: nisi & apud hunc quoque corrupte om-

Arist. H. A.
l. 5. c. 19.
Aldr. Hist.
Inf. l. 2. c. 3.

nia legi dicamus, quod certissimè affirmare ausim. Textus corruptus habet sic. Est & alia Bombycum (de Bombycibus Vesp. par. aut sylvestrium Apum generis erat locutus) origo è grandiore vermiculo, gemina prætendens sui generis cornua. Hi Erucae sunt. Fit deinde quod vocatur Bombylius, ex eo Necydalus, ex hoc in 6. mensibus Bombyx. Ego verò lego sic. Est & alia bombycium origo è grandiore vermiculo gemina prætendens sui generis cornua: hinc eruca fit, quæ & Bombyx appellatur, ex eo *Necydalus*, ex hoc bombylius. Omnia 6. mensibus. Locus Aristotelis colligitur facilè ex ipsiusmet præcedentibus in eo capite verbis, quæ nos ante citavimus, ubi nimirum disertissimis verbis scribit, ex Eruca fieri Chrysalidem, & ex hac Papilionem. Idem ex Plinio diximus, idem Theophrastus tradit, binis in locis, nimirum in quinto de causis Plantar. & in secundo de historia earundem, in quo postremo loco mutari scribit *generationes quasdam per plura animalia*, ut cum ex Eruca fit Chrysalis, ex Chrysalide Papilio: sed Theodorus perperam ibi habet, cum ex tineæ Eruca, tum ex ea Papilio gignitur. Nam Theophrastus Tineæ non meminit, sed Chrysalidem ait nasci ex Eruca. Jam verò *νεκυδαλον* idem esse, quod *χρυσάλις*, ipsum nomen indicat, cum velut mortuum, vel potius sopitum sonet, unde Gaza rectè invalidam transtulit, talem esse Chrysalidem præterquam, quod vulgò notum est, ipsemet ibidem Philosophus attestatur, cuius dictionis vim cum non assequeretur Jac. Dalechamp. in fatidissimum errorem impegit, & suo seipsum gladio jugulat. Nam cum prius locum Aristotelis eodem planè, quo ego restituisset sensu, imò iisdem penè verbis, in subsequenti Plinii capite, mutata prorsus sententia, quamdiu inquit filum ducit Eruca, & latebras illas sibi ædificat. Bombylius Erucae nomine relicto, nuncupatur non à sono, quem *bombyzationem* Festus vocat, sed à *bombycio* id est vellere, quod orditur, unde bombycina vestis nomen habet. Post quadragesimum diem, quam Eruca se abdidit, & in bombylium mutata est, subnascens Papilio, nimirum cornutus vermis, & 4. alis pennatus, tum succum exhaurit, qui mollitiem velleri præbet, tum exeso folliculo, ut exitum sibi quærat, velleris extrinsecus incumbens filum profcindit ac dissecat, ut ejustractum, qui tota carminare nititur, sequi non possit, sed discerpatur, ac divellatur. Papiliones *νεκυδαλεις*, Aristot. vocat ut equidem cenfeo *αλλατρίδεις*, *νεκύων*, veluti redivivos, morte liberatos, hac vita reconstitutos, commutata forma, vel *νεκυστρίδεις* id est, *νεωπύτας* καὶ *περὶ καταστάτας ἐξαλλομένους* ultimos, recentissimos, novissime pro-

filientes. Sic ille. In quibus *hoc præterea notandum*, quod Bombycium vellus, & vestis bombycina, non dicuntur à bombylio, sed à Bombyce. Bombyx enim est Eruca, quæ textit, non Bombylius, ut patet ex Plinio, cuius caput 23. lib. 11. de Bombyce Coa inscribitur, & in fine capitis de bombycinis vestibus loquens, Assyria inquit Bombyce adhuc fœminis cedimus. Sed cum in hujus capitis mentionem inciderimus, in eo quoque nodus explicandus est, locus inquam alius emendandus, non tamen eo modo quo restituit eundem Dalechamp. Plinii verba sunt. Bombycas & in Co Insula nasci tradunt, cupressi, terebinthi, fraxini, quercus flerem imbribus decussum terræ halitu animante. Fieri autem primo papiliones parvos, nudosque mox frigorū impatientia villis, inhonestere, & adversum hyemem tunicas sibi instaurare densas, pedum asperitate radentes foliorum lanuginem in vellera. Legit Dalechamp. Fieri autem primo Vermes parvos, deinde Erucas nudas, mox frigore, &c. Ego lego sic. Fieri primo Erucas nudas mox frigore. Erucae enim prius vermes non sunt. Ut modo ad Bombyliorum nostrorum generationem revertamur, ea plane quò dixi modo se habet, nimirum ex Eruca jam folliculo incluso fit Chrysalis, ex qua Papilio, qui folliculum terebrat.

Summæ equidem imbecillitatis, & brevissimæ vitæ Papiliones isti sunt, ut qui ex folliculo erumpentes, haud ita multo post Venerem ineuntes diebus tribus coeunt, quo peracto masculus moritur, fœmina verò, ordine iterato ova parit innumera rotunda, minuta, semini hyoscyami non dissimilia, aut herbæ peti five Nicotianæ substrato sibi panniculo, vel albo, vel rubro, deinde emoritur: tunc panniculus cum ovis suscipitur, & ubi non possit hyemis pertingere frigus, reponitur.

Scribit Aristoteles esse *quoddam Papilionum genus*, quod durum quiddam simile cartamo, id est, cnici semini producit, sed intus fluidum. Docti considerent, nunquid exacte hoc nostris bombyliis competat. Ego id neque negare, neque certo affirmare ausim. Modus enim ille generandi aliis Papilionibus etiam est communis, & Aristoteles in eodem post capite de Bombylio agit. Rursus cum Bombylii Erucam inquit ex magno, & cornuto verme oriri, cumque nostræ Erucae nascantur ex ovis, aliquando credidi Aristotelem utrumque generationis modum scripto mandasse, prout à diversis audierat. Videtur enim ex mera aliorum relatione isthæc scripsisse. Quamobrem si ex utraque relatione unam, eamque veram conficias, rejecto scilicet cornuto illo verme, & in ejus loco supposito, duo illo simili car-

cartamo bombyliis applicari poterit. Nolim enim cum Dalechampio cornu: cum illum vermiculum inter cornutos nostros Papilionēs: nam sic semestri spatio varia formarum successio, non complebitur, ut voluit Aristoteles, repetit Plinius, quanquam confirmat experientia 2. mensibus omnia absolvi. Semini autem Cnici fermen Papilionum horum simulare potuit, non quia æquè magna sint, sed quia intus utrumque est humidum. Hactenus Aldrovandus.

CAPUT II.

De Anelytris bipennibus.

ARTICULUS I.

De Muscis in genere.

ANelytra quadripennia, bipennia, quæ binis, ut Plinius scribit, pinnis advolant, excipiunt; *Musca*, *Tabanus*, *Culex* & *Ephemerum*. *Musca* primum datus locum, quod in ejus laudibus diffundendis, ex veteribus Homerus & Lucianus, ex neotericis, Leo Baptista Albertus, Henricus Cunradinus, Andreas Dactius & Franciscus Scribabanus, desudarint.

Nomen.

Nomen, à musculo accepit. Nam detractus alis, caput nervosum, corpus molle, cauda tendinosa apparet. Hinc *Muscula* apud Boëtium nomen. Græcis *μῦς* à *μῦς* dicitur. De Caninarum nominibus inferius dicemus.

Descriptio.

Arist. H. A. l. 4. c. 7.
Plin. H. N. l. 11. c. 48.

Bipenne esse insectum & in anteriori parte promiscidem seu aculeum gerere; apud Aristotelem etiam habemus. Senos pedes habere scripsit Plinius, ex iisque primas longiores ut oculos quos duos & hebetes habet, detergere valeat. Variis depingi cancellatim quasi coloribus, pavonis instar, per microscopium apud celebrem illum mechanicum Drebellium Londini observavimus. Reliqua; quæ huc spectant, in *Musca domestica* descriptione, ex Luciano adjicemus.

Locus.

Humidis & æstuosis locis gaudent. Tam numerosæ in Apulia, ut proverbio locum dederint. Tot & in Hispania olim, ut earum venatores conducerentur. Apud pyramides in Ægypto tam frequentes, ut aer volantium murmure concutitur. Causam in sepulchrorum copiam, facile conjicias. Astracanæ denique ad mare Caspium, examina illarum oberrare, ut vix tolerari possint, navigationibus Anglorum debemus. Levibus & politis non diu insident. In Cretæ monte Carina novem M.

Merc. var. l. 3. c. 14.

Plin. H. N. l. 11. c. 14.
Plin. H. N. l. 34. c. ult.

passuum ambitu non reperiuntur. Fodinas, propter noxios halitus fugiunt. Romæ in Herculis in foro boario ædem non ingrediebantur: nec in Papho per fores Veneris aliqua, si Apollonio fides. Præterea Bremenibus ab Emma donatum, nullas ferrè; Cranzius prodidit, nullas & quandam Venetiis domum ingredi, quod Cardano debemus. Causam frustra vel in sublimitatem conjicias, cum tota urbs in lacunis sedeat, vel in parietum marmora, cum & in politissimis armis, & splendentibus templis, museardæ inveniantur, vel in amuletis, quæ nimis dubia sunt. Vidit ad arcendas muscas conflata lamellam Scaliger, ad quam in fenestra vix depositam musca advolans, alvum exoneravit.

Card. Subtil. l. 1. c. 7. 609.
Scal. Exer. 246. f. 4.

Omibus fere eduliis insidantur: sed inprimis, lacti, cadaveribus, melli, (mel Atticum ob thymum, & Carinæ montis excipio) & sphondylis. Plinius ideò balsami melle adulterati certissimum signum ponit, si à muscis infestetur. Varro earum proprium *ligurire* dixit. Lycophron ideò *δολιχὴ* vocavit.

Victus.

Triplex videtur esse Muscarum generatio. Una è Coitu, qui in æstivum tempus, hyemem elementiores, vento meridionali sese vibrante, accedit. Coeunt quædam diu, aliæ non item. Mas postquam inscendit, membrum foeminae, intra suos meatus receptum, materia & vi prolifica adimplet. Visa in agro Heydelbergenfi mixtæ cujusdam naturæ, à Pennio. Vicissim enim conscendebant, sed talium & Lucianus meminit. Post coitum excluduntur vermiculi, qui in muscas abeunt. Albi hi, oculos ad latera prominentes habentes, quorum similitudine staphylomatis species quædam *μυοκέφαλος* vocatur. Altera ex putrefactione. Nam plurimæ ex fimo oriuntur, in quo inchoatæ latent, & ex quo perfectæ exeunt: nec non aliis fordibus æstivo imprimis tempore. Meminit utriusque & Aristot. *Muscarum*, inquit, *ortus fit in fimo, quem agricolæ seorsum à stramentis separaverunt. Quare ii qui in hoc opere sunt, contendunt discernere reliquum stercoreis, quod sincerum non est: ibique ajunt finem confici. Vermiculorum autem principia exigua: primum enim, in his quoque rubor subit: atque ex immobilibus proficiunt ad motum tanquam enascenti hærentes. Deinde vermiculus evadit immobilis: Tum demum motus, rursus movere sese cessat: atque ex ea musca perficitur: moveturque flatus solisve super-ventu. Videtur tamen ex aliorum observatione loqui. Nulli qui per coitum generantur vermiculi: nec qui ex putredine tot metamorphoses subeunt. Crescunt primò ad justam magnitudinem, mox quasi in Nympham mutati, immobiles jacent;*

Arist. H. A. l. 6. c. 19. f. 226. ed. Scal.

rupta tandem statim die nympha, egrediuntur. Scalig. non tam ex putrefactione, quam principiis quibusdam immutatis, ex gummi nempe quodam liquido oriri scribit; vel fortè ex alia aliqua materia à Natura in hunc finem concocta. *Tertium* generationis modum Kniverus Angelus detexit, *Corruptum erucæ corpus*, (verba sunt Moufi) *vel parum contusum in aureliam imperfectam convertitur, tunc ex ea, non papilio, sed tria oblonga ova nigricantia ejiciuntur, ex quibus muscæ vulgares, vel aliæ iis similes oriuntur.* Quandoque aurelia ipsa corrupta, nec papilio, nec ova, sed vermiculi albi, per foramen (quandoque unus, nonnunquam plures) egrediuntur, ex quibus postea muscæ valdè exiles. Ex guttis sudoris de laborantium digitis decidentibus in Dariena regione prognatas, vidit Petrus Martyr. Rivello verò rebus Britannicis præfecto, ex sanguineo imbre procreatæ sunt. Videntur cum rhododaphne amicitiam colere, quod ad eam etiam in scrobe defossam undiquaque convolent. Bellum cum araneis gerere notum. De crabronibus superius diximus. Fortè cibi gratia ab iis capiuntur. *Ætas* plerisque brevissima. Magnis & militaribus paulò longior. Pereunt oleo, quod hoc angustissimos, quales ipsis, spirandi meatus, lentore suo intercipiat. Potes id & temperamento, quod frigidum, adscribere. Ex calefactæ, haud faciliè contrariam mutationem perferunt. Frigidæ, celeriter refrigerantur, & moriuntur facile. Mortuæ vel suffocata, vel solis calore, vel cinere superfuso reviviscunt, ideo quidam immortalem animam habere putant. Tu calori id adscribe. Strangulatur vitalis in iis calor, cum exiles corpusculi meatus, copiosior humor infarcit: sublato per calorem externum isto, suæ libertati restituitur. Obtruncatas capite, currere, salire, & plurimum reliqua corporis parte vivere, notum.

De *Volatu* ita Lucian. *Est illi volatus, non continuo pennarum remigio, ut vespertilionibus: neque saltu ut locustis: neque cum stridore, ut vespis, & crabronibus: verum flexilis, ad quamcunque aeris partem se moveat. Adde, quod non vult quiete & cum silentio, sed cum cantu & melodia: non item immite & sæve, quemadmodum Culices & Muscæ: neque cum gravi fremitu Apum & Vesparum, horribilem ostentans sonum & minacem; sed tanto volat his suavius musca, quanto sunt tuba & cymbalis tibie dulciores.*

Et dum volant, & liberæ, & captæ, præcis etiam alis sonant: sed hæc alio quam illæ modo: aliquando, exeunte in ore spiritu, ut Albertus loquitur, non sonant. Percutitur cadens inter alas earum aer:

meatque etiam non volantibus inclusus, intus spiritus. Major in volatu sonus, quod major aeris attracti copia ad septum transversum validius alliditur. Vix audiuntur quietæ, quod tum se nec contrahunt, nec atollunt. Non trahitur sic intus spiritus, cujus agitationi sonus ipse adscribendus est.

Ingenium detegunt, audacia, impudentia, & indocilitas. Nulli rei non insident: nihil non conspurcant; redeunt etiam millies abactæ. Indociles esse, sed minus hirundinibus quod capitæ horreant, hæc sua natura hominem oderint, apud Plutar. cui suffragatur experientia, habemus. Araneos insidiantes observant illorumque cassus evitare conantur. Elephantem adortæ, in pertusa rimis pelle, si constringatur, intereunt. Plura in Leone Baptista, Alberto & Luciano vide. Dolorificos inferunt morsus, corporique diu affixæ hærent. Unde Homerus sagittarum ictibus comparavit. Acriores illi, si aliquid de serpentibus vel venenatis gustavere. Candidis illapsæ vestibus ita eas conspurcant, ut difficulter eluas. Carnes, emissa ab alvo vermium illuvie, foedare solent. Imminente tempestate validius mordent: seu quod frigidior reddito aëre, calor naturalis appetitum excitet: seu quod exhaustas in circumfluum aërem, una cum vapore humidi substantifici, quod paucum habent, portiunculas, qua patet via resarcire moliantur. Tum etiam ex supremo aere ad infimum descendunt: & in aromatibus maxime apparent. Multa contra insultus earum traduntur. Quidam cœpæ frustulo carnibus affixo arcent. Alii lupi caput intra domum suspendunt: ex falicariæ seu lysimachia fumum excitant: foliorum minoris sambuci, vel cucurbitæ decocto, vel helleboro albo cum lacte trito, loca conspergunt. Sunt qui succum origani cum lacte & suillo felle & malo granatorum contuso, aqua diluunt, & solo superfundunt: visi, qui myrti aut hujusmodi plantarum fasciculos suspendebant, inque iis noctu congregatas, in sacculum conjiciebant. Jumenta ab earum injuriis præservare creduntur, laurus cum nigro veratro in lacte trita, nepetæ odor & folior. ejus decoctum: Unguentum ex baccis lauri cum oleo paratum: frutices rhododaphnes, sit usi in scrobem conjiciantur, convolare in eos undiquaque volumina creduntur.

Habent in *Medicina* usum. Illinuntur à quibusdam cum radice lapathorum vitiliginibus. Impari numero, ab aliis, furunculis, medio digito, applicantur. *Capita* folio ficulneo asperata alopecie conferunt: cui, secundum alios, cinis cum nucum cinere contritus, prodest. Sunt qui melle, sunt & qui lacte subigi volunt. Ad pilorum

Arist. H. A. l. 4. c. 9.

Ingenium.

Plin. H. N. l. 29. c. 6.

Æl. H. A. l. 9. c. 15.

Fuga muscarum.

Plin. H. N. l. 24. c. 8. & 25. c. 8.

Beret. vet. Med. l. 2.

Ufus.

Martyr. Dec. 3. l. 9.

Sympathia & Antipathia.

Ætas.

Galen. de Med. simpl. l. 2. c. 20.

Ælia. H. A. l. 2. c. 29. Plin. H. N. l. 11. c. 36. Volatus.

raritatem, vide ex iisdem & aliis remedium. In Epilepsia rufas & in potu exhibitas commendat Plinius *M. Servil. Nonian.* addit idem, *princeps civitatis, non pridem in metu lippitudinis, priusquam ipse eam nominaret, aliusve ei prædiceret, duabus literis Græcis P. & A. chartam inscriptam, circumligatam lino, subnectebat collo.* Mutianus ter Consul, eadem observatione, viventem muscam, in linteo albo, his remediis carere ipsos lippitudinē prædicantes. Galenus ad chymosin, cum ovi luteo tritas commendat. Ad pilos palpebrarum pungentes, Dionysius Milesius. Plinius ad easdem gignendas masearum si-
miquæ murini cinerem, æquis portionibus permiscet additis quibusdam aliis. Aqua earundem per balneum destillata, oculos à maculis & pterygiis liberari, si vesperi laventur, capillos, si eadem sæpius madesiant, in immensum crescere; duabus guttis, surditatem tolli, Judæus quidam apud Gesnerum retulit. Vas autumnō sepeliendum, & materia sub hyemem destillanda est. *Audivi quendam, inquit Gesner. solitum dare, tres vel quatuor muscas intra corpus, atque ab eum inde optimè solutam. Rac. florum geniste g. s. ponantur in vase terreo, cum butyro alternatim strato, quibus vas impleatur, ac optime clausum in fimo equino, solem versus per annum sepeliatur: post annum, muscas invenies, ad unguenti formam redactas, quæ omnem dolorem, in quacunque corporis parte sedant.* Cedunt & quibusdam animalibus in cibum. Araneæ iis insidiantur, hircines vescuntur. A Chamæleonibus, mutacillis, anate muscaria, zygænis capiuntur & vorantur. Arrident & piscibus truttis imprimis. adhibentur & inter supplicia. Apud Persas, qui legibus obrectasset, diebus viginti in Archivo vinctus, perseverabat, & melle ac lacte delibutus, nudus, muscis exponebatur. Exercuisse & Deum per eas sua iudicia, Historiæ tradunt. Megareses è sedibus populæ. Juliani Apostata exercitum affligere: in Caroli Galorum Reg. Anno. M C C L X V. magnum damnum morfu intulere. In Oriente tanta ex mortuis & putrescentibus exorta Anno. M C C C X L V I I I. pestis, ut vix decimus hominum superesset. Circa medium Augustum in Brombiensis templi fastigio ingens examen quotannis considere solere, Brighthmannus author est.

Genera Muscarum plurima occurrunt, quæ sigillatim in sequentibus ponemus. Differentiæ. Magnitudine, partibus, colore, loco, &c. Magnitudine, sunt magnæ, quas segmili-das militares, Lucianus dicit, alii Canes, sonitu asperrimæ, volatu velocissimæ, vitæ longissimæ, tota enim hyeme perdurant. Sunt mediæ, sunt minimæ. Partibus. Aliæ capite sunt magno, parvo aliæ: ven-

tre quædam crasso, exili, brevi proce-
ro. Sunt pilosæ, glabræ, antennas in fronte gerentes, plurimæ non. In Cyrene habentur latifrontes veluti mustelæ, aliæ viperis similes. *Loco sunt Domestica, Sylvestres,* quarum oleum in magno precio fuisse memorat Cardan. Macedocinæ in fluvio Astræo, *Hippuri* dicto, quæ simul ac hominis manu continguntur, alis evanescentibus colorem perdunt. Moluccanæ, Sumatrenses, Americanæ. *Colore.* Nam virides & pictas, Vespam majores, quæque subterraneos sibi nidos forment. Hispaniola insula alit. *Albas,* aculeis acutissimis, Casparus Balbii itinere suo vidit. Insigni albedine notabilis & illa, quæ *Toleti;* in macello publico, sola per integrum annum comparere solet. Sunt & cineræ, caruleæ, luteæ. Huc pertinent *Canina* quæ canes, *Boaria*, quæ boves, *Equina* quæ equos infestant, *Napelli & Vinaceorum.* Illis à napello, qui in Alpibus Reticis, mense Junio & Julio floret, nomen impositum est. Concolores ferme eidem sunt, communibus majores, alis capitibusque ex lucido viridique vel cæsiō virente, quasi Cicindelæ, vel Cantharides, ut Pena & Lobelius describunt. Guainerius Antidotum ex eis confecit ad multa utilem, quem apud Aldrovandum vide. De *Musca vinaceor.* ita Aldrovandus *Ælian.* Ephemera inquit, animalia unum diem vivunt: ex facie vini accrescente originem trahunt, aperto dolio, ut luce suscepta sunt, vita excedunt. Aristoteles verò Culices (*κύνες*) scribit nasci ex vermiculis, qui fece acetī gignuntur. Quo loco Gaza pro *κύνες* reddidit Culices vinarii, sed quam benedicetur in Culice. Nascitur quidem in ipsis vinaceis Muscar. quoddam exiguum genus, *Moscinos* vulgus vocat; Sed hi meo iudicio, neque culices illi Aristotelis fuerint. non enim ex acetī facie gignuntur, argumento, quod vindemiæ tempore tantum apparent cum nova vina fiunt: neque *Ephemera Æliani*, etiam esse puto: nam plurimos quotidie propè dolia extinctos reperire esset, quod alioqui non fit. *Moscini* autem nostri animalcula sunt admodum exigua, corpore crassiusculo, coloris ex cinereo fusci, brevi: capite rotundo, brevissimis antennis, brevibus etiam pedibus quæ ferè omnia in contrario in culicibus modo habentur. Hæ namque antennas habent longas, corpus procerum, pedes longos. Moscini vini valde sunt appetentes, adeo ut in eo sese submergant, unde bibaculor. adagium cupientium Moscinorum more mori, h. e. in vino, ut in extingubilem suam sitim sedent. *Vinulas* eos vocat
Scaliger.

Arten. H.
A. d. 15. c. 2.

Rhodig. An-
tiq. sect. 1.
17. c. 11.

Aldr. Hist.
Inf. l. 3. c. 2.

Plin. H. N.
l. 33. c. 16.

Galen. de
comp. Me-
dicam. se-
cund. loca
l. 4. c. 25.

Mous. de
Inf. l. 1. c. 12.

Ufus in
cibo.

Sus in
Epicure.

Ælian. Sic.
l. 2. de Hi-
spania Re-
gibus.

Differentiæ.

ARTICULUS II.

De Muscis in specie.

PUNCTUM I.

De Muscis Aldrovandi prima tabula.

Aldrov. de
Inſ. l. 2. c. 1.

Muscarum varias differentias Aldrovandus & Moufetus nobis propoſuere, hic in claſſes certas digeſtas, in tribus tabel-
lis ille. Prima 25. ſpecies continet.

Prima Megalocephale haud ineptè vocari poterit. Capite enim eſt pro corporis portione ſatis magno, cum interim vulgaribus vix major ſit. In fronte candicat, oculi rubent, alvus prope pectus ſublutea eſt cætera fuſca, alæ ex luteo & nigro variegatæ.

Secundam ad Boariarum genus reducendam judico: longa eſt duos ſerè digitos, lata tranſverſum pollicem, colore pertotum corpus luteo, capite triangulari, in medio luteo & hiriſuto, oculis colore caſtaneis & figuræ ovalis. Pectore lato, eminente, gibboſo, utrinque ad latera depreſſo. Ventre longo, anguſto, annuloſo, deorſum inflexo, in extremitate acuto, colore luſcente ac lucido, in fine nigricante. Alæ ſubluteæ totum corpus longitudine æquant, quas, dum quieſcit, ſimul conjungit, & ſupra ſupernas partes ita extendit, ut ſere totas obtegant. Pedes flaveſcunt, in extremo ſerrati, vel denticulati & bifidi, prona parte ex luteo ad fuſcum colorem accedere videtur.

Tertia muſcis vulgaribus majoribus paulò major, utpote ex Boariar. genere, corpore eſt craſſo & rotundo, coloris nigri ſaturati, lucidi & ſplendentis. In capite maculæ ſunt aureæ duæ, oblongæ & obliquæ C. literæ conſimiles. Alæ quæ pectori hærent, eleganter admodum luſcunt. Pedes aterrimi, ſed minimè ſplendidi. *Quarta* propter cinereum ſeu leucophæum colorem Caninis poterit accenſeri. Vulgaribus aliquantò minor eſt, figura corporis eleganti & vivida, colore cinereo, ſed alæ ad luteum vergunt. Caput rotundum, venter oblongus & hiriſutus, pedes ruſſeſcunt.

Quinta forma item corporis eſt admodum venuſta, caput rotundum habens & rubeſcens, lineolis duabus candidis inſignitum. Pectus, quod leucophæum eſt, duabus maculis nigricantibus perornatur. Alæ cinereæ nigris maculis eleganter variegantur. Venter oblongus, & rotundus in extremo, ceu in aciculam deſinens. Partem ſupinam lineæ duæ albicantes tranſ-

verſim ſecant. Prona pars cinerea eſt; Pectus pronum cæruleum.

Sexta pectore eſt æneo, valdeque ſplendenti, ventre rotundo, colore viridi, ſed 3. lineis tranſverſalibus nigricantibus diſtincto. Prona tota viſceſcit.

Septima majori muſcæ comparèſt, capite in medio coloris argentei, antennis brevibus pectore leucophæo, alvo ſupina ſubruba, quæ tamen ſi Soli obverſetur, colorem etiam quendam lucidum cinereum præ ſe ferre videtur. Prona tota ſimiliter ſubruba eſt, & toto ſerè corpore hirta.

Octava noviffime deſcriptæ valdè cognata eſt & ſimilis. Capite ſimiliter albicat, corniculaque eadem in fronte gerit, & toto corpore piloſa eſt. Colore tamen quodammodo differt. Pectus enim & alvus ex cinereo ad cæruleum vergunt, & ſi Soli obvertatur, ſubrubi quid in ejus alvo conſpicitur. Eſt præterea aliquanto minor.

Nona à vulgariis muſcarum generibus ob alvi gracilitatem degenerare videtur, & ad Culices accedere. Caput ei rotundum, pectus nigricans, dein color cernitur luteus, quilineis duabus nigris invicem inſtar crucis interſecantibus inſignitur, cæterò nigra eſt.



Decima tota lutea eſt. Alas, cum quieſcit, ſupra alvum conjungit & explicat. Pectore eſt latiſculo, ventre anguſto & gracili. Alas habet valde ſubtiles, & punctulis innumeris variegatas. Caput ſubtus albicat ſuprà luſceſcit, & è medio duo brevია exilia cornicula erumpunt.

Undecima contractior & brevior eſt, pectore cinereo obſcurè ventre nigro, ſed ad cæruleum quodammodo tendente, tota hiriſuta.

Duodecima valdè puſilla, capite ruſcente, pectore ſubalbo, multis tamen nigris punctis eleganter variegato; alvo ſimiliter ſubalba, aut cinerea dilutè, quàm lineæ multæ nigricantes tranſverſim ſecant, altera tantum per longitudinem excurrente.

Decima tertia in arborum truncis, pyri verò & pomi potiſſimum inſidere deprehenditur. Color toto corpore æneus, aut viridis, ſed admodum obſcurus. Venter autem ſupinus ſoli oppoſitus cinereo, lucido nigroque variegatur, pronus obſcurè viſceſcit. Pectus ſupinum lineis quibuſdam rectis exornatur.

Decima quarta ad majores muſcas ſerè accedit, pectus ei obſcurè luſceſcit, alvus admodum exilis eſt, anguſta, & in extremo acuta, ex luteo & nigro eleganter variegata. Lineæ namq; quaternæ nigre eam cingunt, quarum duas priores linea alia quædam intermedia conjungit, & ſere unit: ſed reliquis punctula quædam nigra ſubſternuntur. Alæ




Vide Muscas

Muscas

Mousetr

Table 4. x. Culices Mucken

Tancken



1. 第一節 總論
一、本國之地理環境
二、本國之政治制度
三、本國之經濟狀況
四、本國之社會風俗
五、本國之文化藝術
六、本國之對外關係
七、本國之未來展望

2. 第二節 分論
一、政治制度之演進
二、經濟發展之歷程
三、社會變遷之分析
四、文化藝術之特色
五、對外關係之變遷
六、未來發展之挑戰

3. 第三節 結論
一、本國之綜合評定
二、對其他國家之啟示
三、對未來發展之建議





læ corporis longitudinem æquant.

Decima quinta vulgaris magnitudine est, alvo graciliori, colore luteo obscuro, capite rotundo, in medio eleganter rubro, oculis nigris, pectore lato, prominente, & utrinque ad latera depressio: ventre exili & gracili, & deorsum reflexo. Alæ & pedes dilutius, quàm reliquum corpus lutescunt.

Decima sexta vulgares aliquantò excedit: pectore supino nigro, sed pilis quibusdam lutescentibus insignito. Alvis depressa est, & versus pectus duas habet maculas luteas, cæterò penitus nigricant, præterquam extremo, quod obscure albicat. In alis, quæ pectori connectuntur, macula lutescens utrinque conspicitur.

Decima septima ex Caninar. majorum numero cinerea est, sed junctis quibusdam nigris depingitur.

Decima octava tota viridis, ac maxime splendidi coloris, pedibus ac capite nigricat.

Decima nona illis videtur accensenda, quæ carnes æstivis temporibus descedant. Figura enim omninò est eadem, colore tamen magis fusco, lucido, & ad cœruleum obscurum tendente: toto præterea corpore hirsuto, alisque circa exortum flavescenscentibus.

Vigesima vulgarium magnitudine est, corpore tamen obesiori. Pectus admodum obscure lutescit. Alæ maculis duabus velut tribus fuscis pinguntur. Eadem in exortu flavescunt. Alvis tota ex cœruleo nigricat, & admodum plana est.

Vigesima prima corpore est rubro, oculis colore castaneo, pectore piloso, alvo nigra, sed tribus lineis subluteis transversis insignita.

Vigesima secunda ex Caninar. majorum numero, sed aliquantò minor, pectus habet atrum, & in eo lineas subalbas per longitudinem ductas, alvum cineream, ac admodum lucidam, maculis multis partim nigris, partim rubescenscentibus respersam. Pediculi sunt ætissimi.

Vigesima tertia alis est colore argenteo ad aurum tendentibus. In ore aculeum gerit. Caput majusculum & pectus obscure lutea sunt. Alvum planè luteam linea longa in duas partes supine dissecat. Fucum fermè exprimit magnitudine. Sicut insuper

Vigesima quarta, quæ ob varietatem colorum valde speciosa est, caput habet album, oculos amplos spadiceos, thoracem nigrum, sed lineis 2. subalbis rectis exornatum. Alvis oblongiuscula est nigra, aliisque coloribus conspicua. Quæ enim pectori jungitur, maculas 4. luteas habet, 2. utrinque intercurrentes lineæ nigrae distinguunt. Cætera albo, nigro, luteoque elegantissime variat. Prona pars penitus

flavescit, præterquam in extremo, ubi nigricat.

Vigesima quinta vulgaribus muscis magnitudine æqualis pectus habet nigrum, lineis aliquot subalbis variegatum, alvum colore aris politissimi & splendidi.

PUNCTUM II.

De Muscis Aldrovandinis tabula secunda.

T Otidem species & 2. tabella habet.

Primo & secundo loco quæ positæ, invicem fere similes sunt, quanquam prior caudam sursum, altera deorsum flectat. Utraque anteriori parte muscas communes ad amissim repræsentant, capitis scilicet & pectoris figura. Dorso sunt eminenti, elatoque ac giboso pilosque. Alæ longæ, angustæ, ad caudam propemodum extremam exporrectæ. Alvis nigra, angustaque in 8. determinata annulos, tandem ita acuitur & reflectitur, ut Scorpionis caudam efformare videatur. Pedes oblongi scabri, in extremo veluti in minutulos digitulos divisi.

Tertia exigua admodum alas habet argenteas, lineolis nigris ternis transversim sectas, alvo breviores, quæ initio crassior est, sed postea magis magisque attenuata paulatim in mucronem desinit. Quidquid alvi ultra alas protenditur, id totum nigerrimum est. Petioli colore sunt ferrugineo diluto ad luteum vergente. In ventre aut ejus apice nulla observare licet segmenta, quæ annulos vocat Albertus. Caput & dorsum nonnihil rufescunt superne. In dorso extremo, ubi alvo jungitur appendicem parvam quandam habet albicantem.

Quarta oblonga est & gracilis, capite pro corporis portione magno fusco, fusco item thorace, qui gibbosus est. Alvis exilis in medio rubra, cæterò nigricat. Pedes atri, quorum posteriores longissimi sunt.

In *Quinta*, quæ tota cinerea est, nihil præterea notatu dignum.

Sexta culiciformis est, caput & dorsum fusca sunt. Caput culicis exiguum, sed nulla fistula. Alæ longæ & angustæ, ad extremam alvum exporrectæ, aut etiam ulterius, ex fusco splendide. Alvis annulosa, angusta, oblonga; dorsum supinum, luteum, nigris maculis varium.

Septima in media fronte inter ocellos nigros punctulum aliquantò prominet jujubæ. Proboscide armatur insigni. Corpus totum, pedes & alæ colore sunt ferrugineo. Membrorum constitutionem icon exacte ostendit.

Octava ex minimarum genere est tota nigricans. Alæ in ipso exortu, nigrae, cætera

cætera argenteo splendent.

Nona pariter ex minimis est, colore viridi pereleganti conspicua, qui, si Soli obverfetur, velut aureus apparet. Alvus angusta brevis, & in extremo nonnihil acuminata. Alæ ultra anum protensæ. Ejusdem generis, imò minor est.

Decima, & ipsa pariter viridis alvo exiliore, magisque acuminata.

Alvum quoque acuminatam, sed non adeo, habet.

Undecima, colore nigro est, sed maculis albis in capite, dorso & media alvo varians. Alæ argenteæ purpureum quid, si Soli obverfantur, ostentant.

Duodecima à minimis illis viridibus nihil differt, nisi quod ano est rotundiore, crassioreque.

Decima tertia ad majores accedit, tota atra, præterquam in alvo (quæ compacta & crassa est ubi tribus, quatuorve lineolis seu circulis cinereis transversim fecatur. Alæ amplæ, & duplo fermè toto corpore longiores, in extremo albicant, cætera aterrime.

Decima quarta vulgaris muscæ speciem refert, sed thorax & alvus ex cinereo viridescunt. Alæ & pedes flavescent.

Decima quinta Fucum & Vespam refert, illum corporis crassitie, hanc colore potissimum alvi. Hæc enim lutea est, lineis quatuor transversis nigris insignita, per quarum medium lineæ aliæ ejusdem coloris recta percurrit. Pectus pariter subluteum, & maculis item duabus nigris utrinque decoratur. Caput in medio lutescens lineæ quædam nigra transit. Oculi sunt fuscis, antennæ admodum exiguæ, pedes lutei in extremitatibus quodammodo nigri.

Decima sexta ex caninis majoribus est; Oculos rubros, magnos, prominentes lineæ alba interfinguit. Pectus cinereum est, sed tribus lineis rectis, albis distinctum. Alvus quadrangulis fuscis, albisque invicem alternatim subeuntibus varia, latruncolorum lusum repræsentat. Ipsa tota in prona parte ex cinereo ad fuscum tendit.

Decima septima exigua est & nigra, musca vulgaris fortè nondum adulta.

Decima octava apem quodammodo refert. Alvum luteam & pilosam lineæ quædam nigra supernè à pectore ad extremitatem protracta recta percurrit. Pectore est nigro, capite albo, oculis fuscis extuberantibus. E media fronte cornicula brevia, nigra & apicibus rotundis insignita emittit. Alas subluteas & splendidas habet. Anus niger est & hirsutus, cætera lutescunt præter pedes, qui nigricant, præterquam in extremo, ubi albicant.

Decima nona toto corporis habitu vulgares refert, sed magnitudine inter majores & minores ambigit.

Vigesima eadem magnitudine est, tota ferè atra. Alæ maculis fuscis colorantur.

Neque ab his discrepat magnitudine *Vigesima prima* hirsuta, pectore nigro, alvo rufa, sed supinè nigris notis ad podicem usque nigrum item continuatis variegatur. Alæ fusco maculantur.

Vigesima secunda majoribus congener, tota penitus cœrulea est.

Vigesima tertia vulgaris domestica est, nulli non nota.

Vigesima quarta coloris est spadicei auri adinstar rutilantis.

Vigesima quinta, quæ ultima est in hac serie, totam penitus auream alæ argenteæ cohonestant.

PUNCTUM III.

De Muscis. Aldrovandi tertiæ tabula.

IN tertia tabella viginti duæ exhibentur.

Priori loco quæ depingitur, corpore est exili, capite, alvo, antennis proceris, pectore nigro, alvo rubente.

Hac aliquanto majores sunt *duæ subsequentes* pulchræ admodum & valde similes. Prior capite & thorace, pedibusque est cœruleis, corniculis oblongis, alis luteis, alvoque inter rubrum & luteum ambigente.

Quæ post has in eadem serie *quartum* & *quintum* locum obtinent, vespæ quodammodo speciem præ se ferunt, quanquam minores sint, antennis pariter instructæ, capite & pectore fuscis, alvo & alis lutescentibus, his intensius, illis obscurius.

Sexta corniculis adeò brevibus, ut carere eis videatur. Corpus totum annulis aureis, & nigris alternis variegatur. Alæ auro & argento mistis resplendent.

Septima ex iis, quas Tavanellos vulgus vocat, longa proboscide, brevissimis corniculis prædita, thorace obscurius, alvo dilucidius lutescente, alis argenteis.

Octava ex majorum numero est tota penitus viridi colore obsoleto vestitur, sed caput rubet, alæ albescent.

Nona eadem videretur, nisi multò gracilior & minor esset.

Decima quoque ex muscarum genere judicavi. In ore promuscidem habet valde longam & bifidam. Capite est rufo & hirsuto, antennis exiguis, corpore toto plano & depresso, colore aterrimo & splendido instar holoferici: alis longiusculis, quæ in parte externa nigrescunt, in interna argentum referunt. Totum corpus supinum admodum hirsutum & pilosum est, in medio nigricans, ad latera albicans, pedibus est flavescentibus hirsutis. Alæ tametq̃

tametſi flaveſcant, ſi ſoli obverſentur, argento ſplendent.

Muſciforme inſectum, quod *undecimo loco* exhibetur, libuit appellare, quod proboscide, capitis & pectoris conformatione omninò muſcam referat. Caput nigrum eſt, thorax item niger: viridis in dorſo macula longa: alvus valde longa, deorſum inflexa & acuminata, ferruginea & maculis atris ſupinè per longitudinem ductis. Crura item ſunt ferruginea.

Duodecimo ordine depiſtum Inſectum muſciforme quoque dici poteſt, capite craſſo ferrugineo, pectore & alvo oblongis, anguſtis, colore viridi; alis albis, nigris ſiſtris intercurrentibus, pedibus ſubflavis.

Tertium & decimum Inſectum alvo pariter eſt admodum procerum, colore modò nigro, modò croceo luteſcente diſtincta, tenui & in extremo obtuſa. Alæ latiufculæ ſunt argenteæ, breves. Per tergus luteum fuſca linea deorſum tendit. Caput nigrum, cervice lutea, antennæ per breves, per breves item pedes, qui cinerei ſunt.

Jam verò *decima quarta* in hoc ordine elegans muſca eſt, alas habens plane argenteas, caput nigrum, nigras item & ſubtiliſſimas antennas, oculos flavos, cætera viridia, præterquam in ſuprema alvo, ubi elegantiffimo miniaceo colore inſignis eſt.

Decima quinta exigua eſt, at longis proportionem alis, iſſique fuſcis. Tota ipſa candicat. Caput rotundum eſt, exiguum, alvus hirta.

Decima ſexta muſcula eſt omnium minima, tota aterrima, alis albis longiſſimis pro corporis exilitate.

Decima ſeptima alis pariter longis & totam cooperientibus prædita eſt, corpore fuſco & nigro, ſuperius vario, pedes habet poſteriores valdè longos, longas item antennas, eaſque nodoſas & flexiles.

Decima octava tota eſt coloris fuſci, corpore exili, breviffimis antennis.

Decima nona alis & alvo coloris aurei ſplendiſſimi, longiufcula, pectore fuſca. In capite puncta habet duo lutea, antennas nigras in extremo obtuſas.

Vigeſima capite eſt nigro, antennis breviffimis nigris, alis argenteis, cætera ex cœruleo viridis.

Quæ *penultimo loco* picta eſt, ſimilis eſt ei, quæ in ſecunda tabula depiſta eſt ſexto ordine, ſed craſſior & elegantior, nigra & luteis annulis: alis item proceris ex luteo ad caſtaneum vergentibus, capite nigro rotundo, unionem nigrum æmulante, antennis brevibus, quæ capiti inferuntur, admodum tenuibus, in extremo craſſis & obtuſis: pedibus longis, ſubflavis.

Poſtrema ex Tavanellorum vulgò dictorum genere eſt, ſed inſolenti aſpectu, quo ranam, buſonemve quodammodo æmulatur. Corpore eſt procerum, craſſo-

que, coloribus nigro & flavo variegato, oculis nigris, amplis, & obtuſo riſtu ranam, buſonemve (ut dixi) exprimente. Antennis caret. Pedes ſunt breviffimi. Alæ longitudine alvum excedunt & latitudine; color iis aterrimus.

PUNCTUM IV.

De Muſcis Mouſeti aquaticis.

Mouſeto duplices ſunt muſcæ, *Aquatica* nempe & *Terreſtres*, quarum illæ *Phryganides*, *Macedonica*, *Tigurina*, *Æſchne*, *Lutea*, *Fuſca* & *Tipula*. ^{Μουſ. Θεſſ. αττι Inſect. pag. 69.} Græcis ſeu lacuſtres nomen tale, quod rebus aquis innatantibus veſcantur, & ſuper aquas potiſſimum degant, ſortitæ ſunt.

Phryganides, inquit Mouſetus ex Phrygania vermiculo (quem Angli Cados Worme appellant) in aquis degente, & menſe Aug. ad ſuperficiem aquarum aſcendente exit, quaternis alis, colore fuſco, corpore oblongo, 2. antennas breves habens, caudam verò bifurcatam, vel duas ſetas è cauda exeuntes. Varia hujus muſcæ eſt forma, quia Phryganiorum ipſorum tanta varietas.

Apud Maced. circa fluvium Aſtræum, qui inter Berocam & Theſſaliam medius fluit, volitat muſcarum genus, quæ non ubique reperiuntur, nec ad aliarum muſcarum ſimilitudinem quicquam accedunt, nec Apum Veſparumve, aut crabronium faciem gerunt; harum tamen cuiusque aliquid referunt: nam magnitudine crabrones, colore veſpas, bombitatione apes, audacia reliquas muſcas repræſentant; *ιπποβροχες* indigenæ vocant. Equiſeles Latini, per ſummas aquas volitantes piſcibus in eſcam cedunt.

Muſca aquatilis æſtiva major frequens circa Tigurum conſpicitur menſe maio (vulgò *tes glaſſit* vocant) quam à generoſo nominatam accepimus & à Tigurinis deſcribi optamus.

Æſchne muſcæ ſunt aquaticæ, colore cinereo, alis quatuor, ſex pedibus juxta caudam, multos quaſi exiguos pilos lanuginoſos habentes.

Muſca aquatilis lutea ex fuſco luteſcit, alas, habet longas, in ſcapulis ſemper inter volandum erectas. Oculi illi magni prominentes, cauda longa articulata, cujus in extremitate duo pili longi exeunt; juxta flumina & paludes ſemper verſatur, rarius alibi, præſertim à pluviis.

Fuſca alia eſt quatuor alis longis, longiſque cruribus corpore articulato; duas longas antennas in fronte gerit; parvum

caput, oculos prominentes & nigricantes. Alæ fuscæ, sed dilutæ magis, quàm reliquum corpus. In sylvis juxta paludes & stagnantes aquas ferè semper reperitur.

Denique inter rariores muscas illam Cardani referam, à semetipso descriptam his verbis: Animal, inquit, habeo scarabæo simile, quod non foetet, molle, celerrimum omnium, quæ noverim, annulosorum: colore est fulvo obscuro, non nigro; 6. pedibus, duabus alis perbrevis atque tenuibus, quæ caudam minimè tegunt, caudam habet ejusdem cum capite figuræ & formæ: ut bicipitem esse putares. Nam ut supina capitis parte os habet: duoque ibi cornicula sub mento brevita: Sic duo item alia in prona: toto animali longiora, totidem quoque habet in cauda, sed his duobus, quæ in capite longissima sunt, breviora, ex his tamen superiora inferioribus longiora sunt & crassiora. Quam sanè bestiolam non vulgarem utinam cum Cardano vidissem, ut descriptioni huic iconem adjecissem.

Et tantum de Muscis Aquaticis. Mouset. Ego quadripennes ad Zygænam potius vel Papiliones referrem.

PUNCTUM V.

De Muscis Mouseti terrestribus ζωφάρμοι.

Mouset. p.
58.59.

TErrestres muscæ, ad quas & minutissima illæ, quæ celerrimè currunt, & in novellis sceniculi foliis subinde reperiuntur, sunt vel ἀλλοφάρμοι, vel ἐπεφάρμοι. Illæ magnæ sunt μακροκνημοί, & muscis potissimum vescuntur. Hæ aut sunt ζωφάρμοι, exque Carnivora, canina, Equisuga, δαμαληφάρμοι buccularum osiores, ovifuga, ὀφιοβόροι serpentivora, σκατοφάρμοι merdivora, βομβυλοφάρμοι, bombylivora, vel αἰζωφάρμοι. Carnivora musca est fere omnium, si corpus respicias, maxima, capite rubente, corpore punctulis ex fusco albicantibus variegato: ventre crasso, cœruleo, pellucido, alis duabus nigris, hirta pilis, carnes avidè appetit. Solitaria plerumque volat, rarius multæ simul conspiciuntur, nisi forte in carnario atque macello: ubi lanii lanistas agunt, muscario muscas continuò cædentes aut abigentes, ne illarum vermibus (Hipp. ὄλως vocat) obsonia scatentia pervilescant. Proditum memoriæ est (Cælio Rhodig. narrante) apud Toletum in publico macello unam muscam albedine nivea notabilem per integrum annum comparuisse. Quam hujus generis fuisse non dubito affirmare, quum in macello tamdiu fuerit conspecta.

Κυνομύια, Musca canum, Anglus à dogge Flye, Germ. Hundsfliege / Hundsmaffen / Polonica Psia mucha, ex Isid. Euthym. & Philon. sententia Musca est sylvestris, catulorum auribus infesta, quam etsi frequenter excutiant, importunè tamen revolat, ac diutius ubi inhæserit, erosione carnis ulcus excitat. De hac Homerus Iliad. φ: πῆλ' αὖ κυνομύια θείας ἐρδὶ ξυμελαίνεις; Athen. item eleganti quidam scorto ob singularem impudentiam, mordacitatem atque molestiam, κυνομύιας nomen additum libro quarto memorat. Est enim κυνομύια (utor Philonis verbis) ἐντομολίαν συνεκὼν ἀναιδὲς καὶ ὑπερβολὴν. Videtur mihi in sacris literis (nempe Exod. 8. Pf. 77. & 104.) insectorum nocentium generale hoc esse nomen, ut ex Chaldaica paraphrasi apparet. Quod speciatim aliquid significet, nulli generi muscarum magis conveniet, quàm nigris illis grandioribus latioribus compressioribus vulgaribus, quæ impudenter involant jumentis, & non tantum ichorem, ut reliquæ, sed ex alto sanguinem maximo cum dolore eliciunt atque exsugunt. Carent proboscide, verum illius loco geminos dentes, ut vespæ habent, quos altè infigunt cuti, potissimum verò pendulas canum aures infestant apud Germanos (asserente Camerario) atque sæpè excoriant. Has nobilis quidam Anglus in Italia se vidisse dixit, alis exceptis Ricino per omnia similes: quem ita compressis alis repræsentant, ut utrumque doctissimus ille Barbarus confundat. Niphus illi ut summam velocitatem, ita rotunditatem corporis assignat.

Ovisuga ad κυνομύιας proximè accedit, dum volat, horrendum quid studet & Afilo gravius & tardius volat. Duæ sunt ejus species, solum magnitudine distant, major sylvicola, minor verò sepicola.

Ἰπποβοσκιοί, German. Rosmücken / sunt muscæ magnitudine vulgarium, corpore compresso, duro, plano ac tenaci adeò substantia, ut inter digitos vix rumpi possint, nigricant magis quàm vulgares, nunquam rectà provolant, sed lateratim, uti dicam, & quasi per saltus, nec diu continuare volatum possunt, neque longè. Equos præcipuè apud Anglos vexant, eos circa aures, nares, testes & emunctoria perpetim lancinantes, quorum sudore juxta cutem ad radices pilorum diffuente vivunt. Angli iis à sive flyn vel à horse flye nomina imposuerunt, ut & Græci πλοσσοπτήρες vocant. Quidam è Græcis κυνοραγῆς appellant, ac etiam in calidioribus regionibus easdem canibus quoque molestiam asserre maximam affirmant. Crotonis speciem alatam ac volatilem dicunt, sed hanc plane aliam speciem esse arbitror, ac solisequis infensam.

De

Tabix

Musca referenda ad Tab. 1 Aldro



Ad. Tab 2 Aldro



Ad. Tab 3 Aldro



Eulices Mucken



M. Bucaria

Afilus

Musca

M. Aquatica

Monfeti

M. Carnivora

Muscas Lupes

M. Bip 3

M. Bipolis Monf 2

M. Scorpuiros

M. Tabanides

Afilyq Apiaq

Wunfeta

M. Mirabilis

M. Bip. 5

M. Tripilis

M. Bip. 4

M. Quadripilo





De Bucularis seu *δαμαλῶφας* in æstro agemus.

His proximè accedit alia musca, bobus & jumentis interdiu sole fervido infesta, quam Pennius *curvi caudam* seu *οὐλοῦμεν* jure appellat. Semper enim cruribus aut ventri jumentis insidens, caudam versus ipsam recurvam tenet & spiculum exertum, quod ad percutiendum cauda sit paratior. Hanc Angli à Whame and à Burrell flye proprie vocant, nec nisi in Anglia facile invenitur. Musca hæc apifere similis forma & colore, sed corpore est crassiore. Non adhæret, nec sanguinem fugit, sed solummodo, stimulo in cauda pungit, atque ut equos affligat, per longissima itinera ipsos volando persequitur. Equi natura hanc muscam timent, & ad ejus solum contactum quasi horrent, cauda pedibusque & labiis tam cruentum hostem abigere sæpe conantes. Sunt, qui putant, hanc muscam non aculeo pungerè, sed stercore pilis equi affigere cauda, unde postea molestissimæ lendes gignuntur. Sed hoc experientia dixerit, nam ratio in re tam minimè probanda silet & obmutescit.

οφωβόρ in Dryini præsertim serpentis squamis latibula habere dicitur Ætio, quæ tandem ipsos serpentes exanimis reddit, hæc pennis æreis donata *χαλκή μυία* vocata ab Hesych. *ὀπχαλκήζαι τῇ χερσὶ*, cum cantharis vescitur, & morfu colorem serpentibus ingentem parit, deinde sitim inexplebilem & mortem. Horum postea cadaveribus si postea hominem momorderint, lethale infligunt vulnus & insanabile.

Merdivora muscæ plurimæ sunt, alia est *Creophago* similis, sed major, oculis obscure rubentibus, scapulis atratis, in quibus circulus oblongus paucillum albicans, dorsum nigrum ex lineis transversim ductis ornatum. Alæ argenteæ, corpore longiores, circa stercus humanum plurimum versantur, aliàs perrarò.

Est & musca *viridis* toto corpore, splendore nimio quasi lanterna Punica pellucens, capite fusco, alis argenteis, in sylvis frequens, circa stercorea ferè versatur vulgaribus muscis magnitudine æqualis. An sit *Giacucul Sylvatici* ignoro.

Aliam *καρσάρον* deprehendimus, musca viridi minorem, corpore fusco, capite rubro saturato, linea medium quasi caput secante.

Aliam item vidimus corpore hirsuto, subflavo, oculis nigris prominentibus scapulis & dorso nigro pulcherrimè maculatis, cauda sublutea.

Alia item est, cui scapulæ dilutum rubent, ad croceum colorem parum accedentes. Duas habet antennis cæteris longiores, alas argenteas, totum corpus te-

gentes, caput nigrum, quadratum & exiguum, in stercore potissimum equino frequentius affidet.

Denique in sterquilinis (unde eas gigni probabile est) muscæ quædam croceæ apparent, corpore reliquis magis oblongo ac gibbofo.

Muscæ item raram, nec ubique obviam, murum ex aggesto finio & materia putrescente factum depascentem vidi, omnino nigram, si absque alis quatuor argenteis fuisset. In scapulis etiam quatuor puncta alba, in reliquo corpore octo, id est, utrinque quatuor. Oculi albi, frons candida veluti asterisco notata, ex qua duæ antennæ nigrae & longæ emergant, habet item in supremo quoque femore album punctulum aspersum. Hanc muscam etiam num in pyxide mortuam & conditam varietatis causa custodio.

Bombytophagus musca est montana, magna, nigerrima, corpore hirsuto, oculis oblongis, magnis, capite spadiceo, prædæ causa acrem cum Bombylio pugnam init, & volatu superans dorsum agilis conscendit, eique tenaciter inhærens tam acriter mordet, ut hostem præcipitem in terram mittat, & melle qualicunque absorpto victrix abeat. In summis Cartmeli montibus se hanc pugnam, donec acies staret, conspexisse memorat in schedis Pennius, sed fortuna muscis favente Bombylios vitæ fuisse ejectos narrat.

PUNCTUM VI.

De Muscis Moufeti terrestribus *αἰωοφάγος*.

Αἰωοφάγος rebus ab animalium natura diversis victum quæritant, suntque *Humifuga* & *Herbivora*, quas itidem Moufeti verbis describere placet.

Humifuga corpore est fusco, in capite juxta os albicante macula resplendens. Venter & pedes nigri: fecusalarum exortum macula utrinque album gerit, dorsum griseum. In scapulis secundum longitudinem quatuor lineas obscurius albicantes obtinet, alas argenteas, & (si in aquam positæ fuerint) noctilucas. In semitis & talparum tumulis recens egestis invenitur, amat etiam humum pedibus complanatam & lævigatam, unde ab Anglis vocatur *Thegray path flye*: floribus rarò insidet, eà præsertim tempestate, quando talpæ terram evertunt cujus se humore sustentant.

Herbivorarum variae sunt species, quarum tres apibus ferè similes, Luciano *εγβολίδες* dictæ, id est, militares. Sunt enim aliis muscis grandiores, animosiores, magis

Moufetus Theatri Insect. p. 74.

gisque athleticæ, aspectu pulcherrimæ, albis argenteis duabus perinfigies.

Harum *maxima* & *primaria* caput nigricans habet, dorsum medium inter duas lineas transversas veluti decussatum, extrema cauda nigra. Aliàs corpore est luteo.

Secunda non multum dissimilis, capite nigricante, scapulas quatuor lineæ flavæ, & tres nigræ secundum longitudinem ductæ ornant, reliquum corpus eodem ferè modo & iisdem coloribus est distinctum.

Tertia atque minimæ harum scapulæ flavent hirsutæ, caput rubet, reliquum corpus quatuor lineis nigris totidemque flavis per transversum actis distinguitur. Omnium corpora splendent, ac quasi inania translucent. In hortis versantur, & floribus assidentes succum eliciunt.

Lucianus militares muscas ita describit: Nascuntur, inquit, & maximæ quædam muscæ, quas militares multi appellant; nonnulli verò canes, sonitu asperimæ & volatu velocissimæ. Hæ & longissimæ vitæ sunt, & totâ hyeme incubatæ perdurant: contractæ præsertim & connexæ tectis & culminibus. In quibus & illud est admiratione dignissimum, quod utrumque & foeminarum & marium faciunt, ut Mercurii & Veneris filius, qui mista natura fuit & duplici forma. His fortè συγγενὴς est alia musca apiaria dicta, cum splendore nigra, bipennis, cerilega, collectos florum succos posterioribus pedibus affigens apum more. Autumno apparet, rarissimè aliis temporibus. An hæc Aristotelis Sirenis? Sanè alarum tantum numero dissentit, quoniam illam περὶ πτερίδας fecit, hæc verò duas tantum alas à natura consecuta est.

Harum aliæ sunt *ερυθρόπτεροι*, aliæ *ερυθροί*, aliæ *χελιδόνιοι*.

Strutiopterôn tres species vidimus. *Prima* tenera est & mollis, sepes, binis alis, alvo oblongâ, à capite paulò supra oculos duas veluti struthiorum pennas præmittens, ceu cornua lanuginosâ mollitie ne ipsis quidem plumis cedentia: scapulis utitur gibbosis, reliquo corpore albo, nigris suis alis longiore.

Secunda est ejusdem generis colore albicante, capite fusco, aliàs parum differt.

Tertia est omninò similis, sed antennas adeò molles & plumosas non habet, cauda albicat, corpore oblongo, quatuor albis lineis transversis insignitur, pedes, longiusculi, albo nigroque colore distincti: dum gradus confert, caudam paulatim elevat, atque alas binas translucidas veluti jactabunda diverberat. Hæ tres species verno tempore cum primis apparent in hortis sepibus atque umbrosis locis, post atque ante pluvias frequentes.

Erinopteros tota alba est musca, vel potius argentea, exigua & ubique plumosa, adeò, ut, dum foliis insidet, nisi penitus intuearis, plumam diceres: alæ illi quasi dissectæ, separatis pennis avium ferè modo disjunctæ. Ab Edmundo Kniveto depictam accepit Pennius, deinde in sepibus & ligustrinis topariis sæpius vidit.

Musca, *χελιδόν* dicta, volatu post se omnes relinquit, lateribus, caudâ, capite fusca & pilosa, oculos nigros habet propendulos, rostrum vel potius nasum mucronatum, è cujus apice antennæ duæ erumpunt; scapulæ summæ, ut & dorsum, nigræ: alæ duæ argenteæ, quarum partes anteriores pedum nigredini respondent. Quandoque in uno loco residet, veluti immobilis, verum ubi propè accesseris, incredibili celeritate oculos fallit, & ne hirundini quidem celeritatis palmam (unde dicta Hirundo) unquam concedit.

Quam à Clusio Pennius accepit, nigra erat, alis duabus argenteis instructa, oculis albis conspicua. In dorso septem maculæ luteæ cum nigro in medio puncto erant.

PUNCTUM VII.

De Muscis *Moufeti seticaudas*.

PRÆTER has Muscarum species observavit adhuc *Moufetus*, *seticaudas* seu *pilicaudas* *τετράπτερος* & *Raras*. Illarum aliæ *unam*, aliæ *duas*, aliæ *tres* quatuorvè setas habent.

Henothrix sive *Unifeta* (sunt verba *Moufeti*) est musca caudata, toto corpore nigra (medio dorso ventreque rubescente excepto) alis duabus argenteis prædita, scapulis crassiss, antennulis duabus nigellis facta, pillum unicum longum è cauda emittens. Hanc depictam ad Pennium idem Joachimus transmissit, affirmans eam non nisi Ameo præstantiori insidere, reliquas herbas non attingere.

Διπρότερες sunt muscæ duas in cauda setas pilosvè habentes, quarum aliæ sunt corpore fastigiato, aliæ tuberoso. Prioris generis duas vidimus alis quatuor argenteis sine maculis, capitibus & scapulis nigricantibus, reliquo corpore fusco, nigris lineis transversis variato. Utrique longæ & exiles antennæ, similesque in cauda pili duo, sed paulò longiores, corpore tuberoso.

Bipiles quinque habemus. *Prima* *Henothrici* per omnia ferè similis, nisi quod huic plus quàm media corporis pars flavescit, duos in cauda pilos prælongos, quo-

Moufeti
seticaudas
set. p. 63.

quorum unus extensus canis leporarii currentis caudam refert, alter intus convolutus lineam spiralem.

Secunda muscarum longarum species est, quatuor habens alas argenteas, pedes longos mediocriter flavescences, totum corpus nigrum, scapulas crassas, antennis duas longas & tenues, ventrem versus caudam protuberantem, e qua duæ breves setulæ sursum versæ erumpunt; In sepibus degit.

Tertiam Carolus Clusius Vienna misit: corpore ex fusco nigricante, alis duabus largis ex argento ceruleis donatam, corpore præditam acuminato, ex quo duæ setæ (ut Pennius notavit) vel plumæ potius excrescunt perdicei coloris, maculis nigris fuscisque mixtim ornata.

Quarta globoso est corpore, quod unciam longitudine æquat, caput, scapulæ ac pectus nigerrima, antennæ breves, pectori crasso sex pedes affixi nigerrimi, quorum priores omnium brevissimi, posteriores longissimi. Inter volandum pedes simul conjunctos pendulos dimittit, alæ quatuor obscuræ, argentei coloris, oculi nigri splendentes, caudæ extremitas nigra, unde duæ setulæ paucillæ longitudinis se monstrant: à scapulis ad mediam usque caudam colore est ferè subcroceo, cauda tenui quasi filo longo scapulis conjungitur. Velociter currit quasi per saltus, in terra nidificat, muscis & erucis parvis famem extinguit.

Quinta longè hac minor est, figura eadem, sed alas verè argenteas monstrat, totumque corpus ad caudam usque fuscam rubescit.

Tripilium muscarum quinque duntaxat observavimus.

Prima oblongo est corpore & nigro, cujus medium valdè ex nigro rubet: antennis habet duas, etiam nigras, alas argenteas, quarum supremam oram macula nigriuscula adornat. Crura rubent, cauda tres crines longos emittit, velociter volat.

*Alter*a similis, sed minor, toto corpore nigra, priore multò longior, tenuior atque exilior; alæ item argenteæ, antennæ priori similes, ac cauda tres longos pilos protrudens, volatus celeritudine à prima longè superatur.

Est & musca *tripilis* toto corpore albicans, nisi quod alæ quatuor maculis nigris distinctæ videantur, quarum exteriores majores, interiores verò breviores, hæc dum quiescit, semper erectas tenet. Sex habet pedes, quatuor minores corpori affixos, duos anteriores majores, nigros, e collo ferè oriundos; inter duos oculos nigros prominentes globosos duæ antennæ nigrae atque breves exeunt. Corpus gracile, teres, longum transversum digitum: in

cauda tres visuntur setæ corpus longitudine æquantes, quas volando in veri trianguli modum expandit. Majo & Junio mensibus ante & post pluvias potissimum apparet; circa fluvios paucis comitibus stipata convolat, quibuscum in itinere sæpè colludit. Anterioribus pedibus utitur quandoque ad palpandum, ecquid in via impedimenti sese objecerit, extendit enim illos corniculorum more. Talem anno 73. observavit Pennius.

Sequitur *quarta* mirabilis structuræ, alas habet duas argenteas, totum corpus nigricat, os forcipatum & aquilinum, in fronte duo cornicula breviter erumpunt: quatuor illi tantum sunt pedes, sub pectore duo graciles & breves, paulò inferius reliqui robustiores. Ex oblonga cauda primum duo brevissimi pili exeunt, atque sub his tertius multò longior, in extremo tuberosus oritur. Semel tantum se hanc muscam circa Hinigham, olim Comitum Oxoniensis castrum, vidisse memorat Pennius.

Ultima toto corpore & cauda nigra est. Corpus habet oblongum, alas duas corpore nonnihil breviores, pedes ex croceo flavescences, caudam longitudine reliquum corpus æquantem, nisi semel in Cantio circa Greenhive visa perhibetur à Pennio.

Quadripilis musca corpore Tripilem primam repræsentat, sed magis versus caudam protuberat; pedes item nigri, ut antennæ, alæ item proceræ, quarum externæ internis triplo majores circa medium nigræ maculâ distinctæ. Quatuor è cauda pilos emittit.

De *raris* muscarum speciebus, quarum quædam ad Papilionum censum spectant, ita idem.

Prima est musca papiloni minori æmula, alis quatuor argenteis, nigricantibus maculis corpus argenteæ lineæ transversim ornant. cauda rubens ex fusco, caput nigrum, scapulæ ejusdem cum cauda coloris, antennæ tenues, nigrae, breves, pedes exigui, nigri; in sepibus versatur præcipue tempore matutino.

Secunda parum à prima diversa est, nisi quod unà cum corpore antennis, pedibusque & cruribus fusca sit.

Tertia est item *tripilis*. Sunt autem longiores illi alæ, maculis nigris distinctæ caput majusculum, nigrum, punctulis luteis pauculis notatum, antennæ tenues, duæ, nigrae, pedes sex subalbicantes, pectori crassiusculo affixi: scapulæ lutescentibus ex albo maculis variegatae; dorsum quinque lineæ transversim ornant luteæ, ac punctulus unicus inter duas lineas conspicitur colore subluteo; in cauda quinque vertebrae rubent, cujus extremitas bifurcata est.

Quar-

Quarta est non valdè dissimilis, sed alas habet argenteas, sine maculis antennis negras longiores. Corpus septem lineis transversis albicantibus insignitur.

Vidimus & duas muscas *scorpiuros*.

Prima similes habet præcedenti alas argenteas, sed paulò minores, & in extremitate ipsarum tribus transversis lineis nigris signatas, caput nigrum, pectus (ut & scapulæ pedesque) albicat: reliquum corpus nigrum, cauda quinque quasi juncturas habet, quarum tres dilutè rubent, duæ nigricant; extrema cauda bifurca, furcæ autem nigræ, & scorpionum modo sursum curvatæ.

Secunda ferè similis, sed extremitas caudæ crassior, furcæ obtusæ, caput luteum, oblongum os, alæ singulæ sex maculis nigris ornatae.

Est & alia musca *quadripennis* corpore virescente, alis quatuor corpore longioribus, è liquido quasi argento factis, quarum nervi virescunt; antennæ huic tenues & nigræ, oculi aurei (unde jure Chrysopis dicitur) volatus languidus, odor teterrimus, quem, ut blattæ, cum vita amittit. Hortorum hospes vivit sambuco insidens. An ex Eruca oriatur, papilionum more, an verò ex vermibus arborum, equidem ignoro. Doctissimus ille atque humanitate clarissimus Joachimus Camerarius primus illam Pennio ostendit.

ARTICULUS III.

De Tabano.

Nomen.

ETsi Isidorus & Junius Tabanum cum Oestro seu Asilo; eundem faciunt: ipsa tamen descriptio, diversitatem inter eos ostendit, Græci *μύωπι*, à stimulo forte, nam *μύωψ*, calcar, quo equi stimulantur significat, dixere. Apud Latinos tabe, quod corpore tabeat, id est gracilis sit, nomen obtinuit.

Descriptio.

Totum corpus oblongum est, in tres præcipuas partes divisum, caput nempe scapulas & ventrem, quinque vel sex incisuris distinctum. Nigricat ex diluto albo totus. In ore proboscis longa, torosa. Sex non octo ut Ardoinus prodit, nigris pedibus instruitur: reliquis maximam *κνωμομύωψ* refert. Cauda ei stimiligera nulla.

Plin. H. N.
11. c. 28.

Plin. H. N.
11. c. 33.

Frequentes sunt circa sylvas & vias regias, sepibus arboribusque munitas. Ex ligno, Plinio teste, proveniunt. Ex eodem nasci scripsit Aristoteles. Julio & Augusto mensibus propter nimium æstum ferociunt: homines tum, equos & serpentes affligunt. Equum in sylva ad arborem alligatum, sex horarum spacio à Tabanis occisum, Mufetus ab amico fide dignissimo accepit. Quia longè videre

nequeunt, jumenta per sudoris odorem consequuntur. Gerunt cum teterrimi foetoris serpente, circa Hellespontum bellum. Camelose tiam infestare, pinguedine piscium abigi, prodidit Plinius.

Nicand. in
Theriac.
Plin. H. N.
31. c. 2.
Differentia.

Diverſa Tabanorum in India Occidentali genera esse, Oviedus observavit, sed non descripsit. Duo apud Aldrovandum habemus. Unum est corpore minore, capite nigro, antennis brevissimis, ut vix appareant, pectore & pedibus nigris, alis subluteis, circulisque concoloribus qui alvum ambiunt. Alterum minus adhuc, capite nigro, duobus albis punctulis in vertice insignito, pectore ex nigredine ad subcinereum colorem tendente. Alvo & alis subcinereis.

Aldrov. de
Insect. 3. c. 4.

Proxime Tabano illa musca accedit, quæ *Cœliæ* & *Curvicauda* Pennio. Api ferè est similis, corpus duntaxat crassius. Stimulo in cauda pungit, quam jumento insidens, versus ipsam recurvam tenet. Non facile nisi in Anglia invenitur. Sunt qui stercore equi pilis affigere, sic pungerè credunt; quod molestissimæ postea inde lentes nascantur.

Mouf. p.
62.

Huc referri potest & illa apud Mousetum *Tabanides musca*, quæ capite & corpore virescit. Scapulæ ex virore splendent: alas habet duas extremis mediisque partibus albicantes, reliquæ ex fusco nigricant. Pennius semel Hanworthi talem observavit.

Mouf. In-
sect. 1. c. 11.
p. 61.

ARTICULUS IV.

De Asilo seu Oestro.

ASilus à Calepino & aliis cum Tabano confunditur. Perperam, superius dictum. An à Silaro amne ad quem frequens, nomen sumpserit, dubium: ab asiliendo, vel quod asellos infestet, verisimilius mihi est. Græcis est *οἰστρος* (Latinis Oestrus & Oestrum) *ὀπὸς οἰστρον*, insannire, quod armenta in furorem agat. *Λιόλον* Eustathius ex Homero vocat, vel quod forma sit *ὠπὸ χαλκῶς*; vel quod turbinis in modum moveatur. A feroci natura Opianus *ἀγέλον* dixit.

Nomen.

Est *χλωροκεφαλῆς*, & toto corpore *ὠπὸ χαλκῶς*, sive subætatus, superat Tabanum proboscidis magnitudine; ab eodem verò bombi stridore vincitur. Gestat antè, durum, robustum, & benè compactum *aculeum*, quo boves tergo faciliè pertundit. Eustathius muscæ per omnia similem; sed majorem facit. Alii locustæ similem (perperam) colore varium, mobilem, *ὠπὸ χαλκῶν* ponunt.

Descriptio.

Suidas.

Circa stagna & fluvios versantur, ad Silerum Lucaniæ amnem maximè. Elatioribus quibusdam bestiolis, quæ fluvios per-

Natura.

Homér. in
Odysſſæa.

3 l. c. 2.

Flint, H. N.

11. c. 16.

Scalig. Exerc. 194. f. 5.

Arist. H. A.
5. c. 19. §
de partibus.
Animal. 4.
c. 6.

Miechov:
Sarm. Eu-
rop. I. 2.

Mouset. l. c.
77.

Home.

Sidor. Orig.
L. C. 8.

vel quasi *Cutilex* quod cutem laciāt. Usurpatur in virili & muliebri genere. Moufetus *Cuticem* vocare mallet. Græci, generali quo omnes culices comprehendant, nomine carent. κώνωψ, amplissimum est, quod πρόγονψ Pausania. Hinc Oetæis Hercules Conopius, qui culices abegit: Bæotiis Parnopius Apollo. Rulando, ἐμπης, κινώπειψ, κώνωψ, σάλητιψ, σέρφψ, σκνίψ, & κνίψ, Synonyma sunt. Nihil quidem certius ἐμπίδα culicem apud Aristotelem Gazæ esse: sed Aristophanis scholiastes, ζῶον ὕδατι γινόμενον, ὁμοιον τῷ κώνωπι, μᾶλλον δὲ τῇ περτοχῇ, ἣ δὲ ὁ μέσων ἀδυνῶ περιζοσμένον, seu animal prope aquas genitum Conopi simile, majus verò in circumferentia, & circa medium, lineâ alba cinctum, interpretatur. Alibi tamen κώνωπα dici ponit. κινώπειψ Hefychio sunt κνώδαλα θηρία, animalia reptilia, Nicandro ἐν τῷ πῶδω κινέμενα, κνίψ peculiaris generis nomen esse videtur, quod fortè Plinio sub *Culicum mulionum* nomine venit. Hefychius volucre culici simile exponit. Σάβηνπι, eidem sunt κώνωπες. Σέρφψ denique animalculum formicæ aut veri simile Varino. Videtur & σέρφψ dici. Constantinus animalculum Culici simile exponit.

Miratur hoc insectorum genus plinius. Ubi, inquit, tot sensus collocavit in culice? Ubi visum in eo prætendit? ubi gustatum applicavit? ubi odoratum inseruit? ubi verò truculentam illam & portione maximam vocem, ingeneravit? quâ subtilitate pennas adnexuit? prælongavit pedum crura? disposuit sejunam caveam, uti alvum? avitam sanguinis & potissimum humani sitim accendit? Telum verò perfodiendo tergori, quo spiculavit ingenio? Atque ut in capaci, cum cerni non possit exilitas, ita reciprocâ geminavit arte, ut fodiendo acuminatum pariter, sorbendoque fistulosum esset. Corpus eis oblongum; proboscis, quam omnes in ore gerunt, quia ex bipennibus, muscarum proboscide triplo longior. Alæ duæ, magnæ, ex gibbosis scapulis oriuntur. Crura sex vacua, prælonga, valga, è pectore prominente & quadrato nascuntur, cum ut melius ambulent; tum ut facilius sese humo attollant.

Paludosis & aquosis locis plærumque gaudent. Mesopotamia insignes & leonibus infestos alit. In Ægypto magna eorum copia. Bellonium cum comitibus ita circa Cairum vexavere, ut exanthematibus correpti viderentur. Eorundem cantu famosa Adriæ littora facit Martialis. In India Occidentali invenias qui vestes pertundant. Antiochiam & Byzantium ne possent ingredi, Apollonium Thyanaeum fecisse, Tzetzes auctor est.

Acidis delectari Aristoteles & post eum Plinius, reliquit. Nec dulcia respuere

certum, siquidem sanguinem humanum, qui dulcis est, eliciunt. Haurunt & vinum, consumptoque moriuntur salicti, ut Martialis habet.

Quia non coeunt, Ideo necesse est, ut ex putri, vel aliunde nascantur. Albertus ex aquosis vaporibus oriri scribit. Ex collis provenire primus Pierius, & falsò, prodidit. Ut verbo dicam. Alii ex putridis cadaveribus, ex putrida in paludosis aquis materia alii: ex herbis, arboribus, ut polio, lentisco, ficu, therebintho, palmâ, ulmo, quidam prodeunt. *E vermiculis*, inquit Moufetus, in napo, ligustro, lentisco, therebintho, ficu, caprifisco, aliisque arboribus veluti seminum sparsis, & per non putrescentem sed animantem naturam natis, culices prodire nemo non novit. Brujerus verò insectum longis admodum pedibus, quod culicem majorem dixisset, in lacuna valde sordida, ex theca coriaceâ molli sese proripere, vidit: putabatque ex verme aliquo erucæ simili ibidem incluso ortum duxisse: quod casula talis intus fuisset, in qualem sese erucæ transformare solent. Plura in Differentiis.

Olfactu plurimum valent. In volando, aërem, ob alarum mollietatem & alvi tenuitatem, non commovent. Lumine adeo delectantur, ut sæpissimè in lucernas incidunt. Strepitum alarum continuâ & replicata concussione edere, credibile est. Chærephon apud Aristophanem, an per podicem, an per os canant, facetè ex Socrate quærit. Quia morsu valent, ideò non mirum, Myntem urbem, è palude quadam, quam Mæxander fluvius obstruxit limo ostio, effecerat, olim vastasse: Acarnensium urbis quæ juxta Asiæ Pergamum frequens habitabatur, pulsos incolas, quod apud Pausaniam habetur.

Idem leonibus in Mesopotamia, & apud Rizophagos qui Astaboran & Astapan fluvios circa Meroën incolunt, Oriente Syrio olim accidere fuetum, Diodorus Siculus & Strabo auctores sunt. Licet ex iisdem & præfagium sumere. Divergente sole, si in aprico colluserint, caloris. si in umbra, tepidas & mites pluvias, si prætereuntes pupugerint, frigus & nimbos præfagiunt. Congressi aliquando inter Shennæ & Sionis monasteria in Anglia, (pugna per quatuor horas duravit) Monachorum exilium quibusdam innuisse credebantur: Bella in parte Occidentali nonnullis cum anno M.D.LXXX. per quatuor continuos dies, ex Italia, in Occidentem evolarent. E pomo quercino, si circa Michaëlis festum culex eruperit, bellum hostile Mizaldo præfagire videtur. Aquam subesse Paxanus eo loco pollicetur, quo se sole exoriente, trabis instar con-
torquent.

Multa

Mouf. de
Insect. 1.
c. 13.

Aristoph. in
Avid.

in N. bulis

Descriptio
Plin. H. N.
11. 6. 2.

Locus.

Nellon. obs.
2. c. 35.

Mertia.
Epig. 3. 93.


Mart. y.
Rev. Oceani
4.
Decad. 3. 8
l. 9. Deca-
da 7.

Tzetx.
Chil. 2.
Cibus.
Arist. H. A.
4. c. 7.
Plin. H. N.
10. c. 7a.
Generatio.

Mouf.
Theatri In-
sect. l. 1. cap.
13. p. 84.

Natura.

Pausan. in
Achaicis.



Remedia.

Multa eorum exitio, vel ut fugarentur, vel vitari possent, humana industria invenit. Conopæo olim Alexandrini utebantur: hodie in summis ædibus sub dio habitant. Indi arenâ obruti, faciem frondibus inter ramos contegunt. Culices, eorum quidam, ut sibi pareant, adorant. Septentrionales tentoriolo ex panno lineo vel cortice facto se includunt. Merula cannabis humidæ ramusculos in lecto apponendos suadet. Anghisuum *Fencanapy* palustre conopæum, seu sterces bovinum, patulum, planum, semiaridum, vel duriusculum filo ad imum lectum suspendunt. Huic odore illecti, totam noctem insident. *Abiguntur*, coniza, cupressi pillularum cum arboris coma, absynthii, melanthii, lupinorum, juniperi, rutæ, vitrioli, &c. fustitu, de quibus apud Dioscoridem, Plinium, Galenum, & alios legimus. Rhases pilum equinum per mediam domum extentum commendat: Pedemontanus, pulverem cumini subtilissimè triti, cum vinoque misti, quo pampini vitis, aut alicujus arboris frondes irrorari, cubiculorumque ostia, & fenestræ aspergi debent. Adhibetur & aceti cum origano decoctum. Ne jumentis noceant, serpentariæ fustitum facere, Olaus M. author est: ne hortis, amurcam recentem & ex caminis fuliginem hortis inspersam, Palladius, malicorii aut galbani fumum, Plinius. *Enecantur*, si rutam decocto conyzæ madidara, in ædium angulis deposueris.

Plin. H. N.
27. 21. l. 19.
c. 10. l. 23. c.
6. l. 27. c. 5.

Usus.

Vilis licet, abjecta & molesta bestiola, usum tamen aliis animantibus præstat. Solo quippe culice Thymalus piscis, Ticini fluvii incolæ capitur. Crocodilus iisdem victitat. Aves *κνιπιδόρας* dici diximus, & *κνιπιδόρας*. Plura in Differentiis dicemus.

Differentiæ.

Magnitudine in primis, & generandi modo præcipuè differunt. Sunt quidam *magni*, quidam *parvi*, quidam *minimi*. Magni *ἐλελοι* dicuntur, quod palustribus locis oriantur & vivant. Corpore sunt oblongo, duabus alis prædito, quas elimatas & politas, supra humeros extendunt. Ocreas sæpè & triplices caligas perforant, & morfu venenato, modò dura & livida tubercula, modò vesicas, modò punctula pruritu plena inferunt. In Hispaniola & calidioribus regionibus sunt crudelissimi. An *εὐζγες* Theophrasti? Strabo *μεγάλας κνώπας* vocat. *Parvi* morfu mitiores sunt, æstate umbrosa, hyeme nivosa incolentes. Salsum duntaxat fudoris pabulum morfu eliciunt. Unde tuberculum jucundi pruritus plenum exoritur. Juxta sepes & arbuta mutuis quasi cursibus colludunt. *Minimi* in Anglia aquilonari, pyramidali semper figura provolant: figuræ suæ aciei fines nemo transit. *Sursum deorsum* (verba sunt *Mouseti*) feruntur, noctu oculi, & dicto citius, in latera aciem deducunt, totumque

Theophr.
de C. P. 2.
c. 4.

Mouset. l. c.

que subito exercitum in latera dispersiunt: quæ sive muscario sive pulvere, sive aquâ affusâ, sive spiritu violento fregeris, coeunt tamen confestim, & ante digiti crepitum, in pyramidalem sese formam omnes recolligunt. Ex uliginè putrescente oriri credo, vaporeque aqueo ali. Intestinum siquidem iis tenuissimum, album, ferè invisibile, spumeo, albo, tenuissimo, & nullius ferè tenacitatis humore plenum. Longius quandoquæ ab aquæ volitant: & loca à flatibus libera amant. Pierius Valerianus, cujusdam generis inter minimos mentionem facit, quod tam est exiguum, ut visum inter volandum fallat, nisi intenderis, sed tam acuti ictus, ut cutem pertesebret.

Fig. Hist.
109. yph. 26.
c. 24.

A modo generandi differentias apud Græcos habemus. *εμπης*, *ψήν*, *κνίς*, præcipuè sunt. *εμπης* quid sit superius dictum. Albo cingulo à natura ornatur. Unde Aristophanis scholiastes, *αἰδοῦ καὶ πῶς τὸ πάλαιον ζῶον ἔχον*, dixit. Muliones quidam vocavere: sed perperam. Hi enim uno tantum die vivere dicuntur, & tanquam *Melliones*, quod solo melle vescantur vocari. Rostrum habent pici arborei instar, longum, acutum. Crapulâ disrupti statim expirant. Erupidas ex Ascaridibus (malè tipulas vertit Theodorus) fieri scribit Aristoteles. *Ascarides autem in limo puteorum*, quo aquæ, subsidente concretionem terrenâ confluunt. Principio limus ille putrescens, colorem capit candidum; deinde nigrum: postremo sanguineum. Tum ex ea quædam perexigua rubra oriuntur, alga pusilla speciei. Ea aliquandiu hærentia moventur: postea abrupta feruntur ab aqua, & vocantur ascarides. Diebus haud multis post, tollunt sese rectas ab aqua; neque moventur, & sunt duræ: tandem abrupto putamine culex superinsidet, donec sole vel flatu moveatur, ut inde avolet. *ῥήγες* ficarii sunt culices. Generantur ex caprificis eorumque putrescentibus granis. Idè cum evolavere non inveniuntur intus grana, quæ in eos versa apparent. Usus in maturandis ficibus. Nam fraudati alimento in matre, putri ejus tabe ad cognatam volant, morsuque ficium crebro, hoc est, avidiore pastu, intus solem secum primò inducunt, cerealesque aures immittunt foribus apertis. Mox lacteum humorem sive infantiam pomi absument: quod fit & spontè: ideoque ficetis caprificus præmittitur ad rationem venti, ut flatu culices evolantes in ficus ferat, qui ubi ingressi fuerint, turgent fici, & celerrimè maturescentes altum tumescunt. Ad hos pertinent quos *κνίπας* *κνιπιδόρας* Græci, Latini *Culices Herculeos* vocant. Inertes vivunt, & nonnisi ex occisis sui generis culicibus cum succo & sanguine plenos conspexere, victitant. *Κνίπας*, vel *κνίπας*, *ἀπὸ τῆς κνίσεως*, quod mordendo vellicent & pruriturum excitent dicuntur.

Plin. H. N.
15. c. 19.
Arist. H. A.
2. c. 32.

Theophr.
H. P. 2. cap.
ult.
Theophr.
H. P. 4. c. 17.

tur: Theophrastus vocavit etiam *ψῆγες*. Videntur, secundum Plinium, ex humore dulci subdito corticibus in quercubus nasci, quod ex Theophrasto sumptum est. Velarandus Insulanus Pharmacopæus, ex quercus pillula, & gallæ foraminulenta meditullio frequentes prorumpere observavit. Proveniunt & in ulmō, napo, rapis, polio, lentisco, terebintho, & aliis, cum vel sine putrefactione. Humoremulmi vesicis primā germinatione inclusum si aruerit, in *κύνες* mutari, Symphorianus auctor est. Hortos præcipuè riguos infestant & incolunt. Pyramidis instar in aëre sublimes videntur, vesperi præcipuè, & juxta sepes. Obliti ferè eramus *Vinaceorum*, quos fortè Arist. *κύνες* vocat. Tra-

Arist. H. A.
5. cap. 19.

hunt ex vermiculis, qui in fæce aceti gignuntur, originem, *ἐκ σκαλῶν, οἱ γίνονται ἐκ τῆς αἰτῆς τοῦ ἐξ ἰλίου*. Generantur ter septem diebus. Wottonus in igne quoque nasci scribit: quod difficulter credetur.

Arist. H. A.
5. c. 20.

In America circa metam incognitam & ad Nicolai portum miræ sunt magnitudinis. Incolæ *Tetin* vocant. Leriis inter pulices numerat apud Nieremberg nisi sphalma non est. In *Brasilia* est genus quoddam paulo minus vulgaribus tinnulis, elegantissimi coloris. Crura habet exilia sex brunni coloris, raris pilis hirsuta: Caput rotundum in duas partes veluti fissum superiusque ex viridi elegantissimus color resplendet ad latera purpurascens. Posterius corpus definit in aculeum satis longum, superius ex viridi elegantis aurei coloris & pilis raris hirsutum: habetque quinque juncturas subnigricantes: alas duas tenues satis longas, iridis colores repræsentantes, imò superantes: in capite cornicula duo, &c. Sed hæc per microscopium exploranda. In *Hispaniola* invisibiles quidam sunt, sed adurentis ictus. Littora amant, nec in interioribus inveniuntur. In ramis arborum circa eos præsidium. His domos cingunt. Huc fortè *Musca Culiciformis* Moufeti spectare, nisi coire scriberet, quod Culicibus negavimus.

Marg. H.
N. Brasil. 7.
c. 7.

Nieremb. H.
E. 13. c. 10.

Aldrovandus, ne & circa istos nobis deesset, duas iconum variorum tabulas proponit, iisdem duas alias species adjicit. Qui exactè cum muscis Moufeti comparaverit, haud paucas inter eas inveniri fatebitur. Primā tabula enim 1. *Culex* communis dicitur. Vide

Aldrov. 3. de
Insect. c. 5.

p. 386. Bonon. edi-

tionis.

†

*

TITULUS II.

De Insectis Coleopteris seu Vaginipennibus.

CAP. I.

De Locustis.

ARTICULUS I.

De Locustis in genere.

Tantum de Aelytris tam quadripennibus quàm bipennibus sufficiat: sequuntur *Cleoptera* seu *Vaginipennia*, *Locustæ* nempe, *Gryllus*, *Scarabeus*, ad quem *Proscarabeus* spectat, *Cantharis*, *Ips*, *Buprestis*, *Corcokus*, *Cicindela*, & *Blatta*. Nullo aculeo infestare, difficulter volare, pennas fragiles & cortici inclusas habere, sedentia potius quam alata videri, commune omnibus. De Locustis tanquam maximè notis primò agemus.

Videntur apud Latinos fortidæ nomen, vel quod sint longis pedibus instar hastæ, vel quasi loca ulsa, quod messes & alia quod attingunt urant. Græci in genere *ἀκρίδας*, *ἡ δὲ τὸ ἀκρὸς τὸ ἐκχλῖον καὶ τὸ φῶτων νέμεα*, quod summitates segetum & plantarum depascantur, vocant. *Μδ-σαι*, *κῶροψ*, *πάρροψ*, *μολαρις*, *ἀπτελῶς*, *βρέχθ*, *ἀναρνθ*, *μαλῖς*, *κάρνωψ*, *πρωχάλις*, *βίχαχόσκη*, quod apud Dioscoridem legitur, *specierum quarundam nomina esse videntur*. Cretenses *ἄλκρεν* vocant: quibusdam fortè *βρέθανα*, & *φόεαρε*, quæ iisdem *ἄκρεν* dicitur. De nominibus Ebraeis consule Aldrovandum. Dioscoridi *μεγαλόκω-λθ* vocatur, quod posteriora duo crura longiora habeat.

Dioscorid. 2.
c. 57.

Egrejiè & breviter Claudianus depinxit. Descriptio.

Horret apex capitis, modo fera lumina surgunt,

Vertice cognatus dorso durefcit amictus,

Armavit natura cutim, dumique rubentes

Cuspidibus parvis, multis acutere rubores.

Albertus, caput habere figura equi scripsit: & ante os duo additamenta dura, quæ labiorum & dentium vicem suppleant. Aculeus est pro cauda, pedes sex, posteriorum crura longiora & ad seipsa reflexa, (Plinius foris curvari dixit) ut melius de terra attolli possent, intestinum unicum sanie & fordibus (succus is plantarum est) plenum. Nigidius oculos iis negat: sed Plinius concedere videtur, quod

Plin. H. N.
11. c. 29.

Aristotel. de part. anim. 4. cap. 6. & H. A. 4. c. 6. Plin. H. N. 11. c. 37. quod & Claudianus facit. Insectorum, inquit, omnium, & quibus testacea operimenta, oculi moventur, sicut quadrupedum aures. De alis perpetuum non est. Aliæ simplicibus, pluribus aliæ volant; quædam saliant. Nec color, quod auctori de rerum natura visum. Sunt virides, nigrae, lividae, variegatae. Exuvium serpentum instar deponere, quo tempore operculum circumrumpitur, Aristoteles testis est.

Arist. H. A. 8. c. 17. Locus.

Nulla eas non ferè terra alit, in quibusdam tamen frequentius grassatur hoc malum. Visæ nuper in Russia, cum servi & mancipia ad signa convolerent, & legiones facerent. In Syria militari imperio olim necabantur. Italiam ex Africa, inquit,

Plin. H. N. 11. c. 29. Plin. maxime còortæ infestant, sæpe populo ad Sibyllina còactò remedia confugere, inopie metu. In Cyrenaica regione lex etiam est, ter anno debellandi eas, primò ova obtinendo, deinde fœtum, postremò adultas: desertoris pœna in eum qui cessaverit. Et in Lemno insula certa mensura præfinita est, quam singuli enecataram ad magistratus referant. Civitatem in Africa ab eis pulsam M. Varro auctor est. Apud Nigritas singulis trienniis ad duodecem milliarium spacium terram inumbrant, si Cadamusto fides. Circa Brundisium quotannis agros absumunt. Apud Cassini montis incolas tot, ut Seleucidas aves à Jove sibi precentur. Planis verò rimosisque locis maxime gaudent, quanquam & in montanis, ubi Cotinus provenit, invenias.

Vitæ. Herbis & segetibus vitant. Ideo *μάστινα* Nicander *Ἰταφάρον* vocat. Amygdalorum floribus impinguntur, si auctorem de natura rerum sequimur: folia quoque lauri depascuntur & vites. Ideò haud sine causa Plinius: *Pabula petere sciunt. Deorum ira pestis ea intelligitur.* Namque & grandiores cernuntur, & tanto volant penarum stridore, ut aliæ alites credantur: solemque obumbrant, sollicitè suspectantibus populis, ne suas operiant terras. Sufficiunt quippe vires: & tanquam parum sit maria transisse, immensos tractus permeant, diraque messes contegunt nube, multa contactu adurentes; omnia verò morsu erodentes, & fores quoque tectorum.

Sigebertus. Plena de iis Historiarum monumenta, inter quæ & memorabilia quædam occurrunt. Anno Christi 591. tantam Italiæ intulere pestem, mortuæ ad littora ab Africa delatæ, ut DCCCM. hominum periisse, Julius Obsequens scribat. Quæ anno 874. Galliam vastabant, senis pedibus, ac duobus dentibus durissimis instructæ erant. Duces præmissi pridie castra metabantur. Volitabant diurno itinere, quatuor aut quinque millia passuum. Britannico absorptæ mari, mox ad littora rejectæ, ingentem pestilentiam excitavere. Anno 1542. alisper

initia carebant, mox binas, tandem quatuor assumebant. Anno 1543. in Lucano agro tam frequentes convenerant, ut glomeratæ cubiti altitudinem excederent. Sub exortum Tartaricorum & Cosaciorum apud nos ante biennium motuum, visæ quoque iisdem quibustumultuatum est locis. Tantum eorum agmen, ut postquam confediscent, equorum in viis ungulas obtegerent. Mirum, non ulterius rabiem eam rusticam progressam, quam istæ pervenerant. Nundum Lublinum attigerant, cum versis velis, Orientem à quo ferebantur, repetiere.

Generantur ex putri & per coitum. Ex phalangis procreari, apud Aristotelem, ni fallor, habetur. Ex putridorum corporum, sicciore inprimis temporis constitutione, apud alios. Sub bello civili in Sicilia, in sepulchris mortuorum cadaveribus ingens Artelaborum prodiit copia, si Plutarcho credimus. Veris autem tempore à Zephyro & Lybico ventis, si Diodori Siculo, ex deserto ad Æthiops Acridophagos deferuntur. Austrò & urente vento deferri Sacra Scriptura habet. Ibidem ut & in Lybia, Strabone prodente, quod rarò aut nunquam pluatur, & lacus cœnosi fiant, magna copia oritur. Fœminas ex se concipere, Vincentius in ea quam nutrit, & prægnantem invenit docuit.

Coitus idem qui & insectorum omnium, quæ cœunt, marem qui minor, portante fœmina. Mas in congressu duos illos aculeos dorso ult. eminentes, per caudæ inflexionem in fœnellæ uterum immittit: fœmina subagitata intente alvum movet, & se ima parte mari applicans, illum diutius continet; modò vulvæ hiatu, modo ejus contractione, venerem sibi jucundiorrem reddens. *Visuntur enim meatus duo in fœminæ pudendo, interstitio quodam disjuncti;* (verba sunt Moufeti) *& crassiusculò operimento cuncti: quod externa sui parte nigricat, durumque est & cartilagineum,* intus autem leviter hirsutum, rugisque quibusdam quasi scabrum videtur. Ad hujus operimenti fundum uterus albicans, instar muliebris pudendi cernitur. Quia ita hærent, ut nec saltu, nec motu, vix manibus avulsæ discludantur, tardo digressu coire Plinius scripsit. Parere in terra fixo cauliculo illo (*ἡ μήτρας τῆς κερκὸς αὐτῶν*) qui caudæ adnascitur: ac universum, & loco eodem, fœtum simul noni sparsim deponere, ita ut quasi favus esse videatur, apud Aristotelem habemus. Hinc

vermiculos specie ovi oriri addit, qui terrena quadam prætenui tanquam membranula ambiuntur: dissecta emergunt locustæ & evolant. At verò ova ineunte Autumno condensu parere, experientia habetur: tanquam mollis fœtura hæc est, ut ad tactum levissimum coneratur. Ea durant hyeme sub terra, cujus visceribus

committuntur. Subsequenti anno exitu veris, (concoctione quasi peracta) emittunt parvas nigrantes, & sine cruribus penisque reptantes. Mori matres cum pepererint certum est, vermiculo statim circa fauces enascente, qui eas strangulat. Eodem tempore & mares, dissipato per validam Venerem calido, obeunt. Alii duplicem earum foetum, geminumque exitum tradunt. Vergiliarum exortu parere deinde ad canis ortum obire, & alias renasci. Est verò & alius eorum obitus. Gregatim sublata vento in mare aut stagna decidunt. Fortè hoc casu evenit, non (ut prisca existimare) madefactis nocturno humore alis.

Visu sunt hebetiores, quod durissimis sint, propter palpebrarum carentiam oculis. *Vox* earum ab occipiti proficisci videtur eo loco, ubi commissura scapularum. Ut Dalechampius legit: ut in textu est. *Eo loco in commissura scapularum quasi dentes habere existimantur; eosque inter se terendo stridorem edere, circa duo æquinoctia maxime, sicut cicada circa solstitia.* Aristoteles *ἡδαιλός τ' ἰσέφω* facere scribit, per quæ alas & foemina innuere videtur. Alis edit observavit Casserius. Impositæ sibi invicem alæ moventur, quarum superior parte intima corpus habet subnigrum, durum, per transversum locatum: inferior ejusdem substantiæ corpusculum in extremitate oræ superioris parte externa, cui perbellum tympanum adjacet. *Veteres nec volare eas noctibus propter frigora tradiderunt, ignari, etiam longinqua maria ab ipsis transiri, continuata plurium dierum, (quod maxime mireremur,) fame.* Sed hic volatus divinæ præceptionis figium potius est, Alias non tam volant: quàm saliant, iterumque pennis deficientibus cadunt interram. Dum se in aërem attollere conantur, cruribus primum se impellentes subvolant, postmodum alis evaginatiss evolant. Altius sese efferunt, æstu urente. Militari ordine uti quibusdam exemplis firmatum est. *Tam frivola ratione morientes, serpentem cum libuit, necant singula, faucibus ejus apprehensis mordicus.* Vidit id & Majoli olitor. Graculi adversu volatu earum exitio occurrunt. Idèò à Lemni incolis colebantur. Idem Galeritæ & Ibides faciunt. In Argo cum scorpione congrédiuntur, inde Scorpionem machi dicti, & aculeo exarmatum, interficiunt, & devorant.

Pestem famem & bella portendunt. Illam infecto à mortuis & putrescentibus aëre. Hanc, absumptis fatis, & quicquid fructuum arbor ferre potuit. Ista, cum militari quasi ordine procedunt. Cum Anno 1543. stupendis agminibus per Illyricum in Italiam convolarent, Turca Rhegium occupavit, Ostiæ subfedit, Nicæam cepit, & multa Christianorum millia, cum sexcentorum millium ducatorum præda abdu-

xit. Idem tumultuantibus Cosaccis & rusticis nuper in Polonia factum, & quod mireris, eo usque lymphaticam illam nebulonum colluviem pervenisse, observatum, quousque locustæ, quæ præcesserunt, delatae.

Variis tantæ pesti remediis, conata est occurrere humana industria. Nonnulli cucumeribus sylvestribus & lupinis amarissimis in muria servefactis eas conspergunt. Quidam vespertilioes ex sublimibus arboribus suspendunt. Nonnulli captas exurunt. Odore illius fumi vertigine corripuntur. In Chuerch Scytharum Catagorum civitate, lacus cujusdam præsentia eas arcet. Mediolanensis præfectus Anno 1542. constituto in collectas præmio, brevi tempore duodecem millē saccos implevit.

Manè colligi debent, dum torpidæ sunt: collectæ terrâ obrui, ne ex occisarum ovium novæ prodeant. Vites non attingent, si propè radicem tria sinapeos grana consiveris, si Geoponicorum auctori credendum. Aristoteles odorem cornu cervi, sulfuris, aut styracis suffitum commendat. Arnoldus bovini aut vaccini stercoris, aut cornu sinistri fumum. Palladius fluviatiles vel marinos cancores fictili vasi cum aqua immisos, si tecti sub dio statuantur, ut decem diebus in Sole vaporentur. Quicquid ea aqua perfundetur, illæsum manebit. Magorum remedia apud Plinium vide; plura apud Moufeturum in Theatro Insector. p. 125.

In Cibis olim Æthiopibus Sillis, falsugine duratæ erant. Nec non Africanis, Syris, Persis, Arabibus, Mandis, & qui Lybiæ loca incolunt. Hodie in Orientali & Occidentali India comeduntur. Sed brevis eorum qui vescuntur vita. Quadragesimum ævi annum nullus supergreditur. Quin successu temporis dracunculi in pedibus exoriuntur: quos huic victui Mercurialis adscribit. Cibus & Johanni Baptistæ fuere. In Medicina quoque adhibentur. Suffitu stranguriæ maxime mulierum juvantur. Stercus pano confert, & morphææ: pedesque earum verrucas eradicant.

ARTICULUS II.

De Differentiis Locustarum Mouseti.

Tantum de Locustis in genere Differentiis ex Aldrovando & Moufeto dare visum est. Hic in *non alatas* & *alatas*: ille in *vulgares* & *rariores* distinguunt.

Alatarum vulgarium locustarum sex sunt *Majores* omnes virides, tam foeminae quam mares, quinque *Minores* multico-

Remedia
contra locustas.

Arist. H. A.
4. c. 8.

Pallad. R.
R. l. Tit. 35.

Plin. H. N.
37. c. 9.

Ufus.
Plin. H. N.
6. c. 28.

Mercur.
var. lect. 2.
c. 20.

Plin. H. N.
30. c. 14.

Moufet.
Theatri In-
sect. l. c. 16.

Plin. H. N.
11. c. 29.

Plin. l. c.

Theophr. de
animalib.
quæ colorem
mutant.

Animales
actiones.


Arist. H. A.
4. c. 9.

Plin. l. c.

Plin. l. c.

Majol. Col-
log. 10.
Plin. l. c.

Aristot. in
auscult.
mirabilib.



Locusta Asiae ac Indiae.

Tab. 4.



Mantes

Mantes

Locustæ Indicae . 1.

Grylli Mouset Gryllen.

Gryl. domest.

Gr. Campystris mas.

G. C. Fleming

Cicada Aquat

Gryllotalpa

Grylli

Aldrovandi .



lores. *Prima* Majorum cucullo veluti herbaceo, caput, collum, mediumque ferè corpus contegit: alæ à collo subtus oriuntur, virentes, parvis paucisque nigris maculis insignitæ, dorso item virenti, venter fuscus subjicitur, caulis extremo nigricante; magnum illi os, & dentes validi latique, ad fruges absumendas egregiè nati. *Secunda* huic similis videtur, sed epomis collo annectitur; nasus item & os ipsum magis rubescunt, punctaque in alis habet majora. *Tertia* viridis omnino vultus; crura albicant, cauda nigricat, alas maculosiores obtinet, & circa extremitates ex albo rubescentes.

Hæ autem *feminae* sunt, à quibus tres itidem mares hoc discrepant, quod vel extremâ caudâ vel supra caudam, duos tresve gestant aculeas, medioque item caputio magis rubent. *Prima* minorum species *Holtspecht* Tigurinis dicta, corpore nigro, externis alis maculosis, internis minio illitis conspicitur; crura absoletius fusca, lineisque nigerrimis fusque deque productis accuratè picta. *Secundæ* antennæ oculi tibiæque suave rubent; crura lineis item nigris variegata, alæ lentiginosæ; venter surdè rubens ex flavo, scitam nobis bestiolam & pulchram exhibent. *Tertia* ex nigro cinerea videtur, antennâs habens brevissimas, atque alas præter morem corpore longiores. *Quarta* undique absolute virescit, nisi quod caputium nigris duabus lineis ornatur, tibiæque postremæ vivida quadam rubedine resplendent. *Quinta* nonnihil minor cæteris, sed colorum situ, & varietate gratior. Corpus illi nec non facies & pedes Xerampelini; alis virentibus gestit, caputioque aurea quadam instita per medium ducta splendente. Omnibus istis minoribus alæ longitudine corpori æquales, vel longiores, nullum item caulem; nullum in cauda spiculum gestant, præstique & in pascuis (raro inter segetes) luxuriant, ut in Gallis nostraque patria Britannia sæpè vidimus.

Rariores tres tantummodo species vidimus, *Italicam*, *Græcam*, & *Africanam*. Illæ mantis dicuntur, vel quia suo adventu, (primæ enim omnium apparent) ver præfagiunt, ut Anacreon cecinit; vel famem prædicunt (ut Cælius & Scholiastes Theoc. annotarunt) Vel quia anteriores pedes veluti manus supplices semper tenent atque elatas, vatum more; qui eo gestu orationes ad Deos fundere solebant. Mantis *Italicæ* (cujus hic Iconem repræsentavi) mentionem facit *Rondeletius* libro de Piscibus ferè in hæc verba: Petrus habet longum tenue, cucullo tectum, caput simplex: oculos sanguineos, satis magnos, antennas breves, pedes sex, locustarum more, sed anteriores multo crassiores longioresque cæteris, quos quia junctos plerumque elevat, (precantium

ritu) à nostratibus Preque Dieu dici solet: totum corpus macilentum est. Tam divina censetur Bestiola, ut puero interroganti de via altero pede extento rectam monstret, atque raro vel nunquam fallat. Cauda illi bifurca, setaceis duobus aculeis prædita: atque ut manuum elevatione vates refert, ita etiam & motus similitudine, neque enim ludit ut alii, neque saltat, neque gestit; sed lentè obambulans modestiam retinet, & maturam quandam ostendit gravitatem. Hanc quamvis in agro Monspessulano sæpè se vidisse Pennius affirmet; tamen Iconem ejus ab ornatissimo Antonio Saraceno Genevensi Medico missam fuisse; in schedis memorat. *Alteram* Mantis speciem *ἀνθρῶπος* *Ἰταλῶν* Vienna misit Carolus Clusius è Græcia allatam, quæ magnitudine & formâ priori similis, alium tamen colorem ex naturæ locive dono accepit, habet enim cornicula saturatè lutea, hiacinthinum ocellum; alas ex luteo fatiscientes; corpus reliquum amethystinum, nisi quod tibiæ priores pilosioresque suffragines albescerent, & recurvæ digitorum chelæ nigrescerent. *Africanam* è Barbariâ nostris aliquot sumptibus accersivimus, gracilem, quinque uncias longam, cucullatam, capite pyramidalis, (ut Macrocephalum putares) è cuius penè vertice duo cornicula latiuscula, unciam ferè longa se erigunt, galorumque illum Turcicum, bipolumem (quali Janizarij utuntur) superbientem repræsentant. Paulò infra summitatem ejus oculus utrinque emergitis prominens, grandis, obscure rubens. Corpus illi oblongum, purpureo cruentum; cauda hirundinia, bifurca; alæ quatuor subcinereæ maculis quibusdam fuscis ornata. Priores quatuor pedes tibiæque pergraciles; posteriores robustæ lacertosæ, longæ, & ex maculis transversim per femora ductis subnigræ.

Atque hætenus de vulgaribus locustis aligeris, atque etiam rarioribus satis dictum sit: nisi fortè alias differentias adjicere necessarium mecum una existimaveritis. Nam *vulgarium* facies torvâ, oblonga, rugosa, velut squamis munita, quæ os ferè contegunt: dentes illis supernâ parte affixi, lati nigricantes, durissimi, quibus aristas facile mandunt, maximoque cum stridore fortiter coherunt. *Græca* vero & *Africana* locusta breviori apparet vultu, dentibusque adeo est languidis, ut molissimum tantum graminâ & summitates herbæ depascit. Vulgaribus antennæ longæ admodum; Manti verò perbreves: thorax illis durus, cartilaginofus, validus; huic ferè nullus, inanis, languidus. Illis item alvus mollis, longa acuminata: his contra, durior, plena & torosa. Utrisque quatuor alæ membranæ quasi ex nervorum filis contextæ; nam licet interna compli-

plicata duplex videtur, ubi tamen extenditur simplex apparet. Id quod Jodoco Willichio fraudi fuit, dum oculorum errore lapsus, sex locustis alas imprudentius adscriberet. Jucundum sane fuerit in nonnullis utriusque generis locustis animadvertere quorundam femora sexangularia, affabre in suis areis levigata, plexuque retiformi artificiose picta. Vulgares locustæ oculos habent magnas & prominentes: unde ἀφελαιοφθαλμοὶ nomen Ebulocuidam inditum ab Athenæo libro. 10. cap. ult.

Non alata locustæ sunt *Bruchus Attelabus* atque *Asellus*. *Bruchos* τὰ πρὸς βρούκην, mordendo seu vorando nomen inditum. Quatuor eorum species: Maris prima, tres reliquæ foeminarum. Mas collare gestat subcruentum, sub quo duplex pendet cucullus leviter ex flavo virens, dorsum ad caudam usque sex porraceæ laminæ transversim ad latera ductæ adornant. Ventris (qui satis magnus) caudæque tres illi parvi aculei ad recens natæ herbæ colorem accedunt flavo viridem, veluti etiam & femora, facies atque antennæ; sed tibiæ rubidæ videntur. Prima foeminarum æruginosa est, absque lineâ esset *Xerampelina* à caputio ad caulem per dorsum ducta: caret item aculeo in caule nascente; videtur etiam plicis vel potius quasi orbibus 10. viridibus circumcincta. Secunda ferè omnino spadicea atque fusca; ventre tamen parum flavescit; aculeumque geminum gerit principio caulis infixum. Tertiæ vultus, caput porcinum vel vitulum marinum refert: antennarum loco barbellam quasi juxta nasum utrinque sitam obtinet; duo in suprema fronte tubercula, urfi veluti aures repræsentant; duosque in caule habet aculeos; fusci, (ut totum corpus) coloris neque parum acutos.

Attelabus τὰ ἀπὸ τοῦ ἀττεῖν, quod tam minutis pennis conspiciantur, ut carere alis credantur, dicitur. Hefychius parvam locustam, Plinius è minimarum genere vocavit. Omnia quasi in pollinem atterit. In arvis cessantibus parit, & postquam peperit, moritur. Ova autumnalibus aquis intereunt, cum nimis increvere, ac sicco autumno largior proventus.

Asello, qui ἀπὸ τοῦ ἀσέλλου, tarditas nomen imposuit. Sine alis est, crassioribus, sed præter aliarum morem brevibus cruribus ventre propendulo. Ἀσέλλου forte Scripturæ, μάστιξ & σιγόρον Nicandro: quamvis Ambraciatarum dialecto omnes μάστιγες dicantur, quod frumentum cum stridore mandant.

Quas Judæis licitum comedere quatuor erant, *Arbeth*, *Salaam*, *Chargol*, & *Chogab*. *Arbeth* Chaldæi *Gebah*, Græci ἀνελαιοφθαλμοὶ vocant. A foecunditate nomen forti-

ta est. *Salaam*, Chaldæis est *Chargola*. LXX. ἀφελαιός, Hieronymo *Scarabeus*, Kimchi species locustæ *Raschon* dicta, *Abenezra Salaam*, quod infideat faxis Quatuor prioribus pedibus graditur; duobus posterioribus qui longiores salit. *Chargol* LXX. ὀφιομαχόν dixere. Pugnatum enim cum serpente, quod Nipho incredibile. *Hagab* vel *Chagab*, Hieronymus ἀφελαιόν vocat. Nascitur in terra frugum foecunda ex ovis quæ parens deposuit. Caulem etiam ipsum confringit. Habentur in scripturis & aliæ, nempe *Gazam* à tondendo, *Jelak* à lambendo, *Chafil* à perdendo, *Telatsal* à rubigine, & *Chenamal*, à manendo, quod stationem non deserat, dictæ. Quæ verò formâ fuerit μάστιξ Suidæ, μάστιγος Cælii, μάστιγος Nicandri, βρέθαννα, ἀχνη, πέλις, ἀρπας, θολακροῦς Hefychii, πέρρο Aristophanis, μάστιξ Eustathii, ἀλγὶς & πύαλις Phavorini, *Ludolochra* Isidori, ignoratur.

Joel. 1.
Amos 4.

ARTICULUS III.

De Locustis *Aldrovandinis*.

Aldrovandus quatuor diversis tabulis Aldrov. de Insect. 4. c. 1. diversas Locustarum exhibuit species, inter quas Papiliones quosdam superius exhibitos invenies. In prima tabula, omnium maxima est quæ prima depingitur &c. usque latitudinem distensas est in-
tueri.

Secunda tabula duodecim habet locustarum diversas species &c. usque & poplitibus distinctis.

Tertia tabula tredecim habet locustas. *Prima &c.* usque nigro distin.

In *quarta tabula*, primus est *bruchus &c.* usque Postrema tota purpurea.

Est & Locustæ genus apud Indos quod *Tenamaznanapaloa* nomen meruit à lapillis pedibus appredendis, quæ est ejus natura. Cornua fert tenuia longa, à seipso triploprolixiora. Crustatum animal, ternis utrinque pedibus, longisque, sed qui sensim procedentes versus caudam fiant breviores. Innoxium est.

Nieremb.
H. E. 13.
c. 23.


CAPUT II.

De Gryllo, & Gryllo talpa Moufeti.

Locustæ Gryllum, quod cum ea in Nomen multis conveniat, subjungimus. Quidam à clamore arguto nomen accepisse putant, qui gryllismus vocatur: alii γρύλλον Græcis vocari, seu nullo authore: Junio est ἀχέτη, sed perperam. Freigio γρύλλος, ani-

Locustæ


Indicæ



Heimischen

Grilli

Grillen



Grillotalpa



animalculum impenne, quod Gryllus non est.

Differentia. Sunt *Campeſtres* & *Domestici*. Hi nocturno ſtridore vocales aridam terram inter focos & furnos excavant. Sunt partim *mares*, partim *feminae*. Fuscum illi totum ferè corpus, & oblongum; dorſum ex fuſco varium magis nigricat: quod juxta mediorum pedum exortum, duæ lineæ tranſverſæ, nivis inſtar albicantes adornant. Caput orbiculare. Oculi nigri, antennæ in omnes partes mobiles. Cauda bifurcata. Non videntur os habere, ſi Alberto credimus: ſed invenitur in capite ejus, (verba ſunt Alberti) longum membrum linguæ ſimile, & naſcitur ſuper anteriorem capitis iplius partem, & pars illa non eſt fiſſa, ſicut ſinduntur ova animalium. Julio & Auguſto, undosè volant, nunc aliſ expaſſis aſcendendo, nunc deſcendendo conſtrictis.

Albert. 4.
cap. 7. apud
Mouſetum.

Scalig. in
Ariſtot. de
plantis.

Femina major eſt, alvo longiore, aliſ quatuor; quarum externæ breviores, internæ arctiores ſimul & longiores. Saltant celeriter. Liquore & ſanie carniſum veſcuntur, & ſpumam juris zythique avidè liguriunt. Nulla tamen in ventribus eorum ſuperfluitas. Delectantur cantu homines; ideò Feſſæ in Africa caveis ferreis habentur & magno venduntur. Ad ſomnum induendum & Scaliger in pyxide ſervabat: quam ſi cribro crebrius pertuſam reddidiſſet, tertio poſt die non mortuos, ſed diu ſuperſtites inveniret. Mouſetus, ſubdito pabulo marem & ſœminam ſervabat: octavo poſt die marem ſœminæ latus eroſiſſe comperit, qui etiam biduo poſt exſpiravit. Vix ſeciſſi ab aère vivere poſſunt, quia præter vocem & aërem nihil continent. Aquam vitriolo tinctam ſi in vitrum immiſeris, fugabis. Diſcum aqua plenum, cum farina avenacea cinctum, ſi appoſueris, inſilient. Adauxere & ſylvam medicam. Purulentis auribus cum terra ſua effoſſus, prodeſt. Manibus contritus ſacro igni medetur. Curat allegatus parotides. In cinerem redactus, cum oleo, putrida ulcera. Aqua dilutus, calculum & dyſuriam. Alligatus, faucium dolores, ſi Marcello fides. In collo ſuſpenſus, quartanam. De ſtridore in ſequentibus.

Mouſet. de
Inſect. 1.
c. 17.

Campeſtrium alii quoque ſunt *Mares*, alii *Feminae*. *Mari* corpus oblongius quàm Cicadæ, color nigricans, caput magnum, oculi exerti, frons antennata. Antennæ articulis carent. Sex pedum poſtremi longiſſimi ad ſaltum vegetiorem. Alæ inſculptæ & incurvæ totum corpus tegunt cauda bifurca. *Femina* minor, ventricoſa, viridis, oculis herbaceis, antennis rubentibus, cauda tridentis æmula. Per æſtatem in campis, terra excavata nidificant: hyeme leniore latitant: per graviorem pereunt. Omnibus commune antrorſum & retrorſum

incedere. Alarum attritu ſonum edere, credidit Plinius: per duo obſtreptentia corpora, quæ motu & agitatione alarum percuterentur, Caſſorius: alvi parte cava, Scaliger: dentium collisione Sabinus Garretus Pharmacopæus aliſ avulſis, eundem ſonum imitando aſſecutus eſt. Albertus, ſi medius dividatur, diu adhuc vivere ſcripſit. Veſcuntur panico, maturo frumento & pomis. Loca umbroſa negligunt, prata ſequuntur. Avidius ſtrident magis à nobis diſſiti: proximi ſilent. Formica capillo circumligata & in antrum conjeſta, eſſato primo ne ſe recondat pulvere, capiuntur. Ramulo cavernæ aliquoties inſerto & extracto erumpunt, quaſi quæſituri, quis foribus injuriam faciat.

Scalig. E.
erc. 273.

Albert. 4.
cap. 7. apud
Mouſet.

P'in. H. N.
29. c. ult.

Ad Gryllos Mouſetus *beſtiolam quandam alatam*, Tryxalida & cicadam *Rondeletii aquaticam*, refert. De illa ita ſcribit. Reſtat adhuc *una beſtiola alata*, quam an ad cicadas an ad locuſtarum claſſem referam plane ignoro. Quæ enim catervatim volat ac ſegetes erodit, locuſta videtur; forma tamen ad cicadam proxime accedit. Mira ſanè hujus beſtiolæ, & quaſi infantis facies. Caput galero triangulari tegitur, in cujus ſuperiore parte, quatuor ſunt maculæ nigræ, duæ oblongæ, & alia duæ fere orbiculatæ, inter quas, duo etiam miniſſima puncta nigra obſervabis. Alas habet quatuor, quarum internæ duplicantur, quieſcit, ita ut *ἐξ ὀφθαλμοῦ* videatur. Atque hi fortè erant illæ locuſtæ, de quibus Cuſpinianus è Sigeberto ſic ſcripſit: Menſe Auguſto, Anno 874. immenſa locuſtarum vis ſenis alarum remigiis volitabat ab oriente, & cum ſenis pedibus & cæteris à quibus tota ferè Gallia devaſtata eſt. Dixeris primò aſpectu caputium ſcapulas ornare, ſed propius intuenti, partes ſunt ſuperiorum alarum veluti ſemicirculo incluſæ. Totum corpus valdè craſſum, nigro fuſcoque eſt colore: poſteriorum alarum partes infinitis nigris maculis notantur. Petrus Quickelbergius Antverpianus hanc ex Africa portatam ad Pennium tranſmiſit, quam nos etiam nunc examinem in theſauro *ἐν τῷ μουσαιο* ſervamus, & cicadaſtram nominamus.

De Tryxalide habet iſta. Non minus in Tryxalide hæremus. A rodendo nomen fortè obtinuit: verum ut vel tryxalides Bruchos eſſe cenſeam, vel olerum locuſtellas, vel cicadas, vel Gryllos, nequeo quidem induci: Non ſolum quia Athenæus, Plinius, alique eo ipſo Philoſophi ſibi non conſtant; verum etiam, vel quod forma, vel natura longè diſcrepent. Et quare obſecro *τρυξάλῃς* à *τρυξάω*, id eſt, ſtridor, non male non direvetur? quòd ſi verum ſit, ſanè Gryllis maxime conveniet, quas tum a-

aliàs tum per stridorem à Blattis Peucerus meritò distinguit: id quod Joachimus nos-
ter Camerarius (magni illius filius, & vir-
tutum ex asse hæres) primus notavit. Plin-
ius ex his viginti torrerì jubet ac bibi è
mulla contra orthopnoeas atque hæmoptoi-
cam passionem. Cinis illitus cum melle
margines duros ulcerum complanat, & mu-
lierum purgationes retentas præclare ad-
juvat.

Moufet. l. c.
Rond. de pis-
cib. aquat.
c. 38.

Cicadae Rondeletii aquaticæ caput pen-
tangulum imitatur. Oculi exerti atque glo-
bosi, non magni & nigri: antennæ ore extimo
erumpunt perbreves; pedes utrinq; ternos
habet, postgemos longissimos: in dorso vel
alas, vel earum rudimenta gerit. Cauda il-
li bifurca, venter sæpe veluti incisus; cor-
poris color subfuscus vel potius ex albo ni-
gricans. In aquis limosis stagnantibusque
reperi, sed naturam ejus nondum habeo
perceptam: hoc à terrestri differt cicada,
tum quod capite sit magis exerto, & cer-
vicis aliquid habere videatur; tum quod a-
las habeat inutiles ad volandum, licet ad
fui correctionem non ineptas. Hæc in fo-
liis nymphææ, potamogeti, aliarumque a-
quaticarum herbarum insidens, jucundum
quid (more Cicadarum terrestrium) strid-
dere dicitur: sed à nobis hæcenus non est
audita.

De suo *Gryllotalpa* hæc habet Moufetus.
Bestiolam quam expressimus, Cordi *Sphon-*
dylis, Dodonæi vera *Buprestis* est: perpe-
ram uterq; nominant & nullo jure. *Sphon-*
dylis enim alas non habet, hoc insectum vi-
des alatum. *Buprestis* Cantharidi similis a-
pud omnes dicitur; hoc verò animal nec fi-
gura, nec colore, nec magnitudine quic-
quam eo accedit: ut taceam elytrorum hic
absentiam, quibus cantharides carere ne-
mo sanus contenderit. *Gryllum* dicimus,
quia eundem cum Gryllo stridorem nocte
appetente facit. *Talpam* quia terram con-
tinuo fodit. Insectum visu horrendum ac
monstruosum, quadruplo maximam supe-
rans Cantharidem: præcipuè ætate si fuerit
provectiore. Formam ob oculos habetis:
ego colores addam. *Fæmina* levius, *Mas*
saturatè fuscus. Illi præter duas longas an-
tennas fibulæ quatuor, quasi è naribus la-
biisque propendent: oculos item habet ma-
jores, & alarum radix miniata macula or-
natur. *Mas* verò fibulis illis nudus, earum
loco fetas duas fibulis duplo longiores obti-
nuit; concolor sibi undique videtur, & sine
macula. Utriusque unguis coracini sunt.
Anterioribus pedibus robustis admodum,
& variis tumulos perfodit uterque & cuni-
culos agit: mediis insitit; ultimis quando
opus est, saltat. Cauda illis bifurca; alæ
corpore longiores membranæ; corpus in-
cisuris variis insignitum. Juniores fere toti
nigricant, adultiore implumati videntur.
Sub terra palustri & humida maximam æ-

tatis partem vivit, noctu tamen egreditur.
Tardigradum valdè est animal, volatusque
ejus saltum refert: unde in locustarum nu-
merum à nonnullis ponitur. Sole occiduo
primum prodit, Gryllorum more, suaque
cantilena, sonora quidem satis, & supra
mille passus stridente sibi applaudit; quam
ubi audiunt agricolæ, oppidò exhilaran-
tur: ac si ejus adventu terram humore gra-
vidam, & calore solis veluti maturatam
scirent. Grana tritici, hordei & avenæ col-
ligit, ac in cavernam asportat, inde fortè
hyeme victurus. Quidam stercoribus eum
equinis vesci affirmant.

CAPUT III.

De Scarabæis.

ARTICULUS I.

De Scarabæis in genere.

UNde huic animalculo Scarabæi sit in-
ditum nomen, vix ausim dicere.

A Cabo seu Caballo, quod ex ejus fimo
prodeat, dici ineptum esse certò scio. Græ-
ci *κατὰ γένον*, Tyrrheni *βύρρον* vocant.

In eorum Descriptione nihil ferè in ge-
nere occurrit. Duas alas habent, teneras
illas & valdè fragiles: ideo superveniente
crusta inclusas tutelæ gratia gerunt, ne à
durioribus corporibus offendantur. Qua-
tuor habere perperam Albertus dixit. A-
culeo destituuntur, & omnes senectam de-
ponunt.

Ubique ferè degunt, in Asia, Africa,
Europa & America. In monte Ætna feli-
cissima eorum progenies. In Thracia jux-
ta Olynthum locus est parvus, in quo, cæ-
teris animalibus illæsis, soli exanimantur.
Ob hoc *Cantharoletrus* dicitur. Cornuti
mensè Julio & Augusto frequentissimi in a-
gro Neapolitano visuntur.

Diversos cibos pro varietate sua appe-
tunt: Sunt qui ligno arido; sunt & qui fru-
mento & panibus vescuntur. Vivunt ex
jumentorum excrementis. Ideò apud A-
ristophanem servus quidam Cantharo fæ-
ces humanas apponit.

Eriphiam quandam herbam prodidere
veteres, Scarabæum in avena habentem,
sursum deorsumq; decurrentem, cum sono
hædi, unde & nomen accepit.

De *Ortu* variæ sunt inter authores sen-
tentia. Isidorus ex putridis equorum car-
nibus nasci putat. Plinius ex asini, quidam
ex muli. Aristoteles, Cantharos in fimo
quem volunt per hyemem condi, vermes
parere, ex iisque procreari. Nonnullis vi-
sum

Moufet. In-
sect. l. I. c.
24.

Nomen.
Aldrov. de
Insl. l. 4. c. 3.


Descriptio

Plin. H. N.
l. II. c. 28.

Locus.

Victus.

Generatio.



Tab. 7.

Tab. 6.

Tab. 5.

Tab. 3. et. 4.

Tab. 2.



Aldrov. de Inf. l. 4. c. 3. sum foemineo sexu destitui nec coire: quod tamen in Carabis falsum esse, Aldrovandus observavit. Variare ortum pro specierum diversitate ego putarem, idque in Differentiis patebit.

Natura. Tanto stridore volant, ut per eos Deorum cum hominibus fieri colloquia Laërtius dixerit. Quia *καρβουίς* delectantur: ideo rosam averfantur, & odoratis illiniti exahimantur. Hemerocallis Dioscoridis quoque à quibusdam *αντικάρβου* vocatur. Tacti, immobiles redduntur & indurefcunt. Solis & Lunæ coitum pillularii ostendunt, ut postea dicemus, ubi & de vindicta quam de Aquila fumere solent, agetur.

Vitus. Differentiæ. De *Uso* in genere nihil occurrit. *Differentias* ex Moufeto & Aldrovando fumemus.

ARTICULUS II.

De Scarabaeorum apud Moufetum Differentiis, & primò de Majoribus Cornutis.

Moufet. de Inf. l. 1. c. 21. Gregiè Scarabæos in sua genera dispescit Moufetus. Sunt alii Majores, qui vel *cornuti*, ut *πλαγίονερως*, *αίγίονερως*, *βένερως*, *ρίνιονερως*, *κερίονερως*; vel non *cornuti*.

Plin. H. N. l. 11. c. 28. Cornutorum primus & præcipuus est *πλαγίονερως*, qui cervina cornua imitatur. Nigidio dicitur *Lucanus* apud Plinium; aliis taurus: nonnullis Cervus volans. Hesychio *ἀκρωθ*, quia cornubus spinosis obvia comprehendit; Comico & Eustathio à magnitudine *ἰπποκάρβου*, Cardano *καρχελαφ*; Gazæ *καρχεβ*. Quatuor ipsius occurrunt genera. *Primus* foemina, Lonicerus Marem facit, sed mares inter insecta minores sunt. Colore ex obscuro, verba sunt Moufeti, spadiceo nigricat præcipuè circa elytra & pectus. Cornua illi duo integra, sine articulis, ramosa cervi instar minimi digiti longitudinis in adultioribus, in minoribus minora ac breviora, vel (ut Plinius loquitur) prælonga cornua & mobilia obtinet, bifulcis dentata forcipibus, cum libuerit ad morsum vel compressionem coeuntia: stringit enim mirum in modum, atque cornubus utitur eum in finem, in quem chelis cancri atque astaci: oculi duri prominentes, albiduli, juxta quos utrinque antennas habet, una in radice inter cornua & oculos racemiferos; quarum articulus rectum ferè angulum facit; alteras vero media fronte erumpentes, rectas atque planas, in tuberculum leve desinentes. Pedibus incedit sex, prioribus reliquis longioribus atque majoribus.

Alter *mas* est, illi omninò, magnitudinem si excipias, tum corpore tum cornibus similis: quæ licet non ramantur, acrius ta-

men compressa pungunt digitum, quam foemina jam descripta.

Tertius priori triplo vel quadruplo minor, colore piceo, cornua admodum parva & bifulca; juxta quæ duæ antennæ plurimis articulis distinctæ oriuntur. Oculos habet prominulos, & pro corporis ratione magnos. Scapulæ utrinque in angulum acutum desinunt. Vescitur maximam partem succo tenaci atque pingui è quercu exudante, nec facile extra quercetâ conspicitur.

Capite præciso diu reliquæ corporis partes vivunt: caput reliquo corpore diutius. Lunæ sacer esse creditur. Cornua, inprimis quæ excedunt, infantum morbis ex collo suspensâ medentur. Strumis quoque & podagræ apposita conferunt. In oleo decoctis si arteria in brachio inungatur, febres apud Mizaldum tollunt. Oriuntur ex vermibus putrido ligno innatis: forte & ex stercore.

Αίγίονερως, dicitur & *καρχίονερως*, *κεράμυξ*, *κεράμυξ* *λ* Græcis; *Capricornus* Latinis. Magnitudine coloreque Platii, ceroten refert. Tredecem eorum genera occurrunt. *Primus* caput habet latiusculum, oculos bovinos & grandes, tres fere transversos digitos longos: os illi forcipatum, hians, aduncis duobus dentibus durissimis horrendum, quibus dum ligna rodit, (experti scribimus) argutulum porcellorum grunitum diserte exprimit. Hoc forte in causa fuit, cur eas arbori alligatas, culices ficarios abigere tradidit Hesychius. Scapulæ ejus curiosule à natura sculptæ, manubrium ebene factum & perpolitum oculis objiciunt. Pedes sex habet, tribus quoque geniculis distinctos: sed imbecilles admodum & languidos; tantoque oneri sustinendo longe impares. His ferunt auxilium cornua duo, supra oculos nascentia, toto corpore longiora, novem decemve articulis flexibilia, non exacte teretia, sed asperitatem capri imitantia; quæ licet in quamcunque partem movere possit, tamen dum volat, directe ea tantum protendit, atque volatu fessius pro pedibus utitur. Conficiunt quippe horum imbecillitatis, cornubus arboris ramulum circumplicat, atque ita pendulus quiescit, ut in agro Heidelbergensi vidit noster Bruerus; avèm paradisi eo referens; quæ pedibus destituta pendulis illis nervis ramos illaqueat, atque ita laboris satur quieti consulit.

Reliquos ita describit Moufetus. *Cerambyces* præter hunc memoratum varios vidimus, *unum* primo huic similem, sed magnitudine & colore varium: nam & paulo minor, & colore fuit ferè cinereo: Venter, crura, & cornua, dilute coerulea: scapulæ, cauda & elytra, nigris quibusdam maculis variegata. Cornuum quoque articuli nigricebant; postrema crura reliquis

longiora crescebant. Hos à Quickelbergio obtinimus Antverpiatransmissos. *Alterum* habemus extra viridem, supinè fuscum; caput, scapulæ, elytra obscure virentia, & auro itidem micantia: corpore est paulò porrectiore, priori similis videtur; sed paulò minor: cornua purpurea obtinet, crura pedesque Hyacinthinos. *Tertium* huic concolorem ipse primus Pennio dedi, nucem moschatam & cynamum vere spirantem. Verùm fragrantia illa dulcis (stacten contra non cara) cum vita in auras statim effluit, & cadavere exulans, sese in pyxidem (qua fuerit servatus) tota insinuat. Cardanus mentionem facit hujus Scarabæi: sed qui ante me invenerit neminem novi. Est quoque *alter* cum splendore nigricans, ventriosus, crassus, corpore, cornuque breviori reliquis. Cornuum junctura non sunt (ut in aliis) globosæ, sed utrinque leviter serratæ. Hunc Carolo Clusio Pennius se debere fatetur. *Quintus* capite, ore & dentibus primo omnino similis oculis nigerrimis, colore per totum corpus fusco, ore patulo dentato, capite, collo, & alis minutulis punctis nigris dense conspersus; corporis magnitudine ferè secundam æquat Cerambicem: rariùs conspicitur; in ædibus vivit, & lignis aridis. *Sexto* cinerascienti caput valde exiguum, oculi albiduli, cornua longiuscula, articulata, candescentibus maculis distincta elytris, imò toto fere corpore varius est; in ædibus item versatur, sed an etiam in lignis habitet, ignoro. *Septimum* ex Russia ab Edoardo Elmero allatum vidi, toto corpore infuscatum, juncturas habuit in cornubus globosæ, septem vel octo: facillè ex forma cognoscitur. Ab hoc *octavus* magnitudine, & forma parum abludit, nisi quod capite, scapulis & alis subcœruleis præditus videtur. *Nonum* misit ad Pennium Joachimus Camerarius (de literaria republ. optimè cum primis meritis) cui alæ pedesque arenosi erant coloris; caput, cornua, venterque subnigricabant: cornubus repandis videbatur, ex pluribus verticillis nodulisque compositis, quæ in utramvis partem nictu citius versabat. In plantis (& potissimum Cithyso) repitât. Hujus generis esse puto Scarabæum quam Joh. de Choul (lib. de var. querc. histor. c. 26.) ita describit. Degit in quercu animal de Scarabæorum tribu (quantum conjectura ducimur) colore rubricante, proceris cruribus geminos capite gerens aculeos, modice inflexos: quibus acerrimè stringit adversantia. Hanc bestiolam fabri lignarii quercus dolantes, in ipsis visceribus vivam invenerunt. Rustici Lugdunenses Thurro nominant. In laquearibus feliciter diutiusque vivit, seque hypocausta colentibus levi cum strepitu prodicens conspiciendum subinde præbet. *Eundem* vel illi similem quendam p. m. Gefner.

Epist. l. 3. ab anu pleuritim passâ dejectum fuisse testatur in hæc verba: Per alvum inquit à potione ex Oxymelite nostro cum decocto fœnugræci exhibita prodiit vetulæ pleuritide laboranti scarabæi genus nigrum, longis pedibus, longis item cornubus flexibilibus articulatisque, rudiplenum pure, vivum; longitudine duorum articulorum erant digiti. *Decimus* totus ex nigro purpurans, os forcipatum habet. *Undecimus* ubique atrescit. *Duodecimo* cornua minus articulata, caput scapulæque cyaneæ, reliquum corpus totum spadiceum videtur. Horum omnium in iconibus utcumque cornua aliàs directâ, aliàs curvata cernitis (explanationis gr.) tamen plerumque nonnisi (caprorum more) ad humeros reflexa gerunt, veluti primus Cerambyx.

Ad Carambyces spectat *Quici Brasiliensis*. Insectum est corpore ovali instar Scarabæi. Corporis longitudine unius & trientis digiti, Crura habet 6. quodlibet tribus internodiis constans, estque ultima pars crurum serrata, & quodlibet habet duos unguiculos. Caput & ocelli parvi: duo cornua propè oculos exorientia, longa, posterius versa & in arcum porrecta, duos & semis digitos longa, longè excedentia corporis longitudinem; & singula habent internodia decem, undecimo inferuntur in caput: crassitie æquant filum crassius. Caput & anterior sectio obscuri & brunni coloris cum splendido nigri mixti, posterior & alæ brunni obscure splendentis. Per medium autem alarum seu dorsum transversim lineâ lata flava pallescens tendit. Crura lutea, & ad internodia obscuro brunno maculata. Cornua diversicoloria luteo & nigro, nimirum ad genicula nigra, cætera alternatim lutea.

Βάκκρος seu πνεύκρος cornubus duobus tetrarum more exertis & directis cernitur. Ex spadiceo circumquaque nigricat, & ferè ἀνέπαλλο videtur. Capite est exiguo, brevibus crassisque scapulis immerso. Media fronte, spina peracuta exit. Defensionis à natura destinata videtur.

Nasicornium quatuor species vidit Moussetus. *Prima* omnium maxima atque rarissima apud Indos vivit, colore nigerrimo: nasum habet ad faciem rostri navalis cornutum & extra curvum, circa cujus umbilicum aliud cornu intus reflexum è tuberculo nascitur, quale etiam è scapulæ tumulo. Totum corpus ab ultimis cornubus ad caudam, longitudinem quatuor unciarum continet, latitudo ferè duarum est. Cantharorum lege fœminam non habet, sed ipse suæ sibi faber est formæ; foetum solo sibi genitum producit. *Secundam* Nasicornium speciem ratam atque pulcherrimam Mercurio sacram Carolus Clusius Viennæ depictam misit; in cujus agro frequens est. Forma illi, qua-

Mareg.
Hist. Bras.
l. 7. c. 8.

qualem vides, absque ventre saturate rubro fuisset, totus videretur piceus: narium cornu illud recurvum adeo acutum est, ut (quod de præliaturo barro fertur) aciem illi rupis tenacis affricatione addi putares. Tertius nasicornis & quartus pariformes pene videntur, nisi quod illi alæ longiores elytris excrescunt, huic verò breviores apparent. Splendente atramento perfusus diceretur, ulque adeo undiquaque nigricant.

Κερόνιος seu *Aries*, cornubus est nodosis hyacinthum æmulantibus capite ex auro viridante, scapulis miniatis, purpureo ventre, elytris capiti concoloribus pedibus, cruribusque spadiceis incedit, alæ vero vagina inclusæ albicantem arundinis membranam scite exprimunt.

ARTICULUS II.

De Scarabæis Majoribus non cornutis & minoribus omnibus.

MAjores Canthari *ἀνθερά* sive Excor-
nes plurimi sunt. *Pillularius* nempe *Melolonthes*, *Purpureus*, *Atratus*, *Arboreus*, & *Fullo*. *Pillulario* nomen quod ingentes pilas aversus pedibus voltitet. Dicitur & *Stercorarius* *Fimariusque*, tum quod ex fimo nascatur, tum quod illo gaudeat. Græcis est *σπερμός*, *ἡλιονκόβα* & à forma *αἰλαεμόρφος*, id est, felli-
formis. Stercoribus vaccar. ita delectatur, ut ad ea frequens & citus advolet. De ejus *Generatione* hoc habetur, pillulam è stercore ad cœli formam conficere, eamque ab ortu ad occasum tamdiu versare, donec ad mundi figuram perduxerit. Mox eandem subter sterco, ubi nidificat, ad mensem lunarem reponit. Hoc exacto sigillatim singulas ejectas aqua dissolvit. Sic prodit scarabæus impennis, sed qui paucos intra dies absolutus, in volucrem abire solet. Nulla ergo in genere eorum anima. Porphyrius, genituram in cœlum emittere, mox pillulas magnas posterioribus pedibus fingere ait. Apollini idè sacros Ægyptii voluere. Imò expresse Plinius. *Propter hunc*

Ægypti magna pars, Scarabæos inter numina colit, curiosa Apionis interpretatione, qua colligat Solis operum similitudinem huic animali esse, ad excusandos suæ gentis ritus. Per coitum quoque propagari observavit Aldrovandus. Vidit enim mense Majo vermiculos albos plusquam 42. horarum spacio, figura Curculionis prodire. Erucas esse opinatur parvas Bombycum modo progredientes, quæque intra 5. aut 6. horas fili tenuissimi folliculos, illosque candidos, Melopeponis seminis magnitudinis sine cortice texere cœperunt. Addit, fodere terram rutilos & prægrandes, fa-

vosque parvæ & fistulosæ spongiæ medicato melle fingere. Nidos ex lufosa valdeque fragili materia à Greg. Capucino eidem communicatos, in quorum uno mortuum Cantharum invenit, hic habet. Una pudendi est figura, unico canali constans. Parti infernæ duo veluti testes appenserant: singulis suus ductus, cum unico illo canali continuus: in hisce Scarabæi. Aliquando plures sunt hiteses, & figuræ oblongæ. Rosas averfantur. Hederae umbra gaudent. Hyemem vix ac ne vix sustinent. Solis calore excæcatis mori, tradidere quidam: plerumque à pediculis suffocantur, quibus undique scatent. Insculpuntur Smaragdo contra veneficia. Oleo rosar. cum terræ intestinis cocti, aurium doloribus medentur. Ex iisdem ad calculi dolorem pulverem Lanfrancus conficit. Ad hæmorrhoidas unguent. quod unguentum populeum, cum oleo rosaceo in quo Scarabæi cocti, aselli, & crocus ingrediuntur. Habet & Villanovanus contra spasmodum suum. Lethargicos excitabis, si duos vel tres sub mediæ juglandis cortice conclusos, occipitio bene rasò, musculis brachiorum anterioribus & plantis pedum alligaveris. Bene cecidit M. Johan. de Florentin hoc experimentum. Quartanariis medetur, si fulvo linteo vivus inclusus collo appendatur. Expertum se Trallianus scribit. Cheloniti de gemma aureis guttis insigni, cum Scarabæo in aquam ferventem missa tempestates ciere velle, insani esse puto. Huic similis est *Melanocyaneus*, cum illustri quodam splendore. Facie est felina. Augusto à pediculis intra crura hærentibus vexatur, & tandem interficitur. Ubique occurrit.

Melolonthen, Attici *Melonthen*, quidam *λεοντίδα* vocant. Nonnullis est *λεοντιδὸν* & *λεοντιδῶν*: quibusdam *Cantharis*; Aristophani *λεόντιον* *λεοντιδὸν* *καυτῆρος* *ομοῖς*; Eustath. *Vespa major*; Polluci, *anomalculum volucre*: rusticis Lombardicis & Gazæ Galenica; aliis *Scarabæus arboreus*. Hesych: eum coloris aurei facit: Aristophan. scholiastes flavi, recentiores Smaragdinum sed auro radiantem volunt. Idem & Plinius sentit. Mas undique viret, oculos si exceperis rubicundos. Elytra foemina castanei coloris, grato splendore micantia. Pectus utrique mucronatum. Stridulum edunt sonum. Generantur è vermibus fimi bovini aut jumentorum: si Aristoteli credimus: si Steph. ex Theophr. ex floribus pomor. Sunt ejus duæ præterea species. Priori quæ Clusii, caput, scapulæ & pedes nigricant, sed è cœruleo. Antennæ sunt cornæ, elytra striata, sed in circumferentia nonnihil rubent. Alter est Thilesii, totis præter oculos qui nigricant viridis. Venter ex auro parum rubescit. Medium dorsum luna elytris

Merzell. de Medic.

Plin. H. N. l. 30. c. 11.

Trallian. l. 12. c. 8. Plin. H. N. l. 37. c. 10.

Plin. H. N. l. 30. c. 20. & 29. c. 9.

Mouset. l. c.

concolor adornat. Ideò Equus Lunæ vocatur.

Parpereus Constantinopol. delatus fuit: Totus talis & violaceus erat, nisi oculi, venter & pedes, picem retulissent.

Atratus totus nigrescit. Os ipsi forcipatum; scapulæ fere quadratæ: tibiæ & antennæ breviusculæ: In lignis aridis habitat. Frequentius graditur quàm volat, & inter gressum, obmurmurat.

Arboreus obvius est, Julio imprimis & Augusto mensibus. Vaginæ alarum, puniceæ sunt, & tenuissimo polline conspersæ, leviterque splendent. Oculorum circulus, antennulæque parvæ flavescunt; junctura ventris albescunt. In Normandia tertio quoque anno sunt frequentiores. Anno. 1574. vigesimo quarto Febr. tot in Angelia in Sabrinam delapsi sunt, ut molidinorum rotas sisterent. Affinis huic est totus ex fasco albicans, glauco ventre & quodammodo canescente. Inservit anatum venationi. Grues quoque eo capiuntur, ut Gesnerus prodidit.

Scarabæus, quem Plinius *Fullonem* dixit, Gaza *καὶ φάεον* Aristotelis esse opinatus est; Scarabæum rubeum Plinius, animalculum cauda forcipata Junius, est Arboreo major, cervo volante foemina minor. Caput gerit corneum, antennulis duabus ornatum. Oculos, & pectus hirsutum, ex albo flavescentiâ; pedes anthracinos. *Venter* caudaque plumas referunt gruinosa. Scapulæ & elytra, albis nigrisque maculis variegantur, tam pulchre, ut vestem Damascenam, Phrygia acu intertextam jurares. Non ubique est obvius. Magi contra quartanam alligatum, commendant.

Tantum de majoribus cornutis & non cornutis sufficiat. *Minores* vel *maculati* sunt corpore; vel *immaculati*: illos *ἄχροχέες*, hos vero *μυροχέες* Græci appellant. *Maculæ* aliorum ex nigro albicant: alii *flavescunt*, alii *rubescunt*. *Albicantium* è nigro septem, flavescentium tredecim, Rubescentium duodecim; quos hic sua quemque classe donavimus. Immaculatorum color corporis idem deprehenditur: atque inter eos sex nigricantes, duos spadiceos, globosum unum ex cœrulo nigrum, alterum ex luteo vidimus. Quidam quoque nuperrime à nobis, inquit Moufetus, deprehensus est fūco puniceo, alter muricis succo inebriatus comparuit. Aurefcentes quinque habemus, parvulos illos quidem, sed clare micantēque auro undique suffusos, quos etiam ne invidisse nepotibus videamur, sculpi appin-gique curavimus.

†

ARTICULUS III.

De Scarabæis Aldrovandi.

Aldrovandus eosdem in *Cornutos*, & non *Cornutos* distinxit. Ex illis alii unum, alii duo, quidam tria cornua habent, & raro vident. *Διήγετος*, aut sunt *Lucani* sive Tauri, quorum cornua sunt dentata, ac forficum modo aperiuntur & clauduntur: aut *Carabi*, quorum cornua nodosa sunt, & ad prætendendum iter facta. Triginta & quinque utriusque generis sunt species; quas sex diversis tabulis exhibet. Exhibeo & ego omnes, ut si quid interjam enumeratos omisum est, adjiciatur, & comparatio inter utrumque melius institui possit.

Prima tabella septem continet, ex quibus primus è Caraborum videtur esse genere, quoad figuram corporis quam habet communem cum aliis Carabis, quamvis locum, quo nascatur, neutiquam observaverim. Toto corpore niger, antennis longiusculis parvis nodulis constantibus, longis in postica capitis parte sitis cornibus, seu potius appendicibus binis prope os nodosis, item crassioribus, quàm sunt antennæ, sed plus quàm media parte brevioribus; pedibus in extremo bifurcatis, asperis: caudam constituunt duæ appendices vaginalium, cum conjunguntur.

Secundus est Scarabæus aquaticus pronus & supinus. Aquaticum nuncupavi, quod præter reliquorum morem in aquis degat, inter majores sanè connumerandus: toto item corpore niger prone & supine exceptis capillamentis, quæ in pedum extremitate cernuntur, itemque antennis, nam hæ rubescunt.

Quartus è minimorum genere, pollicem enim latum longus, tortus quoque niger, capite parvo, trigono, minutis antennis, quarum extremitas obtusa, & veluti rotunda quadam pilula insignitur, pedibus bifidis in extremitate, paulò versus corpus habebat quasdam asperitates, seu appendices, quibus ingressu juvabatur, tanquam cirris polypus. In ea parte, qua vaginæ sese invicem in aliis contingere solent, evidens apparebat rimula, qua dilatata & aperta prodibant alæ subvirides, sed non-nihil ad castaneum vergentes: cum eas ad volandum expandit, toto corpore maxime splendet, alvoque robustissima.

Quintus est Scarabæus pilularius, seu Cantharus compacto latoque corpore & nigro, sed cœruleum splendente. Capite plano inferius, & superius nonnihil arcuato & lato cucurbitæ instar, ac multis eminentiis superius conspicuis, è quo ab utraque parte duæ prominent antennæ breviusculæ, sed in fine divise in plurima tenuia

Aldr. Hist. Inf. lib. 6. 3.

Plin. H. N. l. 30. c. 11.

Moufetus. de Inf. l. 6. 22.

Scarabæi ex Moufeto
Capricorni

Quicij

Scarab. Buceros Nasicornis 1

Scar. Xpioxepros

Sc. Melanocyaneq

Sc. Pilularius

Sc. Atratq 1

Thelafii

MeL Clufy

Fæmina

Sc. Melolonthes Mas.

Sc. Fullo

Sc. Ar. affinis

Sc. Arboreq

Sc. Atratq 2

Scarabæi Minores

Profc wiori fupine

Proscarabæi

Meijwurm


Meijkefer

Profc. Mas.

Profc. Knivetti

Fæmina

Prone





tenuia filamenta, pedes sunt antèrius fer-
rati in fine, ita à natura facti, ut illis, cum
continuo in stercore vitam transigat, ab-
stergere anteriores capitis partes facilius
posset. Crasso magnoque pectore, cujus
medio ab utroque latere pedes priores an-
nectuntur.

Sexto loco datur Scarabæus viridis Me-
loloatha Aristotelicorum quorundam sen-
tentia, quem inter volandum putant son-
nitum edere: corporis parte supina & alvi
maximè colore est obscure viridi, unde
nomen sortitus, capite parvo nigro ferè,
& ab utroque oris latere duobus cornibus
nodosis insignito, itemque dentibus, qui-
bus apprehendit valide, antennis longis,
æqualibus, in extremo paulatim in acu-
tum desinentibus, pectore autem rotun-
do, tenuiorique ligamento alvo latæ an-
nexo.

Ultimis ejusdem tabulæ nigro corpore
est, in quo maculæ virides, sed aliquid fla-
vedinis in se habentes, proceris cornibus
eisdem maculis conspersis, quæ versus po-
steriora flectuntur, eisdem quoque macu-
lis & ipsi pedes, præsertim eorum femo-
ra, alvo procera, quam non universam va-
ginæ contegunt.

In secunda tabula est Lucanus Nigidii,
Cervus volans Leoniceri, Scarabelaphus
Cardani, Taurus Scaligeri, aliqui Scarabæum
bicornem appellant; apud Thes-
salos *κεράμεινα* dici & *ζυλοφαγόν βῆν*, quasi
bovem ligni edacem autor est Antonius
Liberalis. Gallis dicuntur Cerfs volantes:
Turo Lugdunensibus rusticis fortè à Tau-
ro derivato nomine, Italisque cervo vo-
lante, Bucarone del corno, Gufano con
cuernos Hispanis. Ferrantes Imperatus cer-
vi volanti vocat. Belgis *Gen vliegende hert*.
Germanis em *Schröter* dicitur. Nigro est
toto corpore & maximo, huic duo cor-
nua prætenduntur ramosa seu dentata, qui-
bus cum constringuntur, validè apprehen-
dit: oculi utrinque à latere horum positi,
intra verò cornua duo parva cornicula ve-
luti antennæ; capite latiori quàm pecto-
re, sed minus longo; hujus & caput &
corpus reliquum à se invicem divisa diu-
tius vivunt.

Qui vero hunc ordinem consequitur, cæ-
tera priori similis, ut magnitudine tantum
differre videatur, qua dimidia parte mi-
nore est.

Sequuntur *duo alii* *μονόκεροι*, hoc est, u-
nico cornu in summo capitis, quos ab Æ-
gyptiis Mercurio dedicatos suprà memi-
nimus, corpore nigro, cui nonnihil ru-
bri admixtum sit, crasso magnoque capi-
te. Horum posterior hirsutus atque pilo-
sus est prona parte, horum species Rhin-
ocerotas appellat Ferrantes Imperatus ob
similitudinem cornuum, quam habent cum
Rhinocerote, animali quadrupede, tarde

volant, quò fit, ut ultrò fere in manum
ejus, quiprehendere voluerit, involent.

Quinto loco est Lucanus Papilioni simi-
lis, est enim versicolor toto corpore duos
digitos per transversum longo, cornibus
instar cervi dentatis nigris, quibus ab u-
traque parte posterius ante oculos promi-
nent antennæ tenues, longæ, ut ad late-
ra viam tendant factæ, nam ad latera u-
træque protruduntur, capite albis insigni-
to maculis, per quas rubor quidam ob-
scurus perfunditur, pectore angustiori,
quàm capite est, tribus albis maculis in me-
dio notato, alvo proluxa, crassa, longa,
ut Papilionibus quibusdam contingit, an-
nulis rubris, alis non universam alvum con-
tegentibus, sed multò brevioribus, &
ut puto, farinaceis. Nam, ut verum fatear,
id nunc me fugit, cum ejusmodi Insectum
inventu rarum existat, nec ejusdem descri-
ptionem exactam, quam olim feci, repe-
rire postea unquam potuerim; variis colo-
ribus hujus alæ exornantur, nam suprema
parte, qua superiori alvi parti contingunt,
vicinæque sunt pectori, rubicundam ma-
culam ingentem præbent cordis, quod
vulgò pictores depingere solent, compresso
mucroni seu cono similem; reliquum de-
inceps alatum corpus nigrum est, macu-
lis aliquot primum argenteis, deinde li-
neis latioribus obscure rubentibus, quæ
utræque aliquoties per vices iterantur, ita,
ut in hujus animalculi alis natura illuisse
pictores artemque eorum videatur.

Tertia tabula tota Caraborum plures
continet species, excepto primo, qui ad
Lucanorum genera potius pertinet, parvo
corpore, nigerrimoque cornibus incurvis
parvis sine dentibus ad eundem usum; ad
quem Lucanorum aliorum, his item an-
tennæ postponuntur singulis à latere, pe-
ctore modice crasso & crassiori, quam ca-
put est, alvo duplo longiori, ejusdem cra-
ssitie & latitudinis. Cervettino vulgò di-
citur.

Secundo loco datur Carabus inter minima
genera referendus; ejus caput, quod par-
vum est, itemque pectus, antennæ &
pedes nigra sunt: sunt autem antennæ lon-
gæ, nodosæ, vaginis rubris ab utraque
parte, quæ in medio maculam nigram gran-
dem habent. Porta terra vulgò Italis dicitur.

Huic ex ordine *secundo loco* succedit
Carabus, quem Aristotelis verum esse ar-
bitror, cum aliquoties in ligno is sit repertus
arido, è quo postea evolavit.

Tertius Carabus è ligno arido quoque
nascitur, ut vidimus, nodosis procerisque
cornibus, quæ nodis constant novem aut
decem grandioribus primum prope caput,
deinde minoribus, in quos singulos extre-
mitates tenuiores superiorum nodorum in-
feruntur ita, ut articulationes nodosæ ap-
pellari possent. Ultima autem articula-
tio

tio ex parte constat nodosa & absque nodis ita, ut ea; quæ nodis destituitur, tenuis in fine in nodosam partem inferatur, veluti in ultimis digitorum articulationibus facile est videre. Porro hæc cornua, quæ antennæ merito ab Aristotele nominantur (supplent enim earum usum) quandoque corpore multò breviora, quandoque longiora sunt, vidi quandoque duplo longiora ipso corpore; cæterum colore nigerrimo, ut totum corpus. Capite paulò minor, quàm pectore, quod inæquale est, venter omnium longissimus latissimusque, prona parte annulis quatuor aut quinque latis constans, in ventris fine, ubi alvus est, hirsutus, pedum extrema ferrata sunt & aspera, multis hirsutis particulis constantia, quarum ultima bifurca, seu bifida, & adunca in modum hami, quæ validissime cuique obviæ rei, velut lapidi, ligno, linteisque adhæret, ut vix inde tuto avelli subitò possit. Unde Portapeſo ab Insubribus dictus putatur. Nam etiamsi parvum sit animal, tamen quandoque sustinet, retinetque pondera sextuplo, aut amplius ipso animalculo longiora cum suis cornibus suspenditur, & in altum evehitur; hunc aliquando in pertusa pyxide conservavi vivum per aliquot hybernos menses, apponens lignum aridum & cariosum. Sed hybernis illis temporibus observare non potui, num eo vestatur, quod quidem verisimile est, cum duobus dentibus aduncis sit instructum, ut reliqua Scarabæorum genera, his enim se conjungentibus sectum alimentum ori ingeritur: universum autem corpus exceptis cornibus longum duos digitos, latum minus uno.

Qui descriptum sequitur ejusdem generis, differt autem corporis universi colore, qui fuscus est ad castaneum vergens, cornua sunt tenuiora, longioribus constantia internodiis, sed tenuioribus, pectore multò minus caput, in quo oculi sunt satis conspicui, siti in posteriore magis parte, nec ita distantes, & ad latera, ut in præcedenti, pectore quoque minore ventree longiori & nigra cauda insignito.

Succedunt duo alii sub eodem Caraborum genere referendi, minores, corpore nigerrimo: capite majori, quàm pectore, quod lineæ quadam fusca à pectore separatur, alvo seu ventre figura ferè ovali; qui totus vaginis binis cooperitur, secus quàm in prædictis, pedum extremitas non usque adeò aspera, ut cuique obviæ rei adhærere possit.

Ultimus est Carabus dubius: nam eæ antennæ, quæ in aliis nodosæ erant, in his veluti Papilionum sunt quorundam plumatæ, toto corpore nigro, capitis ac pectoris magnitudo fere eadem, sed in pectore ab utraque parte duæ appendices

videntur nodulis aliquot constantes, quæ, cum pedibus pectus duobus destituatur, secus ac in multis aliis pedum vicem supplere putantur; pedum utique constitutio differentia est notabili, nam secundus eorum articulus, atque tertius iisdem villis est, seu asperitatibus, & capillamentis, quibus sunt antennæ & descriptæ appendices pectoris; universi autem corporis ea est parvitate: quæ in icone cernitur.

Quarta tabula duos tantummodò continet, quorum primus ad Caraborum quoque genera referendus, ac præcedenti tabula quarto loco descripta congener, dorso multis punctis protuberantibus resperſo, alvoque caudata.

Secundus totus niger dentato capite absque cornibus nodosis; quorum loco duas antennas nigras æquales mediocriter longas habet.

Quinta tabulæ primus uvæ corrodit, toto corpore niger, exceptis pedibus, vaginis & antennis, quæ sunt colore castaneo, antennæ in extremitate multifidæ sunt veluti scopæ, vaginæ ad finem alvi non pertinent.

Alter ferè ejusdem generis caudatus, pectore & capite nigris viridè resplendentibus, vaginis non totam alvum circumdantibus colore castaneis, pedibus in extremitate magis rubentibus, item antennis eodem colore præditis, quæ cum in fine crassæ apparentur, ut fructus tenues & oblongi, æqualesque, parvo admodum pediculo capiti adnectuntur.

Insecta tria quæ subsequuntur, ad Cantharidum genera referuntur, quorum *primum* toto corpore nigrum exceptis vaginis, quæ miniacæ ferè totæ sunt. Nam lineæ nigra in principio latiuscula à medio vaginarum ambarum, qua parte sibi invicem contingunt, oritur & versus anum protenditur, finitque; antennæ sunt in eo longæ. *Secundum* capite, pectore, antennis, & duobus prioribus pedibus ferrugineo colore, reliquis membris colore nigris coeruleum fere splendentibus, seu plumbeis. *Tertium* & *ultimum* pedibus antennisque nigris, reliquis membris miniaceis.

Sexto loco ponitur Scarabæus vermis facie, toto corpore niger, duabus in ano appendicibus crassis, antennis proceris.

Septimus caudatus est, toto corpore ex cinereo ad castaneum vergente, pectore & vaginis aurum splendentibus, antennis tenuissimis, oculis conspicuis à latere capitis collocatis.

In Sexta tabula ordine primus ponitur Scarabæus fætidus dictus, quod tetrum haberet odorem, in campis repertus, Scarabæo pilulari magis, quàm alteri alicui insectorum similis, antennis est nigris geniculatis, in quarum extremitate duo sunt globuli seu pilæ, maculamque prope has ha-

habet ferruginei coloris, cæteræ partes omnes nigerrimæ, exceptis vaginis, in quarum suprema parte quatuor apparent maculæ ferrugineæ; pedes erant in fine maximè ferrati & asperi, cauda annulosa, quam extendere & retrahere poterat. Dum tangitur, stridet, curritque velociter. Notandum in hoc eodem animalculo in parte inferna circa os vermiculum, aut exiguum animalculum extitisse, quod utrum ei naturaliter insit, an verò per accidens, adhuc me profectò latet: nam tamdiu, quam apud me continui, semper apparuisse deprehendi.

Secundus & ille foetidus, totus niger, minor, antennis ferratis & absque pilulis, pedum extremitate aspera.

Tertius serpentarius à nobis nominatus, non quod serpentis figuram referat, sed quod in occisi serpentis corpore, cujus carne vescebatur, deprehensus sit, pilulario minor, angustiorque corpore, capite nigro depresso, antennis nigris, parvis, quarum apices flavescent, rostro bicorni, oculis emissitiis, pectore nigro scutiformi, vaginis quadrangularibus brevibus (non enim totam alvum cooperiunt) nigris, quarum utraque duas in medio habet fascias luteas paululum ferratas, alvo valdè annulosa & circa extremitatem valdè pilosa: pedibus omnibus ferratis, quorum tamen anteriores in extremo articulo reliquis erant latiores, ut manum quodammodo imitarentur, subrus verò flavescerent. Inter medios & posticos pedes colore est aureo, obversusque ea parte Soli splendorem emittebant: sed hunc colorem aureum pili quidam rufescentes efficere videbantur; In pectoris parte supina crucè erat notata, inter antennas macula obscurè lutescente & triangulari: pars ejus inferna multis pediculis scatebat.

Quartus è Pilulariorum fortè est genere: nam circa excrementa eum versantem deprehendi, brevi corpore & obeso, nigerrimo colore & relucenti capite rotundo, & instar scuti militaris efformato, è cujus medio cornicula duo exierit breviora cum apicibus, & alias duas appendices his multo exiliores: Pectore item scutiformi, quod tamen in anteriori parte appendicem quandam protensam & acuminatam, habet, ut tertium cornu referre videatur, vaginis striatis, pedibus in fine ferratis & asperis, anteriores horum minus asperis, posteriores magis; ad latera pilis quibusdam rufescentibus vestitus, ani figura medii scuti figuram exprimit.

Quintus niger, parvo capite, antennis longioribus, nec pedibus asperis. *Sextus* aquaticus minor dictus, quod in aquis degat, corpore est nigro, lucido, ad viridem quodammodo accedente, pectore ac ven-

tre lato, vaginis ventre majoribus, in medio ventre inter pedum exortum appendicem quandam habet, qua pedes à se invicem separari videantur.

Duo postremi minimi, dorso uterque variegato. Prior pectore scutiformi, ac capite rotundiusculo, duabus antennis exilibus insignito, dorso autem multis punctis seu granulis resperso, coloreque nigro. Posterior corpore magis rotundo & compacto, capiteque exiguo, antennis longioribus, dorso toto variegato, & colore magis nigro.

Postrema tabula primus è minimorum genere est, toto corpore nigerrimus, compactus, antennisque exiguis, vaginis universam alvum tegentibus.

Qui hunc ordine sequitur, major & corpore item nigro, magis oblongo, antennis longioribus, pedum extremitatibus minimè asperis, sed levibus & æqualibus, ut ad scandendum non usque adeo aptus videatur, nisi ejus parvitas has asperitudines cernere non sinat.

Tertius inter Scarabæos quoque à nobis relatus, quod cum eorum natura corporisque constitutione magis quam cum aliorum conveniat, capite parvo, cujus articuli cum dorso aurei sunt, cæteræ partes nigerrimæ.

Quartus corpore universo niger, capite rotundo parvo, antennis mediocribus, pectore triplo majori, vaginisque universum ventrem contegentibus.

Quintus è minimorum genere niger fere totus, præterquam in vaginis, in quibus aureus color, sed obscurè videtur; capite rotundo, & exiguis valdè antennis, nec facile conspicuis.

Sextus totus niger, capite serrato & magno, pedibus ferratis & asperis, in fine bifidis, vaginis brevibus, nec alvum totam contegentibus.

Septimo loco positus est Gryllus potius oblongo corpore, colore flavo, sed circum latera præsertim vaginarum nigris quibusdam maculis variegato, antennis rectis, longis & nigro atque flavo colore distinctis.

Octavus supine depictus, capite rotundo & exiguo nigro, antennis parvis & tenuibus nigris cum pectore, quod majus capite est, pedibus item nigris, inferna ventris parte seu prona rubra.

Nonus, totus niger & oblongus: capite minutissimo, antennis mediocribus acuminatis, pectore grandi, quod à ventre divisum longo interstitio & exiguo ligamento connexus: pedum ultimis articulis ferratis & asperis.

Decimus quoque niger excepto dorso, quod quodam argenteo splendore nitet, mixto scilicet cum nigro, capite est exiguo, exiguisque antennis, ventre paulatim versus inferiora gracile-

scence, pedum extremis particulis bifidis.

Ultimus & is exiguis antennis, totusque niger, minus gracili extrema parte alvi, inter minimos hic computandus.

B A P U T IV.

De Proscarabæo, & Scarabæis aquaticis.

Moufet. de
Inf. l. 1. c. 23.

QUEM Latini Proscarabæum dixerunt, illum Paracelsus *Meloen*, Agricola *pinguiculum*, Græci *σινιδυρα*, & *ελαυνιδυρα*, vocant. Germani Majalem Scarabæum appellant. Corpus ei molle, è cæruleo obsoleto, cum splendore nigricans. Scapulis alæ duæ, vel potius alarum rudimenta innascuntur, celeritatis in gressu adjumentum. Circuli, dorsi ventrisque fasciæ; viriduli in junioribus, in adultioribus, cærulei apparent. Agricola falsò quadrupedem facit: constat enim sex pedibus Wier. apud Clut. sic describit. Hic vermis, in capitis & colli circuitu colore purpuræ saturato aut violaceo annotatur, paulum scintillans, alæ delitescente viriditate tinctæ sunt; Sub alis atque in dorsi ambitu circuli videntur diverso colore imbuti, subinde viriditate micantes, subinde flavedine obscura distinctæ; venter atque pedes colore caput & collum repræsentant; in utroque latere ventris tres pedes continentur. Rostro autem incurvato aliis congeneribus & rostratis non absimiles. Ubi ætas tenerior est promiscuè cæruleo colore tinctiores censentur; excrescunt in duorum articulorum digiti longitudinem & unius crassitiem. Contritus fragrantiam fundit. Foliis violar. & graminis tenelli præcipue vescitur. Rarò extra Majum conspicitur. Reliquis anni temporibus vel latet vel semine pillulis incluso, obit. In ericetis colligitur: solet & ex fossa herbacea rorida erui. Coeunt aversis caudis, foemina, quæ major & oris forcipati, quæque levissimo tactu oleum fundit, trahente marem, qui minor, & quasi exsuccus, ut retro reptare cogatur. Wieri supinus, (*vermem Majalem* vocat) ad faciem humanam maxime accedit. Alas longiores reliquis gerit, & cingulis pluribus corpus ambientibus distinguitur. Quem Edmundus Knivetus vidit, parvus & exsuccus erat. Habent in *Medicina* usum. In Ditmarsia filo circa collum appenduntur. Ibidem in Epidemico capitis dolore tres efficati & in pulverem redacti, in Cerevisia propinantur: ad sudandum per novem dies. Sed solemnissimus in arthritide vago usus. Manibus eos tangere cum colliguntur, religio est. Numerus semper impar, prima vice unicus post ternos assumitur: quinque ad summum: in pulverem redacti in

Clut. de Ephem. p. 74.
Proscarabæus Wieri
supinus &
pronus, apud
Moufet. p. 163.

Clarius l. c.
p. 22.

cerevisia calida exhibentur. Maxima hinc primò ventris perturbatio, maximus & circa urinæ ductus dolor, ut cum morte conflictari videantur: hinc vomitus, cardialgia, ardor urinæ, & similia. Serum tandem copiosum prolucunt, & aliquando restituuntur. Paracels. in hydrope aquam ex dr. x. Meloum & sem. raph. unc. j. ab unc. ij. ad unc. iij. propinat. Destillati tumores oculorum tollunt. Pinguedo fissuras manuum sanat. Kegler. in oleo dulcissimo suffocatos, ad bubones & carbunculos commendat. Quid de *Scarabæo Culi*one Marcellus scribat, vide apud Moufetum.

Scarabæum Aquaticum Moufetus ita describit. Scarabæos aquaticos Græci *ιδεοκαυταπες* appellant. Horum omnium ventres spadice infecti, dorsoque carbone notata, præter Anglicanum. In cujus iconæ si limbum scapulis totoque corpore ovali circumcurrentem leviter infuscaveris, atque oculos argenteos feceris, non est quod amplius expetas ad illius descriptionem. Sex quilibet pedes obtinuit, posteriores longitudine latitudineque ceteros vincentes, quibus pro remis inter natandum utuntur. Sed elytris nigerrimis, membraneæ latent alæ argento tinctæ, quibus noctu aquis egressi, celeriter convolvant per aërem, quem interdum perarò (forte nunquam) diverberant. Omnium verò minimi sunt illi, qui irrequieto motu huc illuc in aquæ superficie multi nullo ordine transcurrunt, & q. colludunt, & aqua turbata vel se fundo immergunt, vel in riparum foraminibus abscondunt: Deinde verò mutis & tranquillis fluctibus iterum gestiunt. Christoph. Leustner. se Scarabæum in loco quodam invenisse scripsit ad Gesnerum, vaginaria (ut solent) crustula, cui quasi formicæ caput subluteum, atque alæ multæ erant affixæ; ventre inferiore pinne spargebantur, caudis astacorum similes: quibus (ceu in aquis remiges) divagabantur. Cauda prominebat pro sua munitione exigua, sed in longissimas setas divisa. Ex aqua palustri in fontanam coniectus paucis interjectis diebus vita excessit.

Moufet. de
Inf. l. 1. c. 23.

C A P U T V.

De Tauro volante Brasiliensi, & ei congeneri.

Tauri volantis, seu Scarabæi platycerotis quatuor sunt apud Brasilienses species, *Enena* incolæ vocant.

Maregr.
Hist. Bras.
l. 7. c. 2.

Totius corpore in primo longitudo plus duorum digitorum Rhyndandicorum, crassities autem fere quatuor. Totum corpus splendide nigrum, sed pilis flavescens opertum, ita ut flavescens vide-



Tambetua



Braf



Grün. Kefer
Spanische fliegen



Mas. lata.



Canthari. Mouf. Golt. Keffern
Maj. lata. Maj. lata.

Cantharide s. Maj.



Canth.

parva



Cantharides



Alderanti

Tab. 1



Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1

Tab. 1



Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2

Tab. 2



Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3

Tab. 3



Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4

Tab. 4



Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5

Tab. 5



Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6



Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7


Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7

Tab. 7



Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8

Tab. 8



Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9

Tab. 9



Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10

Tab. 10



Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11

Tab. 11



Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12


Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12

Tab. 12



Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13

Tab. 13



Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14


Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14

Tab. 14



Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15


Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15

Tab. 15



Tab. 16

Tab. 16



videatur. Sex habet pedes seu crura duos antèrè versus, duos ad latera fere extensos directè, & duos post se extensos, nigros omnes splendidosque & superius raris pilis præditos; in quolibet autem pede tres ungues, cum parvulo digito, qui quasi tertius unguis: suntque crura variis denticulis armata. Unius fere digiti intervallo à capitis initio (quod minimum) sectio est corporis. Capitale cornu habet magnum, & in extremo sectum, nigrum & splendidum, unum pene digitum longum: oculos nigros eminentes & propè illos duos cirrhos extensos, singulos tribus apicibus qui in extremitatibus sunt fuscis. Prima sectio corporis tricornis in summitate anteriori habens cornu protensum & paululum deorsum flexum, longitudinè dentis humani: & utrinque ad latera unum, ejusdem magnitudinis. Alæ ejusd. coloris cum tota corpore, pilosæ ac duræ. Posterior sectio corporis inferius multas habet divisuras. Prior sectio superne magis rufescit pilis, posterior autem magis flavescit.

Alter paulum diversus à priori est. In toto corpore superiori obscurè castanei seu nigricantis splendentis coloris, in infimo per totum castanei coloris splendidi. Totius corporis longitudo, duorum & semis digitorum crassities circiter quatuor. Corporis anterior sectio, unum digitum longa. Caput parvum: oculi nigri splendentes, non tamen prominuli, ut in priori: propè oculos duos habet cirrhos ut prior: proxime caput cornu erectum & paulum versus posteriora reflexum semidigitum longum, & ad latera in sectione anteriori superius versus utrumque cornu crassum erectum, paulo brevius & obtusius quam prius illud. Alas habet ut alter & corpus ita conformatum: Crura sex tribus juncturis, & tribus digitis, & uno minimo pro quarto: media crurum pars inter secundam & tertiam juncturam aculeis pyramidalibus munita; integra autem crura sunt hirsuta pilis castanei coloris, uti & circa os ac in sectione corporis.

Tertius, rarissimæ est conformationis. Magnitudo illi eadem cum prioribus; crasso & rotundo ventre: crura habet sex, singula duabus juncturis constantia: anteriora autem quinque processus acutos quasi digitos habent, quibus terram fodiendo citissimè sub eam se ingerunt. Alas habet duas striatas, & in prima sui corporis sectione eminentiam fellæ formem, & ante illam foveam s. cavitatem subrotundam, avellanæ majoris capacem, in qua magnus numerus foetuum vivorum visitur, coloris bruni & filamentis quibusdam in fovea annexorum, qui magnitudinem referebant semina papaveris, sed Megascopio quilibet inditus magnitudinem ostendebat pisi, eratque omnibus numeris absolutus &

cornutus ut parens. Caput semilunaris fere figuræ & compressum, cui cornu impositum, satis crassum & plus digito longum, erectum, sed in summitate paulum versus posteriora inclinatum. Pone cornu hujus exortum, in quolibet latere oculus grani milii magnitudine rotundus, niger, splendens. Totum autem corpus, crura & alæ sunt insignis splendentis coloris, ex nigro, viridi, & aureo mixti, estque totum subtilissimis pilis vestitum. Validissimus est, nam scatulæ crassæ à me inclusus ac latere cocto, crasso imposito, nihilominus se semper exferebat, ut funiculis fuerit coercend. Hirci pene odorem de se fundit.

Quartus. Crura habet sex, quatuor in posteriore, & duo anteriore sectione corporis: pedes desinunt in duo lunata cornicula: singulaque habent tenuius tenaculum. Anterior sectio digitum longa in cornua desinit duos & semis digitos longum, teres & paulum deorsum incurvatum, & duos habens veluti dentes versus posteriora. Inferius in antica parte corporis, sub exortu hujus cornu, jungitur caput, parvum quidem sed & cornu habens sursum incurvatum, duos fere digitos longum, cum processu tripartito in ipso acumine. Oculos habet rotundos, nigros, splendentes semin. canabini magnitudine, pone oculos autem duos processus coniformes, contortos, posterior sectio duos digitos est longa, atque alis crassis testæ, cum anterior sectio glabra & solida testa tegatur, quæ in cornu extenditur.

Tota autem anterior sectio cum cornibus capite & cruribus, atque inferiore ventre, nigri & splendentis est coloris, & superius seu longum cornu, versus inferiora, villosis pilis, obscure flavis sive luteis vestitur, ita ut ad tactum holosericum referatur: Junctura ad caput quoque villosa, crura autem & infimus venter brevioribus vestitur pilis obscurè flavis. Alæ exteriores constant testa colore fuctus olivarum cui obscurè flavum admixtum, & variegantur sparsim punctulis fuscis. Cornua illa duo magna conjungere potest & illis aliquid tenere.

Congener Tauri volantis Brasiliensis, corpus habet bissectum, cujus anterior pars tertiam partem digiti longa, posterior paulo plus duobus digitis. Caput habet quasi quadratum & duos forcipes exsertos pro dentibus, oculos magnos prominulos ellipticos: duos cirrhos ante oculos, in exortu latiusculos, hinc angustiores plus duobus digitis longos, novem juncturis constantes: crura sex, duo in anteriori sectione, quatuor in posteriori quodlibet duos digitos longum, tribus juncturis constantes, pedes latiusculos, & in extremitate duos ungues aduncos. Anterior sectio ad latera desinit in quatuor aculeos, testa nimium qua tegitur: posterior quatuor

*Mayg.
Hist. Bras.
l. 7. c. 10.*

habet alas tenues, duabus testaceis testas. Totum corpus superius obscure est flavescens, seu lignei coloris; caput, oculi, cirrhi, forcipes, crura, inferius corpus splendide nigra, & venter præterea cana lanugine obductus.

Maygr.
Hist. Bras.
l. 7. c. 8.

Hiscæ Colophonem imponat *Tambeiva*, insectum testudinem terrestrem non male referens, mediocris avellanæ magnitudine; alæ, nimirum exteriores duæ testaceæ, figura ut clypeus testudinis: anterior sectio corporis testa coloris splendidi quasi aurum viridi colore tinctum transplenderet: in ambitu autem testæ coloris est splendentis instar rubro tincti. Duo cornicula ad quodlibet latus oblique extensa. Crura habet sex nitentia ut aurum quod elegantissimo rubro transplendet. Corpus inferius ejusdem splendoris. Tarde incedit nec facile avolat.

Nieremb.
Hist. Nat.
Exot. l. 13.
c. 20.

Facit denique quorundam Scarabæorum Indicorum mentionem Nierembergii; quorum cornua darsa, & in aqua sumpta, venerem mirificè excitare ajunt.

CAPUT VI.

De Cantharide.

Nomen.

Nomen quod insectum istud apud Græcos habet, apud Latinos quoque obtinuit. Variegata *κατωιδες* dicitur, quod in modum testudinis compuncta, & variis maculis conspersa sit. Plinius omnes *parvos scarabæos* vocat.

Descriptio.

Descriptions in Differentiis adferemus. Qui *πικύλας* eas describunt, alii vespæ similem, sed corpore longiorem faciunt: alii vermem terrestrem, coloris viridis, auri colore superlucentem: nonnulli insectum oblongum parvum aurei coloris. Quidam denique animalculum parvum, varium, luteis lineis, quas in pennis transversas habet, promisso corpore, blattarum modo præpinguem.

Locus.

Occurrunt in Italia & aliis regionibus, in quibus frumentis, rosas, fraxinis, & oleastris infident. Nec tamen omnia ubique genera occurrunt. Nam in Belgio, & ultra ejus ad Septentrionalem plagam provincias, ea quæ in frumento inveniuntur, reperiri, Aldrovandus negat.

Aldr. Hist.
Inf. l. 4. c. 4.

Vitus.

Arborum foliis & fruticum quorundam floribus ut & frumento, victitant. Unde *καυτάριδος σπηράγος*, Nicander meminit. Noctu in unum diem congregant, & mutuis auxiliis, formicarum instar, conservantur. Die per totum locum volare Vincentius prodidit. Ex putrescente humido & sicco, oriuntur, seu humore foliis infidente, in summis fraxini ramis, ficubus, pyris, pinis, populis, & Cy-

Ellia. H. A.
l. 9. c. 39.

nacantha. Ex crucis illarum arborum gigni, Aristoteles prodidit; & Plinius expressè. Cantharides *nascuntur* ex vermiculo in spongia, maximè cynorhodi, quæ sit in caule, sed fecundissimè in fraxino: cæteræ in alba rosa. *Cocunt* tamen & quidem tardo motu; generantque vermiculum. Perit ficus, si in ea prodierint. *Olfætu* picem liquidam referunt, gustu Cedrum, ut Nicander prodidit. Calidissimæ sunt & siccissimæ. Ideo corpus adurant, erodunt, & exulcerant.

Generatio.

Theophr. de
Caus. plant.
l. 5. c. 13.

Inter venena reponuntur, periisseque illis assumptis, Cajum Carbonem, Pyrrhum, tertium ab eo qui cum Romanis bellum gessit, Cossinum item amicitia Neronis notum, proditur. Adde & Abbatem illum, cui scortillum, ut in amore detineret, condimentum pulvere cantharidum aspersum apposuerat; ut apud Paræum habetur. Catoni denique Uticensi obiectæ sunt, seu venenum vendidisset in auctione regia, quod eas sestertiis LX. addiderat. Largius si bibantur, vel diutius extra hæreant, dolorem in visceribus qui ab ore ad penem extenditur excitant; vesicam ulcerant; penem & vicinas ei partes inflamment: sanguinis & carnis mictum; sæpè diarrhæam, dysenteriam, syncopen, mentis alienationem etiam concitant. In ore sapor picis sentitur. In capite quidam & pedibus venenum hæreere judicant: negant alii. Variis malum impugnatur remediis. Lac humanum ab ubere sumptum, caprinum, bubulum, singulis horis exhibitum, clysteres ex jure pingui cum oleis emollientibus quos nitrum ex hydromelite non malè excipiet. Oleum liliorum, amygdalinum recens ex ovo forbili, Samium, cenanthinum, & quam Lycus Neapolitanus pro antidoto posuit, portulaca, vehementer laudantur: Oleum verò cydoniorum certissima hujus morbi Theriaca est. Nec frudari sua laude debent, acetum scilliticum, terra samia, lutum Armenium, quod vi emplastica erosionem prohibet. His quidam theriacam & Mithridatium, quæ tamen refrigerantibus & erosioni resistentibus doloremque levantibus castigari debent, adjiciunt. Nec vomitionum obliviscendum est. Ideo à Dioscoride imperantur.

Documen-
tum.
Cic. ad Pætum l. 9.
Epist.
Plin. H. N.
l. 9. c. 4.

Plin. H. N.
l. 29. c. 4.

Galen. l. de
Ther. ad Pisonem, de Tem.
l. 3. c. 3. Nicander, in Alekiphar.

Circumspectè in Medicina adhibeantur necesse est. Vesicæ enim ita sunt infestæ, ut quidam, manu duntaxat detentas, sanguineam urinam prolicere credant. Montagnana certe cum alteri genuum applicatæ fuissent, quinque sanguinis per urinam libras eduxisse scribit. Cautè agatur, si mensuræ, medicamenti, & ægri habitus fuerit ratio. Tria vel quatuor præbentur intus grana; exterius, majore copia opus est. Calidiores ægerimè ferunt; destituti viribus aut viscerum scirrhus affecti planè non.

Plin. H. N.
l. 20. c. 13.

Plin. H. N.
l. 23. c. 2. &
4. l. 28. c. 10.

Ufus.

non.

non. Ipsæ cantharides, abjectis alis, capite & cauda à quibusdam exhibentur, quod & Hippocrati in usu. Audax qui has partes abjecto corpore adhibuit Medicus, mortis in uno & altero hydropico causa erat. Nonnulli tamen totis utuntur, quod & Galenus fecit. Alæ reliquorum remedium. Unde *Plinius*. Alæ medentur, quibus demptis lethale est; nisi forte mutilatus sit locus. De cætero, ad urinam ciendam, lichenes tollendos, verrucas, faciei pustulas, scabiem, podagram, mensium suppressionem, sceminarum sterilitatem, uteri strangulatus, quartanam, &c. adhibentur. Scapulis vel brachio appositæ potenter urinam provocant. Excoriatorium lichienum Pamphili, quo Romæ usus est, dum mentagra morbus grassaretur, Cantharidas recipit. In quartana telæ aranearum involutæ de collo ægri suspenduntur. Reliqua in Aldrovando vide. Venerem excitare notorium est. In gravissima symptomata, & penis distentionem perpetuam incidunt, qui incautius propinatas hausere. Formulas passim apud Medicos invenies. Viperas si domi in vitreo vase alere volueris, cantharidibus ciba. Suffitu stercoris bubuli cum galbano, à frugibus depelluntur.

Mousetus in *maiores* & *exiguas* distinguit. *Majorum* alæ sunt, ut verbis ejus utar, oblongo corpore crassæ, ex tritico collectæ, ac Blattarum more pingues, variae aureis lineis, quas in pennis transversas obtinent (atque hæ in medicina potissimæ habentur) alæ *minutiores*, macilentæ, latæ, pilosæ, interiores dictæ; & ad medicos usus inutiliores. Majorum quoque non omnes ex viridi radiantes videris, sed alias item ex *Xelampelino*, inexplicabilis omnes splendoris, & colore oculis gratissimo donatæ. *Parvum* genus Cantharidum Thomas Decateus primus mihi communicavit; forma nonnihil & mole dispares videntur, sed virtute Cantharidea & ortu consentiunt. Harum (scilicet minorum) *prima* corpore, & capite oblongo est; & forcipato, oculis nigerrimis prominentibus, antennis longis atque nigris, alis circa medios lumbos extuberantibus, quæ duobus punctis argenteis, & maculis paucis albis notantur: in Cicutaria herba per æstatem plerumque reperitur, pedes habet & crura, gracilia admodum atque longa, purpurascens minio ornata. *Secunda* ejusdem cum prima coloris est, nisi quod antennæ oculique virides videntur. Caput huic exiguum, scapulæ globosæ, atque gibbosæ.

Tertiæ caput & scapulæ confunduntur, coloris æruginosi, sed ocelluli picem referunt nigerrimam: alas habet capiti concolores, sed striis quibusdam aureis micantes: pedes item piceos & breves. *Quarta* tertiam æmulatur, sed herbaceo potius

colore est, quam æruginoso; aliàs præter magnitudinem (quippe omnium minima est) non differt.

Aldrovandus quinque tabulis easdem representat.

Primæ tabulæ primo loco depingitur Cantharis è maximarum genere, colore viridi, atque aurum lucente in rosa aperta.

Secundo prolixiori corpore, lineis luteis, in capite, pectore ac dorso, antennis longiusculis ac nodosis, luteis, ut etiam pedibus in rosa ex eruca nata, in qua & *tertiam* reperi rotundo corpore nigro & piloso, violarum speciem existimo.

Quarto ac quinto loco est Cantharis rotunda seu Viola nigra prona & supina, obscuris in vaginis punctis albicantibus & rarioribus, in alvi vero parte prona quatuor lineis parvis & albisejusdem generis, & ea est, quæ hanc sequitur, nisi quod punctula illa alba, quæ in prioriora erant, magis sint frequentia & conspicua.

Septimo loco est araneus, quem exactiùs suo loco describemus.

Proxima huic cantharis oblonga capite ac pectore nigra, duabus antennis factis conspicuis, in extremitate pilulam habentibus, pedibus item nigris, vaginis rubro & nigro colore transversim maculatis.

Eadem sequenti pictura expansis alis ostenditur, ut alvus, quæ tota rubra est, exactè videri possit.

Decimo loco est Cantharis alia fusco colore, seu potius subcinereo ad obscurum tendente antennis longis.

Undecimo colore nigriore multò, antennis nonnihil nodosis & in fine obtusis.

Duodecimum locum negligenter Culex occupavit, longis alis & antennis, rubicundis pedibus.

Postremo est Cantharis tota viridis, & in vaginis colore mixto aureo, pedibus nigris.

Secundæ tabulæ prima est viridis, antennis longiusculis, è mediocrium genere, oblongo corpore. *Secunda* inter minimas numeranda, tota cœrulea. *Tertia* inter fabas reperta, prædicta paulo major, tenuibus antennis, lineis in vaginis transversalibus nigris, reliquo corpore nigro.

Quarto & quinto numero notatur Scarabæus *χλωροχρυσος*; five colore viridi in supina parte, qui soli expositus aureum fulgorem edit, ut in aliis quibusdam Cantharidibus, tamen inter Scarabæorum genera referendus; forte erit Scarabæus viridis *Plinii*, quem ait suo jucundo aspectu contuentium visum exacuere. Prona parte niger totus antennis exiguis.

Sexta est Cantharis parva pectore nigro, antennisque exiguis, vaginis subaureis, recteque ob parvitatem describi nequit. *Postrema* è Violarum, seu rotundarum Cantharidum specie, capite nigro &

pectore, antennis longiusculis, vaginis rubris; pedibus in fine nonnihil divilis & rubris. Melancephalon appellavi.

In tertia tabula primo loco ostenditur Cantharis omnium minima cœrulea. Secundo Longicolla dicta paulò minor Vespa, toto corpore nigro, rostro seu collo protenso, cui utrinque duæ insunt antennæ.

Tertio minima colore aureo & viridi.

Quarto numero notata, est capite, antennis ac pedibus nigris, vaginis luteis, quibus sex nigra, rotundaque insunt punctula, bina superiori parte, quæ caput proximè contingunt, reliqua in parte extremâ versus alvum per transversum ex ordine posita. Hanc alia sequitur latiori corpore atro, capite & pedibus lutescentibus vaginis obscurè, longiusculis antennis.

Sexto loco ponitur Musca viridis, antennis longis, inter Muscarum genera referenda.

Septimo & octavo duæ exiguæ, prior cœrulea tota, altera cinerea.

Octava oblonga corpore, capite, pectore, antennis ac pedibus nigris; vaginis rubris.

Nonus numerus significat convolvulum, in Græcis Tagliadizzo vulgò apud Italos agricolas, corpore cœruleo, pedibus obscurè lutescentibus in vite repertum, ac folia ejus depopulantem, nascitur hic ex ovis Bombicum, ovis similibus magnitudine, colore rubicundis, hic cum parere vult, multa cumulat, convolvitque folia (undè fortè à Latinis id nominis datum) atque in his sua ova reponit.

Sequens numerus aliam ejus speciem cœruleam continet.

Duodecimus Cantharidem nigram duabus maculis fuscis, nigris in vaginis distinctam. Minima & è viridi aurea decima tertia est. Hanc sequitur nigra semicirculis minaceis in crustis insignita. Postrema minaceis vaginis, sed nigro maculatis, pedibus antennis, ac capite nigris.

Quæ in quarta tabula proponuntur, omnes ferè sunt cantharides rotundæ, violæ dictæ à nobis nomine & idiomate Italico, è quarum numero prima est lato corpore ac pedibus nigris, quos extendit in utraque latera cancri marini aut Paguri modo: capite nigro; antennis ejusdem coloris longis in fine obtusis, vaginis rubris, quatuor maculis nigris rotundis æquè à se invicem distantibus, quadratæ figuræ modo.

Secundo loco Culex idem, quem prima in tabula numero duodecimo exhibuimus, hunc eximere sumus veriti, ne notas numerorum atque ordinem depictorum inturbaremus, quemadmodum & eum, qui hunc ex ordine succedit, numero undecimo primæ tabulæ delineatum & ibidem descriptum.

Sequuntur Coleoptera duo, quorum pri-

mum fuscum corpore, alterum viride, & usque adeò exiguum, ut ad aliquod genus rectè referri non possit, nos inter Cantharides retulimus.

Sexto loco datur Viola colore rubra, maculis nigris insignita.

Septimo & octavo eadem, sed nigra utraque, quarum prior linea rubra cingitur.

Nona est ex prædictorum genere, rubro nigroque colore varia.

Alia decimonnumero notatur rubra duobus punctis aspersa nigris.

Undecimo & duodecimo pectore sunt nigro albis punctis maculato, vaginis luteis, maculis nigris aspersis.

Quinta & ultima tabula quatuor continet violas, quarum prima est minima punctis albis ornata. Secunda magna, nigro & aureo varia, triangulo in lineas dissecto nigras, dorso pulchra. Tertia nigra quinque aureis notis ornata. Ultima exigua cinnabari colore tineta.

Est & in India genus Teocuilin cantharidum parvarum, rubri capitis, pectoris smaragdini, & reliqui corporis fulgidi. Ajunt, lepræ illitas, atque confricatas, mederi. Vivunt apud Hocitalpenfes. Est autem Teocuilin vermis igneus, & ab igne aut urente naturâ impositum est insecto huic nomen.

Nieverb.
lib. 13. c. 17.

CAPUT VII.

De Bupreste, & Ipe.

Quem Ardoinus Buprestem vocat, is Vegetio, *Vulpestris* & *Bulpestris*, Sylvatico, *Bustasaris*, *Bublites* & *Bubestis* vocatur. Græcis βυπρεστis Nicandro βυδων, & βυβρωστis, dicitur: quanquam fortè hæc pro araneola illa ruberrima boves mordente sumi possit, quæ devorata eadem cum Bupresti Symptomata inferat. Buprestis verò, nomen βυπρεστis το πηγαυ πὰς βὲς, quod boves rumpat; seu βυπρεστis το πυρκαϊα, quod incendat, impositum est. Primò enim per summam acrimoniam intestina inflammantur, mox tumor, febris, & tympanites ingruunt: tandem membranæ ruptis, crepunt pecudes mediæ.

Difficulter describi potest. Nam & apud veteres altum de ea silentium. Scarabæo longipedi similem, & in Italiâ raram scripsit duntaxat Plinius; in Lybia frequentem Lucianus. Ideò nondum se veram Buprestem reperisse reliquit Aldrovandus. At Pennius veram se in agro Heidelbergensi invenisse gloriatur. Ex Cantharidum genere esse dicit, quod & apud Galenum, Aëtium, Aeginetam, Phavorinum & Avicennam habemus, sed oblongiore corpore. *Elytrum* exterius aurum imitatur. Caput est

Nomen.

Veget. veter.
l. 3. c. 15.

Description.

Aldrov. Hist.
Insect. 4. c. 69.

Mouset.
Theatri Insect. l. 1. c. 19.

est parvum, Os patulum, durum, robustum, forcipatum, dentatum: *Oculi* globosi & prominentes. Ex fronte duo oblonga & articulata cornua. *Venter* in longum productus. Bellonio in descriptione montis Athos, est bestiola aligera, Cantharidi similis, sed major, colore flavo seu luteo. *Visa* & altera Buprestis vera, corpore paulò brevior, & circa ventrem latior, caudà magis acuta; capite parvo, oculis prominentibus, ore hiatulo; & forcipitio; elytra secundum longitudinem striata, colore saturata gramineo, ex auro splendente, ut Mousetus habet. Addit idem, crura pro corporis mole longiuscula tantum sex habere, (malè Grevinus & Mathiolus octo ponunt) eaque nigricantia; cornua prioris cornibus duplo minora & subtiliora, &c.

Mouset. l.
c. p. 142.

Grevin. de
venenis, l. 2.
c. 11.

Locus.

Rarò in Italià reperiit scripsit Plinius: frequentior tamen nunc.

Vitus.

Vescitur muscis, erucis, lacertis, lumbricis, & aliis insectis. Araneum etiam interficit. Morticina non tangit, & ubi se interfectis implevit, reliquum ad cavernas trahit. Nitrosi est saporis, foetoris vix tolerandi. Tam exquisiti veneni, ut infectas contagio herbas, pecudes, si, depascantur, intereant. Intus sumptum, corporis tumor, flatuum inter cutem & carnem copia; labiorum livor, sapor in ore virosus insequuntur: ne de urinae suppressione, ventriculi & intestinorum dolore, quicquam dicam. Hinc benè capitis ejus propinatores tenentur.

Venenum.

Remedio sunt, aphronitrum cum aqua; lac muliebre è mammis affatim extractum; urina muliebris epota & vomitu reddita; pyrorum sylvestrium omnia genera; quæ tamen corpore tumido exhiberi nos debent: Cantharidum alax & pedes, si quibusdam credimus. Reliqua apud Dioscoridem vide. Bos vel equus si comederint, inflantur, stercore minutim & frequenter reddunt; & cibum averfantur. A cursu & venæ in palato sectione remedium. Quidam oleum naribus infundunt. Plura apud Aldrovandum habes.

Galien. H.
A. 6. c. 35.
Remedium.

Usum nihilominus in Medicina invenire, si Cantharidum instar præparentur. Dioscorides eas super cribrum ferventi cinere torret, Galenus aceto niacerat, Hippocrates capita, alas, & pedes abjicit. Cum sevo hircino, septica vi, lichenas tollunt, ut Plinius prodidit. In desperatis mensibus, cum duplo ficus pulpæ, ab Hippocrate supponitur, ne de uteri scirrho & suffocatione, aut molæ ejectione quicquam addam. Quantum ad *Differentias* Mousetus duas *Scaraboides* describit, alteram ex auro virescentem, alteram ex flavo nigricantem. Illa priori major, alæ externæ auro saturato lineatim ducto illitæ; & paxillo viridi (verba ejus sunt) adumbratæ: Inter lineas umbones concavi, eleganter sculpti, assur-

gunt. *Alteram* à Jacobo Quickelbergio ex agro Viennensi accepit. Lonicerus, Cornarius, & Cordus propter foetoris magnitudinem Cimicem sylvestrem pro Bupreste sumserunt. Aldrovandus tres proponit. *Prima* in arvis deprehensa, rictu satis magno, coloris candidi, in interna parte serrato; supra cujus duo cornicula, quibus constat, aliud corpus habetur candidum similiter, in ipso rictu appendices illi quatuor breves, & pilosi, quibus videtur primum gustare cibum antequam in os sumat. Capite est obscurè viridi, item dorso; & vaginis, quarum utraque maculam habet rotundam, albamque. Antennis longis. Lineam quam utræque vaginæ, cum in alvi medio junguntur, constituunt, ænei coloris, sub alis viridis, ut elegantiorum colorem vix intueri quispiam posset, pedibus longiusculis pilosis, colore non semper uno, sed prout foli obvertuntur, ita nunc colorem viridem; nunc aneum referentibus, plus tamen ænei participantibus. Color qui supina est parte nullum colorem de se fundit: in parte pronâ omnia eleganter micare conspiciuntur. *Secunda* superiori similis, colore tamen differt, qui in toto (exceptis pedibus; qui flavi sunt) niger est, & hæc quoque in arvis reperta. *Tertia* est Jacobi Grevini, quam quatuor pedibus ab utroque latere depinxit, colore viridi. Similem depinxit Matthiolus in suis ad Dioscoridem Commentariis. Sed cum ibidem eam non describat, dubito num eam velit esse Cantharidem; quibus in Medicina utendum est; an Buprestem.

Ips Plauto est *involutulus*, Italis rusticis *Tagliadizzo*. Proprium ejus in vitibus versari, easque ut & cornua arrodere. Hinc ab *ἄλω*, id est *βλάττω* noceo, nomen accepit. Qui Serpentis genus esse putant, ab Hermolao redarguuntur.

CAPUT VIII.

De Cucujo.

Insectum Indis familiare Cucujus, seu Coccojus, & ex Scarabæorum genere esse videtur. Septuplo cicindela nostrate volante major est, digiti minimi crassitudine, duarum unciarum longitudine. Haud paucicervinos scarabæos æquant. Vespertilionibus paulò minores ex Petro Martyre Nierembergius dixit. *Corpus* duodecim incisuris ornatur, ex cinereo parum nigricans. *Caput* est longum, cujus anteriori parti nigra superius quasi in medio, triangularis macula insidet; breves antennæ; *Oculi* grandes, juxta cornicula prominuli & nigri, prope os locantur; reliquum caput coloris est spadicei ferè, exceptis duobus clavibus propè collum aureis, è quibus radij splendentes,

Descriptio.

Nieremb. H.
N. 13. c. 3.
Mouset.
Theat. In-
sect. 1. c. 15.

Galien. l. 1.
c. 10. c. 1.
Differentia.

dentes, in volatu præsertim, atque alis, expansis, insigni fulgore exeunt. *Pedes* sex nigri à corpore exeunt. *Elytra* quibus alæ teguntur, colore ferè castaneo videntur. *Icones* ex *Moufeto* apposui. Hic, à *Candido*, pictore peritissimo, qui eas in *Hispaniola* & *Virginia*, observavit, accepit.

LXX.

Lucere noctu nemo dubitat: quaparte non convenit. Oculis duntaxat radiare quidam prodidere. Unde *Moufeto* *νεφελολαμψις*, dicitur. Quatuor lucidissima specula habere, *Nierembergius*, oculorem fede duo, in ilibus sub vagina latentia duo: quæ tunc ostendit, quando morè scarabæi evaginatis tenuibus alis, aërem captat. *Navigatores* oculis & clunibus eandem adscribunt. Alii visceribus & cuti ventris diaphanæ. Nullum aliud olim *Indis* sive domi sive foris lumen. Noctu gradiuntur duobus ad pollicem pedis alligatis: gestant & manu unum, dum *Utias*, seu cuniculorum genus murem magnitudine superans, venantur. Tantum id, ut quivis in cubiculo legere, scribere, & necessaria peragere possit. Imminuitur, dum fatiscunt; post mortem, evanescit. Quare vix credi potest, formari ex eo pastam, quæ ad faciem & pectus attrita, lucere ea faciat. *Candisio* & *Dudlejo*, cum ad *Indiæ* littora appulissent, imposuisse *Moufetus* ex itinerariis *Anglorum* author est.

Captura.

Nieremb.
H.N. 13. c. 3.

Quomodo capiantur, & culices, quorum gratiâ captura instituitur, capient, *Nierembergius* ex *Martyre* prodidit. Primo noctis crepusculo exit domo cucujorum indigus, titionem manu gestat ignitum, tumultum unde queat à cucujis prospici, ascendit vicinum, elatis vocibus cucujum appellando, circumrotat titionem, cucujè, cucuje inclamitando, aërem obtundit. Ad vocantis reboatum simplices putant nonnulli, cucujos, eo delectatos strepitu, convolare: veniunt namque properanti ac præcipiti accessu. Ego vero accittrere arbitror ad titionis fulgorem cucujos, quod ad lucem quancunque agmina culicum advolent, quibus cucuji vescuntur in aëre ipso, uti cipfelli & hirundines. En cucujorum numerum optatum, titionem venator manu projicit. Titionem aliquando sequitur cucujus aliquis, & solo se dimittit, captu facilis tunc est: uti scarabæum ambulantiem vaginâ clausâ, licet viatoribus si quis eo indigeret, carpere. Negant alii hoc pacto solere capi cucujos, imo ajunt paratos habere venatores frondosos maximè ramos aut latam lineam, quibus alto circumvolantem percutiunt cucujum, in terramque impellunt, ubi jaccens torpescit, & capi se patitur; vel, ut alii dicunt, secuti volucris lapsum frondoso eodem ramo, vel linteo projecto super eum, prædam assequuntur. Ut cum-

que sit, venator venatore cucujo apprehenso, domum revertitur. Ostiolo domus clauso, prædam solvit. Totam circuit præcipere volatu domum quæritando cucujus culices, sub lectis pensilibus, & circum facies dormientium, quas implere culices assueverunt. Custodum officio, ut quiescere queant, inclusi, fungi videntur.

Sunt & aliæ ibidem bestiolæ, volantes quæ noctu lucent, sed nostris multò majores, & lucem etiam majorem emittentes. Lucent enim adeo clarè, ut qui itinera constituunt, capitibus & pedibus, has cindelas arte quadam pendulas vivas figant. Sic enim de longinquo oculis facile percipiuntur, & ideo rei veritatem ignorantem attonitos reddunt. Mulieres non alia luce ad negotia sua peragenda in ædibus noctu utuntur.

Mouf. l. 6.

CAPUT. IX.

De Cicindela.

Plura hoc insectum tam apud Græcos quam apud Latinos accepit nomina. Græcis enim dicitur *λαμπυρίς*, *λαμπυρίς*, *πυρολαμψις*, & *νιζολαμψις*. *Aristoteli* *βόσρυχο*, *Suidæ* *πυρολαμψις*, *Hesychio* *πυρολαμψις*: vel potius *πυρολαμψις*, igniclunis & luciclunis. Aliis *λαμπηδών* & *σπινθηρ* metaphoricè, *μυκήτης* *Aristophanis* quidam *Cicindelas* exponunt. Male *φάλανα* dicitur, *καθαρς*, verò vocabulum majori competit. Apud Latinos invenies appellari *Cicindelam* & *Cincindelam*, quod candèrem cieat, *Noctilucam*, *Nitidulam*, *Noctuvigilam*, *Lucionem*, *Luculam*, *Luciolam*, *Flammidem*, *Venerem*, (*Levinus* vetustissimus author, sic vocavit,) *Lucernutam*, *Incendulam*, ut ex *Cicerone*, *Plinio*, *Scopa*, *Agricola*, *Varone*, *Festo*, *Plauto*, *Scaligero*, *Turnebo*, & aliis videre est.

Nomen.

Aldr. Hist.
de Insectis
4. c. 3.

Descriptionem in *Differentiis* vide. Nulli in hyeme apparent. Mensibus Aprilis, Maji, Junii, & autumnno, quo raro volant, in pratis vesperi cernuntur. *Plinius*, ideò, ante matura pabula aut post discessum conspicuas dixit.

Locus.

De *Generatione* dissentiant authores. *Baptista Porta* è rore nasci putat: apud *Hesychium* aliquid de stupa *Φρύγαννα* legitur. *Crediderim* locum generationis innui. *Arist.* non volantes, ex erucis non magnis, densis, nigris, hirsutis procreari scripsit: ex his pennatas, oriri. An *βόσρυχο* dicantur, & utrum hæ ex pennatis oriantur, non facile dixerim. *Ephesius* sanè *Græcus*, τὰς *βόσρυχας* à *cicindelis* prodire, & rusticis *Ciccas* ac *Platas* vocari (*Ricinos* *Niphus* vertit) reliquit. *Cardanus* ex genere *Cra-bronum* oriri voluit. *Primus Scaliger*, fo-

Generatio
Porta Phys.
togn. 6. c. 3.Arist. H. A.
5. c. 19.Mouf.
Theatri
Insect. 1.
c. 15.Scaliger.
Ex. 191.

mi-

minam cum suo mare in coitu deprehendit. Mas; ne contactus quidem destitit: postero die in meridie solutus obiit. Ab ea hora sub vesp̄eram usque multa ova edidit foemella: quæ intra viginti horas vivificata abiere. Idem Guil. Bruerus Anglus observavit, ut apud Moufetum habetur. In eo à Scalig. erratum, quod ova benè non observaverit. Aristotelis opinioni Merula favet. Observavit is vermes noctu splendentes pilosos, tam in foro Lebetiorum in fossis herbidis & aquis carentibus; quam in lacunis circa Viglevanum, quod veteres Vergeminum appellabant. Diu in coitu harere, solutas parere citò, Aristoteles, tradit.

Ad Naturam ipsarum pertinet, noctu lucere; quod tamen non omnibus competit. Mares enim in Vasconia, teste Scalig. non lucent, sed foemina quæ vermes. In Italia & agro Heydelbergenfi foemina omnes sunt ἀλάρπει mares lucigeri. Exit utrinque à lateribus & clunibus fulgor, si hient & efferantur: Compressis tota lux obscuratur. *Fulgorem igni similem alarum compressu tegi, secumque lucem & noctem habere, dixit Plin.* Non ante crepusculum vespertinum conspici, hinc Plinio, *stellantes volatus, & terrestres stellas*, apud Politianum habemus. Innoxia sunt: nec morſu nec punctione impetunt. Ad candelas frequenter & avidè advolare, prodidere nonnulli.

Liquorem ex Cicindelis fieri posse, seu ipsis per se sumptis, seu cum ligno faciliſis putrido, felle canis & albumine ovi commistis, qui noctu resplendeat, docuit Vitalis, Cardanus: Quomodo destillari debeat, Weckerus & Mizaldus. Ridet hæc Scaliger, & lucem hocſe de cælo deductam, in materia, tanquam in triremem captivum remigem imponere, atque in cæteris habere velle videri, tam verè quàm facete, ait. Sanè, bestiola mortua, aliquot post horis, pars illa albida, ac in tenebris splendens, lucem omnem ammittit. Vitro lucido cum gramine iuclusas impenes, lucem per duodecim dies de se largiri, si recens semper injiciatur gramen, ipsæ libro fruantur aère, concedere Moufetus videtur. Sed illam fatiſcentibus imminui, mortuis planè evanescere addit. Quid Ardenus Anglus fecerit, apud eundem vide.

Duplices sunt, *pennatæ* nempe, & impenes: quarum istæ, adeò clarum noctu splendorem emittunt, ut ad illum majusculæ literæ legi possint. Utrasque in *Masculis & Foemellis* Moufetus distinguit, Masculus (verba ejus sunt) animalculum est pusillum, volucré, quatuor alis, quarum exteriores coriaceæ, interiores membranæ, colore argenteo, translucentæ. Corpore est oblongo parum compresso & la-

tiusculo quinque incisuris prædito, ut pro lubitu extendi & contrahi possit. Corpus extensum, alis longius videtur, contractum brevius: Caput latum, fuscum, compressum ad cuculli formam fabricatum. Cornicula duo è media fronte tanquam ex uno centro exeunt, juxta quæ antèrius caput parum extuberat. Non procul ab antennarum exortu minutissimus utrinque globulus niger apparet, Gagatis splendore nitidus, qui oculorum vicem supplet.

Caput collo corporique brevissimo conjunctum est, colore ex fusco nigricante: pedes sex pectori juxta caput affixi, quorum posteriores & crura, juxta sublucro sunt calore, reliquæ pedum partes nigricant. Tardius & gressu quasi composito proreptat; pectus parum extuberat; corpus juxta incisuras albicat, juxta caudam duas habet maculas; utrinque unam, ad lunæ crescentis formam: ex quibus noctu splendor emicat pellucidus; sulphuris accensi æmulus, ut scintillas lucidissimas per aërem volare crederes: hinc nunquam in Anglia apparet, vel saltem si hic degat, non tamen lucet. Cicindela Europæa foemina, tardigradum est animalculum, alis carens duos plerumque digitos transversos longa, (licet in Vasconia longò majores longioresque, luctartas ibidem dictas vidit Josephus Scaliger) erucæ magnitudinis mediocris, cui ferè est similis. Caput illi parvum; compressum, durum, nigrum, oblongum, & os versus acuminatum: è cujus extremitate duæ exeunt antennæ, breves nigrae. Sex habet pedes, parvos, nigros, tribus articulis distinctos, juxta caput, erucarum ferè modo. Corpus oblongum crassiusculum, tæniæ instar compressum, duodecim incisuris profundioribus præditum, præter collum quod pro arbitrio nunc exerit, nunc lacesſita retrahit & abscondit: partes intermediæ nigricantium laminarum sese ingressu elevantium faciem obtinent. Per dorsum linea admodum exilis & parum candicans à capite ad caudam usque decurrit. Latera ventris ex xelampelino suave rubent. Cauda atque venter juxta caudam albicant. Uropygium tamen ipsum nigrum est. Cujus beneficio & nisu sese attollens arenatim repit, & furculis inde enatis sese pendulam affigit, sub hoc Uropygio excrementum ab alvo reddit subviscidum & filosum, mellis æmulum, quod caudæ furculis ad os reductum, denuò absorbet, staminaque exinde retrocedens fingere videtur lentoris prodiga, quæ secunde devorat, eorumque revomitio- ne & resorbtione sese sustentat. Partes albæ in tenebris mirabili splendore fulgent, & stellas quasdam terrestres repræsentant: adeò ut cum lucernis lunaque

Merula obs.
3. c. 81.

Arist. l. de
gener. c. ult.

Scalig. Ex.
194. Moufet.
l. 5.

Plin. H. N.
18. c. 28.

Ufus.

Aldrov. H.
Insect. 4. c. 8.

Differentiæ.

Moufet.
Theatri In-
sect. l. 1. c. 15.

de lumine certare videantur. Hoc observatione dignum; clarissimum istum splendorem una cum spiritu vitali profuse evanescere, ubi ergo perpetua illa lux, de qua nonnulli putidi Paraphysici tam ineptè imprudenterque garriunt? In arvis sæpius pennatas, quandoque verò intra opidorum mænia per plateas volitantes vidimus.

Aldrovand.
Hist. Insect.
4. c. 8.

Aldrovandus quoque aliquot species nobis exhibuit, de quibus ita loquitur. Insectum hoc, quod *primâ tabulâ* Erucæ ferè simile, in sepium favea repertum Lampyridem *ἀλφειν* esse judico, cum, & ipsum proprio suo lumine in fovea latens noctu proditum fuerit, tineæ est instar compressum, pollicem ferè longum, sex pedibus anteriore parte instructum, nullis posteriore. Capitulum nigrum quatuor cirris tanquam corniculis Limacis instar munitum collo albo, quod ad libitum modo exerebat, modo contrahebat, præsertim lacescitum sub primæ incisuræ lamellam tanquam galeam caput contegentem. Compactum enim est segmentis duodecim, sibi mutuo imbricatim succedentibus, ac se subeuntibus laminarum instar dorso æqualibus, ac compressis nigris, quæ tamen singula ad latera puncto utrique notata purpureo. Pedibus, inquam, senis oblongiusculis & trium articulorum: stans, & caudam trahens dracunculi quodammodo speciem præbet. Cum verò his pedibus anticis progréditur, caudam sub ventrem inflectens & antrorsum complicans postica parte arcuatim repit. Nam & caudæ pedum eorum vicem subit, qui in posteriori parte in veris Erucis existunt. Hanc enim candidam, & tricuspidem promit, qua posticam corporis partem inter serpendum sustinet, & cuilibet rei ut aciculæ affixæ adhærescit pendula. Prima & antica segmina longiora sunt, breviora verò versus caudam vergentia, & medio latissimum corpus paulatim in caudæ penicillatum mucronem attenuatur. Alvo extrema egerit excrementum quoddam lentum, ac ceræ in modum fulvum, quod ipsum nonnunquam cauda ad os adducta in circulum cœu vertitur, contractum ori admovet, quo tamen etiam similem liquorem vomere videtur, ac veluti filo facto, retrocedit, illud diducit, ac protrahit lentore sequax, deinde denuo absorbet. Parte prona modicè nigrescens diluta purpura qualis Persiciflorum est, admixta variat. Qui purpureus huic est macularum color, in quibusdam magis lutescit. Julius Scaliger in Vasconia sine alis Cicindelas esse scribit, Erucæ majoris quantitate, crassiores, ventricosas, Lucrambam ibi vocari. Ex harum grege ea forte erit quam secunda tabella pronam, & supinam ostendo, una cum Lampyride alata.

CAPUT X.

De Blattis.

Blat tarum nomine, non tantum vermes quæ in auribus & alvearibus nascuntur, Phalænæ dictæ veniunt: sed & p. grani in ilice humili nascentes vermes; nec non farinarij. His illi intelliguntur, quos *ἀλφας*, & *πλφας* Græci, Itali *Platellas* aut *Buccaroni* vocavere. Nec audiendus est Hermolaus, qui *καρβας* & *παραμυρδας*, blattas vertit. Nomen.
Aldrov. H.
Insect. 4. c. 9.

Insectum est lucifugum, scarabeo simile, sed elytro carens. Plura in Differentiis occurrunt. De *Ortu* non constat. Alii ex vermibus & erucis provenire credunt: quidam, ut Cardanus ex ligno. Omnes fenestutem exuere, Aristoteles & Plinius testantur. Mares majores, & omnes alati esse creduntur: foeminae ventricosæ, & alis destitui. Descriptio
& alia.

Faciunt contra surditatem & aurium dolorem, si duodecim alis abjectis, in vini veteris & mellis anauncia una semis, cum malicorio uno, pomi succi sesquiacyatho, coquantur; post terantur, & tritis unguentum Syriacum, pix liquida, & succus e quatuor cepis expressus, adjiciantur. Fugantur herbâ blattaria dictâ, vervecis recenter mactati ventriculo, ex consilio Diophanis, si is in loco in quo versantur, deponatur; oleo denique spicæ, si eo inungantur: & hoc laudatissimum est. Cardan. 1.
de ven. c. 7.
Arist. H. A.
8. c. 17.
Plin. H. N.
11. c. 28.




Tres Blattarum sunt species, *Mollis*, *molendinaria*, & *fætida*, cui *Peruanam* addere possumus. *Mollium*, mares omnes alati, & minores: foeminae, magis ventricosæ, & alis destitutæ. Caput habent parvum, unde duo cornicula, prælonga, & in quamcunque partem mobilia exeunt. Pectus unâ cum scapulis orbiculare, cum septem incisuris. Alæ corpori concolores: Cauda bifurca & forpiculata: pedes sex. Visâ Petropoli in templo, vulgari sextuplo major, sanguinem venantibus eliciens. Visâ & in Philippo navî à Dracō capta, molliores nostris, coloreque magis fusco. Cursu omnes valent: & struthiocameli instar, currunt magis quàm volant. Latrinarum & balnearum incolæ. In oleo decoctas, verrucis efficaciter illiniri, experientia testatur. *Σιτοφάγος* dixere quidam, quod farina vescantur. Dioscorides *ἐν ἀρτοποιείοις εὐεργιστομένους* dixit. *Molendinaria*, Græcis *μυλωνες*, *μυλωνος*, *μυλωνες*, *μυλωνες*, & *ἀρτοποιείων*, ita à Moufeto describitur. Foeminam, ni fallor, vidi, quia alis caruit: vulgari illa molli longiorem, crassior, & cum majore splendore nigriorem, os forcipatum illi, parvum, quasi sub ventre positum, antennas habet primæ Ufus.

Galen. med.
sec. loca. 1. 3.

Differentiæ.
Moufeto. In-
sect. 1. c. 18.

Arist. H. A.
8. c. 17.

Plin. H. N.
11. c. 28.
Moufeto. l. c.
p. 131.





Handwritten text in Chinese characters, arranged in several horizontal lines. The characters are faint and difficult to decipher.

Handwritten text in Chinese characters, located at the bottom of the page. It appears to be a signature or a date.

primæ similes; oculos item exiguos concavos, vel potius oculorum signa atque vestigia. Pectori penè quadrangulari quatuor primi pedes affiguntur, posteriores ventri: supra scapulas alarum quasi rudimenta conspiciuntur, alæ tamen dici non debent, corpus reliquum crassiusculum, variè orbiculis incisum, quos, si à latere intuearis ferram referunt. Caudæ apex & furca utrinque una innascens, ad tridentis formam accedunt, stabulantur istæ Blattæ in locis tepidioribus, pistrinis & vaporariis. Vix magna in fame lucem ferunt: vel si victus quærendi gratia in apricum procedere coguntur, celerî cursu ad tenebras recurrunt, vel pulvere sese regentes, venatores fallunt.

Μυλωνις Polluci est insectum, magnitudine Cicadæ, colore exalbido, quod farina in moletrinis vescitur. *Σιλφη* appellatum, Stephanus addit.

Fætida, Græcis *Σιλφη βδεια* & *Εδεια* dicitur. Plinius, acuta clune facit: recentioribus scarabæos pillulares, abscissa cauda, graphicè repræsentat. Nigerrima est, *δ'Αιγγος*, etsi alatam & elytro testam crederes, ore bifurco, cruribus longiusculis & gracilibus. Nocte lentissimo gradu proreptat: profundis in cellis habitat: lucem fugit, & foetore universam viciniam inficit. Vix sanè marem in hoc genere alatum inveneris. A quibusdam cum Cimice confunditur. Datur & alia ejus species in Hungaria, Gryllo similis. In aggeribus & apricis invenitur. Dirum quid dum volat strepit. Hyeme lucis focia, quam fugit æstate. Tempore pestis, ceu arcanum gestatur, imò à quibusdam deglutitur. Frequentiores, ubi vina generosa nascuntur, invenias. Pinguitudinem, si caput avellatur, cum rosaceo tritam, auribus mirificè prodesse, scribit Galenus: sed lanam paulò post extrahendam; cum pissellæo ulcera sanare traditur. *Poruane*, Araneæ dictæ, gryllorum sunt magnitudine, & gregatim noctu volitant, omnem ferè mollem supellectilem ambedentes. Melius fortè inter gryllos recensueris. Aldrovandus unam, pronam & supinam, colore fusco, pedibus tamen & antennis paulò plus rubentibus, quam corpus reliquum.

CAPUT. XI.

De Forficula.

ARnoldi *Forficula*, Latinis recentioribus *Auricularia*, Priscis *Mordella* dicitur. Niphus *Velliculam* appellat à Vellendo. Gallis *Aureilliez* vel *Perceureille*, Germanis *Ohrenwurm*. Belgis *Orenvuetel*. Anglis *Earewig*. Hadrianus Junius *Fullo-nem* esse existimat, quum tamen à Scarabæi

forma multum differat. An hæc Græcorum *ὀροδελινη*? Sane & ortus ratio, & mor-sus conspirant; nam & hæc generatur in caulibus herbarum fistulosis (utpotè Pastinacæ sylvestris, Angelicæ, Ferulæ) & in Brassica frequens conspicitur. Boreales Angli obsceno nomine *Tunickballok* nominant, quasi *Scortimordium* vocaveris, vel *ὀροδελινω*; nam ubicunque rugosam pliatamque cutem invenerit, vel ore mordendo, vel cauda bifurca stringendo, maximum dolorem excitat, quod semel nobis pueris accidit inquit Pennius.

In duas auriculariæ species incidimus, utraque volucris erat, contra multorum opinionem. Nam si eas in loco aliquo tabulave inclusas, scyrpo huc & illuc repuleris, quod Illustrissimus Knivertus Pennium docuit, expansis continuo alis, quæ sub elytris conduntur, avolat. Sed diligenter cavendum, ne festuca aut scyrpo durius prematur, aut vulneretur, tunc enim si velit maxime, avolare minimè possit. Vulgatiore corpore spadiceo cernitur. Antennæ, pedes, caudaque forficularia, flavescent. Altera (quæ in Angliâ rarior & semel atque iterum duntaxat à nobis visa) vulgatiore major est; corpore nigricantiore, collum, argenteus quidam torques adornat: extrema elytra subpunicum referunt colorem; os forcipatum habet & flavum. In dorso utrinque juxta latera quinque maculæ sufflavæ oriuntur, caudæ furca brevis est & nigra, qua versus caput sublata per aërem irata provolat.

Reperiuntur sepè in Brassicis & ferulaceis arboribus, ulmique foliorum tuberculis. Ex vermibus in caulibus ortis generantur: pellem quotannis veterem exuunt, quæ spoliata nivea videntur. Sed cum ætate renascitur pristinoque colore imbuuntur. Anglicæ mulieres maximo eas odio habent ob garyophyllati flores depastos, atque excisos, infidiasque struunt hoc modo: extimis arcis bacillo in terram defixo ungulas bovinas, fuillas, vel veteramenta cava supponunt pannis vel stramine leviter infarcta: quæ dum per noctem (pluviæ vitandæ animo, & tegumenti causa) Forficulæ intraverint, manè veteramentis subito ablatis atque excussis, magnus earum numerus excidit, atque ita pedibus contritæ diem obeunt. Arnoldus eas in oleo communi vel flammulæ coqui consulit: eoque convulsorum arterias, tam temporibus quam carpo inungi, ut febris convulsivonis medela inducatur. *Iosephus Michaelis Halus* Medicus non incelebris, magnum earum numerum colligere solebat, ac in vitro arctissime clauso per balneum in pulverem tenuissimum redigere. Tunc urinæ leporis tantum admiscebant, ut in aurem infundi manè vespereque posset. Arcanum hoc esse in furditate

Breviar. 2.
cap. 25.

pellenda sapius protestabatur Pentio. Alii pulverem cum oleo garyophili miscunt, atque adhibent ut supra. Gallinago minor (Sinite ab Anglis dicitur) & gallinæ, auricularis vescuntur: maximumque harum omnium numerum in ventriculis earum reperisse, me fat memini.

CAPUT XII.

De Scorpio, Formica, & Pediculis alatis.

Moufet.
Theatri Inf.
l. c. 28. Pau-
san. in Bedt.
Æl. H. A. 16.
c. 42. & 43.
Strabo l. 15.
Nicander in
Theriaca.

Plin. H. N.
l. c. 15.

Ælian. H. A.
8. c. 13.

Aristot. de
partib. ani-
mal. l. 1.

Scorpiones alatos dari, negavit Aristoteles, Apollodorus teste Plinio, Pausanias, Nicander, Ælianus & Strabo asseruere. Sane homo Phryxalatum in Joniam attulit. Pŷlli eosdem in Italiam importare conati sunt. Latinis *Nepales* quasi nepæ alatæ dici possent. Colore sunt melleo, unde *μελιχλωεῖς* dicuntur. Flammeos Ælianus facit. Summæ caudæ niger nodus est, duplici præditus aculeo. Septinodem Strabo facit. Alæ locustæ Malaci similes. Magnitudo vulgaris. Reperiuntur in India apud Prasios, in Ægypto, Palimbrotæ, &c. Intra Siculi coeli regionem non vivunt, in Italia sunt innocui. In Joniam alatos supra diximus. Communis his cum impennibus generatio: venenum calidum est. Lacertas, araneos, & omne genus serpentum enecant. Suo vulnere applicati medentur: & si exustinodor ad alios scorpiones pervenerit, ædibus exigit.

De Formicis alatis, quæ Aristoteli, ut Moufetus vult *ἰππομύρμηκες* & *ἰππῆες*, hæc pauca adjicimus, nempe *νύμφας* & *στέρους* quibusdam appellari, vulgaribus corpore & lacertis esse majores, & inter nigrum furvumque medias: quatuor alas argento perlitas, externas majores & longiores toto

corpore, internas duplo minores habere. Quæ de Indicis vulpibus non minoribus auri indefessis custodibus, & quarum pelles quasi pantherinas se vidisse Onesicritus scribit, & cornua Erythris in æde. Herculis miraculo fuisse, Plinio produntur, mendacia sunt. Plura capite de formicis vide.

De Pediculis alatis ista habet Moufetus. Agatharchides author est, à maris rubri incolis non multum distare Acridophagos, sive locustarum esores, quæ quidem gens staturæ aliis brevioris, aspectu macilens, ac supra modum nigra. sub æquinoctium vernum, quando apud Italos Africi & Zephyri spirant, ex loco quodam incognito, ineffabilis magnarum locustarum multitudo una cum illis ventis ad ipsos provehitur, quæ ab avibus volandi facultate parum, at corpore longè differunt. Ab hoc animalium genere toto tempore nutriuntur, iis salitis atque alio modo paratis vescentes. Venantur autem ipsas fumo ex aëre in terram dejicientes atque hi agilitate quidem & velocitate pedum pollere dicuntur. Sed quum valde siccum nutrimentum capiant ultra quadragesimum annum vitam minimè producant, imò vita sanè miseriorem mortem obeunt. Siquidem appropinquante senectute, eorum corporibus alata quædam pediculorum genera innascuntur, figurâ quidem caninis muscis similia, sed alioquin minorum. Incipiunt à pectore ac ventre, brevique universam faciei cutem depascuntur. Atque horum alii scabiosorum instar afficiuntur, deinde semetipsos graviter dilacerant, tandemque morbo consistente, nec non cum bestiolarum exortu tenuibus effusis humoribus, intolerabiles cruciatus subire miseri coguntur: sicque vel ob succos, vel ob alimentum, vel ob aeris pra-

vitatem intereunt.

HISTO.

HISTORIÆ NATURALIS

D E

I N S E C T I S

L I B E R II.

De Insectis terrestribus, pedatis non alatis.

TITULUS I.

De Paucipedibus.

CAPUT I.

De Insectis sex pedum.

ARTICULUS I.

De Formica.



ANTUM DE INSECTIS terrestribus alatis sufficiant: sequuntur non alata, eaque vel *Paucipeda*, vel *Multipeda*. Illa sunt pedum sex, octo, duodecem. *Sepeda* sunt, *Formica*, *Cimex*, *Pediculus*, *Ricinus*, *Pulex*, *Lens*, *Forbicina*, *Talpa*, *Sphondyle*, *Staphylinus*, *Asellus arvensis* & *Anthrenus*.

Nomen.

Incipio à *Formica* stupendæ naturæ insecto, & ad quod hominum genus obstupescat & confundatur. A ferendis farris micis Latinis dictas, Isidorus opinatur. Græcis *μύρμηξ* est, *μύρμηξ*, & Doribus *μύρμαξ*, quibus etiam *μύρμολογος*, *μύρμολος* vocari, Hesychius scribit.

Descriptio

Notissimum animalculum describere, superfluum est. Promuscidem ore contentam gerunt. Plinius ipsis linguam tribuit; Wottonus dentes; addit, parte posteriore aculeum gerere. Nulli in capite propter parvitatem oculi, super quædam addita-menta quæ ceu duæ pili de capite egrediuntur, habentur. Alas senes, nec diu super- victuræ emittunt.

Locus.

In quibus degant locis, nemo est, qui ignoret. In acervis, quos congestere con- di, notum omnibus.

Victus.

Frugum granis vescuntur, unde *frugilegæ*, & *agrina granifera* dicuntur. Cuius- pressi & papaveris semina, experere, apud Plinium & Plautum habemus. Fru- ctus exsugunt, nec a mortuis anguibus ab- stinent. Cadaveribus, humanis fortè par- cere, *Ælianus* prodidit. Alii frugibus, si menstruo sanguine polluantur.

Hyberno quoque tempore coire, & sere- nis austrinisque diebus nasci, *Aristoteles* prodidit: vermiculum ovis similem, vere- gignere, *Plinius*. Oblonga illa, & colum- natæ figuræ, in locis calidis & muscidis, extra corpus, incrementum accipiunt, si *Alberto* credimus: vermes ipsi albi, & panniculis involuti erumpunt. In Ame- rica ex mortui parentis corpore prodire dicuntur: miroque modo vivunt, donec ex subterraneis specubus alati evolent.

De *Ingenio*, ita eleganter *Plinius*: *figuis* comparet onera corporibus earum, fatea- tur nullis portione vires esse majores. Ge- runt ea morsu. Majora aversæ postremis pe- dibus moluntur, humeris obnixæ. Et iis *Reip.* ratio, memoria, cura. Semina ar- rosa condunt, ne rursus in fruges exeant è terra. Majora ad introitum dividunt. Madefacta imbre, proferunt atque siccant. Operantur & noctu, plena Luna. Eadem interlunio cessant. Jam in opere qui la- bor? Et quoniam ex diverso convehunt, altera alterius ignara, certi dies, ad reco- gnitionem mutuam, nundinis dantur. Quæ tunc earum concursatio? quàm diligens cum obvis quædam collocutio atque percon- tatio? *Silices* itinere eorum attritas vide- mus, & in opere semitam factam, ne quis debeat, qualibet in re, quid possit, quan- tulacunque assiduitas. Sepeliuntur inter se viventium solæ, præter hominem, defun- ctasque in granorum folliculis efferunt. *Hie- ronymus*, alias herbarum quædam semina forcipe oris traxisse: alias humum de fo- veis egressisse, & aquarum meatus aggeri- bus exclusisse, vidit. Quædam venturæ hyemis memores, ne madefacta humus, in herbam horrea verteret, illata semina præcidebant, quodque magis mirum est, in tanto agmine, non obstabat egrediens intranti: quin potius si quam vidissent sub- fasce, & onere concidisse, suppositis hu- meris adjuvabant. *Ælianus*, ad pabulan- dum profectas, natu grandiores agmen- ducere, segetes ascendere, spicas abscissas dejicere dicit. Natu minores sub stipu- la stant, spicas distrahunt, & grana vagi- nis inclusa explicant. Interlunium sentire

Generatio.

Arist. H. A.

5. c. 9.

Plin. H. N.

13. c. 30.

Plin. H. N.

11. c. 30.

Natura, &

Ingenium

Arist. H. A.

9. c. 38.

Hieron. in

vita Malchi,

Ælian. H. A.

2. c. 25. l. 4.

43. l. 6. c. 43.

Plin. H. N.
2. c. 41.

apud Plinium habemus. Alvi onus, quod urinæ simile, in ædibus non ponere; ubi per cænium facto itinere, maculosæ redeunt, in ipso ædium vestibulo, ad asperum se corticem eliminare; recentiora ova in ulnis gestare, ubi ad amplitudinem eam devenire, ut laborem remorari possent, alto sinu deponere, ab aliis observatum est. Exclusis, foetum ad laborem instruunt: denegatur tardioribus cibis. Hinc suetum, ut robustiores, unguiculis, ore, rostellis, terram egerant, egestam accumulunt, cumulatam stipulis inspergant: sapientiores ædificent; minores in cuniculis versentur; peritiores, mazandros, labyrinthos, concamerataque cubilia efformant. Linguens otio, ædibus ejicitur, pro foribusque ductum, facta omnium ordinum corona, capite mulctant. Intus Veneri operam dare, modestiæ debetur. Additum & præfagas esse. Scilicet, exposito ad siccandum à formicis frumento, nunquam imber cecidisse visus est. Democritus, cum coelo sereno id facere observasset, ut messem sub testâ referret, fratrem monuit; subsecutumque diluvium. Theophrastus pluvias portendere putat, vel, cum densioribus & in se invicem per viarum angustias concurrentibus agminibus, prædam convehunt: vel cum ova ex depressione & cavo loco, in eminentiorem deportant. Quæ de Nerone apud Suetonium, & Cimone apud Plutarchum dicuntur, sublimiora sunt. Piaculum esset, domiciliorum, in quibus exstruendis singulare artificium adhibent, oblivisci. Tortuosissima illa, ut vel invia sint, vel aditu saltem difficilia. Terra pro foraminibus aggeritur, tanquam muri & propugnacula, ne descendente pluvîa, alluvione intereant. Triplex iisdem regio. Mares & foeminae in androne habitant: Pannymrecium verè dixeris: in Gynæceo foeminae pariunt: tertium granorum acervis destinatur. Plutarchus, in una, vitam degere & comedere; in altera, alimenta tanquam in granario recondere; in tertia, mortuos sepelire, scripsit. Radices & extremæ monticuli oræ Cœmiterio assignantur. Domicilium sibi visum Majolus descripsit. Aldrovandus unius & alterius, quæ in putrida quercu, & semiputrido trunco observata sunt, iconem apposuit. Apparuit, inquit ille, in argillosa humo urbs quædam quadrangularis, longa pedes fere quatuor, lata ultra pedem; in qua per vias velut ad negocia ultro citroque cursitare, velut cives, ipsæ formicæ visebantur. Admiranda erat angulorum, laterumque directâ delineatio, quam artificum amissi, circinoque fabricatam putasses, quod æqualis semper dimensio longitudinis, latitudinisque servaretur. Urbis longitudinem media servabat via quædam directissima, profunditate, la-

titudineque digitali: quam rursus per transversum æqualibus inter se spaciis tres alia viæ eadem digitali profunditate, & latitudine directissime interfecabant, ut ita tria compita, foraque spectarentur.

In extremis viarum angulis, velut angustioribus spectabamus collecta in acervos servari ova, unde Formicarum proles gignitur. Altera urbis partem antra vidimus frumento ita oppleta, ut in vias ipsas redundaret. Mira fuit omnium viarum mundities, nihil in illis lapillorum, nihil pulveris, nihil festucarum, nihil humoris, ut deprehendas urbem illam à suis civibus ita curatam, ut prolixum eximium studium, annonæ, & structurarum ornatus ubique spectaretur: qui omnes illi cives communi studio ad Reipubl. beneficia incumbentes, dum alii domi de rebus consulunt, alii foris res agunt, summa pace, concordiaque curandam Rempubl. nos docebant; studuisse quoque iidem cives visi sunt omnium incolarum incolunitati. Erat enim in urbis longitudinis medio unica porta Zephyro objecta, quod ab Aquilone, Euro, atque Austro, immunem urbem sua Philosophia oportere esse didicissent.

Simile domicilium in putrida quercu inventum, rusticus ad Aldrovandum attulit, quod secundo loco in iconem expressum est. Admirandum quoque in quod Cleanthes incidit spectaculum. Venisse formicas de suo cavo ad aliud formicarum examen, formicam portantes mortuam, verba sunt interpretis Plutarchi, *ascendisse alias formicas, tanquam ad colloquium, rursusque descendisse. Id bis terre factum. Tandem has, sursum extulisse vermem, tanquam redemptionis precium pro mortua. Hoc illas accepto & reddito formicæ cadavere discessisse.*

Elephantos atque urfos læsæ ab illis lædunt. Serpentes & Dracones in rabiem agunt, seu quod laborantibus viam obstruant, seu quod cavernis venenatum halitum afflent. Cicadas glireque summo prosequuntur odio: illas quia cantando hyemem conterunt, hos, quia dormiendo eandem perdunt. Pugnam & inter se inire, Aneas Sylvius, post Pontifex observavit. In agro Bononiensi, inquit ille, pyrum aridam, pastus gratiâ ex minoribus formicis famelicis complures ascendunt, supervenere majores non parvo numero, quæ illas erepto faucibus bolo partim occiderant, partim deiecerant. Dejectæ ad suam revertentes Myrmeciam sive acropolim, in itinere cum obvis quasi habito colloquio injurias memorant, omnemque sociorum vim & numerum castris educunt. Post duas fere horas tot Minorum Centuriæ, tantæ acies exortæ sunt, ut totus ager nigro agmine atratus videretur, accessere stipatæ omnes, & arboris utrinque stipitem circumdantes, paulatim

Majolus Descriptio
Cens. cels. 4.

Plut. de sect.
lect. anim.

Ælian. H. A.
6. c. 43.

Antipathus

Aldrovand.
H. Insect. 4.
6. l. p. 509.
edit. Donon.

Sylv. 1. de
Europæ c. 40.
Moufser.
Theat. Insect.
c. 1. p. 242.

latim ascendere coeperunt. Majores, ubi hostes adesse animadverterent, conglobatae supernè pugnam expectaverunt, postquam simul commisso praelio acies conveniant; Majores è minoribus permultas morfu rabido interemerunt, omnesque primo impetu ascendentes miserrimà strage confectas disjecerunt, ut mortuorum cumulus ad pyri radices non parvus in terrà succreverit. Reliqua minorum pars mediaeque acies, non animos propterea ponere, aut loco cedere voluerunt; sed centuriatis spiritibus tentant, pertinaciusque instantes, atque aciem acie prementes majori quam antea numero arborem conscenderunt, hostesque à tergo, à latere, & à fronte undique pungentes, manus herbamque dare vi coegerunt. Magnae majoribus vires ad victoriam valuissent, nisi minorum praevaluisset numerus, unamque viginti simul essent adortæ. Hæc acta sub Eugenio IV. Pontificis cathedram occupante, spectante Nicolao Pistoriense jurisconsultissimo viro, omnemque pugnam bona & sincera fide narrante. Tale quid Olavus Magnus recenset Upsaliæ & Holmiæ contigisse, antequam Barbarus, & immanis ille Tyrannus Christiernus Secundus à Sueciæ incolis è Gothorum Suecorumque regionibus fuit expulsus. Quo in praelio illud non omittendum. Minores post adeptam victoriam suorum cadavera inhumasse, relictis hostibus, & ad corvos, porosque expositis. Martis item in aream Campanile elegerant altissimum, ac si Tyrannorum prodigium ejusque Satellites, ad sui fati *δοκοναλυσιν* poenæque imminentis contemplationem, clarâ voce vocarent atque traherent.

Ufus.

In Indiis in *cibis* sumi, & quidem pipere conditas, inferius dicemus. In *Medicamentis* maximo sunt usui. Aqua ex iis destillata vomitum excitat, & febres solvit apud Gesnerum. Omnem intermittentem febrem curabis, si æger omnium unguium præsemina pro formicarum foribus projici curet, & primam ea trahentem apprehenderit, colloque subnexam gestaverit, si prodentibus fides est. Ova trita & auribus imposita, quemvis obtusum auditum sanant, si Marcello credimus. Eadem inter psilothra numerat Arnoldus, & ad phagædænas commendat. Quidam conterunt, & aquosam substantiam expressam instillant. Balneo myrmecino calculus pellicitur. Oleo, & aqua destillata virilitas promovetur. Gesnerus, ollam melle intus obductam, & ad medias formicis plenam accipit, pyrethro, nuce moschata, cardamomo, pipere longo, & butyro additis. In fimo macerata destillantur. Aquæ aliquid jejuno exhibetur. Brunfelsius quatuor in potu sumptas, omnem coeundi potentiam auferre scripsit. Cum sale communi, ovis & axungia, panno interposito applicatas,

Ischiadicam tollere idem author est: Impetigini cum modico sale appositas, præfenti remedio esse, Marcellus; pruritui & scabiei è papulis, Serenus: status potenter dissipare, Albertus: clavos & tumores auferre Nonnus. Ursis in nausea ex plenitudine, & postquam mandragoræ poma degustavere mederi, ex Plutarcho; supercilia cum muscis tritas denigrare; tritas, adjecto sale, psoras, lepras, & lentigines curare, quinque contra phalangiorum morfus auxiliari, ex Plinio habemus. Idem, *Plin. H. N.* terram à formicis egestam, aliquos strumis *30. c. 3.* illinere scribit.

De Ufu dixi: meminere & *damnorum* *Damna & Remedia.* authores. Venenum morfu suo spargere, & pustulas excitare, Albertus prodidit. Apud Cumanenses, capita, inter venena quibus sagittas inficiunt, sumuntur. Ova pota, flatulentiam & ventris tormina excitant. Agris, hortis, horreis, areis, arboribus, vitibus, frugibus, fructibus, cibis insidiari, notius est quam ut demonstrari debeat. *Remedia* passim apud authores occurrunt. Rubrica & pice liquida ab arboribus abiguntur, si caudices perunxeris. Sunt qui caudicem succo Cyrenaico, ex aceto soluto inungunt, vel hedera amiciunt. Non exedent vitem, si bitumine cum oleo cocto, imas vites tetigeris. Ex latibulis pellentur, si vel tithymali ex aqua decocto, vel cochlearum testis cum styrace uestis, vel origani sulfurisque pulvisculo, ea consperferis. *Arist. H. A.* Sabinus Tyro, apud Plinium, heliotropio *4. c. 8.* necari putat. *Plin. H. N.* *19. c. 10.* *Differentiæ.*

Differentiæ formicarum, à *constitutione corporis, loco, quantitate, colore & effectis sumuntur.* Illam si spectes, sunt quædam *alatae*, quædam *semiformicæ*. *Alatae*, de quibus supra, apud nos senes sunt & inutiles & ejusdem generis, nymphæ dictæ. In India Orientali laccam conficiunt, & in Brasilia, ut post dicemus, rubri sunt coloris. Habentur & in aquilone *alatae*. *Semiformicæ* quæ & semivermes, in Occidentali India inveniunt, Comixen indigenis dictas. Alba velut cauda prœrepunt, & ligna erodendo penetrant. Arbores vel parietes scanfuræ, opercula terrea, digitum crassa secum ferunt, in iisque ad quatuor & ultra palmos productis, nidulantur: *Ex Loco* sunt *Indicæ, Brasilienses, Philippinæ, & Aquilonares.* De *Indicis* ita Plinius. *Indicæ formicæ cornuâ, Erythris in aede Herculis fixa, miraculo fuere. Aurum ex cavernis egerunt terræ, in regione septentrionalium Indorum, qui Dardæ vocantur. Ipsius color felium, magnitudo Egypti luporum: Erutum hoc ab iis tempore hyberno, Indi furantur æstivo fervore, conditis propter vaporem in cuniculos formicis: quæ tamen odore sollicitatæ provolant, crebroque lacerant, quamvis prævalentibus camelis fugientes. Tanta pernicitas feri-*

*Plur. de Jo-
leat. anim.**Damna &
Remedia.**Arist. H. A.*
4. c. 8.
Plin. H. N.
19. c. 10.
*Differentiæ.**Ovioid. Indid.*
*Occid. c. 52.**Plin. H. N.*
*11. c. 31.**Plin. H. N.*
*28. c. 7.**Plin. H. N.*
27. c. ult.

Syrabo Geog.
37. l. 15.

Ælian. H. A.
3. c. 4. § 1.
26. c. 15.

Cardan. de
subt. l. 9.

Dalechamp.
H. P. l. 18. c. 1

Nieremb.
Exor. l. 13. c.
13. p. 28.

Ovied. in bi-
sior. novi
orbis.

feritasque est cum amore auri. Nearchus earum pellem, pardi pelli similem sibi vitam scribit. Solinus, pedes illis leoninos tribuit. Ælianus Campylin fluvium nunquam transire auctor est: domunculas, sinuosas foraminibus obliqua, in excelsis locis construere, ut fluvio rem alluviones effugiant, addit. Aggeres aggesti confirmantur magis. Primum enim ex matutino rore pulveri admixto, tunicâ tenui sed validâ vestiuntur: inferiore parte, de fluviali cœno, cortex muscosus adnascens, aggerem stringit. Fides sit penes auctores. Strabo talia prodentes, ridet; Arrianus rejicit; moderni navigatores tacent; non omisuri, si veritati responderet relatio. Taceo ergo & Rhasis formicam, publicè in regno Persidis nutritam, quæ in dies singulos libram carnis comederet: taceo & illas, quæ apud hydrophagos, catuli magnitudine reperiri dicuntur. Laccam in Orientali India conficere certissimum. In regno Pegu cum terra pluvia, vel aqua justo plus irrigatur, ligna tenuia ab incolis disposita confcendunt. Ex illis certagummi species defluit, quod illæ exfugunt & circa ramos, ut Apes mel ac ceram diffundunt. Stercus favaginemve ipsarum esse, Delechamgio visum. Acoſta arborem nominat, Lusitanis, Mancanos de la India dictam, quæ alatis perpetuò onusta æstate videtur. *Brasiliensis*; velut forfices in ore habent, quibus fata & fruges abscondunt. Morsu earum arescunt omnia. In sinu Salvatoris inveniuntur. De rubris in sequentibus agetur. Apud eosdem, si non alibi, aliæ agros depopulantur, aliæ eosdem, vastatores pellenso conservant. De *Philippinis* ita Nierembergius. Reperiuntur in Philippicis, duo formicarum genera, *sulum* dicta, quarum aliæ sunt sex digitos longæ, ac crassæ digitum latum, coloris nigri nitidique, rictu dimidii digiti prædura maxilla, & eodem quo corpus colore, cui tres hærent dentes tenues & firmi, vivuntque in montium arboribus. Aliæ sunt alatis *formicis similes*, & aliquando majores. Vivunt in campestribus, atque adversus hyemis injurias congerunt arenæ acervos incredibilis magnitudinis, intra quos favos construunt, ubi & tutæ & munitissimæ degunt.

Aquilonarium una species est, quæ ex frondibus pini & abietis in edito aliquo in campis loco, nidos ædificat. Ursoſ insidiantes adeò solerter invadit, ut ejiciat. Si vel unica pilis immersa in latebras delata fuerit, ita foeticat, ut & inde urſi pelantur.

A quantitate, aliæ sunt *magnæ*, quales Indicæ, aliæ, *minimæ* quales in novo orbe reperiuntur. Domum modii magnitudinis sibi exstruunt, lutum adeò dureſcit, ut glutinis instar appareat, nec gladio penetrari possit. Ad ingressum ostium latens

constituitur. Apud Brachmanias palmatis sunt longitudinis: in nova Hispania, scabæos æquant. Majores Aristoteles *πρωτομυρμηκας* nominat; Gaza formicas equites vertit, Plinius *Herculanæ*. Ille in Sicilia inveniri, Abensina in Lycia negat. Ad *minores* & illæ spectant, in novo orbe, quæ domos luteas, sphaericas, capitis magnitudine, parant, quas per prælongum accessum, quasi exiguum fistulam, ingrediuntur, ibidemque horrea conficiunt. *Acolore* sunt *albæ*, vel *rubræ*. Illas in regno Nigritarum, Senegæ, Pephno parva infusa, vel potius Pheneo Laconicæ invenies. Humiles in Senega casae exstruunt, & absque calce ferruminant; elibanos vel ruscula in ordine dices. Aliquando enim centum & centum quinquaginta se subsequuntur. De *albis* etiam ita Nierembergius: Circa montem Leænæ, album genus formicarum est, idolis inclusarum. Vocant idola quædam *Chimas*, quæ pyramidis artificiosæ formam referunt, in quibus formicæ albæ, quæ foras non prodeant, sed internis cellulis distinctæ, ut quo vivant cibo incertum sit reptantes cursitantesque apparent. Has Chinas formidant barbari. Quocirca mancipium cœmunt, ante pyramidem huic vinum aliaque offerunt, mancipium sistunt, eique quodammodo devotent, orantes ut ipsum, si fugam ineat, serpentes, lacertæ, tigridesque dilacerent. Quas servi minas adeò exhorrescunt, ut etsi ab heris acerrimè vapulent, inire fugam minimè ausint.

Rubræ in provincia Mangi, quibus cum pipere vescuntur, & Brasiliâ visuntur. Magnæ hæ, & dum conteruntur, cedri odorem spirant. De iis ita Aldrovandus: Verno tempore, hoc est, mense Septembri magnum sensim foetuum agmen educunt idque eo potissimum die, qui pluviam subsequitur, atque tonitrua, cum videlicet Solis æstus viget maxime. Parentes præcedunt, ducesque sunt liberis, ore aperto huc, illucque cursitantes, viasque undique complentes, morsus multo quam aliis temporibus acerbiores inducunt, ad sanguinis effusionem usque. Sequuntur subinde liberi magnitudine prævalentes, volatuque novæ sibi habitationes quærunt, tanto sæpè agmine, ut velut densissimam in aëre nubem efficiant. Ubi quiescunt terram eo in loco effodiunt, ac quæque sibi habitacula construit. Vita earum brevis est, ut ex singularum ventre ingens foetuum numerus erumpit. Cum latibula sua egrediuntur, acurrunt Indi, accurrunt & volucres coeli. Indi autem magno cum desiderio tempus hoc expectant, Formicas istas, seu novos fructus in cibi usum colligentes. Accedunt autem ad cavernarum ingressus, eas aquæ ductibus circumsepiunt, adversus mordaces, & graviter morsu vulnerantes paten-


Scal. Exerc.
367. Pau-
san. in La-
con.

Nieremb. H.
E. 13. c. 13.

Aldrov. H.
Inf. 4. c. 1. p.
516.

Wantheuzen Wantzen

Simices



Grafwatzen Schreider
Aldrow

Perlee Libelle





tes formicas sese defendentes. Novas recentefque eas formicas, in multis dies servant, ac igne torrentes devorant. Quam modo suavem, delicatamque cibum præbeant, testantur Jesuitæ, qui & ipsi illis vescuntur. Ab *Effectu Venenata* quædam dicuntur. Tales Telephus Cretensis *Laertas* nuncupat. In Brasilia nidum, hirundinum more in arboribus faciunt. In isthmo del Sur & Nort, tam duras casae erigunt, vix securibus rumpi possint. Indi iis sagittas inficiunt. Istis, necessario moriendum est.

ARTICULUS II.

De Cimice.

Cimici nomen Latini à *κῆμα* cubo, quod in cubilibus nascatur, imposuisse videntur: nisi fortè à *cama*, lecto brevi, & circa terram deducere volueris. Græci *κῆμα* vocant, à Coriherba, quam Latini Cimicariam dicunt. Appellatur & *αἰς*, & à recentioribus *κῆμα*.

Fastidiendum natura animal est, ut Plinius loquitur, & simile ferè ricino. Corpore est rhomboide, colore nigro, parum rubente: pedibus tribus, & juxta collum brevibus: dorso & ventre incisuris notato: Cuti apertè tenera, ut vel levissimo contactu media crepet, foetoremque abominandum expiret.

Reperiuntur in lectis, abiegnis inprimis, & quorum linteamina & stramina raro renovantur; parietibus lectis proximis, & alabastris obductis; coturnicum caveis; libris chartaceis.

In insula S. Thomæ non inveniri, prodidere quidam. De die in parietum rimis stabulantur. Ex cujusdam mulieris apertâ calvaria, magna Cimicum multitudo prorupit. Hominum sanguine, quem fugant vitant: post morsum vestigia purpurascencia cum dolore pruriginoso tumida relinquuntur. Victitare & aliis vel exinde colligas, quod in iis etiam lectis inveniantur, quos nemo frequentat. Ex humore per summa corporum animalium exsudante, generari apud Aristotelem habemus. Oriri & ex humoribus aliis circa lectos putrescentibus, & è lignis paulatim exsulantibus nullum dubium. Vidit Aldrovandus peregrinantium vel rus euntium lectos subinde à Cimicibus infestatos, cum nulli præsentibus apparuerint. Scaliger etiam inter chartaceos libros, oriri innuit. In coturnicum caveis, maximè brevi tempore multiplicantur. Propagari & per coitum Pennius in agro Aurelianiensi animadvertit. In dissecta vagina adultos & juniores, cum magno ovorum dilutius albicantium numero comperit. Cardanus Carthusianos cum iis non conflictari, quod carnibus abstine-

rent, ridiculè credidit. Tolo sati lectuli, inquit Scaliger, carnes non esitant, & nihilominus eâ peste sunt infames. Vulgò jactatum est è contritis alios oriri. Pestem multiplicatos præfagire, apud Alexandrum Benedictum habetur.

Arcentur ab ingressu, cucumeris anguini aquâ alicubi reposita, felle bubulo acetato permixto & lecto inuncto: crinibus equi in ostio cubiculi suspensis: nigellæ & cicutæ fumo. *Fugant eos*, Canabis in lecto posita: sterçus tauri si eo suffitus fiat: Genistæ communis filiquæ semine prægnantes, si sub pulvinari ponantur: odor rubrarum pellium, quas, Neuschæder Germani vocant: pix liquida, & cucumeris sylvestris succus cubilibus inspersus. Cornu cervinum vel leporis pedes circa lectum pendentes, fæces butyri coctæ: obolus lecto substratus, &c. *Necantur*, tintura sulphuris: foliis hederæ cum decem hirudinibus tritis; lupini madentis imbre: foliis utriusque filicis fumo Chalcanthi & æruginis: calce cum lixivio fervente mixta staphidiagria, hydrargiro, sulfure, & oleo laurino, additis; illis denique, quæ apud Aldrovandum occurrunt.

Conferunt, in serpentum morsibus, si cum testudinis sanguine sumantur: contra epilepsiam ab utero, si suffiantur ægræ in Tertianis si cum allio & mero tribus diebus vel ovo sumantur. Gesnerus fidem facit: in quartanis, si cavis fabarum inclusi, ante febrium significationes septeni devorentur: in urinæ suppressione, si fistulæ urinariæ indantur. Plinius in aspidum morfu commendat: Vegetius in stragula equorum si unus in aurem, alter in meatum penis imponatur; Galenus in urinæ incontinentia: in Calculo Valerianus: in eodem cineres per clysterem injectos, recentiores & quidem mirè: in colica Gesnerus quatuor ex vino manè bibitos, per tot dies donec duodecem devorati fuerint. Sic Functum urbis Tigrinæ nepotem liberatum, & cæt.

Alii sunt *Domestici*, de quibus hic: alii sylvestres, de quibus inter alata egimus.

Ad eos pertinent *Hocitexca*, & *vermis cornutus*. *Hocitexca* denarium æquat magnitudine, teterrimo odore, & haustu sanguinis infensa: morsu excitat rubeas eruptiones. *Vermis cornutus* apud Mechoacanenses ytzuaqua & sipantipe dictus. Duobus corniculis rubris iter prætentat, nigro fuscoque variegatus.

ARTICULUS III.

De Pediculo, & Syronibus.

Pediculo à pedibus nomen est. Plinius dicitur *pedunculus*, aliis priscis *Pedes*, & *pes*; & quidem in foemino

M

ge.

genere; nonnullis *sexcupes, vermis, serpens*, &c. A Græcis vocatur communiter, *φθεῖρ*, modernis *ψύρα*; Achæis *νίον* & *νίον*; aliis *καρύν*, *ἐγκαρύν*, *καθερύν*, *ἀρπιδών*, *βερύλδα*, *πάρδακα*, &c. *πολύποδες*, & *λίγνια*, species sunt.

De *Descriptione & Loco*, non est quod simus folliciti.

Generatio. Ex carne oriri, & futuris, pustulas quasdam emergere; ex punctis, pediculos fundi, Aristoteles putavit; ex corrupto sanguine Theophrastus: ex materia putri calida & humida, quæ in cute redundat, Mercurialis.

Sanguinem inprimis pituitosum hic locum habere dicerem, cum biliosus & melancholicus, interimat eisdem, & felle illito intereant. Locum si spectes, inter cutem & carnem prodire visus est dixisse Galenus: in toto gigii corpore, cum ubique porosa cutis sit, nemo negaverit.

Dicendum tamen, in capite magis, & ad axillarum & inguinum emunctoria, erumpere. Copia ibi excrementorum colligitur, & pilis obstructæ sordēs, distillatione negata promptius longè putrescunt. Nec collum, licet detectum & glabrum eximendum est. Cum enim & illic emunctorium, cum amplissimis quæ humorem ad caput deferunt vasis, frequentior & copiosior illic sudor excitatur. De efficiente tot sunt sententiæ, quot de spontaneo viventium ortu occurrunt. Principium ibi oculculum esse necesse est, animatumque illud, sed quod ab alio in actum deduci oportebit, ut alibi dicemus. Occasionem ortus nonnulla præbere, experientia docuit. De Ocimi cibo id apud Plinium legimus, de castaneis & ficubus, apud Galenum. Idem de raphano, xyloaloe suffita, apio hortensi, dactylis, &c. apud Diodor. in Empiricis traduntur. Lanam ovis à lupō admorsæ, si vestis ex ea sudore madeat, eos procreare, apud Aristotelem & Plutarchum habetur: imò pannosequino adipe illitos idem efficere, apud Mousetum. Accedit complexio, regio & cultus. In India Occidentali Christianis ne in capite quidem innasci, prodidit Oviedus; incolis ubique. In insula S. Thomæ, nigri pediculis scatent, albi ab iisdem non attinguntur, si Vespucio credimus. Iter maris Indi qui ingredi solent, pediculos; ubi Azores insulas à tergo reliquere, confestim tabescere ajunt: subito oriri ubi eas reviserint. Oviedus de trajectu æquinoctialis lineæ id sumit. In tota Hibernia ob immunditiam diffuere dicuntur, nihil de ergastulis dicam.

Plut. Symp. 2. 9. 49.
Mouset. Theatri Insect. l. 2. c. 22.

Ovie c. 82.

Morbus pedicular.

Pedicularis hinc aliquando morbus, quo haud paucos mortuos, Historicis proditum: illos inprimis, qui vel sævitie famam quærere, vel divinitatem aucupari volebant. De Antiocho Epiphane in

Maccabæorum libris legimus: de Hero de Ascalonita, apud Josephum: de Hero de Antipa in Actis Apostolorum: de Pheretima Cyrenæorum regina, postquam Barcæos ob interfectum filium crudelissimè ulta esset, apud Herodotum. Eodem morbo periisse traduntur, Pherecides Syrus Pythagoræ præceptor; Cassander Antipatri Fil. qui Alexandri matrem & filios interfecit; Sylla, quem Plinius, erodente seipso & supplicia sibi gignente, periisse scribit: Vidisse se sævō ab agmine vinci Sammonicus. Idem de Euno fervō in Sicilia, Galerio, Maximino, Speusippo Eurymedontis filio, Juliano Juliani apostatæ avunculo, qui Antiochiæ sacram mentem perminxerat, & aliis proditum est.

Remedia contra eos plurima apud autores invenies. Dioscoridi allium cum origano decoctum, vel coriandrum cum eodem tritum probatur. Plinio Staphidis agriæ femina corticibus abjectis trita: sinapi, allium cum aceto & nitro, oleum raphaninum, extra: senēta anguium trita myricæ semen, aqua ex raphani foliis, &c. intra laudantur. Oribasius, ad helxines succum diu infricatum confugit: ad berberis folia Rhafis: ad argentum vivum oleo rosaceo, nec malè, Abensina. Fallopius ceratum ex oleo, argento liquido & cera componit, eoque corpus inungit. Nonnulli statim interimi putant; si cingulum ex lana eodem illitum, nudo ventri circumligetur. Idem linimenti, quod ex pomī cocti medulla cum argento vivo componitur, author est. Quidam apud Mousetum Nosocomii præfectus, virgis betuleis nova pelle ægros vestiebat, quæ vibicibus picta, pediculos postea non admisit. Plura apud Aldrovandum & Mousetum vide.

Cumani, si navigatoribus credendum, & crudis & coctis vescuntur, quod & Phtrophagis olim fvetum. Ictericis, si duodecim contusos ex vino vel cum butyro exhibebis, certo certius subveniunt. Quidam in dysuria vivos & grandes coli immittunt: Si ex diuturno morbo decumbentibus, in capite nascantur, solutionem morbi indicant.

Differentiæ à subiectis fumuntur. Sunt enim alii *Hominum*, alii *Brutorum*, quibus & qui in plantis Mousetum adjungit. *Homines* qui infestant, vel sunt *Mansueti*, vel feri, vel *Syrones* & minimi. *Mansueti* inter digitos leviter fricati quadranguli videntur, & pulcibus paulo duriores. in capite nati, majores sunt, nigriores, quod succus ibi pinguior; longiores & velociores; in reliquo corpore magis obefuli, ventriosi, tardi, obscure albidī, & nigricantibus liris insigniti. Aldrovandus oblongiores cæteris, in postica parte crassiores, versus caput in acutum desinentes dixit. Gignuntur & in vestibus laneis, leucophæis inprimis, Pueris magis, viris minus in capite

Macc. l. 2.

c. 1.
Joseph. Antiq. l. 18. c. 1.

Herod. l. 4.

Plin. H. N. l. 11. c. 13.

Remedia contra morbum.

Ufus.

Differentiæ. Ar. H. A. l. 5. c. 31.

capite oriuntur: nec male tum illud valet. *Feros alii pediculos inguinales, Ciccos, ricinos humanos, & vulturinos pediculos* vocant. Italis *Piatola & Piatones*, aliis *Platula & Platulae* dicuntur. Palpebras, pubem, inguina & axillas occupant. Compresiore sunt corpore, acutiore rostro, quo tam alte cutem penetrant, ut vix cum capitis iactura avelli possint. Raro vagantur, sed loco quem sibi excavavere affiguntur. Duriores mansuetis Aristoteles dixit. Quia minus turgiduli, aridiorem & quasi semiasatam materiam fortiti videntur. In Synonymiis, *Motes & Immites* dicuntur. Palpebras saepe ita infestant, ut oculis exulceratis, visus aciem obtundant. Evelli primo diligenter debent: mox sapone nigro acerrimo locus optimè inungi, & si corpus fuerit calidius, argento vivo, pomi dulcis pulpa excepto. Lixivium senæ, vini facem, succum genistæ, magnificiunt Medici: Varignana, decoctum ex staphidis agræ unc. ij. vini phialis iij. setarum porcinar. unc. ij. Hydrarg. purgati unc. j. parat. *Syrones* antiquitati ignotos, Thomæ à Veiga opinio; *αυαρίδιον* Aristotelis esse, Moufeti. Videntur *αυαρίδιον* *εργον* dici, quia tractum sub cute repunt. Latini *Pedicellos*, Taurini *Sciros*, Vascones *Brigantes*, Itali *Cirones* vocant. Langius inter pediculos refert, Moufetus non item. Nulla illis expressa forma præterquam globi: vix oculis capitur magnitudo tam pusilla, ut unum ex Epicuri atomis diceret. Colore sunt albicante, capite excepto: propius intuenti nigricant, vel parum ex nigro rubent. Ita sub manuum, crurum & pedum cute habitant, ut actis, quamvis pedibus destituantur, cuniculis, & excitatis aqua plenis, penes quas habitant pustulis, pruritus maximum ingenerent. Acui extracti, movent se, si calore Solis adjuventur. Ungue pressi, haud sine sono crepant, aqueumque virus reddunt. Intra oculos, & toto corpore generari, certum. Illud, le Jeune Chirurgus prodidit, apud Moufetum: hoc in nobili quadam Angla sexagenaria accidit. Interdiu & noctu, labius, gingivis, plantis pedum, capite, naso, aliisque partibus lacinata, tandem carne depasta occubuit. Major succedebat soboles, quo diligentius acubus ad stantium effodiebantur. Maximum & præsentissimum eorum venenum, acetum falsum, & vini sublimati portio. Abenzoar corpus pulpa melonum fricat, vel succo foliorum Persici. Plura in Moufeto vide. Huc *Tinea* pertinent, quas Græci *τεχνοπαρῆς, τεχνοπαρίδας, ονίξας, τεχνοπαρῆς*, vocant. Nascuntur saepe in capite, & pilorum radices exedunt. Succo limonum cum aqua vitæ & sale usto mistis, & inunctis, depelluntur. Alii, panis filiginei calidi micæ saepius alligatas commendant. Fortè nec semen in abiete

summa crescens; in cineres redactum & aspersum oberit. Oviedus *Niguae* bestiolæ apud Indos Occidentales meminit: de qua sub pulice. Nec est quod *Dermestis* insecti oblivescamur, quamvis ad hominem non pertineat. Pelles id consumit, & pro earum ratione colorem mutat. Pulicis est magnitudine, pedum sex, & forcipatirostri.

Bruta quod concernit, *Leo* adeo à pediculis in palpebris infestatur, aut aliquando in rabiem conjiatur. *Equi* rubentes capitis reliquo corpore albicantes habent. *Boum & utiulorum*, nigri sunt. *Porcorum*, qui *Vrii* ab urendo, adeo grandes & duri, ut vix digitis interimantur. *Canum* sunt parvi, lentiginosi, capite albicante, reliquo corpore excoeruleo livente vel nigricante. *Ovium* minuti valde, quibus capita rubent, corpora candicant. *Cervorum*, capiti concolores. *Capror.* ab ovillis parum differunt. *Avium* exigui sunt. In capite potissimum atque alis oriri, Columella testatur. De Phasianis, perdicibus, coturnicibus Gallinis, &c. taceo. *Asino* parvum, quod tardo gradu incedens, nullo sudore perfluat. *Salmones* macilentiores sub brachiis pediculis scatere vidit Plinius. In Abrotano, Ablynthio, Nymphææ floribus, & potissimum Aquilegæ foliis, mense Junio, ob singularem ejus dulcedinem haberi, Moufetus author est.

ARTICULUS IV.

De Ricino, & Reduvio.

Ricinus, nomen à Ricini plantæ seminibus, quæ æmulatur, apud Latinos obtinuit. Vulgo Græcor. dicitur *κεστρων* Hefychio *δοκόν*, Suidæ *κδορ*, aliis *κνιδόπιας*, Ferlinis, ut ex Didymo Zelonote apud Hermolaum Barbarum accepimus, *καυγίς*. Gaza *Reduvium* vocat, Albertus *Tacam*, Guillerinus de conchis Eugulam, Sypon-tinus *κνωπίαν*, sed falso, Scaliger *Cicam*, vel *Ceccam*. Insectum est parvum, compresso valde & plano corpore, cute admodum tenaci, figura corporis rhomboide, colore nigro cum quodam splendore, aut ex fusco obscure nigricante. Sex habet pedes collo affixos, rostellum acutum sed breve, exitum excrementi nullum. Estate ineunte in pascuis inter gramina, & in sylvis inter folia ex putri quodam humore nascitur. Gignitur aliquando in carnibus. *Observavi*, inquit Aldrovandus, *saepè in canibus, quod cum domo egredierentur, ipsorum Ricinis carerent, redeuntes vero ex agris, ubi frequentior, spissior, & altior herba erat, eis insecti essent*. Infixo semper sanguini capite vivit, atque ita intumescens, quia ei, ut dixi, nullus cibi exitus, dehiscit nimia satietate, alimentoque ipso moritur. Equè est mira sanguinis, ut Hi-

Colum. R. R. l. 3. c. 7.

Aldr. Hist. Inf. l. 5. c. 5.

Moufet. The. Insect. l. 2. c. 26.

rudinum generi in palustri aqua sitis. Perfert tamen & famen per septiduum. Sanguis igni sacro auxiliatur: mulieris lumbis si inungatur, veneris tedium parit. Ex aure sinistra canis avulsus, omnes dolores adalligatus sistit, ut Plinius ex Nigidio prodidit. Præservantur ab eo canes, si aures oleo nucum avellanarum & amygdalarum amararum illinantur, vel ex vino, aceto, cumino & aqua falsa abluantur.

Plin. H. N.
l. 22. c. 18.

Monst. l. c.

Adeò similis ricino *Reduvius*, ut sæpe inter se confundantur. Rostellum ipsi longius, pedes obscure rubent, dorsum cineritio est colore, tribus minutissimis nigricantibus punctis distinctum, & ad cordis figuram effigiatum. Corpus à maxima repletione nunquam ita distentum, quin semper compressum, nunquam globosum videatur. Caput rarius cuti infigitur. Sanguinem per vices exugit, & excrementa inde genita per alvum exprimit: quæ lanam viridi colore ita tingunt, ut vix calido lixivio ablui possit. In vellere detonso annum integrum vivit, & boves, oves, capras, barbam etiam hominis & inguinam infestat.

Tolluntur mandragoræ radice, cedria, pice liquida & sevo ovillo, amurca optime depurata, & vini fortioribus fœcibus, cum decocto lupinorum, si iis oves detonsæ illinantur. Reduviorum pulveris drachma una & semis, in potu exhibita, Ictericam certissimè & cito sanat, si quibusdam Anglis credendum.

ARTICULUS V.

De Pulice.

Aldrov. de
Ins. l. 5. c. 5.
Monst. Tb.
Ins. l. 2. c. 28.
Descriptio.

Pulex, quod ex pulvere generetur dicitur. Græcis est *ψύλλα*, *ψύλλας*, Æolibus *αρόλλα*. Caput illi exiguum, os torosum, collum breviusculum, *proboscis*, cuius mucro rigidior, sine dubio cava, ut sanguinem exugat, & intus transvehat. Duæ minutissimæ è fronte antennæ, quibustum viam explorat, tum de objectorum natura judicat. Oculos habere vel inde colligas, quod luce se subducant. Posteriora crurcula ventrem versus retrò flectuntur, anteriora ad pectus, Extremæ tibiæ, bifidæ, uncatæ, acutæ, & corneæ quasi, tum ut certius sublimia scandat, tum ut glabræ cuti firmius adhæreat. Intestinum unum minutissimum & implicatum, quod pro cibi quantitate, vel relaxatur, vel contrahitur. Non tantum in animalibus, canibus, vulpibus, homine reperiuntur, sed & in terra subsiliunt. Hea civitas propter caprarum abundantiam, eorum est feracissima. In territorio Sigelucensi, nec ii quidem qui importantur vivunt. Loca calida & solè illustrata amant. Sanguinis sunt appetentissimi. Oriuntur ex pulvere,

Arist. de
part. anim.
lib. 4. c. 6.

Vitus.

Locus.

Ortus.

inprimis si capræ aut hominis urina præmadefiat. Sed & inter pilos canis, ex humore succido putrescente. In Perienna regione, è mancipiorum sudoris guttis, quæ statim in pulices delapsæ convertuntur. Coeunt mare fœminam conscendente, diuque in coitu hærent. A coitu gravis fœmina obessior videtur, ovorum plena, quæ in ventre oblonga, minutissima, numerosa & candida videntur, exclusa, repente nigricant & in pulicellos minutissimos abeunt. Ova non lendes parere, apud Philoponum habemus: quod & Niphus tradidit. De *Natura* hæc habet: carni putri vel mortuæ non insidere, nec morbo regio laborantes, & quidem ob succi amaritudinem, nec morituros, ob ejusdem fœtorem, attingere. Nocte inprimis infestare. A pastu in lodices villosas vel pulverem se abscondere. A morsu locum rubicunda macula notatum dimittere. Imminentibus pluviiis maximè mordere: frigore deficere & mori.

Natura:

Pelluntur variis, inprimis verò, equæ urina & fœcibus, aqua marina, decoctionis arsenici aut sublimati, calce viva cum hellebori albi succo permixta, &c. Eisdem negotio inserviunt caules, ebuli folia, filix, anchusæ radix, pulegii flores, ruta, colocynthis, rubus, oleander, mentha, lupulus, rapi semen, cuminum, staphis agria, persicaria, sinapi, & alia, quæ apud authores vide. Alcairi redigitur in pulverem persicaria: pulveris circa lectos sparsi odore ita soporantur, ut non mordeant. Numidiæ mancipia quia calceis destituta, injuriis hujus animalculi nimis sunt obnoxia, ferro, & igne eadem arcere solent. Multi ex eo digitis pedum, vel pedibus integris mutilati superfuere.

Fuga:

Sunt alii *Communes*, rariores alii. Illi pediculorum magnitudine, sed molliore corpore, dorso gibboso, & ferè porcino. Pectus venterque ex nigro flavent. In catellis candidis sunt dilutiores, in ruffis fulvidiores, in nigris nigriores. In Hispaniola non sunt magni: sed mordent dirissimè. Ex Rarioribus sunt illi quos juxta Nigum fluvium parit India. *Pulicellus* est, inquit Scaliger, *rostrum acutissimo: pedes potissimum invadit, (raro partes alias) non ingreditur tantum, sed & Cubantium quoque. Ideo in sublimi cubant Indi. Frequentissime partem illam quæ subest unguibus, lancinant, quarta die crescere tumor incipit, tum ad eam turget magnitudinem, ut pisum superet. Tumor fœtus est lendibus candidis: quibus extractis, calidos imponunt cineres. Quæ de Numidiæ mancipiis superius diximus, ad eundem spectant.*

Differentiæ.

Scal. Exer.

44. l. 8.

Marogr.

Hist. Bras.

l. 7. c. 3.

ARTICULUS VI.

De Lendibus, Forbicinis, &
Talpa Ferrantis Imperati.Mouf. The-
arri Insect.
8.2.6.35.

TRia hæc animalcula Moufeti & Aldrovandi verbis describemus. *Lendes*, inquit ille, Græci *δένδρας* & *κόνιδας*, Itali *Lendine*. Hispani *Liende*. Germani *Nüsse*. Angli *Nits*. Illyrici *guida*, appellant. Sunt autem minuta quædam animalcula albicantia, Syronibus, (si pedes haberent) quam simillima, sed duplo ferè minora: corpore item oblongiusculo, ex quibus nihil aliud gigni posse Aristoteles testatur. Inter ungues compressi cum sonitu moriuntur; non solum in hominum capillis & ciliis, sed etiam boum & equorum macilentiorum crinitus scatent; pedum exfortes tam pertinaciter nihilominus adhærent ut eadem opera totum pilum qua illos auferas. Has *Trotula* *τεροφώτας* non ineptè dixit, nam ut cochleæ herbarum, sic istæ capillorum succo victitant, eosque depascunt.

Philosophus ex pediculorum coitu provenire cōs affirmat, quorum proinde ova dicuntur. Sunt autem *Iasmini* florum apud nos crescentis similia. Nam sicut ille flores profert feminis expertes, sic pediculi ova pariunt effœta. Moriuntur aut alimenti inopia, aut pectinis densioris usu, aut medicamentorum vi: qualia veteres neoterique medici multa præscribunt. Plinius alumen cum aceto, vel acetum cum felle vitulino miscebat, & lacte item caprino eas tolli affirmabat. Laudat item nitrum cum *Samia* terra illitum, & serobem cornu cervini cum vini epotam. *Abinzoar* cum centaurea minore, & *Alkitrum* capillos inungere præscribit. Sulphur in aceto tollit lendes, uti quoque oleum cum lixivio illitum. Marcellus stercus suillum cum vino & succo rosarum mixtum, mellis item cum sale armeniaci inunctionem, sed præsertim oleum raphani cum fortissimo lixivio variè prædicat. *Hildegardis* ex dactylorum ossibus lixivium parat, quo cum oleo radiculae mixto lendes enecat. *Ardenus* sublimati hydrargyri parum cum vino ardente miscet: atque etiam dicit; Si caput primum ovo gallinaceo, deinde cyclaminis succo, vel aqua marina irrigetur, nunquam renascitur esse lendes. *Gilbertus Anglicus* fel cuiuscunque animalis, uti etiam amara, mundificativa, & aromatica, cum succo calendulae mire effert.

Ejusmodi insecta vulgò *Forbicinæ* dicuntur, quod caudam habeant bifurcatam ad instar forficis: apud Belgas (ut audio)

Oor-Wormen, id est vermes auriculares, seu potius aures petents, siquidem Belgæ existimant in aures irrepere, ut cerebrum offendant. Habitant multum inter uvas, in cavis arborum, foraminibus parietum, sub lapidibus, sub terra. Color eis fermè castaneus, pedes sex; corpus oblongum. Quæ prima pingitur, omnium est vulgatissima, sed nec dum magnitudinem suam adepta. *Secunda* rara & insolens, capite etiam bifurcato, corpore crasso, tota subfusca, & flavescent. *Tertia* ejusdem cum proxima speciei, minima, candida. Prima verò in secunda tabula, nescio an è forbicinarum genere (alata enim est) leucomelana, sive nigra & alba, alis expansis. Numer. 2. eadem clausis alis atro-castanei coloris caudam habet, & bifurcatam & ferratam. Numer. 4. omnium est vulgatissima. Quinta omnium minima caudam habet trifurcatam: sicut etiam sexta corpore admodum crasso, magnis & crassis pedibus tota nigra. Postremo loco pictum insectum, è Gryllorum forte potius, quam Forbicinarum genere; coloris leucophæi, cauda trifida.

Ferrantes Imperatus Neapolitanus diligentissimus ac eruditissimus aromatarius, in naturali sua historia Insectum, quale hic depingimus, *Talpam* nominavit, quod *Talpæ* more pedibus anterioribus ceu manibus terram effodiat: sunt enim pedes utriusque animantis simillimi. Rusticis Neapolitanis, inquit, Gussulo dicitur, sed cur, non explicat. Nostri rustici vocant *Zuccaram*, quos ego secutus vermem cucurbitarium nominavi. Siquidem cucurbitas quas *Zuccas* vocant, summopere infestant. Imperatus hoc insectum hortulanis apprimè odiosum esse ait propter plurima, quæ stripibus damna infert, earum radices devorando. Insectum est quatuor digitos longum, unum verò latum, habitu, corpulentia fere locustæ. In tria segmenta præcipue divitur. Caput enim prima sectione ab ea parte, quam pectus libet appellare ventri supersitem; separatur. Hoc Locustæ ora, & faciem fere antèrius repræsentat, sed oculorum medio quidpiam eminens nonnihil conspicitur, quod nasi vices, & locum tenet. Ocelli utrinque aterrimi splendentes gagatis in modum: sub his duo velut cornicula oblonga tenuia, forsan ad prætentandum iter extant. Extremo rictu, seu fræno alia velut emissitia cornicula, seu appendices in articulos seu internodia quaternæ, aut quina ad commodiorem flexum, minora tamè superioribus, intra verò rictum ipsum, ac oris lateribus alia binæ utrinque appendices, denique sub mento utrinque una protenduntur, quibus ut opinor, tanquam digitis quibusdam, alimentum in ore retinet ac complectitur, & forsan comminuit,

ita ut partim dentium manus obeant. Ter-
ni utroque latere pedes. Primi anticilati,
tribus articulationibus compacti, quarum
extrema velut in digitulos secta est plures a-
cutos ferræ dentes referentes, cristam gal-
li diceres, aut equitis calcar. Media & po-
stica crura similiter tribus constant articu-
lis, sed hæc majora & in femore crassiora
in altum supra tergum elevato medio, seu
poplite, anticis longiora, sed minus lata
majora mediis, hirsutie molli infernè. Ven-
ter lanosus octo compactus est annulis.
Dorsum vestiunt quaternæ alæ, superiores
breves, & latæ, aliis angustis longioribus,
& ad caudam fere extensis incumbentes.
E cauda geminum exit spiculum longius-
culum, ac subtile: cum Gryllo Locustæ
specie affinitatem quandam habere vide-
tur, estque colore fere per totum subca-
staneo.

ARTICULUS VII.


De Sphondyle.

DE Sphondyle seu verticillo (ita dici-
tur, quod circa radices ita convolvatur,
ut verticilli speciem gerat) diversæ
occurrunt sententiæ. Plinius serpentem
facit. Aristoteles & Absyrus, domesticæ
meminere, quæ selpio similis Hesychio
& Camerti ex Aristophanè, aversa coit;
si tetigeris fugit, & præ metu male pedit:
exiguo eadem corpore & subnigro. *Sylvestris*
fit apud Theophrastum mentio. Natura
ejus nullam radicem etiam acrem in-
tactam relinquere. Agricola eum longitu-
dine & crassitie minimo digito æquat. Ca-
pite rubro, reliquo corpore albo, nisi quod
superne sit aliquanto, ubi cibo sumpto
turgēt, nigrum, sepedem, addit. Rodit
radices cucumeris asini, chamæleontis nigri,
centaurii, peucedani, aristolochiæ, vitis
sylvestris, &c. Tertio suæ generationis
anno formicarum instar prorumpere, & Mo-
guntinensem diocesin infestasse, Malleo-
lus author est: anno suum ortum sequente
in scarabæos majales verti, Cordus. Germa-
nis Enger / forte quasi *Enger* dicuntur. An-
glis Aprili & Maio mensibus plurimum
nocent.

De *Differentiis* ita ex sua Observantione
& Camerario Mousetus. Habeo penes me
sphondylam cruciformem, colore ex ei-
nereo albicante, capite nigricante, tacta
veluti sese in sphaeram colligit, & Verti-
cillum foeminarum fuso nentium scite ex-
primit: unde nomen. Extra terram tor-
pet, aëris impatiens. Vulnerata liquorem
emittit dilutius atrum, quo tanquam encau-
sto literas scribere quis possit. Habeo &
rubram sphondylam, intra terram ad duo-
rum pedum profunditatem viventem: cui
caput nigerrimum, os forcipatum: collum

ex luteo rubescens, dorsum cocco infe-
ctum, sex pedes anteriores miniatuli, veri-
ter reliquumque corpus omnino flavum,
nisi lateri utrique juxta ventrem, octo ru-
bescencia punctula, ornatus nomine addita
fuissent. Medium digitum longitudine æ-
quat, & vergente ætate in mulcam trans-
mutata abit. Vidimus quoque *lucidam*,
corpore crassiore, satis à medio dorso ad
caudam cœrulescentem: à collo autem
cæsi magis coloris videbatur, caput illi
flavescens uti & pedes: os forcipatum at-
que rubeculum. Dùm juvenis est, tota
candicat corpore: Livor ætatem sequi-
tur, incipitque à cauda. Mirum quo modo
corpus in latum longumque undoso quo-
dam motu sine loci permutatione agit, ac
inter movendum colores sæpius mutat.
Nam dùm in terra quiescit, albicat tota,
dum verò agitur, quasi per iracundiam,
livescit. Omnino Cossis majoribus similli-
mum Insectum, quod ad corporis formam
attinet, sed illi sese in verticillum agere
& torquere nequeunt. Ex isto vermi ma-
gnum muscæ genus natum conspeximus,
quatuor alis donatum. Aliam denique
habemus juxta *capæ radices* inventam, e-
jusdem fere cum livida magnitudinis, ca-
pite viridi, albo, Xelampelino, coloribus
mixtis notato: nos *Capariam* vocamus,
quarum hic omnium icones representamus.
Nunc insuper Joach. Camerarii de sphon-
dylis sententiam addere placet, cujus mi-
hi judicium semper integrum. Sphondy-
li (inquit) fortè sunt isti vermes qui in
terra inveniuntur, initio Veris planè can-
didi, aut potius nonnihil lividi; qui au-
tumno fiunt obscure virides, & pellucen-
te è cute, pullo quodam succo coloran-
tur: Caput iis spadiceum, nigricans &
satis durum, ut facile radices arrodere pos-
sit. Erucæ statim cōglobantur, & mori-
untur, aliasque resumunt formas, musca-
rum aut erucarum.

Crassitie sunt digiti unius & longitudi-
ne sesquiunciali; pedes habent octo in me-
dio corporis, quod caput spectat: nostri
vocant Erdtworm. Guilandinus dicit
Sphondylos esse vermes, sic dictos, quod
instar verticilli radicibus herbarum circū-
volvuntur. Alii etiam vermes, *nigri sub-
rubentes* testaceoque cortice, multis pe-
dibus instar Scolopendræ præditi (cui e-
tiam cognati, videntur, nisi quod rotun-
diores, nec ita lati) reperiuntur in terra
eruta primâ ætate, eo quo dixi modo (si
quis eos tetigerit) convoluti. Engerlin
quoque vocant Germani vermes subter-
raneos, flavos, nigro capite, juxta quod
pedes tenues: in reliqua parte coporis nul-
li. Hi cum eruti fuerint, in globum se
formant, atque Soli expositi statim tabe-
scunt. Vivunt etiam tantum intra ter-
ram, & plantarum radices arrodunt. Om-



nes hi sese conglobantes vermes, quis non inter Sphondylas censeret?

ARTICULUS VIII.

De Staphylino.

Abfyr. in Hippiatr. Moufet. Theatr. l. 2. c. 7. **S**taphylinus Sphondylo domestico, apud Abfyrum, similis est, qui cum nobis ignotus sit, non est mirum, nec tantam Staphylini notitiam esse. Moufetus duo infecta cum suis iconibus proponit.

Prima tota cum splendore nigricat Blatis non multum dissimilis, sed corpore magis gracili ac longiore. Totum corpus duos digitos transversos vel minus longum, cauda bifurca; quam dum aufugit (fugit autem atque currit valdè velociter) quasi in sui defensionem elevat, ac duos veluti aculeos candidissimos, breves, extrudit: Verum nec pungere eum vidimus, nec ferire; minoresque & molliores aculei sunt, quam ut penetrare possint. Hos dum per iram exierit, effundit cum iis albam & crassam quandam substantiam, sed humido unguento molliorem. Vivit maxima ex parte super terram; sæpius tamen inter segetes supra terram conspicitur.

Altera quam à Kniveto depictam accepit, quæque frequens in Norfolcia, caput habet parvum, è puniceo fuscum, fere globosum; os forcipatum atque exiguum. Proxime à capite tres utrinque pedes; quorum duo priores breves sunt, (Erucarum more) quatuor reliqui colore ferè sanguineo, quadruplo longiores. In medio corpore sub ventre octo habet pedes obtusos, veluti etiam Eruca. Cauda tuberosa, & duabus setis bifurca. Venenatam utriusque naturam ex eo didicimus, quod equi duo, dum cum fœno eas devorarent, toto corpore inflati interierunt.

Meminit Staphylinorum & Cordus, qui Gallis Courtilles. Inveniuntur in hortis parvi digiti quandoque longitudine, tumulosque elewant more talparum, in quibus dormiunt. Thymum potissimum & sambucum infestant; sed non ita, quin aliis quibuscunque herbis plantisque vim inferant.

ARTICULUS IX.

De Anthreno & Afello Arvensi.

Referre huc placet Anthrenum & Afellum arvensem Moufeti. Illum Græci ἀνθρήνιον ἀνθρήνιον, alii Crabronem reptilem, quidam speciem Phalangii, Plinius pennis tantum à Crabronibus differentem. Rostrum illi, inquit Moufetus, aduncum, & forcipatum, vultusque erectus. Noctuum

illam cornutam (qualem in Belgio vidimus) plenè exprimit; Oculos habet piceos, pectus hirsutum valde & fulvidum; pedes ortu flavi, deinde fuscii: octo incisuris ex rubro flavescentibus constat reliquum corpus, quas maculæ in dorso Coracinæ valdè ornant. A summo rostro antennæ sive cornua emergunt flava, hirsuta, flexibilia, tamen tactu nonnihil dura. Morsum ore infert ægrè curabilem; non ita tamen lethalem, ut Phalangium videatur, nec ita lenem quin Crabronis superet.

Afellus arvensis ob similitudinem, quam cum afello habet, dicitur. Reperitur inter arvos, segetes, pedum duntaxat numero (quippe sex tantum parvos & nigricantes habet) à reliquis discrepans; Collum illi brevissimum, corpus latiusculum, compressum; cauda aliquantum mucronata. Julio mense agro Colcestriensi eum Pennius vidit, alias nunquam reperit. Quem in Medicina usum obtinuit, nobis adhuc inexploratum est.

CAPUT II.

De Insectis apteris octopedum.

ARTICULUS I.

De Scorpione.

Insecta aptera octo pedum sunt *Scorpio* Nomen: Aldr. Hist. Inf. l. 5. c. 11. Moufet. Theatr. l. 2. c. 10. & *Araneus*. *Scorpius* nomen apud Græcos το σκorpion, quod venenum jaculetur; vel ut alii το σκorpion, quod flexuose serpat, nomen invenit. Plinio *Scorpio* etiam, Ciceroni & aliis *Hepa*, Pandectario *Satocollos* dicitur.

Animalculum est colore subatro & veluti fuligineo, corpore oviformi, Capite, quod in pectoris summitate gerit, latente, Oculis tam exiguis ut penè nulli conspiciantur. Pedes habet octo: chelis & forcipibus solidis furcata bina *brachia*, cæteris grandiora, fluvialibus astacis & cancris haud absimilia. Aristoteles quinque bisulcis dentata forcipibus habere scribit. Ex corporis imo, cauda producitur, globulis multis septem plarumque, aliquando sex, & novem, quorum ultimus, cæteris longior, solus præfixo simplici vel duplicato aculeo, & nonnihil reflexo ad ipsius extremitatem, armatur. Dentem Plinius dixit. De lingua nescio quid apud Gordonium habeas. Lambere ea cunctem dicuntur. An tenui fistula quod Plinio, Eliano, & Nicandro, visum, pertusus sit aculeus, qua venenum ejaculetur, authores viderint. Galenus certe negat. Admitti fortè potest, cum & viperæ sectione, sub dentibus vesicula lateat, è qua

Descriptio.

Arist. H. A. l. 4. c. 7.

Plin. H. N. l. 11. c. 37.
 Nicand. in Theriac.
 Plin. H. N. l. 11. c. 37.
 Elian. H. A. l. 9. c. 4.
 Galen. de loc. aff. l. 6. c. 5.

qua venenum, cum mordet, effundere solet.

Locus.

Synab. Geogr. l. 16. 17.
Plin. H. N. l. 5. 7. & l. 8. 16. 29.

Ælia. H. A. l. 10. c. 23.
29. l. 15. c. 26. l. 17. c. 40.

Vitus & Generatio
Æl. H. A. l. 6. c. 22.
Plin. H. N. l. 11. c. 25.
& l. 20. c. 12.
Antig. Hist. Mirac. 24.
Holl. Prax. l. 1. c. 1.
Plin. H. N. l. 10. c. 72.
Plin. H. N. l. 20. c. 12.

Plin. H. N. l. 11. c. 25.

Natura & Mores.
Plin. H. N. l. 29. c. 4.
Scal. Exer. 245. l. 3.

Ælia. H. A. l. 8. c. 13.

Æl. l. c.

Venenum & Medela.

Plin. l. 10. c. 25. & l. 11. c. 25.

Loca frigidiora nullos alunt: innoxii qui in Germania & Helvetia habentur. In Italia, Romæ imprimis, America, Persia, inter Sufas imprimis & Mediam, Canariis insulis, Numidia, Scythia, Pescara, Barbaria, Æthiopia, India Orientali prope flumen Estamenum, tanta multitudo, ut incolæ solum vertere necesse habuerint. Plura in differtentiis occurrunt. Sub lapidibus & in parietibus plarumque latitare solent.

Terra vivunt, & aliquibus in locis, herbas, lacertas, aspidas, verticillos, & blattas comedunt. Non coire, sed nimio Solis calore procreari, apud Ælium habemus. Per putrefactionem ex paguris, Crocodili cadavere, silymbrio, ocymo, & si Alberto fides; lignis putridis, nasci, dubitari non debet: per coitum, & quidem vere & autumno, sæpius undenos, Mousetus author est. *Vermiculos*, inquit, *quod vidimus albos, vivos, dvorum specie pariunt & incubant: mox ut prolem perfecerunt, pelluntur ab ipsa, interimunturque magno quidem numero.* Antigonus foetum ab ipsis devorari arbitratur, unum modò solertissimum relinqui, qui ipse matris clunibus imponendo, tutus & à cauda & à morfu fiat: reliquorum hunc ultorem, & supernè parentes conficere.

Nonnisi pilosas partes attingunt. Cum incedunt, transversos sese inferunt. Propter longitudinem enim pedum posteriorum, quos in vacuum ponere necesse habent, ingressionis corrumpitur quadratura. Nunquam mansuescunt, quod Galenus prodidit. Unum per viginti duos dies in oleo vixisse, & in imo vasis ambulasse, Albertus author. Quid in foetum committant, & ab eodem vicissim patiantur, paulò ante dictum. Umbram solis declinantes, umbram petunt: nec nisi calcati, prodeunt & aculeos exerunt. Capite ablandiuntur prius, ut cauda commodius feriant. Nec Isis sacerdotes circa urbem Copton lædere, nec Ppyllos, apud Ælium invenies. Porci nigri percussi, omninò moriuntur: non nigros ab ictu liberos dicunt. In Æthiopia, qui eorum excrementa calcavere, ita pedibus exulcerantur, ut vix convalescant. Nulli animalium nocere, cui non sit sanguis, reliquit quidem Plinius, sed Wolphius cum vipera, conclusum, mutuis periisse vulneribus vidit. Cum omni virulentorum insectorum genere, escæ causa configere, Ælianus author est.

Pestis importuna veneni, nisi quòd graviore supplicio lenta, per triduum morte conficiunt, virginibus lethali semper ictu, & foeminis ferè in totum, viris autem matutino, exeuntes cavernis, priusquam aliquo fortuito ictu egerant venenum. Constat eos, quibus septem aut novem caudæ internodia faviores esse: pluribus enim fena sunt: feriunt obliquo ictu & inflexo. Venenum

omnibus medio die, summa item æstate exasperatur, cum incanduerit solis ardoribus: itemque cum sitiunt inexplibili potu. Maximè exitiales sunt, si suum genus adeant, antequam noceant. Incurabile venenum, si ictu eo die ocimum comederit. Non sentiunt puncti dolorem, si manu cnicum tenuerint. Symptomata varia affligunt. Locus affectus inflammatione corripitur, indurescit, intensius rubet, vicissimque dolore premitur: modò æstuat, modò frigore corripitur. Vulneratum affligit sudor & tremor. Extrema frigescent, inguina attolluntur, flatus per sedem prorumpunt, capilli eriguntur, facies distorquetur, &c. Dodonæi famulus tam frigidus sudore perfusus erat, ut argentissima nive se opprimi quere-retur, &c. Infinita contra ictum apud auctores prostant remedia. Ex herbis sunt Absynthium, Abrotanum ex vino pota, Amomum, Ammi, Anisum, Allium, Aristolochia, Asphodelus, Asa fatida, Attractilis, Atriplex, Blitum, Caltha, Calamintha, Cœpa, Centaurea, Chamæpitys, Colocynthis, Cyperus, Galbanum, Hordeum, Iris, &c. Ex fruticibus Balsamum, Myrtus, Paliurus, Rosa, Rubus, Laurus, Morus, Thus, Vitis. Ex animalibus Sputum humanum & urina, Mumia, Ranæ fluviatiles, Coracinipiscis in Nilo, Scorpio denique ipse tritus, & cum sale, lini semine & althæa impositus. Taceo composita, quæ apud Diosc. Plinium, Rhafen, Albucafin, Oribasium, Serapionem, Sylvaticum, & alios extant, & à Mouseto ac Aldrovando collectæ sunt. Villanovanus herbam trinitatis, cum succo radicis ebuli, & vino, tanquam unicum remedium commendat. Ioh. Arden. Chirurgus Anglus præsentissimum ait, si tres quatuorve sanguinis guttæ juxta vulnus extrahantur, eodemque vulnus statim illinatur. *Fugantur* suffumigio ex sulfure, galbano, & ungula asini. *Non egrediuntur*, si raphanum incisum cavernæ imposueris. Rhasis radicem enulæ gestatam laudat, &c. *Torpescent*, si delphinium herbam substraveris. *Necantur*, si raphanum commansum, basilicum latifolium, in aqua nascens, aconitum, helleborum nigrum, ocymum rubro flore imposueris, & Galatæ insulæ terram. De *Antipathia* habe. Scorpionem & Crocodilum, simul atque alter alterum conspexerit, in mutua funera sponte rapi, id ab Ægyptiis proditum. Stellionem, visu quocunque pavorem ipsi inferre, & torporem frigidis sudoris. Cum sol in Cancro est, serpentes ictibus torquere. A vipera devorari. A vespis, apibus & crabronibus non attingi, qui à scorpionibus percussi sunt. Reviviscere mortuum ajunt, si quis helleboro candido linat. De odio inter eos & aconitum, ita Plinius: *Hoc quoque tamen in usus humane salutis vertere, scorpionum ictibus adversari experiendo datum, in vino calido,*

Plin. H. N. l. 20. c. 12. l. 21. c. 23.

Plin. H. N. l. 20. c. 4.

Plin. H. N. l. 35. c. 19. Antipathia.

Plin. H. N. l. 29. c. 4. Arist. H. A. l. 8. c. 29. Plin. H. N. l. 25. c. 10.

Plin. H. N. l. 27. c. 2.

calido. Ea est natura, ut hominem occidat, nisi invenerit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus invento. Sola hæc pugna est, cum venenum in visceribus reperit: mirumque exitalia ambo cum sint, duo venena in homine commoriuntur, ut homo supersit. Imo verò etiam ferarum antiqui remedia prodiderunt, demonstrando, quomodo etiam venenata ipsa sanarentur. Torpescunt scorpiones aconiti tactu, stupentque pallentes. & vinci se confitentur. Auxiliatur eis helleborum album, tactu resolvente: ceditque aconitum duobus malis suo & omnium, &c.

Magni est in calculo atterendo & pellendo usus. Combuitur à quibusdam, & cinis cum pane felicissimè exhibetur. Alii Olea conficiunt, inter quæ laudatissimum & mirabile, quod Matthiolo debemus. Habetur & apud Janum Damascenum confectio.

Usus in
Medicina.
Galen. l. de
Theriac. ad
Pison. c. 9.

Differentia.

Differentia Scorpionum, à forma, sexu, loco, quantitate, colore & viribus sumuntur. Formam si respicias est 1. *Gibbosus*, cauda pro corporis pusillitate magna, quam post se convolutam trahit. Pallidus videtur: sed aculeus admodum productus albescit. Omnium celerrimè, & calidum solum, venenum infundere, prodiderunt Arabes. Ad ictum, calor corporis in singulas ferè horas variat, & ex viridiflavo, albo, rubidoque alteratur: acuta febris affligit, lingua tumet, urina sanguine tingitur. Remedia vide apud Mouf. 2. *Caudati* & non caudati, & vel unum habent aculeum vel duos. Qui paguros imitantur, splendescunt sunt colore, & eadem quæ alii inferunt accidentia. 3. *Alati*, quos Mauritania alit, Lybiam dicit Lucianus. Alis sunt tenuibus ut Cicadæ. 4. *Non alati*, quos ibidem inveniri Strabo asserit. 5. *Paguror.* & *cancror.* instar, qui splendescunt colore sunt, & eadem quæ alii accidentia inducunt, vide infra in Differentiis de colore. 6. *Septem vel octo nodis*, qui sæviores. Sex qui benigniores. 7. *Caudati* qui vel unico mununtur aculeo, vel duplici. *Excaudes.*

Plin. H. N.
l. 11. c. 25.

A *Sexu* sunt 1. *Mares* graciliores, longiores, ventre, chelis & spiculo maculatiores, qui venenum habent infestius. 2. *Feminae*, quæ majores, pinguiore, ventricosiores, placabiliores.

A *Loco* sunt 1. *Pescarensis*, in Afr. à quibus icti continuo moriuntur. Ideò cives relicta temporis æstate urbe, ruri ad Novemb. usque mensem commorantur, si Leoni Africano fides. 2. *Egyptiaci*, qui maximi, & statim interficiunt. 3. *Lybici*, qui vel terrestres, multis corporis vertebis insignes, vel volatici, de quibus antehac. 4. *Americani*, omnium minimi, sed maxime virulenti, si Africanos demferis. 5. *Castellani*, quos agricolæ, dum terram aratro scindunt, for-

micarum more congregatos, inveniunt, ubi per hyemem delitescunt.

A *Quantitate*. 1. *Minimi* sunt Americani. 2. *Maximi* Africani, & illi qui in India Orientali.

A *Colore* septem sunt apud Nicand. genera. *Primum* albicat, & minimè est lethale. *Alterum* ore est rufescente: ad ictum, vehemens ardor, febricitatio, & fitis intolerabilis sequitur. *Tertium* luridum & nigricans, cujus ictus inconstantem membrorum ictum facit, cachinnumque Sardonicum. *Quartum* colore ad viride inclinante. Ad ictum frigus & horror invadunt. *Septena* aut *novena* habet internodia. *Quintum*, lividum pallidumque est, amplo & distento ventre. Vescitur herba: & dente quoque mordet. Virus ejus Nicander βεβρωσιν vocat, quod ab ipso vulnerato, homini bubo intumescit. *Sextum*, & *septimum*, ad differentiam ex forma pertinet. *Illud* cancro marino littorali simile est, corpore grandiori, orbiculari. Matthiolus nigros, ferrugineos, virides, in Arcinonenfi comitatu vidit. *Hoc* ad Paguror. formam accedit, ex quibus in sicco cavernam aliquam ingressis, & postquam mortui sunt putrescentibus oritur. *Ælianus flammeum* vocat: quod pagurum coctione rubentem æmuletur.

A *viribus* sunt 1. *Noxii*, de quibus in præteritis. 2. *Innoxii*, quales sunt in Noricor. subalpinor. regione, Pharo, Avaniensi territorio, Helvetiæ agris, & Germaniæ regionibus.

ARTICULUS II.

De Araneo.

PUNCTUM I.

De Araneis in genere.

A Raneum, seu Araneam, Isid. quasi ab aëre nutritam & natam esse vult, perperam. Sollicitè muscas capere scimus: scimus & coire, & ova ac vermiculos excludere. Melius cum Becman. ab Ebraicis ארנא texunt deducas. Græcis ἀράχνη & ἀράχνης, ὅθεν τὸ ἀραχιδίχνη ἔχειν: ἢ ὅθεν τὸ εἰς τὸν ἀέρα αἰρεῖν τὰ ἴχνη, dicitur. Alii μυοχαυτήν muscatricem, Kiranides ἡγεφον, Hefych. ἡγεφον vocat. ὁ λυδὸς quoque nonnullis araneus, Φάλαγγξ & Φαλαγγιον pro araneo quovis sumuntur, *Lydiam* & *aridam* Juvenalis vocavit. Illam propter Arachnen puellam, quæ in hoc insectum à Pallade immutata dicitur. Hanc, quodd telam aridam texat. *Audax* est Claudiano, quod cum Pallade congregi ausa fuerit.

Nomen.
Aldr. Hist.
Inf. l. 5. c. 12.
Mouf. Theatri Insect.
l. 2. c. 11.

Caput omnibus minimum, excepto uno, quod

N

quod

Plin. H. N. l. 11. c. 47. & 24. quod grandissimo capite Plinius esse dixit. Omnibus terna in cruribus internodia, quibusdam bini pedes prælongi accedunt. Nam omnes ejusdem longitudinis habere, diversitas operarum innuit. Quibusdam fila quæ neverunt, attenuant, & in longum protrahunt: aliis eadem in telam deducunt, ac invicem conjungunt: aliis denique per eadem prorepunt, & cum volunt, ex iis ceu immobiles se suspendunt.

Locus. Nulla ferè non regio Araneos alit. Gaudentius tamen Merula in vetusta prope Gratianopolim in Gallia turri non inveniri, immisos emori, author est. De *Phalangiis* in Differentiis agetur.

Vitus. *Vicitant* muscis, asilis, tabanis, vespis, sæpè & parvis Lacertis. Nihil conficere vel recondere, author est Aristoteles. Quicquid ceperint, foras fugendo evaporare. Filo suspendere, alii existimant.

Generatio. Ex seminibus aëriis situ & corruptione putrefactis generari inde colligere licet, quod novissimæ ædes, primo ferè quo dealbantur die, eorum corporibus telisque scatent. Propagatio plerumque coitu fit, cujus actio & desiderium fere totum verdurat. Tum retis mutua & repetita attractiuncula, venenem quasi accendunt: continuo inter trahendum propius accedunt, tum denique averfis clunibus quia ille coeundi modus, (ob globosam corporis formam) maximè erat conveniens. De Partu ita Aristoteles: Parit vermiculos pusillos primum. Totius n. mutatione fiunt, non ex parte. Subrotundi per initia sunt: cum peperit, incubat, ac figurat tribus diebus. Intela sua parit omnes: sed partim intenui & brevi, partim in crassiore & alia insinuata: nonnulla etiam aliqua ex parte circumdantur à tela. Non omnes aranei simul generantur: statim nati & saliant & filum emittunt. Humor idem in vermiculis attritis, & in juvenculis araneolis; quippe crassus, candidus. Circiter quater septenis diebus absoluti fiunt. Vifa ova multa, modica, livida, exiguis maculis aspersa, mollia, viscida. Vifi & ex unico ovo multi prodeuntes fetus, tam exigui, ut vix oculis percipi queant. Vifus denique sub captæ aranæ alvo, magnus ovorum, adeò exiguum ut atomis comparare licuisset, candidorum, & quæ digito compressa, crepitum excitabant, cumulus.

Arist. H. A. l. 5. c. 22. ed. Scalig. Cum stellione, lacertis, & serpentibus dissident. Lacertor. catulos venantur, hos primum tela involventes, & tunc demum labra utraque morfu apprehendentes, amphitheatriali spectaculo cum contigit. Librat idem, verba sunt Plinii, se filo in caput serpentis porrectæ sub umbra arboris suæ, tantaque vi morfus cerebrum ap-

Plin. H. N. l. 11. c. 48. prehendit, ut stridens subinde, ac vertigine rotata, ne filum quidem desuper pendens rumpere, adeò non fugere queat: nec finis ante mortem est. De *Præfagiis* hoc habet: ruinis imminenti-
Plin. H. N. l. 8. c. 24. & l. 11. c. 24. bus cum telis primos cadere: incremento omnium futuro, telas altius tollere, & quia sereno cœlo non texunt, nubilo texunt, multas araneas imbrium signa esse. Sub Leuætricæ pugnae tempus, albas circa templi valvas texuere telas: adorantibus fines Macedonibus nigro opere omnia complevere.

Antipathia. Plin. H. N. l. 11. c. 24. Ingenium solum texturæ artificium testatur, quod in tertio genere post Aristotelem Plinius elegantissime describit. *Orditur*, inquit, *telas*, *tantique operis materię uterus ipsis sufficit*, sive ita corrupta alvi natura statotempore, ut *Democrito placet*, sive est quedam intus lanigera fertilitas, tam moderato ungue, tam tereti filo, & tam aequali ducit stamina, ipso se pondere usus. Texere à medio incipit, circinato orbe subtegmina (*νεβρας*) annexens: maculasque paribus semper intervallis, sed subinde crescentibus, ex angusto dilatans, indissolubili modo implicat. Quanta arte celat pedicas scutulato rete grassantes, quàm non ad hoc videtur pertinere cribrata pexitas telæ, & quadam polituræ arte, ipsa se tenax ratio tramæ? (villosa & lanuginosa filorum natura) quam laxis adflatus non ad respicienda quæ veniunt finis: derelicta lasso præterenti summa parte, ut arbitrari licet illa quæ difficile cernuntur: atque ut in plagis lineæ offensæ præcipitant in sinum? Specus ipse quæ concameratur architectura, & contra frigora quantum villosior? quàm remotus à medio, aliudque agendi similis? inclusus vero sic, ut sit nec ne, intus aliquis cerni non possit? Age firmitas quanta irrumpentibus venis? qua pulverum mole degravante. Latitudo telæ sæpè inter duas arbores, cum exercet artem & discit texere: longitudo fili à culmine ac rursus à terra per illud ipsum reciprocatio, sabbatque pariter ac fila deducit. Cum vero captura incidit quàm vigilans & paratus ad cursum? licet extremum hereat plagii, semper in medium currit: quia sic maximè totum concutiendo implicat. Scissa protinus reficit ad polituram sarcimens. Namque & catulos lacertar. venantur: hos primum tela involventes, & tunc demum labra utraque morfu apprehendentes, amphitheatriali spectaculo cum contigit. Fæminam putant esse quæ texat, marem, qui venatur, ita paria fieri merita conjugio. At Aristot. fæminam & venari & texere scripsit. Flandris ideò similes Scaliger facit dicit, qui otiose agitant: mulieres negocia exerceant. Novam verò telam mane & vespere textit: illudque tam firmum, ut ex alto se filo demittens, parieti vel arbori adeò affigat, ut ne ab

Ingenium. Arist. H. A. l. 9. c. 39. Plin. H. N. l. 11. c. 24.

Scalig. ad Arist. H. A. l. 9. c. 62. f. 203.

PUNCTUM II.

De Araneorum Differentiis,
& primò de Innoxiiis.

DE Araneis dicturis occurrit Moufetus. Hic enim Araneos eleganter, in *Noxios* seu *Phalangia*, & *Innoxios* qui vel *Domestici*, vel *Subdiales*, distinguit. Utroque denique in *Retiarios*, *Telarios* & *varios* dispescit. Omnes cum ætate majorem acquirere peritiam; lanis inclusos, tinearum generationem augere, & senectutem quotannis sapius exuere addit. Apud Aristotelem tria habentur genera. *Primum* mordax: *alterum* luporum: *tertium* erudita operatione conspicuum, de cujus tela superius diximus. Aristoteles σοφώτατον καὶ γλαφυρώτατον, sapientissimum & elegantissimum dixit. Aldrovandus à se observatos duabus tabellis expresfit. Nos, ne quicquam omittatur, utrumque conjungemus.

Ex *innoxiiis* ergò, de *Domesticis* jam in genere ex parte actum est, qui omnium maximi *subdiales* à rapacitate venatorum, & Lupor. λυκῶν nomen accepere. Horum minimi non texunt: qui verò major est, asperam parvamque telam apud terram aut fepes orditur. Cavernarum exigua vestibula prætendens, & primordiis telar. intus positus, observat dum aliquid in tela offendens commoverit; mox accurrit ut capiat.

Ex *Retiariis* unum maximum vidit Moufet. *Corpus* illi spumeum ovali ferè figura. *Caput* sub ventre exiguum & forcipatum. *Dorsum* variis maculis candicantibus ornatum. Brevi tempore à pisi magnitudine ad eam crassitiem ascendit. Inter rosarum ramulos autumnò rete expandit, & muscas, culices &c. mira dexteritate fune attracto illaqueat.

Telarii vel *subtilem* telam texunt, vel *mediocre*, vel *vilem*, *crassam*; rudem & deformem. *Priores* sunt *Domestici*, ex quibus unius, fusci coloris, & cujusdam si inter oculos solemque ponatur, pelluciditatis. Ex illis qui *Mediocre* texunt est *Agrestis* seu *Sylvestris*, qui in sepibus cum sago linteamen expandit. *Corpus* ipsi fuscum, leniter hirsutum. *Pedes* polymiti, nigris & albis maculis seriatim variis. Os forcipatum, acetabulis munitum. *Puncta* in capite supra os duo, albicantia, forte oculorum vice. Tela ne pluvias quidem transmittit. *Filum* ducit & quasi in fasciculum colligit *hic Campestris*. Pennius eum in Colcestrensi agro inter Origanum muscis insidiantem observavit. *Corpus* est globi æmulum. *Dorsum* quindecim maculis notatum. *Anus* quadrangularis & nigra. *Pedes* proximo descripto similes.

ne ab imbre vel ventis detrudatur. *Μαυροκελέερα* de imo loco se suspendit, ut inde bestiolæ irretiantur; minor superiore loco excubat, in exiguo se telæ foramine occultans. Sensus esse exquisitissimi vel exinde colligas, quod in medio suæ telæ residentes, Muscam in remotissimam etiam partem impigisse sentiant.

De *Nocumentis* & *Remediis* in Differentiis exactè agetur. Oleis & vitibus sunt inimici, domosque conspurcant. Demorso penis erigitur. Si quis casu devoravit, vinum melissæ superbibat necesse est. Prodest & refina abietis sumpta. Morsui allium cum ruta permistum & ex oleo tritum feliciter superimponitur. Huc emplastr. de muscis, adeps humanus, sanguis testudinum, cinis ungulæ arietinæ, sterminus capræ dissolutum, cerebrum capicum pip. in vino dulci sumtum, &c. faciunt.

In *Cibis* ap. quosdam fuisse admiratione non caret. Fit cujusdam meretricis tempore Alex. M. quæ à juventute araneis nutriebatur, mentio. Meminit & Albertus Coloniensis, cujusdam puellæ. Sed & Heroïna quædam ap. Anglos, teste Mouf. eis non abstinebat. Notat & Cardan. triennem. In *Medicina* haud contemnendi sunt usus tam *aranei*; quàm telæ. *Aranei* faciunt ad *quartanæ* aversionem, si alutæ vel nucis putamini inclusi, lacerto aut collo appensi fuerint: quod per experientiam verum fuisse scripsit Pennius. *Ad auris dolores*, si oleum cui incocti tres auri immittatur, vel succus eorum exprimatur. Plinius aceto macerari, conterri, & cum croco immitti debere scribit. *Ad uteri suffocationem*, si ceratum ex iis confectum umbilico superponatur. *Ad suppressam alvum*, si cum filo descendens, sinistra manu apprehensus & contritus, umbilico appositus fuerit. *Adstringi* ajunt, si ascendentem ita adhibueris. *Ad Condylomata*, si dempto capite pedibusque infricetur, &c. *Tela* adstringit, refrigerat, siccatur, glutinat, & nihil putrescens diu subesse permittit. Ideo hæmorrhagias, dysenteriam, & alios fluxus sistet. Emplastri febrifugi compositionem apud Strobilbergerum ingreditur. Cum oleo imposita, articulorum vulnera consolidat. Ingreditur unguentum contra serpiginem. *Condylomata*, alligata absumit. *Verrucam* si rudior in pilæ formam convoluta, & verrucæ imposita, accendatur, & in cineres ibidem redigatur. Paratur apud Ægyptios ex multis araneis & telis medicamentum, cum oleo rosaceo linimenti instar: vel araneas in ipso oleo incoquant, quo calido carpum ambarum manuum inungunt.

Differentiæ
ex Mouf.Mouf. Th.
Inf. l. 2. c. 11.Moufet. l. 2.
c. 14.

Arist. l. 6.

Nocumen-
ta & Re-
media.Plin. H. N.
l. 32. c. 4.

Ufus.

Mouf. Thea-
tri Insect.
l. 5. c. 15.
Cardan. de
variet. rer.
lib 8. c. 40.Strobel-
berger. l. 2.
c. 53.Prop. Alp.
l. 4. de Me-
dic. Ægypt.

Huc spectant tres *Subdialium* species. In murorum rimis degunt. Sordidam & parvam telam texunt, & extra speluncam spe prædæ longè vagantur, eandemque correptam in antrum trahunt. *Maximus*, inquit Mouf. fusco est colore, caput illi quasi ovale; corpus globosæ ferè rotunditatis; utrumque latus duæ parvæ ac breves lineæ albæ exornant, circa medium dorsum colore est magis albicante: pedes habet ex nigris fuscisque maculis pulchre varios. *Medius* minor est tinctura *grisea*. Spinam albæ tres quasi margaritæ illustant, quarum quæ collo proxima, major & longior. *Tertius nigrior* videtur, dorso crucem gerens transversam, rectangularem altissimam, ideoque à quibusdam Sanctus vocatur. Eluporum hose esse genere conjicio, quia currunt cum saltu quodam, & voracitatem miram produnt, nihil enim in crastinum reponunt, sed omnes uno die prædas absumunt. Cinereum hujus generis vidit Gesnerus.

Moufet. l. c.
p. 234.

Ex variis sunt *Longipedes Nigri*, *Albi* ex *atro rufescentes*, & *Rubri*, de quibus idem Moufetus ita: Sunt præterea Aranei *Longipedes* inordinatæ rudissimæque telæ artifices. Campestem corpore ferè globoso & fusco, graminicolam, ovisequum, Angli Shepherd five opilionem nominant, vel quia ovium consortio gaudet; vel quòd agros illis refertos, pastores noxa & veneno carere (est enim & ipse tam intus quam extra sumptus, animal innoxium) existimarent. Sunt adhuc plures Araneorum species. Est enim araneus quidam *niger* breviusculis pedibus, ovum sub ventre niveum secum portans & celeriter currens; rupto ovo araneoli multi egrediuntur, qui cum matre ad pastum omnes unà procedunt; vesperi verò parentis dorso conscenso requiescunt. Hunc verrucis asperum credidit Pennius, donec stipulæ contactu araneolorum descensum planè viderat. In putridis quoque & cavis arboribus Aranei nigerissimi, magno corpore, pedibus brevissimis, cum Afellis & Julis habitantes. Vidimus item (inquit Gesnerus) totos *albos*, compresso & latiusculo corpore, in flore Oreofelini, in rosis atque in gramine, pedes illis tenuissimis longissimi, os macula, latus verò utrumque rubicunda linea notatur. Venenatum credit, quia certopithecum ejus esu penè exanimem vidit, & vix oleo infuso liberatum. Novimus quoque oblongo corpore araneos & acuta cauda ex *atro rufescentes*, veluti etiam *virides*. Sunt & *rubri* duum generum. Unum majus in terræ cavernis tantum habitans, pectore miniato, pedibus ex rubro flavescentibus, cauda atque ventre ex fusco colore ad flavum nonnihil tendentibus. Aliud genus valde minutum, reduviò ovili minus, (intense veluti ex Cocco) rubens. Sex tantum pedes habet, ut monstrum aranei referat: caput

illiaraneis simile, sed parvum valde. Intra terram habitat, rudissimam telam operans, & indigestam; quandoque foris oberrat, & in præda captanda magnam agilitatem monstrat.

Aldrovandus suos duabus, ut dixi tabellis expressit. In *priore* viginti & unum delineat. *Prior* è parvorum genere est, corpore crassiusculo ac oblongiusculo, pedibus octo instructus, totus cinereus, parvam texit telam, araneum lautum vocant. *Secundum* pictus minimorum generis, totus est viridis, Araneus pratenfis nuncupatus. Numero 8. Araneus est pedibus brevibus, totus subcastaneus, assultim ingreditur, arbitrorque eum esse; quem Pulicem Aristoteles nuncupavit. Ejusdem generis est, ejusdemque coloris, qui *quarto* numero datur. Ex minimis est *sextus*, campestris, rotunda alvo, alboque pectore vero castaneo, tribus albis notato punctis, cum totidem nigris notetur alvus: pedibus teneris, longiusculis, telam texit oblongam, in medio, quo refidet, rotundam. *Septimus* totus viridis, & ipse pratenfis, protenso corpore, & acuta alvo, lineis candidissimis quinque insignita. *Octavus* ex minoribus est, brevissimo corpore, alvo admodum orbiculata, crassissima proportionem corporis, pedibus mediocris longitudinis, totus nigricat. *Nonus* corpore maximo, at brevi & compacto, adeo ut vix pectus ejus sit conspicuum, figura marsupium æmulatur, totus ruberrimi coloris. *Decimum* lautum quoque dicunt, alvum habet bifidam, qualem in aliis non invenias, pedes verò qui hirsuti sunt, illius quam pictor expressit proceritatis ac crassitie. Color ei cinereus, maximè in pedibus, corpus enim nonnihil ad castaneum inclinat, & punctulis candidissimis undique maculofum est. *Undecimus* quasi triangulari alvo, totus flavescit, quemadmodum *duodecimus* huic postremo congener, totus candicat. *Decimus tertius* albo, & cinereo fusco varius telam texit, parvam, rotundam & subtilem ex mediocrium genere. *Decimus quartus* admodum exiguus, rotundus, coloris flavi, longissimos habet & subtilissimos pedes: agros colit. *Decimus quintus* corpus habet rotundum, videturque pectore carere, colore est subluteo & subviridi, maculis tortuosis, serpentium gyros æmulantibus varius. *Decimus sextus* idem forte est, licet paulo minor. *Decimus septimus* pratenfis est, corpore procerò, pectore candido, alvo flava, pedibus crassiss, quorum penultimi cæteris paulò sunt breviores, nulla in omnibus apparent internodia; antennis caret. *Decimus octavus* sex tantummodo pedibus instructus folliculum texit candidum, sicuti in expresso hic mori folio videre licet, unde aranei generis esse vix credo, corpore Araneis simile animalculum est, cinerei coloris. Numero

Differentiæ
ex Aldrov.
Aldrov. de
Inf. l. 5. c. 12.

Vermes arboræ Xylophthori Aldro.





20. expressus ex minimorum genere, colore ex castaneo, lineis duabus flavis per alvum notatus. Postremus in hac serie, capite, pedibus, & pectore aterrimis, alvo ex albo cinereo ad majorum genus redigitur. E phalangiorum genere videtur.

In secunda tabella novem sunt aranei. Primus, terrestris quoque dici potest, quia terram habitat è Pulicum genere, salit enim. Corpus habet breve & breves etiam pedes, ex cinereo fuscus totus. Secundus hujus ordinis corpore est atro, albo variante, grandi capite, candicante, brevibus antennis, pedibus cinereis. Tertius exiguus, subalbidus ad luteum vergens, maculis variegatus nigris. Quartus araneus foemina prolem tergore ferens, sed ea orbata: corpore procero, pedibus crassis, crassissimo item pectore. Quinto loco exprimitur ejus foetus. Sextus idem forte qui quintus, prole tam numerosa onustus, ut quadam hirsutie villosus esse videatur. Proliger dici potest, color ex leucophæo ad atrum vergit: Septimo & octavo loco pictus Araneus prono & supino corpore, *ὠχρεμέλας* dici potest, atro enim & luteo variat. Nonus est ex minimorum genere totus flavus albo triangulari.

Addamus hic Indicos. In Cumana adeo firmas telas texunt, ut difficulter disrumpantur. Alibi adeo virides ut serico ejusdem coloris æquari possint. In Hispaniola ipsi aranei pilas lusorias corporis magnitud. æquant, si Oviedo credimus. In Brasilia sex species observavit Marcgrav. *Nhamdúi* nempe, *Elegantissimum*, *Elegantissimo similem*, *Fabæ magnitudine*, *Muscar. magnitudine* & *Pisi quantitate*, quos etiam ita describit.

Nhamdúi Brasiliensibus, araneus magnitudine Cicindelæ, clypeum in dorso gerit triangularem, splendidissimum, in laterum circumferentia sex conis acutis prædictum albi coloris, cui brunneæ maculæ immixtæ. Ad os habet denticulos duos & splendidi coloris, incurvatos.

Elegantissimus Cicindelam superat magnitudine, corpus vix semidigitum longum; anterior ejus sectio minor continet crura octo, duobus internodiis constantia, ferè digitum longa, ex flavo & brunno variegata. Posterior sectio major: prior tota argentea, splendens: posterior ad medietatem etiam toto argentea, & in hac ponendo posteriorem partem deorsum, quasi facies humana egregiè apparet, quasi sculpta & argento esset obducta: reliqua medietas quasi ex argenteo & brunno glaciata. Similis quoque mixtus color inferiori corpore. Inveniuntur & duplo majores.

Elegantissimo similis, major est eo. Anterior sectio corporis parva, magnitudine feminis cannabin. sed paulo longior; posterior avellanam majorem æquat: & an-

terior sectio ut & posterior ad medietatem argentei coloris splendidi, ultima posterioris medietas flavi & maculis duabus argenteis notata, in quolibet latere una; cæterum in flavo illo subtilibus lineis fuscis variegato, varia sibi imaginari quis potest. Crura octo variegata ex pallide flavo & fusco omnia in anteriori sectione: tenacula adhæc duo prope os ejusdem coloris. Telam facit more cæteris communi.

De *Araneo fabæ magnitudinis* hæc habet. Araneus alius fabæ magnitudine, frequentissimus in ædibus: Prior corporis sectio subrotunda æquat pisum, altera longior & fabæformis. Crura habet octo, in quolibet latere quatuor, sesquidigitum longa, tribus internodiis constantia & quartum est insertio in corpus. Anterior etiam duos propedes habet, vix quartam partem crurum longos, quibus apprehendit: duos denticulos nigras, ut maximus. Totus est coloris ex flavo, albo & saturato rubro instar holoserici fusci detriti: pilosum corpus, uti & crura. In superiore corpore magnas habet maculas nigras: crura quoque per intervalla punctulis nigris notata. Hi quoque Aranei cutem exuunt, ut major ille. Foetus in orbiculari folle sub ventre progenerant. Noctu texunt. Reperiuntur & hujus speciei dimidiæ magnitudinis.

Araneus paulo major muscis vulgaribus, cinerei coloris, hirsutus instar holoserici. In lateribus nigro serico vestitur. Crura habet sex, brachia duo, quibus apprehendit, cinerei in totum coloris, punctulis nigris.

Marcgr. l. c.

Araneus pisi quantitate, testa clypeata sexangula argentei coloris, cum maculis nigris elegantissimis tegitur. Capitulum & crura sunt nigra.

Placet & Hernandi Araneos proferre, Nier. H. E. quorum undecim habentur genera. Pri- l. 13. c. 28.

imum genus *Teacoltocatl* seu stercoreis araneus vocatur, mediocri corporis magnitudine & colore, inter nigrum & fuscum constans. Secundum quod majus, *tocamaxacualli* dicitur eodem colore. Tertium *toatl zintlatlauhquei*, minus prædictis, ac nigri coloris, valde venenatum, & quod contusum admotumque dicatur lateris sedare dolorem. Quartum *tzintlatlauqui* nuncupatur, quod etsi toto ferè corpore nigrescit, macula tamen rubea insignitur. Quintum dicitur *tocamaxacual* corpore magno, fulvo atque hirsuto, difficile sanabilia infligit vulnera, quæque (si cicatrice obduci contingat) aliis atque aliis locis renoventur, eademque non morsu aut ictu excitata, sed incessu, confractione & redditu alvi excrementis. Sextum omnium maximum *tlalhochehtl* coloris nigri pallefcientis atque cinerei est. Septimum *ocolotocatl*, ita nominatum, quod tigris pellem colorum quadam varietate tenus imitetur. Octavum est

Hoitztocatl seu araneus spinosus, morfu dementat, supriore & media corporis portione ater cætera luteus, forma aculeata & similis tribulo, inde impetravit nomen *Hoitzli* spina est. *Nonum atocatl* seu araneus versans in aquis, rubro, aureo & nigro variatum colore telam ducens magna ex parte, vitamque agens juxta plantam vocatam ab incolis metl, levissimi atque innocentissimi ictus, mirum qua dexteritate opus peragat, filis hinc atque illinc distinctis, & in orbem velut circino quodam compositis staminibus, deinde verò intexto atque stipante subtegmine. *Decimum* excellit columbinum ovum *ahochtocatl*. Alii quitlalhochocatl dicunt. In tanta mole nullius veneni est. Aliæ apud Caribes araneæ exæquant dimidium malum citreum, sed cruribus exiguis. Dentes illis longi & acuti. Elaborant telam fati constantem (posset fœminis pro calanticis) & cum ora seu fimbria texunt. Ab lui potest & alba redditur. In aliquorum telis si passer incidat aut alia volucris, irretietur. *Undecimum* *Lavalava* Aranei parvuli sunt, aureique, & punctis rubris distincti. Vulnus est noxium, ictusque agit in insaniam, membrisque subinde stuporem inducit, non sine anxietate & dolore. Præfidiom est rubæ prioris tambalaguisæ & pilipoc singulorum tres obolos tundere, atque ex vino palmarum resolutos deglutire; aut oleum cujus mixtionem narravit Franciscus Hernandus inter plantas novæ Hispaniæ, illinere vulneri. Cavendum tamen primis tribus diebus à potu; aut si bibendum sit, vinum palmarum aut nostratum, quod præstantius est, sumendum; præterea ab aëre & sole. Vivunt in pratis herbiferis Philippicarum insularum.

PUNCTUM III.

De Phalangis & Tarantula.

Tantum de innoxiiis Araneis, Noxii Phalangia vocantur. Nomen accepit, quod internodia terna in cruribus habeant. *Φάλαγξ* enim digitorum internodium propriè significat. Italiæ ignotum inquit Plinius: at nunc tota meridionalis ora illis abundat. Singula in reti pariunt, & magno numero incubant: cumque ipsa proles increverit, matrem amplexa interficit & ejicit. Nec parcit patri si ceperit. Fœminam enim incubatu adjuvat. Pariunt autem & trecentos. Æstate duntaxat venenati morsus esse Alexander ab Alexandro prodidisse ait Moufetus: quod tamen de Tarantula duntaxat sumendum est.

Circa specierum enumerationem haud

levis est inter Authores differentia. Plinius, similis *Formicæ*, *Lupi*, *Rhagionis*, *Asterionis*, *Tethragnatii* mentionem facit. Aëtius sex genera enumerat, *Rhagium*, *Lupum*, *Formicarium*, *Cranacola-^{Aëtius 13.6}pten*, *Sclerocephalum*, & *Scolecium*. Nicander illis quæ Plinius attulit, addit *Rhagæ*, *Cyanei*, *Agrostis*, *Dysderi*, siue *Sphæcium* & *Formicarium*. Basilius decem Phalangiorum genera dicit, sed non describit. Avicenna, in *Egyptiacum*, *Nigrum*, *Rutilum*, *Rachen*, *Album*, *Citrinum*, *Uveum*, *Formicarium*, *Cantharadeum*, *Vesparium* & *Orabaten* distinguit. Nos sedecem eorum genera, nempe *Formicarium*, *Venatorem*, *Rhagium*, *Stellatum*, *Cæruleum*, *Sphæcium*, *Tetragnathium*, *Cantharideum*, *Ervestre*, *Cranocalapten*, *Sclerocephalum*, *Scolecium*, *Lanuginosum*, *Appulum* seu *Lentiginosum*, *Cretense*, & *Brasilianum* ponemus; iisdemque illa, quæ Moufetus minora phalangia vocavit, cum similibus adjiciemus.

1. *Formicarium*, seu *Myrmecion*, prægrande, est formicæ simile sed multo majus; ruffo capite reliquâ corporis parte nigra, albis intercurfantibus respersum guttis. Aëtius, cervicem cineream facit, dorsum veluti astris insigne. Ad ejus morsum adeo somno obruuntur ægri, ut in sempiternum *πνεύματι* tandem incidant.

2. *Venatorem*, Nicander *ἀγρῶσιν*, Aëtius *λύκον*, quod Aldrovandus qui cum Pulice Aristotelis eundem credit, non probat, vocat. Muscas, vespas, culices, apes, tabanos, vespas venatur: & inde nomen sortitus est. Corpore est lato, volubili, rotundo. Circa os tres eminentiæ enascuntur. Partes circa collum incisuram habent. Doloris expertem plagam infert.

3. *Rhagium* ut Aëtius vocat, *ῥῶξ* Nicandro, *ῥῶξ* Æliano, ab acino uvæ nigræ similitudine dicitur. *Figura* est rotunda colore nigro, splendente corpore & globofo, pedibus brevissimis (apud Ælian. *μικροὺς πόδας* lege) & quasi imperfectis, ore subalvo dentato. Accumulatis pedibus movetur, & velocissimè incedit. Non multum ab Aristotelis *Mordace*, abladit. Ab ejus morfu exiguum quidem vulnus, sed genæ & oculorum inferiores partes rubescunt: totum corpus inhorrescit: urina emittitur, & semen profunditur. Æliano Lybicum duntaxat animal est.

4. *Stellatum*, idem cum *Rhagio* esset, nisi stellatis quibusdam & virgulis niveis, pinguibus illis & lucidis distingueretur. Solus ejus Plinius post Nicandrum meminit. Icti enervantur & clumbes fiunt.

5. *Cæruleum*, Cyaneum, Plinius lanugine nigra hirsutum sed perperam vocat: Nicander *πυλῶσιν*, quod sublimibus utrinque & longissimis pedibus incedat. Ictus ejus

Idem l. c.
c. 25. 26.

Idem c. 27.

Idem c. 15.

Nieremb. l. c.
cap. 24.

Plin. H. N.
29. c. 9.

Aldrov. l. c.

Ælian. H. A.
3. c. 36.

Plin. H. N.
29. c. 4.

Alexand. ab
Alexand. Ge-
nial. dier. 2.
c. 16.

Differentiæ.

ejus vomitum araneosum, lypothimiam, coma & mortem concitat.

6. *Sphæcium*, Vespiforme, Nicandro *Μοδμη*, à crabrone rubicundo penna tantum differt, & vehementer ruffescit. Solo tactu venenum ingerit: & speculum crystallinum levi transcurso, Scaligero teste, confregit. Lento veneno tabem inducit.

Ælian. H. A.
17. c. 40. 7. *Tetragnathium*, corpore est latiore, subalbulo, pedibus scabris. In capite duo prominent tubercula, unum rectum, alterum latum, ut videantur ora duo & maxillas quatuor habere. Magnus eorum circa Arrhatam in India numerus, exitio incolis fuit, ut *Ælianus* prodidit. Unum est cinereum, posteriore parte candicans, quod telas muscis in parietibus latissime pandit. Aliud, cui caput medium linea una alba, & transversa altera distinguit. Locus ab eis percussus inalbicat, membrum ad articulos gracilescit. Cinereum Nicander morfu venenum infundere negat.

8. *Cantharideum* parvum est, specie *Cantharidi* simile, colore flammeo ruberrimo. Invenitur messis tempore in leguminibus. Pustulas excitat, mens perturbatur, lingua balbutit, &c.

9. *Ervestre*, quod in ervo provenit. Eadem quæ præteritum edit: & equos devorantes, juvenaque, siti exardescere, mediaque crepere censetur.

10. *Cranocalaptes* Dioscoridi *καρδαμύνης*, quia prætereuntium capita ferit, seu per filum descendat, seu se præcipitem det. *Phalænæ* papilionis specie est, capite nutabundo, ventre gravi, corpore oblongo, colore viridante. Aculeum in summo gestat. *ἐν τοῖς φύλλοις τῆς περσεύας κέρεται, καὶ τὰ πέρα ἔχει ὁμοίαις ἐν ταῖς κνέπαις ψυχαῖς.* Unde Scholiastes nobis insinuare videtur, alatum esse. Quidam Tarantulam esse opinantur. Plinius lethiferum nimis ipsius vulnus ponit: Nicander & *Ætius* nullo negotio fanari.

11. *Sclerocephalum*, caput habet saxi duritie: totius corporis lineamenta illis animalculis similia quæ lucernas circumvolitant.

12. *Scolecium* longiusculum est, & maculis quibusdam, præsertim circa caput, variegatum. Earundem cum *Cranocalapte* & *Sclerocephalo* virium.

13. *Lanuginosum*, grandissimo est capite: quo dissecto inveniri dicuntur duo vermiculi, qui mulieribus, corvinâ pelle ante sobolis ortum adalligati, præstant ne concipiant: estque hæc vis eorum annua, ut *Cæcilius* in *Commentariis* reliquit. An sit virulentum, nemo determinavit.

14. *Lentiginosum* Moufetus appellat, quod *Apulum* & *Tarantulam* à Tarentino agro, vel fluvio Thara alii. Reperitur quidem & in Calabria, Sicilia, Romanisque campis, æstivis mensibus: sed sine ullo

ad saltandum incitante veneno. Aldrovandus idem cum *Solipuga* facit. Multiplex est specie. Aliud est cinericium, albis nigrisque maculis: aliud dorso cinereo, rubris aut viridibus: quoddam mole majus, fibris nigris, excinerea rubroque emicantibus, aut etiam virgulis subinde undatim per corpus porrectis. Moufetus & *fusci* meminit, cujus iconem Pennio ab Italo mercatore datam, damus, & *Crocei* clarique, quale *Ægyptum* dare scribit. Effigies à Kircheri exhibitæ, Francisci Corvini Pharmacopæi Romani Musæo debentur. Visum & illas quæ ab Imperato habentur adjungere. Mira venenum ictu infusum *Symptomata* excitat. Alii perpetuo currunt, alii rident, plorant alii, alii clamitant, dormiunt, vigilant, vomunt, saltant, sudant, tremebundi fiunt. Nonnulli coloribus ita delectantur, ut iis conspectis, in lypothimiam, nisi potiantur, incidant. Exemplum Kircherus habet. Alii, *verba sunt Kircheri* accuratè ista exponentis, Musica incitati, in saltus prorumpunt gladio evaginato, vel alterâ armaturâ fulgidâ & corrusca (quo fulgore vehementer afficiuntur) gestientes, variaque corporis agitatione, & ridicula prorsus gesticulatione, nunc eam dextera, nunc sinistra, nunc ore excipiunt, nunc in altum gladiatorum more projectam dexterè recipiunt, nunc in terram projicientes, pugilum more veluti duellum inituri adeo pericè tractant, ut in palæstris publicis instructi, omnes artis regulas observare videantur, modo verbis quibusdam obmurmurantes, eam veluti incantare, nunc prono, nunc supino corpore super eam sese distendere solent & extensi sic aliquantisper, veluti novo Enthusianismo excitati, ad novos conflictus, saltusque hinc inde lymphaticorum more debacchantes accingere solent. Alii, quæ res maxima admiratione digna est nunquam quiescere solent, nisi vitreum vas plenum aqua manu circumferant, cum quo eosdem gestus, quos glandiatores fecisse diximus, peragunt. Quidam ardentè videre desiderant in medio loco saltui deputato, conchas aqua plenas, circumdatas viridibus herbis, potissimum arundinum foliis, quibus uti & aqua maxime delectantur, intra quam brachiis & manibus quin & capite toto non secus ac mergi, & anates, concussione alarum aquam veluti ventilantes, sese identidem submergere solent. Nonnullos quoque non sine risu videas milites in duello conflictantes, quosdam temulentorum vario jactantium personas induere, alios Hispanicis verbis ad pompam & gravitatem affectatis nescio quem ducem & gubernatorem agere; visi sunt quidam, qui ex arboribus cruribus penduli hæreant, eaque pendicatione multum afficiantur, hoc affectu laborant potissi-

Kircheri
Artis M.
gnet. 3. parte
8. c. 2.

munum ii, qui à Tarantulis fila ex arboribus ducentibus feriuntur. Multi denique postquam aliquandiu saltarunt, sedentes manibus tam fortiter collidunt genua, ut aliquam gravem passionem calamitatemque suspiriis & voce miserabili egerere velle videantur. Alii etiam per terram extenti, tali impetu & vehementia manibus, pedibusque terram concutiunt, ut epileptici ac lunatici non multum sint absumiles.

Venenum principio parum sentitur: anno elapso, ad saltus violentos cogit: bimestri spacio, appetitus frustratio, febres ardentes, artuum dolores, *ναυγεία*, ictericus dolor, &c. infestant. Unicum in Musica remedium: quæ pro diversitate veneni variat. Aliqui afficiuntur, inquit Kircherus, tympano quodam vulgo, (surdaastro) plectris ligneis utraque parte pulsari solito, cui consonare faciunt, ut plurimum fistulam pastoritiam, vulgo (la Zampogna rustica de pastori) sonus autem multum à Turcico illo superius dicto participat & ob vocum gravium acutarumque jucundam commissionem multum auribus gratus est. Alii ut plurimum cantu recreantur, cui Auletarum, sive tibicinum strepitosa musica conjungitur: delicatioribus sonantur testudines, lyrae, cytharæ, clavicymbala simul concordata; mirum tamen est, quod non omni tono musica, sed certis tonis afficiantur, si enim tonus harmoniæ humori veneni pungitivo, vellicantique non fuerit proportionatus, patiens tantum ab est, ut aliquid inde levaminis acquirat, potius miserabiliter eum hoc improporcionado ad humorem sonum torqueri contingat: quod satis insolitis suis gestibus ut oris oculorumque distensione, brachiorum, manuum, pedumque complosione, totiusque corporis in hanc, nunc in illam partem contorsione, similibusque gestibus quantum sibi istiusmodi musica contraria sit, demonstrat; qui tamen mox ubi ad amicam harmoniam converti ipsum contigerit, veluti ex tenebris in lucem emergens, agillimo motu in saltus pristinos, amico modulamini auribus oculisque admotis veluti applaudendo erumpit; durabitque spectaculum eo usque dum veneni vis frequenti saltu, pro isto anno excitata, aliqua ex parte sudore evaporavit: atque ita tandem unius anni spatium cum morbo constituuntur induciæ.

Harmonias apud eundem vide. Contrariari unam ratione Musicæ alteri Hispanus quidam Tarenti, nimis incredulus, suo exitio expertus est. Morsibus enim à colore & qualitate diversis, ultrò acceptis, cum remedium à Musica quæreret, ab uno quidem modulo se ad saltandum sollicitari sensit, sed qui à contrario cohibe-

retur. Observatum in civitate Andria, palatio Ducali, & hoc, bestiolam ad proportionatum humori sonum saltasse. Quod si citharædi in plures incidere, nunc hæc nunc illæ tripudiare, pro ratione modulorum comperiuntur. Causas tantorum Paradoxorum apud Kircherum vide.

15. *Cretense* sic describit Bellonius. Infecta sunt; parva, admodum perniciofa, Araneo paulo majora, octo pedibus prædita, utrinque quatuor: singuli pedes seu crura quatuor articulis constant, binosque ungues habent incurvos: bina utrinque crura anteriora illis data sunt ad progrediendum, bina posteriora ad retrocedendum, obliqua in terrâ foramina inhabitant binos pedes alta, quæ retrocedentes ingredi solent, atque cibum ita attrahunt: aditum foraminum quæ inhabitant stramine muniunt, ne obturentur, sed aperta maneant. Corpore sunt superiore parte cinereo, binis rubentibus maculis anteriore dorsi parte insignito: inversa autem, nigris maculis notata conspiciuntur ea parte quâ singuli pedes corpore inhaerent: venter flavet. Si quis autem scire cupiat quâ parte nocere queant, eorum os intueatur, & binos parvos nigros aculeos deprehendet, iis similes quos Scolopendra obtinet, quibus mordent atque cibum retinent: relas Araneorum more texunt, muscisque & papilionibus vescuntur. Circa sexaginta ova ponunt, & pectori adhaerentia fovere solent, pullosque exclusos ventri inhaerentes gestant donec adolefcant. Pilo sunt corpore: quoniam autem magnitudine differunt, foramina pro corporum magnitudine excavant: variare autem inter se pro insularum diversitate observavimus. Immortale est dissidium inter exiguum hoc animal & Vespæ cujusdam genus à Latinis Ichneumon vocitatum.

16. *Brazilianum* Marcgravius depinxit, incolæ *Nhamdu Guacu* appellant. Araneus maximus sive Phalangium. Totum corpus tres & semis digitos longum & bisectum. Anterior pars major est & penè duos digitos longa, susquidigitum lata, subrotunda ac compressa: posterior magis orbicularis, nucis Muscatæ majoris magnitudine & figura. Sesquidigitum longa. In dorso medio versus posteriora foramen habet umbilicale. Capite caret speciali, sed supra os in anteriori parte corporis ocellos habet minimos splendentes, instar punctulorum; & ad utrumque oris latus prominentiam unguiformem, semilunarem, semidigitum longam & ita binos dentes, quibus pro dentifcalpiis utimur auro inclusis. Crura habet decem, utrimque quinque, priora duo prope dentes duos digitos longa, & præter duplicem articulationem qua corpori conjunguntur, quatuor habentia internodia,

Bellon. observ.
serv. l. c. 12.

Marcgr. Fl.
Brasil. l. 7.
c. 3.

ternodia, & in extremitate unguiculum curvum, nigrum, splendidum retrorsum versum. Secundi paris crurum, quodlibet penè quatuor digitos longum & præter duplicem articulationem propè corpus, alias quatuor habet articulationes. Tertium par tres & semis digitos longum, totidem articulationibus. Quartum per tres digitos & paulò amplius longum, cæterum ut præcedentia: omnia autem crura, in extremitate duo habent exilia cornicula nigra, & bisecta ut cancri. Prope anum habet duos processus semidigitum longos iuxta se positos, fili crassioris crassitie, quibus nere solet. Totus araneus vestitur cute pilosa brevibus pilis, nigris ad visum, ad tactum instar holoserici. Per totam autem superficiem crurum partis posterioris, laterum & processuum, qui dentes continent, pili copiosi sunt insparsi, ex albo & gryseo rubidi coloris. Tota posterior sectio corporis in adultioribus plerumque nuda est pilis, & cutis ex albo incarnata. Vescuntur muscis & aliis insectis. Diu vivunt: nam ad biennium in scatula me aluisse memini, qui certo tempore, cutem exuerunt integram, dentibus etiam adhærentibus, nova subtus generata.

Ad Minora & Phalangii similes bestiolas, refero, *Pulices*, *Phalangia parva Bellonii*, & *Tungam Brasiliensium*. *Pulices*, *ψύλλαι*, apud Ælian. sunt procaces, cacuminati, salaces, & assultim incedentes. *Pitheci* simili nuncupantur. *Oribates* nonnullis, quod in arboribus, præsertim montanis reperiantur: *Hypodromi* etiam, quod sub foliis degant. Animalia sunt pilosa: ventre leniter inciso ut sectio notata filo videri possit. *Phalangia parva*, vel potius animalia phalangio similia, Bellonius in itinere à rubro mari Cairum versus observavit. Octonis erant prædita pedibus, id est, utrinque quaternis, & dum equorum crura conscendebant, mirum in modum eas divexabant. *Tunga* Brasiliensium, Floridanis *Nigua*, aliis *Ton*, Hispanis *Bicho* vocatur. Eadem cum pulicello Oviedi & Scaligeri superius adducto. Insectum est parvulum, inquit *Marcgravius*, figura pulicis, nigricantis coloris, duos cirrhulos in capite pro barbâ habens, in pulvere more pulicum generatur, & pedibus se insinuat, potissimum plantæ, digitis & sub unguibus imò & manibus aliquando vidi. Statim autem quando intravit pruritus excitat, qui certum indicium est, itaque *Tunga* statim acicula eruenda, nam si sinatur, tridui aut quadridui spacio sobolem progenerat innumeram, lendum modo, quæ folliculo pellucido rotundo magnitudine pisi includitur, huic insidet *Tunga*; hic folliculus acti eruentus & manet in carne foramen rotundum ejusdem magnitudinis, quod sponte sanatur, vel inspergitur pulvis pyrius.

Crepitant unguibus uti ut lèndes. Familiarissimum malum, sed quod magis per negligentiam incrementum sumit quam per se.

CAPUT III.

De Insectis apteris duodecem & quatuordecem pedum.

ARTICULUS I.

De Erucis in genere.

Insecta aptera duodecem & quatuordecem pedum sunt *Erucæ* de quibus ingenere & specie dicendum est. Nomen vel ab erodendo obtinere, quasi erodæ, quod frondes, olerum in primis abrodunt: vel ab hærendo, ut Apulejo placet, quod pertinaciter adhærescant. Plinio, si Turnebum sequimur, dicuntur *Uruca*, quod pratæ & arbores urant. Columella hirsutas, *Ovidius agrestes tineas* vocavit. Græcis dicuntur *ἀρμπυ*, ab undoso & arcuato gressu, quo se rependo curvant & attollunt, & *τρωχάλλιδες* ab erodendo. Fortè & *πρασινιδες* apud Hesychium; *πρασινιδες*, inquit iste, est *ζῷον χλωρόν κείθεν τὰ ἐν τοῖς κήποις λαχάνα*: est animal viride rodens in hortis olera.

Magni omnes arbarum & herbarum heluonæ. Hinc Philippus parasitus, *erucam sethymo & olere vespertem* dixit. Aliæ frondem depascuntur, aliæ florem. Cum rodunt eduntve, sonum quendam qui *τρίση* dicitur edunt, ut Scaliger notavit.

Circa ortum dissentiant authores. Aristoteles eas è virentibus foliis brassicæ nimirum aut raphani oriri tradit, semine scilicet milioformi, sub autumno ibidem relicto, unde vermiculi nascuntur. Ex his vermiculistrum dierum spacio erucæ fiunt; morituro vere, quæ auctæ satisque alitæ motu cessant, at ineunte autumno cum Chrysalide formam vitamque mutant. Plinius rorem calore solis densatum in folliis relinqui tradit, unde Erucarum genus speciemque omnem deducit, cui suffragatur Arnoldus. Alii earum originem papilionibus ferunt acceptam; quæ simul ac aureliis exiverint, supra vel subtus vicina folia: ova quædam (stercora vocant Barbari) excludunt, pro ratione sui corporis majora vel minora: horum aliquot testæ coeruleæ, aliorum flavæ, albæ, nigricantes, virides, rubentes) quatuordecim ferè dies fora solis calore, rupto cortice Erucas excludunt, parvulis lumbricis similes, sed coloratas; quæ primo ortu famelicæ, foliis floribusque devorandis totæ incumbunt, præcipuè illarum arborum atque plantarum, quibus olim in ovo fuerant.

Aldrov. H. Inf. l. c. 4.

Nomen.

Turneb. Adv. versar. l. 18. c. 16.

Nutrimentum.

Scalig. sup. Theophr. l. 5. de c. plant. c. 19.

Generatio. Arist. H. A. 5. c. 19. Mousset. Theatri Inf. l. 1. c. 24.

Ælian. H. A. 6. c. 26.

Bellon. observ. 2. c. 68.

Marcg. l. c. De Laet. India Occid. l. 1. c. 4. & 15. c. 6.

Ego singulis his modis oriri posse non dubito: maximè vero humidis temporibus cum humor refedit, inprimis si acrior sol post ufferit.

Naturâ
Mouset. l.c.

Ubi devorandi tempus præterit, vagulæ huc illuc & jejunæ migrant, sensimque marcescentes fame, aliæ intra, quædam supra terram, locum idoneum quærunt, ubi sese vel filo appensæ in aureliam membranâ rectam, vel in nudam thecam transformant. Hoc media æstate si contigerit, post viginti quatuor dies rupto cortice evolat statim papilio: sin adultiore autumno, per totam hyemem durat aurelia, nihilque ante calorem vernalem excludit. Nec tamen omnes in aurelias abeunt, sed aliæ, *volvaces* nempe putrescunt, è quibus nonnunquam ova quasi tria excidunt, Cantharidum vel muscarum matrices. Quando serò papiliones coivere, ova ad ver usque proximum depromunt, vitalia: ut in Bombycibus usu venit, quorum ova per uncias librasque vendi apud Hispanos notum.

Usus.

Habent in Medicina locum. Oleraceas cum oleo inunctas, tutos à venenosorum moribus reddere, Ægineta scribit. Tela & involucrum epotum, muliebrem fluorem sistit. Ligustrum depascentes non solum Cyprium piscem mirè hamo obductæ alliciunt, sed & earum fimus naribus inditus, Epilepticis ab utero mulieribus statim succurrit, si expertissimæ obstetrici, à qua Mousetus habet, credendum: Usta & naribus indita hæmorrhagiam cohibet. Vesicas omnes excitant, & cutem deglubent. Equus si devoraverit, tumores surgunt, arefcit induraturque cutis, oculi excaventur. Omnes hortis, pomariis, herbis & floribus sunt infestissimæ.

Dammum.

Remedia.

Remedia apud Geoponicos, & qui de re rustica scripsere, occurrunt multa. Pelluntur, felle tauri, si eo arbores illinantur; sulfure pauco, si cum stramine sub arbore accendantur; terrâ sub esculi arboris radice effossâ, si in horto spargatur, scillâ, si in hortis feratur, aut suspendatur. Alii mentham, eryum, absynthium, in hortorum ambitu serunt. Fumum è vespertilionum stercorebus, vel fungis sub nuce arbore nascentibus, excitant. Multi in ficulneo lixivio semina præmacerant. Nec male post pluvias matutinis horis arborum rami & frutices olerum succutiuntur. Decidunt enim nocturno adhuc frigore torpidæ.

†
*

ARTICULUS II.

De Erucis inspecie, & primò de Erucis Mouseti.

PUNCTUM I.

De Erucis glabris.

Erucarum differentiarum infinitarum ferè sunt, seu quantitatem, qualitatem, & partes corporis; seu etiam actiones, & alia observes. Sunt glabræ, hirsutæ, magnæ, parvæ, mediocres, virides, nigræ, variæ, rigidæ, molles, cornutæ, excornes. Plurimæ in aurelias, hæ in papiliones abeunt: quædam non, sed cum omnia depasctæ sunt, ipsæ quoque consumuntur & intereunt. Quæ aureliæ fiunt, aliæ immediate in eas abeunt, & hæ non texunt, aliæ prius ova pariunt. Quarundem aureliæ leves & æquabiles; aliarum hispida, rugosæ, acuminatæ, asperæ: quarundam, ut duriorum, nudæ: aliarum musco vel capillis sericis obductæ. Plurimæ ex ovis papilionum nascuntur: quædam in arborum foliis ex semine proprio ibidem in tela per autumnum derelicto, vel rore aëreve illi incluso & putrescente. Quædam foliis, aliæ floribus, nonnullæ fructibus vescuntur. Undoso & celeri motu plurimæ gaudent, aliæ placidè & lentè incedunt. Aliæ leberidem quotannis mutant, aliæ non. Quædam texunt, quædam non. Illæ vel more araneorum telas faciunt; vel folliculos sæpè adeò compactos, & duros, ut ne acutissimo quidem telo rumpantur, &c.

Placet & hic tam Mouseti, quam Aldrovandi differentias ponere & describere. Illi vel sunt *ἐπερὴνεις* sive affines à papilionibus & aureliis fatæ: vel *αὐτορὴνεις* & consanguineæ, ex sua tribu profectæ. Utræque vel sunt *glabræ* vel *hirsutæ*. *Glabræ* in *Bombyces*, de quibus post agetur, *virides*, *flavæ*, *vinulæ*, *fuscæ*, & *varias* distinguuntur.

Virides sunt quintuplices. *Prima* quod ligustro infideat, *ligustrina* dicitur, cui vultum, ambiens circulus pedesque omnes, & recurvum in caudâ cornu, ex rubro nigrescunt; maculæ lateribus transversim inductæ dimidio purpurascences albicant: rubescunt punctula: cæterum verò corpus undique virens videtur. Altera *Sambucina*, quæ non multum ab ea differt, nisi quod undique viret, transversis illis maculis albissimis, & punctulis quibusdam lacteis exceptis. Sambuco rosea inprimis vescitur. *Tertia Lactucaria* ubique viridis in thecam sese fuscam appetente autumno vertit, olera comedit molliora, lactucas præsertim. *Quarta Mespilaria* mi-

Mouset.
Theatri In-
sect. 2. c. 2.
& 3.

nor

nor est, undaque virescens in thecam cineream maculis nigerrimis conspersam sese recipiens. *Quinta Quercina*, omnium minima, in arboribus (quercu præsertim) fila ducit, per quæ descendit in itinerantium capita vestesque & galeros illaqueat; notissimum æstate animalculum, & ubique obvium rudi tela sese implicat autumnino ingruente, & rubro-viridi theca inclusa, moritur hyeme, decem duntaxat pedibus donatur, ut superæ omnes. *Flavescentes* dicimus, quæ maximam partem flavent. Tales hæ figuræ repræsentant; quibus servatur quicquid à nigro liberum: id si pallidiori flavo infeceris, Icones habes depictas. Vivunt mollioribus foliis, præsertim tilia. *Vinula* elegans mehercules Eruca, & supra fidem speciosa: in salice eam invenimus avidè pascentem: labra atque os illi subflava, oculi anthracini, frons purpurea, pedes extremumque corpus herbacei, cauda bifurcata ex vinaceo nigricans. Corpus universum veluti crassiore rubicundoque vino intinctum; quod à collo per scapulas decussatim transiens, ad caudam usque linea albissima, mirifice adornat. *Fusca Porcellus* Eruca dictus, ex fusco nigricat, major præsertim; in minore quos vides orbiculos, albicant: trifolii palustris foliis frequenter insident, eaque mira celeritate devorant.

Varia decem sunt, quæ conspiciuntur. *Prima* cœrulea, oculi nigerrimi; corporis cuticula cæsia, nigris flavisque punctulis multum conspersa: in aurellam convertitur spadiceam, alba membranula vestitam, brassicas amat, & genus universum naporum. *Secunda* caput, pedes, caudamque nigerrima obtinuit, cancelli quadrati, flavi sunt: intus quæ pinguntur tessellæ, striis nigris glaucisque alternatim in longum ductis distinguuntur. Foeniculum amat, anisumque atque cuminum. *Tertia* ex albo viridis gibbosa in incessu graditur; est enim utrinque sepes duntaxat, sicuti omnes *Imray*. In aurellam echinatum mutatur, colore fuscum: oleas absomit. *Quarta* draconium depascens viperam maculosam refert: incedit semper capite erecto, & pectore potissimum se sistit: amat juncos, & fluviis innascentes plantas pappiferas. *Quinta* descendentes costas si obsoleto minio infeceris, pauca in Icone habes quæ desideres. In *Sexta* quod album vides, ochra impleas: gaudet utraque populo nigra, eaque sese ingurgitat. Striæ in *Septima* ductæ ex flavo albescere debent: reliquum totum corpus fusci coloris in aurellam spadiceam se vertit. *Octava* cinerea videtur, ex nigricante undulata: thecam facit nigro-puniceam, è qua pulverulenta Phalæna. *Nona* varia quidem, & meritò censeri debet: incisurarum orbes virent; cornu caudæ refle-

xum, cyaneum: sub qua miniata macula ad ornatum facit. Media incisurarum pars cinerem æmulatur: aurelia demum includitur Xerampelina, hanc in via publica invenimus: gaudet ranunculo pratensi. *Decima* glauconigra: quod enim hic album est, id glauco superinducto bestiam exprimet. In thecam spiralem transmutatur dilutè cæruleam, spiris subrubentibus, quæ ad buccini conchæ formam proximè accedit. In Solano sylvestri (quam Itali Belladonnæ vocant,) glabra eruca provenit, crocei viridisque coloris, cornu in fronte gerit digiti longitudine; quam se sæpius vidisse memorat Cardanus.

PUNCTUM. II.

De Erucis hirsutis densius pilosis
Mouseti.

Pilosæ omnium maximæ maleficæ, vel densiore sunt pilo, vel rariore. Ex illis sunt, *Pityocampe*, *Ambulones*, *Coriariæ*, *Polymidæ*, *Neustriæ*, *Tuberculosæ*, *Mesoleacæ*, *Urticariæ*, *Brassicariæ*, *Sepiariæ*.

Pityocampes, id est pineæ piceæve, Erucæ, digitum minimum crassitie æquant, tres digitos transversos longæ. Undecim incisuris inter caput & caudam constant, sedecimque (more reliquarum) pedes habent: nempe juxta caput utrinque tres, medio corpore utrinque quatuor, & ad caudam extremam utrinque unum. Priores vero sunt adunci & exiles, quibus viam tentant; reliqui latiores, & multis crenulis ferrati, ut foliis firmiter insistant. Caput formicæ; reliquum corpus Erucis vulgaribus simile. Hirtæ sunt pilis, villisque repletis undique obseptæ: pili in lateribus nati albicant; in dorso fulgent, cujus pars media maculis veluti oculis ornatur. Villis abrasis, cutis subest nigricans; pili valde exiles: pungunt tamen quàm utrica acrius, maximumque dolorem, ardorem, febrem, pruritum, inquietudinem adducunt: veneno scilicet subito sine sensu vulneris infuso, & ad partes visceribus proximas delato. Te- las subtiles quales aranei texunt, prioribus pedibus fila ducentes, ac disponentes: has, veluti tentorium, nocte ingruente subeunt; tum, frigoris tum ut procellarum vitent incommoda: tentorii hujus tam tenax & subtilis materia est, ut nec ventos curet furentes, nec imbris inundet. Amplitudo item tanta ut vel millia plura erucarum faciliè ferat. In ramulis Pini & Piceæ supremis nidificant, ubi non solitaria, (ut aliæ) sed gregales vivunt. Quacunque iter fecerint nentes fila ducunt telaria: primaque luce (faveat modo ferenitas) catervatim minores majores comitantur, ac viduatis fronde arboribus, (omnes

enim absumunt) textrinam strenuè colunt. Solæ pini piceæque pestes, ad alias coniferas arbores non accedunt. In Atho monte; nemoribus Tridentinis, atque transalpinis convallibus, (ubi frondis nutritiæ copiam) admodum abundant, ut Matthioli testatur. Virulentissimæ profecto bestiae, sive extra premantur manibus, sive intus exhibeantur: tam certissimi veneni olim habebantur, ut Ulpianus legem Corneliam interpretans de Sicariis, in eorum numerum & poenam, Pityocampæ propinatorem vocaret: Alium ff. ad legem Corn. de sic. Haustis Pityocampis dolor os & palatum graviter affligit; lingua, alvus, ventriculus ab erodente veneno valde inflammantur: Etiam ingens dolor excruciat, licet initio pruritum quendam jucundum passi videntur: insequitur æstus, cibi fastidium, & perpetua, sed irrita vomendi dejiciendique cupiditas. Tandem nisi occurratur, adurunt corpus, & ventriculo crustas inducunt, Arsenici ferè modo. Diosc. Æt. Plin. Celsus. Galen. item 11. simpl. cap. 5. & Avic. sos. cap. 25. Hac de causa Ætius & Ægineta mensas sub pino sternere, vel commorari, noxium dixerunt, ne forte cibi nidore jusculorum vapore, vel clamore hominum Pityocampæ suis sedibus motæ, in escas decidant; vel semina saltem æquè lethifera demittant. Qui ab his læsi fuerint, ad Cantharidum antipharmaca respiciant: liberabuntur enim iisdem remediis: propriè tamen melinum oleum (quod è Cotones & oleo temperatur) ad vomitum usque bis terve hauriendum est, ex Diosc. & Ætii præscripto. Generantur vel potius regenerantur (convolvulorum more) è semine Autumnali in tela certis vesiculis relicto, vel ex ipsis Volvocibus putrefactis ut Scaligero sentire visum est.

Ambulones dicimus, quibus incerta domus & esca: unde superstitiosulè peregrinantium modo vagantur, & (ut mures) semper comedunt alienum cibum. Quare Angliceos *Palmer worms* appellant, ab erratica nimirum vita, (nusquam enim consistunt) quamvis ratione hirsutiei *Beare worms* dicuntur. Certis foliis aut floribus non astringi se sinunt, sed audacter percurrunt delibantque omnes plantas ac arbores, & pro arbitrio vescuntur. Undecem ponuntur. *Primo*, quas vides in latere maculas albas, tales revera esse debent: corpus universum nigrescit, pili inferiores omnes subcrocescere oportet; superiores vero omnes in dorso positos canescere; tribus iis ordinibus exceptis, qui in collo juxta caput nascuntur: ii enim eundem cum ventris pilis tenent colorem. Ex cujus aureliæ exit, quem hic vides papilio, cujus iconem coloremque & naturam superiori libro descripsimus. Si *Secundi* collum, ventremque atque

ibi nascentes pilos flavos fegeris, non est quod plura expectas. Theca ejus fusca videtur; ova pallida, papilionem inde nascentem superiori libro expressimus. *Tertius*, toto corpore pilisque è fusco flavus, nisi quod macula lateratim in unaquaque incisurâ obliquata lateſcunt, caput puniceum furca quadam nivea ornatur. *Quarto*, venter atque inferiores pili infuscantur, dorsum atque superiores ex fusco flavent. Linea in facie bifurca seri colorem vel lac dilutum refert. *Quinto*, vultus spadiceus, ventris latera canescentia; corpus pusillis varium guttulis subluteis, atque hæc supra, piceis: pili quasi radioli exeunt flavi, arguti illi quidem, & medio acuminatius crescentes: multum vicinas herbas & segetem lædit. *Sextus* colore est leucophæo, nisi incisuræ nigris lacteisque hic illic maculis essent infectæ. Setæ infra supraque natæ, & tanquam ferratim positæ, hispida valde sunt & rigida, sed à colore corporis non recedunt. *Septimum* cute nigra, pilis autem non nihil lutescentibus donatum, *Peniculum* vocare soleo, quia utrinque ex fronte atque etiam in uropygio peniculus erumpit mollis, colore coracino. Quas vero cuneiformes in dorso eminentias conspicias, radice lactea; cæterum, nigellæ videntur. *Octavus* murinum colorem exprimit, cujus in dorso cunei septimi illius respondent. *Nonus* coloris peregrini & rari; singulae enim incisuræ variis ab invicem coloribus; sed mixtis invicem omnibus pinguntur; quas clavus, quamque argenteus pulcre adornat. *Decimus* inter naturæ luxuriantis lusus, non minus elegans quam rarus; nigris, coeruleis, viridibus, atque luteis liris, & nervis scabris striatus: quos guttula quædam aureæ mire efferunt. Pilos admodum molliculos gerit, miræ gratissimæque viriditatis, thecam habet purpuream, membrana munitam. *Undecimi* incisuras albicantes, prafinas imaginare; vellusque & pilos medio virentes facito.

Corylaria undique cum virore pallet, tribus inter cuneolos maculis nigris exceptis, & cornu illo in ultimo dorso; & quasi uropygio crescente, quod rosaceum ruborem latè fuscipit. Coryli præcipuè foliis infidet, unde *Corylariam* dicimus, duas illarum species vidimus; alteram saturatè, alteram pallidiùs viridem.

In *Polymitis* multiplex naturæ venustas resplendet: quibus licet faciem Æthiopis Maurivè tribuit, vestem tamen concessit Polymitam; vario opere, vero artificio fulgentem. In fronte pili, veluti in cirros nexi nodosos, antennas referunt; quales item in ultimo dorso, cutis iridis æmula, orbiculis splendet murice inebriatis, quos veluti latos clavos costis affixit natura. Vellere enati pili fulgorem solis repræsentant, oculosque oculato die perstringunt.

Erucæ Raupen Mouf





Nesfrias è Normania duas accepimus. Majori vultus cœruleus, albis, rubris, cœsisque furculis corpus liratū; pili aureo splendore coloreque grati. Minor convolutus, echinum exprimit: Caput illi nigerrimum, corpus glastinis quibusdam guttulis variè perfusum: pili croceum fulgorem imitantur. Tuberculosa pyri germina corrumpit, capite atrato, corpore nigris rubentibus, & lacteis quibusdam liris ornato; mediis quasi humeris, & ad finem ferè dorsi, tumuli sive tubercula assurgunt livida, albis punctulis conspersa. Ova è quibus nascitur, spadicea sunt; qui est etiam aureliæ, & pilorum color. Aliam vidimus congenere, sed duntaxat tumulo gibbosam.

Mesoleucam à capite ad dimidium dorsum, obsoletè luteam, dein liliaceam peperit natura. Venter luteo cinereus, clavis medio tessurato fixis ornatur.

Urticaria pedes si fatisciente luteo leviter tetigeris, parum à naturali icon differet: rigidulos & erectos pilos habet spinatim crescentes. Levi tactu vulnerant; primumque blandum, sed venenatum pruritum, deinde vix ferendum dolorem superinducunt. Haud desunt qui eam Pityocampes malitiam malignitatemque vincere asseverant.

Brassicaria, eruca capite est cyaneo, corpore flavis furculis duobus utrinque lineato: inter quos subcæsia quasi area nigris quibusdam feminibus confita videtur: pili aureliæ (quæ cinerascit) colorem obtinent.

Sepiaria binæ offeruntur. *Majori* crocesceret vultus, nisi quem nasi loco triangulum videtis liliâsceret. Corpus albis flavis rubrisque & nigris, (quas expressimus) maculis, nullo ordine locatis, variatur: pilis subluteis horret. Sepes populatur, & nudat frondibus: ubi tamen ferici rudioris relicto glomo, in thecam spadiceam, quasi in Sarcophagum se recipit. *Minori* facies subcœrulea, uti & totum corpus, absque maculis quibusdam nigris albicantibusque esset: pilos cum prima concolores fortita est.

PUNCTUM III.

De Erucis rarioris pili Mouseti.

Rarioris pili sunt *Geranivora*, *Iacobæa*, *Antennula*, *Echinus*, *Rubicula* & *cornuta* illa bestiola, quam Germani *Hornworm* appellant.

Geranivora magnitudinem formamque ritè hic dedimus, & affabrè explicatam. Albas maculas, cingulos nigros ornantes, ferrugineas facere oportet; ventremque pedesque & album inter cingulos spatium porraceo, viridi ornare. Camerarius ad Pennium hanc misit, cum hac Hypographe: *Eruca grandis*, hortis tantum agrestibus victitans, & potissimum Geranio palustri *Barbaxodæ* infecta.

Antennulata corpus varium: à capite ad tertiam incisuram cretâ illitam dices; quinque aliis sequentibus nigrocineream; tribus iterum postremis cerussatam: *Antennulæ* ex pilis veluti colligatis constant; quales item ultimo dorso, cristæ instar, se erigunt. Quatuor illi erecti in dorso cirri, è pilis quoque fiunt dentatim ordine crescentibus.

Iacobæa sive Senecionem majorem depascens eruca, capite pedibusque obsoletius purpurantibus, ventre pallidiusculè virente; corpus habet inamæno viridi fariscens, & nigris flavis flammeisque maculis ornatum. Pilorum color ventri consonans.

Echinorum duas animadverti species; unam è cœruleo virentem, alteram *Mesoleucen*. Primus *Echinorum* tessellato prodit corpore, ex nigro flavoque varius: spinæ luteæ videntur, ineunte autumno in aureliam cineritiam vertitur. Secundus verà *Echinum* præ se fert; dorsi dimidia pars, prior nempe, ex flavo nigricat; posterior cum flavedine albescit; spinas gerit argutas valde & crassas, colore cæcio.

Rubicolam nigrocineream liris utrinque tribus pallidè flavescens pinxit natura: pilos rariores gerit, plane nigros.

Est & *Cerastes* cujus varia loca è luteo virent, pili medio dorso nati canescunt; cornu vero crenatum rubescit.

Varia item in verbasco, lupulo, *Scrophularia*, *Glycypicra*, *Solano*, *Alno*, *ulmo*, *ocymo* & *Tithymallo* nascuntur: imo quævis pænè herba peculiarem habet erucam vastatricem: quas, ne infinitus videar, quasi notas pertranseo.

Gesnerisæ *fætida*: Erucæ cornutæ simillima est, sed & cornis, & colore aliquantum discrepans. In muro repentem cepi exeunte Augusto Anno 1550. Gravem spirat odorem, ut planè venenatam crederes. Iracunda perrexit capite cum anterioribus duobus pedibus semper erecto; cœcam puto: digitum longa & crassa, paucis sparsim pilis per dorsum & latera horrescens, dorsum nigricat. Ventris laterumque color ex flavo subrufus: internodiis quatuordecim totum corpus distinguitur. Singula internodia sulcum insuper quendam ceu rugam per dorsum habent: caput illi nigrum, duriusculum; os forcipatum, denticulatumque vel ferratum: his forcipibus, quicquid comprehendit, mordet: pedibus 16. graditur, ut maximam partem omnis *Erucarum* nationis proculdubio venenosa est. Vergerus *Pityocampen* putavit, alii *scolopendram*: sed pedum numerus non patitur *scolopendram* dici. Vix ferebam odorem, dum viam describerem: duo hypocæusta nimio & abominabili fœtore adeo infecit, ut manendo ferendoque non essem. Hæc *Gesnerus*.

ARTICULUS III.

De Erucis Aldrovandi.

PUNCTUM I.

De Erucis prima Tabula.

Aldrovandus sex diversis tabulis nobis diversa Erucarum genera exhibet. In prima novem exhibet. *Prima* primæ tabulæ ex maximis est, & caudata, cauda nimirum instructa sursum revoluta: tota est lutea, annulis verò cœruleis, iisque triangularibus, inter quorum singulas singula ab utroque latere nigra sunt puncta. Os item nigricat. Cum eam aliquo tempore domialuisssem, telam non texuit, aut folliculum, sed in Chrysalidem immutata Papilionem progeneravit luteum, eum quem in prima Papilionum tabula tertium exhibuimus. *Secunda* quæ ejusdem est magnitudinis, identidemque caudata, leviter lutescit, subfusca tota, nigerrimis punctis, ac annulis instructa. *Quarta* ex mediocrium genere, etiam caudata est, ad latera sublutea, per tergus flexibus arcuatis coloris elegantissimi miniacei decorata, annulis verò nigris, sed qui candidis notentur punctis. *Tertia* caudam habet in extremo acutissimam tota viridis, annulis nigris, pedibusque, qui sunt quatuordecim Brassicas, & olera infestat, ex hoc potissimum genere Papiliones illi exiguo corpore progenerantur, subvirides & albicantes. Papiliones enim erucarum suarum colorem ferè referant, ut Aristoteles quoque testatum reliquit. *Quinta* ex maximis est, colore flavo, & viridi, & lineis per dorsum latis triangularibus, viridibus, & punctis maculata purpureis. Caudam gerit semper erectam, & caput etiam erectum, quare cum incedit, incessum carnis quodammodo æmulatur. Cauda hirsutis quibusdam villis præmunitur, parteque infernè notabilem habet maculam nigram. Ligustri foliorum esu gaudet. Sedes habet quatuordecim. *Sexta* corpore major est, rostro, & pedibus exilioribus, colore tota eodem, sed dilutiori, lineis verò transversalibus flexuosis magis ad cœruleum quam ad viridem inclinantibus: Inter singulos annulos, singulis infra notatur punctis nigricantibus, nam cætera puncta, quæ per supernum corpus conspiciuntur, ad purpureum vergunt. Supernè per tergus color magis est luteus, infernè ad pedes magis viridis. Degit plerumque in viti sylvestri. Cauda superiori similis. *Septima* toto est flava, infernè ad croceum vergente colore, lineis distincta supernè triangularibus ut in quinta, sed cœruleis, & quæ punctis consperguntur atris. Pedes


& rostrum nigricant. *Octava* admodum est exigua, caudata tamen, maximâ sui parte nigricans. In tergore lineas habet binas admodum exiles, luteas, inter quas altera est lata, viridis. Caput habet rotundum, pedes quatuordecim, in extrema alvo appendicem, quam per terram trahit, cauda pro corporis portione majuscula est. *Postremam* paulo rudius, quam par erat, pictor expressit: nam puncta illa candida, quibus modo majoribus, modo minoribus toto corpore conspergitur, obscurè admodum apparent. Tota colore ferè est ferrugineo, extremo alvi, cauda, pedibus, & capite rubris, rubra item linea lata à capite, ad anum usque per dorsum extensa fertur. Anterius corpus exilius est, quam extremum, extremumque exilius medio, sanguisugam dixeris.

PUNCTUM II.


De Erucis secunda tabula.

Quæ in secundâ tabulâ dantur Erucæ, omnes ferè bicaudæ sunt: in quibus hoc notandum est, quod caudæ sint in extrema alvo, cum in iis quas pinximus in prima tabula, in extremo dorso sursum enascantur. *Prima* tota purpurascit, præterquam inter primum, & secundum flexum, ubi viridis est. Binæ item lineæ, eo quo pictor expressit modo à capite ad extremum usque alvi extenduntur, candicantes. Cauda utraque nigricat. Pedes habet quatuordecim. *Secunda* caudis duabus instructa minimis tota atra est sed luteis interstincta zonis. *Tertia* corpore est crasso, & compacto, ex luteo virescente zonis annulifve admodum viridibus, capite verò quod exiguum est, & primo flexu coloris aurei. Pedes quatuordecim habet, nigricantes; caudas exiles, proceras. *Quarta* brevissimis est caveis; oblonga, sed exili, ac tenui corpore, tota ferruginei coloris, exceptis annulis semicircularibus, qui ab ima parte flavi sunt, ab altera nigri. *Quintam* monstruosæ quodammodo figuræ, quod partim ex Eruca, partim ex Araneo constare videatur, ἡ ἐρυνόειπλος, sive Erucaraneum nuncupavi. Sex primum à capite ex primis corporis flexibus pedes Araneorum pedibus simillimos emittit, dein interpositis aliquot flexuum intervalis, alios octo more Erucarum, quas aliqui toto corpore refert. Tota ex cinereo ad luteum vergit, sed annuli coloris sunt planè castaneæ, sicut etiam pedes, & alæ. Insolentis profecto etiam formæ est, quæ *sexta* in hac serie ponitur, capite scilicet, cum id contrahit, compresso, facie Muris, aut felis, sed nigra. Supra enim rotundam illam nigredinem linea est alba, sub qua puncta duo, nempe ab utraque ejus parte unum, nigra, velut aures efformant, in medio verò nigre-


Tab. 1




Tab. 2




Erucaraneq




Tab. 3



Tab. 4



Tab. 5



Vermic Digfaci



nigredinis puncta alia duo oblonga nasum, qui illis animalibus admodum est compactus, tria denique alia sub his minima, aliquo rudi modo æmulantur. Tota est viridis, corpore pallidiùs, intensius annulis. A capite ad caudas usque porrecta linea alba per medium corpus transfertur. Caudæ eriguntur, & punctis atris consperguntur. Pedes numero quatuordecim, quorum qui posteriores sunt, admodum sunt crassi: *Septima* eadem est naturali situ procedens. Rursus *Octava*, à primo loco depicta differt tantum in eo, quod primo post caput flexu sit luteo, duobusque punctis nigro distincto: item, quod lineæ illæ, quæ per superiora feruntur, inter quintum, & sextum flexum, invicem conjunguntur: denique, quia in hac subinferiori linea, inter singulos flexus, album sit punctulum. *Nona* eadem est cum secunda, bis per errorem depicta: infestum est hoc genus brassicæ. Habes *decimo* loco Scolopendram terrestrem parvam, sed de hac suo postmodum loco. *Undecimo* loco depicta exhibentur Erucarum ova lutea; simul conglomerata, exigua. *Postrema* Erucarum minima, in frumento inventa est. Insectulum hoc tam tenui, ac exili est corpusculo, ut potius fili cujuscumque particella, quam animalculum videatur: longum est digitum transversum. Maximum tantillo in corpusculo robur adverti, velociter movetur, & nunquam ferè à motu cessat. Pedes multarum Erucarum more habet quatuordecim. Capite nigricat, cætera cinereus. Sex integris diebus nihil edebat.

PUNCTUM III.

De Erucis tertia tabula.

Tertia nobis novendecim exhibet. *Prima* Echinata ipsius videtur Hippocratis, zonis luteis, & punctis nigris, & candidis variegatur: quam, vel saltem simillimam superiori ad me allatam ætate sic descripsi. Vermis est digitum, & medium longus, posteriore parte caudæ vicina latior, quam anteriore, duodecim constat annulis, sive segmentis, sive flexibus, qui supini nigro colorati sunt, linea medium dorsum secante castanea. Interstitia annulorum pallent. Caput duabus appendicibus velut corniculis armatur. Sex pedibus, tribus utroque latere ante instructus graditur; postica parte Erucæ instar arcuatur, quâ latior est. Quatuor in eo villorum in penicilli formam adunatorum ordines in singulis annulis conspiciuntur, bini singulo latere: unus superior ad marginem dorsum, alter inferior ventri propior, ille octonos annulos ultimos eminentibus penicillis ornatus, hic novenos. In ultimo, quem caudam dicas, extant duo, colore omnes ferrugineo. Convolutur in glomum ad instar verticilli:

quemadmodum etiam, quæ subsequitur, quæ in orbem convoluta depingitur, simillima ex toto cum illa, nisi quod in hac inter singula interstitia puncta candida non sunt, quæ illic summam conciliant venustatem, contra in hac puncta iisdem locis nigra sunt, & semicircularibus maculis ex albo lutescentibus ambiuntur. *Tertia* tota aterrima est, sed castaneis tantum interstincta zonis & punctis. Supina parte, quæ quarto loco depingitur, minus nigrescebat. *Quinta* tota longissimis vestitur villis densissimis, fuscis, sed & ipsa eruca tota ad latera fusca est, supina lutescit, pluribus prædita annulis nigricantibus, à capite ad extremam alvum linea item nigricans defertur, mediam alvum distinguens.

Loco *Sexto*, quæ datur, ex minimarum genere est, quin etiam paulò minor quam pictor expressit. Nisi moveri, aut incedere videas, alvum à capite vix interstingues. Pedes habet innumeros. Toto corpore coloribus miniaceo, nigro, luteo, & albo varia est. Caput totum est nigrum, nigri item pedes, nigra capillamenta, dorsumque & venter tergus miniaceo colore conspicuum est: annuli nigerrimi, inter quas supra punctum est album, infra luteum. *Septima* paulò major iisdem ferè coloribus variat, sed pedes tantum habet quatuordecim. Totum corpus quadrangularibus punctis constat, primò (à tergore ad inferiorem descendendo) nigris, dein flavis, tertio miniaceis, quæ latiores sunt: quarto iterum nigris, quinto flavis, sexto nigris, flavis rursus septimò, ultimò ac octavò nigris. Caput totum, ut in præcedente nigrum est, pedes item nigri. Sed capillamenta ferè ferruginea. *Octava* murem montanum, qui vulgo Marmota nobis dicitur, facie æmulatur. Tota coloris est castanearum, admodum hirsuta, longa palmum. Color propè annulos dilutior est. Cum invertit se color inter annulos apparet niger holoserici instar micans, & cum ingreditur, capillamenta quæ sunt à lateribus, ad cinereum vergere videntur. Caput totum est nigrissimum.

Nona ex mediocrium genere est, corruptior tamen, tota viridis, exceptis tuberculis, quæ per singula annulorum intervalle, tria habet, & quartum in dorso, ex quo capillamenta, enascuntur similitudine penicillorum, quæ coloris sunt planè aurei. Os nigricat. Pedes anteriores lutescunt, posteriores virides sunt; omnes numero quatuordecim. *Undecima* similiter per dorsum habet tubercula rotunda cum suis penicillis, nec non inter singulos corporis flexus, sed cærulea, rostrum item cæruleum, & pedes præter tres anteriores, qui minores sunt, & coloris ex castaneo rubicundi, quo colore corpus totum constat. Durum mihi peperit folliculum. Pedum

numeris corpori, flexibus respondet. *Decima* tota etiam est viridis, tuberculis, & floccis cœruleis, rostro & anterioribus pedibus ferrugineis; reliquis nigris. In alvo maculam habet ferrugineam. Habes *duodecimo* loco hujusce decimæ Erucæ expresum folliculum coloris ferè ferruginei, admodum densum, & durum. *Decimo tertio* loco picta tota hispida est: Linea candida à capite exorta ad caudæ finem per tergus fertur. In dorso duodecim habet velut puncta, aut potius tubercula rotunda, sex ad singula latera colore mali punici; item quatuor alia à singulis lateribus ex nigro ad castaneum vergentia; ex quorum omnium medio capillamenta quædam exeunt numero quatuordecim, quorum octo magna sunt, parva sex. Cætera per dorsum cœrulea, supina pars, & pedes flavescent. *Decima quarta* colore est ferrugineo, supernè admodum diluto, & ad luteum vergente, infernè admodum intenso. Annulos habet nigros, & punctis ad latera maculatur exiguis candidissimis. *Decima quinta* inter minimas majuscula est, colore tota flavo, infernè ad aureum, supernè ad castaneum inclinante. Caput & alvi extremum nigra sunt. In dorso nigra etiam habet puncta, sed intus candida: capillamenta penicillorum instar distinguuntur invicem. Pedes habet exiguos ferrugineos. *Decima sexta* eadem est, ideo picta, quod tacta se velut in vertibulum contorquens stellæ figuram exprimat coronatæ. *Decima septima* rubra est, annulis nigris & albis, ubique maculis variegata, capillamentis exilibus, rubicundis. *Decima octava* capite est coloris aurei, corpore vero toto cœruleo. Linea aurea nigris conspersa guttulis, rotundis à capite ad anum, usque per superna fertur. Ab utroque illius lineæ lateribus, rursus aliæ maculæ sunt, seu potius puncta minima nigra ipsa posita, ut etiam lineas duas, hinc inde unam efficere videantur. Alvi extremitas acuta est, & nigra, nigri quoque pedes, numero quatuordecim, licet quatuor ab utroque latere in anteriori parte pictor pinxerit. Capillamenta habet subtilissima plenè aurea. Ova mihi peperit candicantia, quæ appinximus postremo loco.

PUNCTUM IV.

De Erucis quarta tabula.

IN quarta tabula quatuor duntaxat dantur. Quæ primo & secundo loco, ex maximarum genere est; Alvum habet bifidam, & ex dorsi extremo, caudam exiret rectam. Toto corpore ferè unicolor ex luteo fusca. A cervice ad quartam usque vertebra latè est linea aterrima, exiguis aliis una recta, cæteris transversis candidis insignita. Supremo etiam vertice atro est, facie ante-

riore flava; pedes habet monstrosæ magnitudinis. Supina parte ad cinereum vergit. *Alter*a, quæ *tertia* est in hac serie, tribus constat coloribus, viridi, aureo, & nigro. Corpore nimirum undique toto viridi, sed annulis nigris aureis punctis distinctis. Inter annulos singulos linea est annularis item sublutea. Pedes habet quatuordecim virides. Fructum nè arboris an potius folliculum cuiuspiam Insecti dicas, quod quarto loco depingitur; id Frat. Gregorius Capuccinus Regiensis mense Julio anni 1597. in abiete offendit. Folliculum esse arbitror: erat enim intus plenum telis Araneo similibus. Inerant & ova. Quare cum Erucas aliquot ova edere observaverim; Erucæ cuiuspiam esse judicavi, eam hoc sibi fabricare operculum, ut ova ab omni externa injuria protegat. Figura, & colore maturas æmulatur olivas. Ejus exterior substantia erat cartilaginea, & variis exiguis tuberculis ceu punctis extuberabat.

Sed nunquid hanc Eruca ipsa texat, quod verisimilius est, vel aliunde Crabronum more allata materia conficiat, necdum didici. Fructum interim non esse abietis exemplo discimus, quæ conifera est; nisi quis dicat abortivum esse, quales multos observamus in quercu. Cum reperiretur, non erat unicus, sed quatuor simul erant conjuncti: quatuor ni fallor Erucarum opus ac labor. Quæ in conjecturâ si fallar, lector boni consulat.

PUNCTUM V.

De Erucis quinta tabula.

IN 5. tabula sunt novem. Quæ primum locum habet, magnitudine est duorum digitorum transversalium, colore fusco, quaternis macularum nigrarum seriebus distincta: capite flavescente, toto corpore glabro; utrimque ad latera propè ventrem linea quadam flavescente insignito: subtus toto colore albicante. In brassica nasci rustici dicebant. *Secunda* descriptæ aliquo modo est similis, quoad formam & glabritiem, sed minor tamen, coloreque castaneo magis diluto; capite duabus maculis nigricantibus insignitur. Ab eo ad extremum uropygium duobus macularum ordinibus, partim atris, partim luteis decorata est; & utrimque ad latera linea quadam rubescens per longitudinem fertur, cui in singulis annulis punctula quædam in medio candida, & in circumferentia nigra superfident. Parte supina tota dilutè lutescit. *Tertia* bina è lateribus frontis emittit cornicula exilia, & brevita: caput etiam habet parvum & nigrum. Toto corpore hirta est, & colore ferrugineo, annulis vero nigricantibus. Capillamenta

pillamenta penicillos æmulantur ubique, præterquam in cervice, & dorsi initio, ubi vix ipsa videntur capillamenta, quia rarissima sunt, & exilia admodum. Cauda etiam penicillis horret, quod nec dum in aliis vidi. *Quarta* ejusdem cum secunda magnitudinis, colore est terræ illius, quam umbram pictores dicunt: Inter singulos annulos tria habet tubercula, ex quibus pili oriuntur penicillorum figura coloris castanei. Albicans vero linea per dorsum recta à capite ad caudam ducitur. Pedes anteriores magis, quam posteriores nigri sunt. Inter singulos quoque flexus à lateribus punctula sunt albicantia alternatim posita. Quod *quintum* datur in hac tabula, id dispari fructu nascitur. Celebre est apud Plinium aliosque probatos scriptores ad quartanam. Alibi de hoc insecto, hoc etiam prodidit loquens de remediis adversus dolores dentium. Is quoque vermiculus, qui in herba labrum Veneris appellato invenitur, cavis dentium inditus mirè prodest. Nam Erucæ brassicæ, ejus contactu cadunt. Idem mihi proprijs ante multos annos manibus ostendit Cardinalis Paleottus: neque id amplius videre potui, licet multos fructus, diversis aperuerim temporibus, donec tandem an. 1592. sub finem Septembris cum fortè speculaturus, nunquid potius in maturis quam immaturis nascerentur, inveni illis, qui maturi erant. Longitudo digiti auricularis transversim dimens: sed cum nunc exactius descripturus id intuerer, offendi ex erucarum genere esse, nam quatuordecim progreditur pediculis. Caput atrore splendet, ut semen amaranthi æmulari quodammodo videatur: cætera albicat. Dioscorides etiam meminuit, sed nemo veterum Erucam esse scivit. *Sexta* à lateribus leviter lutescit, infra, ac supra colore est castaneo, annuli quoque castanei caput nigrum, pedes exigui, sublutei. *Septima* pictura est induramenti cujuspiam Erucæ affabrè facti ex folio quodam arboris, aliaque materia bomicina. Folium id extrinsecus multis velut laminis sericis albicantis coloris erat obvolutum; intusque quidem eodem modo, sed pluribus laminis intricatum erat. In centro, seu medio laminarum plurima ova, nigra, parva seminibus vel hyoscyami, vel nicotianæ comparibus, una cum fœtibus etiam numerosis latebant. Ex quo docemur etiam Erucas esse, quæ & ova, & eodem etiam anno fœtus edant. Aliud nidulamentum sive folliculus exhibetur loco *octavo*, figurâ pudendi humani. Inferna enim parte referebat quodammodo scrotum, superiore virgam, ac eò magis cum duabus, ut hæc instructum esse fistulis aut ductibus. Eo aperto vidimus rami frustulum, & folij pediculum figuram virgæ effor-

mare: hæc enim simul complicata Eruca filis obtexerat; sicut item folium, quod scrotum efformabat. Intus ut in proximè descripto, & ova & fœtus delitescabant. Erant ambo isthæc nidulamenta ita undique clausa, ut ne hilum quidem aëris, ne dum pluviam admitterent. At cum ita undique clausa sint, quispiam quarat, quomodo ea ibi posuerit Eruca, cum hæc intus non reperiatur. Responderem ego texere quidem primo folliculum Erucam non totum, & in ea, quam texuit parte ova edere, dein occludere, & abire, sed nunquid postmodum moriatur, aut in Aureliam convertatur, nec dum didici. *Po-
stremo* loco depicta Eruca tota erat viridis punctis conspersa nigris, capite rubro.

PUNCTUM VI.

De Erucis sexta tabula.

IN ultimâ quindecim depinguntur. *Pri-
ma* est tota viridis, lineis transversalibus, sed singulis tribus aureis punctis decoratis, quales in pluribus aliis observavi, annulis luteis, sub quorum singulis punctum est atrum: rostro etiam atro est, atris anterioribus pedibus, posterioribus viridibus. *Secunda* quoque est viridis, sed in hac lineæ nigræ illæ corpus ambientes latiores sunt, & binis tantum maculis aureis insigniuntur; præterea annulos habet nigros, & luteas, latusque velut à capite antennas emittit. *Tertio* loco habet figuram Cossi, de quo suo post loco separatim agemus, hic ideo positam, quod si posteriores haberet pedes, omnino esset Eruca. *Quartum* depicta Eruca glabra, ex minorum genere, toto corpore ex viridi lutescit, sed annulos habet nigros, & inter singulos puncta oblonga tria, iridem nigra. Caput rube-
scit, retro, quod duobus minutissimorum punctulorum nigrorum ordinibus conspergitur. Pedes quatuordecim nigricantes. Habes *sexto* loco Erucæ suæ involutæ folliculo rubicundo Chrysalidem, sive Aureliam. Ad tactum tantum mobilis, & tota viridis est, & nigrum habet inter singulos annulos punctum, quod supra candicat. Habes deinceps aliquot Geometrarum icones, ideo hic adjectas, ut quomodo ab Erucis differrent, unico intuitu conspicias. (Geometras eas voco, quod hominis Geometræ ferè instar incedendo agros dime-
tiantur) Pedes enim in hisce animantibus contrario sese habent modo, ac in Erucis, quibus nimirum antèrius pauciores sunt, postèrius plures (loquior autem de ijs quæ habent quatuordecim) cum Geometræ sex habeant antèrius, postèrius etiam totidem, in medio ventre nullos, quo fit, ut eo, quo pictura prima ostendit, modo incedant. Aristoteles huic Erucarum

generi nomen non dedit, sed appellat *καμπύνας*, αὐτὸ καμπύσαι τῇ πορείᾳ, hoc est, Erucas, quæ undatim incedunt. Parte enim, inquit, innitentes priore contrahunt sese, adducentes posteriorem, arcuatimque incedunt, & ex his scribit nasci *πυρία*, & *ὕπεργα*, quæ Gaza vertens Acias, & superas dixit. Prima tota lutescit supernè, infernè ad ferrugineum accedit: A lateribus inter singulos flexus punctulis nigris maculatur. Quæ subsequitur eadem est extenso corpore depicta. Caput candicat, pedes nigricant. Nona in hac serie Geometra est omnium minima, tota viridis, vel potius coloris herbacei, excepto capite, quod rubicundum est. Decima pictura ejusdem est in spiram revolutæ: nam sit tangas, eo modo se contrahunt, & caput celant, contra pericula, ac injurias. Undecima ex minorum genere est, corpore coloris ferè ferruginei, à lateribus lutei. Pedes, caput, & extremum caudæ habet nigra. Duodecima, rursus ex vulgatissimarum Erucarum, quæ brassicas infestant, tota herbacei coloris, exceptis annulis, qui lutescunt. Decima tertia ejusdem coloris herbacei, sed annulos habet aterrimos, serici instar splendentes; præterea inter singulos annulos rotundos habet velut oculos luteos, & in medio horum nigerrima puncta. Caput luteum est, punctisque nigris minimis maculatum. Quod decimo tertio loco depingitur insectum, corpore quodammodo Erucas æmulatur glabras, sed pedes habet ab utroque latere ternos, quanquam bini tantum à pictore expressi sint: toto corpore est nigerrimum. Epidauro id allatum mihi donavit Antonius Maria Alberghinus Philosophiæ & Medicinæ D. eximius, inquit illius pulverem ad strumas curandas remedio esse peculiari, ac præstantissimo. Ex minimarum genere est *postrema* Erucula, tota ferè cinerei coloris, annulis vero subluteis.

ARTICULUS III.

De Bombycæ.

Nomen.
Aldr. Hist.
Inf. 1. 2. c. 4.

Bombycis historiam separatim nos daturos supra diximus. Stamus ergo hic promissis, addituri insuper & de *Chrysalide* seu *Aurelia*, aliquid. Eruca ista *βόμυξ* est Aristoteli, Hefychio *ὄλομήτης* seu *ὄλομψήτης*, ut quibusdam placet, Ambrosio & Basilio *vermis Indus*; Alberto, *vermis lanificius*, Baptistæ Pieræ, *Eruca bombyce vorax*; Scaligero *Ser*; Aufonio, *Ser vestigiatus*; Pausaniæ *Seres*.

Descriptio.

Omnes septem habent annulos: Pedes quatuordecim, anteriores sex, qui minores sunt; posteriores octo, qui post ter-

tium annulum incipiunt: postremæ duæ omnium sunt maximæ, supra quas cauda est acuta & surrecta. Inter singulos annulos macula conspicua est nigra. In dorso inter eosdem annulos, quatuor sunt Semicicla literam G majusculam formantia, quorum priora evidentiora sunt postremis, quæ nempe tam sunt exigua, ut visum ferè effugiant. A capite ad caudam usque linea per dorsum medium fusca fertur. Rictus omnibus idem, porcorum ferè similis, oculi magni, & nigri, uropygium caudæ piscium ferè specie.

De generatione & aliis, hæc nos olim in Naturæ admirandis diximus. Vermis primo est, Folliculo inclusus emoritur informis: E folliculo denuo prodit alatus papilio. Itaque insectum reptile in volatile per medium Zoophytum motus atque sensus expers, admirabili metamorphosi commutatur. Exclusus enim primo vermiculus, alimenta quærit copiosa, quibus avidè depastis, capitis crebra arrectione cum veterano veluti luctans, tandem obdormiscit triduum vel biduum, pelleque interea exutus ad consueta redit alimenta. Cum quater pastus, quater obdormiens, quater renovavit, spreto deinde pabulo sublime petit, & virgultis conscensis, alvo rite purgata, lanificii rudimenta inconditis primum mæandris per ramos exercet, mox folliculo inclusus pellucido, indefessi laboris fructum è centro ad circumferentiam protrudit pilum album, viride, flavum, ovali figura, cum æqualibus veluti certans, novem dierum spatio: absolutoque operi immoritur. E folliculo loco subterraneo depositus, papilio post decimum diem prodit cornutus, sed alarum alimentique immemor, brevis ævi jacturam foetificatione reparaturus, molli impositus velleri, concubitu perpetuo per triduum, rarius quatrimum scæminæ connexus, emoritur, nec multo post vidua, relicto post se instar granorum milii semine, centenario fere, mariti fata sequitur. Sed de his & aliis quæ circa bombyces occurrunt, accuratissimè egit, *Andreas Libavius*, in sua observatione, quam hic in gratiam Naturæ indagatorum appono.

Cum difficile sit singulorum auctorum sententias & experimenta ad amussim explicare, quæque illi diversis temporibus aut locis observavere, ad unam historiam revocare, proque hujus fide damnare vel astruere, quod quisque verum usu & notatione rerum deprehenderit: ubi forsàn eveniet, ut nec Plinius, nec Pausanias, nec cæteri, qui videntur secus ac à nobis cognitum est, commentati esse, repudiandi existimentur: adjiciam specialem historiam bombycum domesticorum, quam anno salutis reparatæ 1599.


Roten-

Erucarum Aldrov.

Tab. 6.



Aurelice Aldrov.



Bombyces. Seidenwürm Mouf.



B. serico exempto.



Bomb. supine sect.



Bomb. Mouf.

Papil. Erupturus

P. Erupt.

Papilio Eruptur.


Follicul. Bomb.



Follic. inclusio Papil.



B. Gravid.



Papilio Bombyc.





Rotenburghi ad Tubarim ipse ex diligenti istorum cura & attentione ad naturam, & opera consignavi, vel utique in diarium conjeci. Si quid diversi in India, Græcia, Italia, & alibi aliis temporibus, ministerio, educatione, consuetudine, & cæteris, perspectum est: quanquam natura dicatur semper agere eodem modo, nec nisi accidentibus variare: id quoque conferent, qui notaverint, ut sic ex multorum experientia naturæ historia accipiat incrementum & absolvatur.

Circa vigesimum quintum Aprilis ova bombycum in charta simplici superiore anno procreata, & per hyemem in tepidario cubiculi servata exponebam Solis radiis per fenestras orbes incidentibus. Quæ plumbea seu nigra erant non quidem omnia uno die in eruculam abibant, sed tamen ante finem ejus mensis cuncta, sub auro-ram potissimum vermibus erumpentibus, prout quisque perfectionem suam erat consecutus, relicta vacua testa seu putamine coloris albi, in latere orbiculo eroso, qua in parte extremitates nonnihil nigrescebant, propter terminum rodendo acceptum. Punicea, & cirrea, five puta, five nigro puncto discreta, nihil edebant, quod vel intacta fuerant masculo semine, vel principium in eis suffocatum. Hæ eruculæ intra ovum nanciscuntur suam speciem, & in circulum convolutæ jacent, unde exesa testa primum nigrum splendensque caput exerunt, postea tractim prorepunt osculo, & pedicellis nifu suo, & in pavementum impactione, adminiculum præbentibus. Statim tunc notavi filamenta ab osculis dependere ea-que tenuissima ut vix conspicias nisi obvertas luci. His sese librant, pendent-que à foliis, aut etiam sicubi delapsæ ex altiore loco eum repetunt, vel experienti gratia suspenduntur, multiplici flexu involvunt, atque ita sursum contendunt, more vulgarium erucarum arborum folia & flores depascuntur. Vermiculus niger est & pilosus cum albo circulo, in confinio pectoris & cranii, & alio in ea regione, qua venter contingit pectusculum, eique cohæret, qui tamen ob pilositatem non est admodum conspicuus in prima ætate. In fine dorfi, ubi est alvi exitus, pinna quædam parva prominet: Et plane cætera forma eadem est cum bombycum specie, nisi quod hirsuties & nigredo per aliquod pellis mutationes in glabritiem splendentem, albedinemque transmigrant, & ex parvula bestiola fiat vermis, medium digitum viri mediocris tribus articulis junctis longus, crassus ferè auricularem, quanquam non omnium eadem sit magnitudo.

Invenias aliquas eruculas cum caudæ plectro triplici, aut duplici, ita ut majus

furrigatur ex circulo ultimo dorfi: minora ex subjecta statim lorica caudæ. Unum vidi majus hinc inde binis stipatum minoribus, in quorum loco alias duntaxat sunt protuberantia puncta.

Progressio erucarum est ut bombycum. Nam caudæ fulcra pavimento infigunt, & postea tractim per circulos sese promoveant, sublatis primo partibus, inter caudam & pedes posteriores: postea his fixis interstitio inter pectus & pedes, donec ad pectus ipsum & pedes anteriores sit perventum, quibus hærentibus cauda vicissim tollitur & fulcitur gressus. Nam motus animalium sit aliquo quiescente & stabilimentum præbente. Natis statim præbui tenera mori folia, in quæ transtuli eas cultello levi, vel etiam sivi per se irrepere in folia, cum quibus eas cistellæ ligneæ demandavi, invadunt autem folia ab extremitatibus & planitie superius inferius. Non enim impediunt rostri appendices. Ita pascebantur ab Ultimo Aprilis, & circiter, usque ad Octavum Maji, quo animadverti primam senectam positam, quæ erat oscillum nigerrimum splendens cum exili nigra pelle. Solent autem aliquando ante quasi cunctari, & dormire somnium renovatorium, siquidem somnus est appellandus. Abjecta senecta, statim apparent grandiores, leviores, & nigredine dilutior. Nam corneum capitis tegumentum, quod subnascitur veteri, secundum proportionem majus est. Detracta pelle, etiam intumescit reliquum corpus, quasi prius incrementum prohibuerit angustia corii. Idem tegumentum seu cranium capitis, cum recens est, albicat, postea cum firmatur itidem evadit nigrum, donec plures procedant mutationes, Sicut autem ante positionem leberidis abstinere esca, ita & post aliquantulum quasi pigrescere videntur: nam tenerius est instrumentum quam ut carpere folia possit. Dum percuritant folia, non raro altera alteram transit, idque patitur ea placide nisi nimis offendatur. Tunc enim sublato pectusculo capita concutiant hinc inde motitantes, idque etiam bombyces faciunt. Semel atque iterum tunc præbentur pabulum, & angusto in loco degit multitudo. Cum satis comederunt, ad dormiendum inducuntur. Tunc videas eas instar statuarum, aut eorum qui catroche laborant, pectusculis sublatis cum osculo in foliis quasi obriguissæ. Sed si pabulum novum injeceris, statim excitantur & comedunt rursus. Olfactu videntur folia deprehendere nova. Nam etiam nondum tangentia erectione corporis affectant. Fieri tamen idem etiam alteratione quadam qualitatis tactilis putes. Excrementum alvi tunc exile est, & nigrum instar pulveris

pyrij. Decimo sexto Maji aliquæ secundo mutarunt pellem, aliquæ quieverunt, & sequentibus diebus exuerunt membranas. Rumpuntur eæ in capitis confinio hærentesque foliis manent, eruculis per circulos ordine motos sese expedientibus, oscillum etiam non statim cadit, sed pender aliquanto spacio ab ore novo.

Tunc color niger in gryseum mutatur, & erucæ grandescunt magis. Pectus tamen album conspicitur, plenumque succi adeo, ut pellucere credas. Quoniam autem non uno die omnes mutant corium, si placet, potes pares ab imparibus segregare. Sed ego una reliqui, tantumque recentibus suppeditavi novam escam, cæteris in veteramentis adhuc conviventibus, & metamorphosin exspectantibus. Non enim tunc potes stabulum expurgare, sed differendum negotium est, donec evigilarint, & possint in folia pellici nova. Tertia mutatio incepit 22. Maji, quo dormierunt multæ, aliquæ etiam pellem devolverunt. Ea non amplius tam nigra erat, sed albedinem præ se ferebat cum oscillo, ipsique vermes exibant candidiores, relicta senecta, corrugata magis quidem ea, quæ non adhærebat foliis per filamenta, minus autem ea quæ affixa erat. Nam hæc in longum porrigebatur trianguli specie; ratione altitudinis. Etenim deorsum acutum surgit è medio, quod quidem ego fieri puto per caudæ apicem ea traductum & elevantem corium. Extremitas posterior hujus leberidis est instar caudæ piscium bifidæ. Pascebantur erucæ liberatæ rursus usque ad 25. quo somnum renovantem animadverti, & aliquas etiam eodem die novas: sed 26. dormiebant plures; aliquæ etiam 27. paucæ 28. & 29. ita ut jam majus esset discrimen. Quæ tamen dormiebant 27. eæ sequente mutabantur, & ad pabulum post cunctationem aliquam redibant.

Hac quarta mutatione ex erucis facti sunt bombyces glabri & albi, cum maculis tamen plumbeis, & oscillo albi cornu instar. Hic est mensis primus vitæ, & prima ætas. Sed cum in tertia & quarta renovatione cuticulæ omnia sint notatu facilia, pateantque liquidius, uti observavi, accuratius paulo describam. Erucæ tertiæ & quartæ mutationi vicinæ, pellem habent subsquallidam aspectu, & rigidiorum quam vermis incrementum ferat. Itaque subrus nascente cuticula molli abscedit paulatim, & quia cohærent nerveis quibusdam vinculis in utroque latere, quæ sunt punctorum vestigia, hæcque non facile distrahuntur, major nifus est in exeundo, & quies fere biduana.

Cum itaque foras contendunt, verus oscillum corneum separatur à subnato novo, vermis ipse, siquidem affixa folio le-

beris est, pedes & crurcula convellit, modo contrahens modo remittens, donec ex ocreis vetustis eos extraxerit. Interim & cutis laterum corrugatur, corpore per squamas diviso in se contracto iterumque extenso. Sic toto corpore laxantur exuviae. Mox in antèrè sese promovet vermis, & lateralia vincula paulatim ducit, promotis ordine squamis iterumque reconditis ut fere initio dubites *nebor* an *enior* exiturus sit vermis. Sed tamen isto modo vincula abrumpuntur. Primum juxta pectoris confinia observatur promotio. Ibi enim puncta secedunt, & duo in verme, duo in leberide apparent. Dum porro squamæ trahuntur, quasi linea violacea existit in latere utroque senectæ, tum ob puncta, tum vincula intus applicata lateribus. Interim cauda rugatur, pedes exinaniuntur, prorèpitque octava horæ parte vermis novus, vetus oscillum ori præfixum habens, ut mulus capistrum. Videas in extremitate caudæ etiam chordam albam trahi, qua pellis dorso cohæsit. Facilius enituntur effixi, solutis verò miris modis sese convolvunt in dorsum, latera, ventrem, donec tandem expediantur. Et horum leberis in globum fere coacta est, illorum vero extenta. Si duo extrema unguibus prehendas, & diducas, justam longitudinem recuperes, cum vestigiis pedum omnium & squamarum. Nihil enim deest præter oscillum. Longe autem candidior quartæ mutationis cutis est quam tertiæ, ut & cranium. Vermes ipsi jam bombyces sunt, modo recte & sedulo sint curati & nutriti, pingues candidique, quamquam alii aliis minus, adeo ut videantur nonnulli subflavi esse, alii ad plumbeum nonnihil accedere. Pedes & ora initio sunt mollia. Itaque & tactu foliorum & comestualiquantulum abstinent, hærent eis pertinaciter, & caudæ quidem adminiculo possunt retrahi & explicari, pedes autem posteriores obtusiores, crassioresque tribus quasi articulis constantes in medio nigrum punctum habent, quem ego puto esse prehensionis instrumentum, quod queat pro arbitrio, ut unguis felium, promi & recondi. Anteriores non tantum gradiendo inserviunt, sed & prensando folia, trajiciendo corpus, distribuendo fila & aliis usibus. partes secundum longitudinem à capite ad caudam in dorso sunt caput, gibbus seu tuber pectoris rugosum, octo semicirculares squamæ & tripartita cauda. Tuber pectoris in capitis confinio aliquibus albet, aliquibus distinctum est maculis duabus lividis, quas dividit linea flava, quæque diversis diversimode sese habent. Nam color aliis remissus, dilutusque & fere eyanidus est, aliis intensior. Quæ verò sese attollit ille gibbus, quatuor nodi conspiciuntur, quibus ass-

Itellus cutis rugosa efficitur. Sequuntur semicirculi; Hijunguntur membrana tenuissima tanquam linea viridante ex coeruleo. Ipsæ vero squamæ albescent, quamquam in nonnullis aliquid plumbei subluceat: & cum jam maturi sunt bombyces serificio, spicei evadunt. Singulæ etiam in utroque latere insigniuntur puncto, quem ambit circulus parvus. Dixi ibi vincula esse, id quod etiam apparet in chrysalide. Deinde squama octava, aut duobus punctis lividis distincta est, aut semicirculis lunatis, quasi duas lunulas se mutuo respicientes cornibus inscripisse. Veruntamen non sunt pares in omnibus. Nam alicubi magis sunt conspicui, alicubi evanidi, subtiliores, tenuiores, magis plumbei, magis albescentes, &c. Hinc bini circuli leves post quos qui sequitur duos nodos habet, usque ad eum qui podici imminet, & apicem seu cuspidem surrigit. In majoribus observantur protuberantiæ in squamis singulis, sed tamen hæ sunt eminentiores in tertiis. Cranium ipsum corneum quidem est, sed divisum quasi in tres partes, dexteram scilicet & sinistram, quas putas oculorum notas esse, & deinde oris compagem, quæ iterum in appendices & maxillas suas, in quibus serratæ dentium figuræ distinguuntur. Per totam dorso longitudinem gula protenditur, usque ad fulcra caudæ, super quibus inter ultimam squamam est exitus alvi. Conspiciuntur etiam in dorso usque ad plectrum caudæ; quidam nervi continua diastole & systole mobiles, quo pacto moveri cor & arteriæ solent. Et hi nervi ex albedine flavescent, cumque distrahantur, viridem gulam, seu intestinum detegunt. Cohærent plectro, tanquam ibi esset respirationis quidam exitus, quamquam non respirent. Sed vitæ sedem ibi esse non est dubium, licet deprehenderim in nymphis partem quandam rubeam, ut infra docebo, palpitantem per se solam instar cordis. Cum refecatur istud plectrum, exit humor liquidus subflavus, & vermes ipsi non quidem moriuntur, sed tamen moventur vehementius, seseque convolvunt, & reflectunt, ut iudices dolorem exoriri acerbum, nerveo principio læso. Stercora cibum referunt, suntque sicca, sexangula, oblonga, quasi stellata, unde intestini vel alvi dispositionem quis colligere possit. Virent quidem ex esca, sed tamen quia stipantur dense, & exucca sunt, nigra apparent, sicut plus viridescunt humidiora. Fœminas à maribus distinguere hic jam queas si attentus sis. Evenit enim & in his, quod de aliis fœminis scripsit Philosophus, ut scilicet sint majores, & pinguioribus, humidiores, mollioribus, condidioreque maribus, qui austeriores, maculis lividioreque, tenuioreque. Si digitis atrectes, omnes frigere animadvertas; Sape se erigere so-

lent in pedes posteriores, & tanquam statui sic manere. Cum vesci volunt, foliorum margines, & venas protuberantes invadunt, contra ac erucæ. Puto obstare appendices oris, præstat tamen aliquid adjumenti pedum anteriorum in tenendo cibum officium. Exedunt autem folia circulariter, seu in orbem, ut lacuna maneat rotundi ambitus: Passi secedunt, & conjuncti multi quasi cumulo quiescent, delectari puto mutua calefactione & tepore: ut dormientes à mutaturis pellem discernas, observanda erit nervorum in dorso systole & diastole. Nam in dormientibus par est vigilantibus motio, at in exuvias posituris tardior obscuriorque, ut intelligas tunc potius ægrotare. Deinde dormientes os habent simplex, sed senectam abjecturæ præferunt ossillum. Verum hoc non in bombycibus sed erucis adhuc locum habet, quidam jam quater renovati circa caput poluuntur fuscitudine, & tamen pergunt vescendo. Quidam non proficiunt admodum incremento, sed parvi manent.

Dictum superius est à Maji 25. quartam mutationem in pelle usque ad 29. ejusdem in diversis factam esse. Ab hoc itaque tempore usque ad Septimum Junii, & deinceps per octavum, nonum, decimum, undecimum, studiosè affectantur pastum, itaque pingues & grandes evaserunt, suisque ter die, & ultimis diebus quater, vel sæpius præbendus cibis. Nam cum serificio & maturitati sunt vicini, vorant contentius, invadentes folia cupidissime atque & nervos absumentes. Notabis autem circiter tredecim dierum spacium intercessisse inter renovationem quartam, & à cibo abstinentiam seu serificii meditationem. Respondent enim sibi tempora à 25. Maji ad 7. Junii, à 26. ad 8. à 27. ad 9. à 28. ad 10. à 29. ad 11. quo ultimam inclusi excepto uno parvo masculo qui diutius perseveravit in pascendo. Jam circa ultimos dies plerique incipiunt, spicem colorem adipisci, qui à posteriore parte incipit evidentius apparere, hincque ad gibbum pectoris ampliari & progredi, quamquam aliqui magis & fere toti flavescent, aliqui albi misto extulco manent. Cum fata instant secedunt ad latera capsulæ, nec adoriuntur folia ore, quamquam perreptent. Nonnulli ad angulos fila figunt, quasi jam exorsuri vestibulum: alii repunt per extremitates, & hinc inde speculantur, inquiruntque aptum latitandi locum. Inclusi plerisque cycullis chartaceis, quos alicubi commode disposui & affixi, in quibus rodendo, vellicandoque parietes aliquantum strepunt, sed postea alvi sicco & humido excremento (nam tunc duplex emittunt) projecto ex posterioribus parietibus chartæ affigunt ea tenacitate, ut glutine firmatam putes. Postea triduo continuo, occupati follicu-

lum pertextunt, quo absoluto, quintam ponunt pellem cum capite & cauda; transformanturque in nympham; Aliquos non inclusi chartis, sed in capsula lignea dispositis ramusculis sibi sibi locum nidi eligere, ubi observes potissimum sequi angulos, & latebras, & plerumque multi eodem in loco bombycia faciunt, si fieri id possit, alii statuantes ea in rectum, alii in obliquum, alii in latum. Si locus est angustior, comprimitur à latere folliculus, nec plane ovalem tumorem retinet; est alius alio longior, amplior, densior, pro magnitudine & firmitate bombycis. Discrepant etiam colore. Sunt enim aurei, argentei, citrini, & hi duplices. Quidam enim virorem referunt, quidam plus ad citrinum declinant, quamquam hi omnes ab aliis soleant virides appellari. Omnium prodromus, quantum ego observavi, albet, præter paucos, qui stupam subcitrinam præmittunt. Aurei aliqui etiam internam tunicam habent albam, nec est stabilis color citrinus. Nam cum explicantur ex aqua folliculi candidum fit filum, in lixivio flavescit, &c. Sed operæ pretium est, contemplari serici materiam, & quid sit id, quod tanta longitudine continuum præbet filum.

Cum itaque grandem vermem vagabundum conspicerem, funiculum collo injeci, & ad sectionem protraxi. Vixit pertinaciter etiam coarctata gula, exquisite sensit. Nam ad singulas incisiones dorfi, etiam vix applicato cultello, violenter se covolvit, quasi ore & anterioribus pedibus sibi opem laturus. Divisa cute conspexi longum intestinum, quale est lupi piscis, anteriore parte tumidum & capax, posteriore arctius. Ei intestino nervi seu arteriæ pulsátiles cum continua systole & diastole incumbabant, & definebant in plectro caudæ. Hoc reciso, non tantum humor flavus perspicuus erumpebat, sed & capita nervorum; in motu inde sese exerebant, & agitatio fiebat languidior. Habebat autem intestinum duplicem tunicam, unam externam crassam, alteram internam tenuissimam. Crassa sentit accurate, estque juxta gulam visciditate multa obductum, quæ postea fit materia alarum, & pilositatis in necydalo, sicut humiditas excrementitia externa in aureliæ putamen cogitur. Crassa tunica pertusa, exit intestinum, adhuc involutum tenui, & multum cibi hefterni è foliis viridibus continet. Videre verò etiam est ex pelle secta, & crassa tunica intestini effundi liquorum sat copiosum & transparentem, quem ego puto pro sanguine esse, & mutari coctione in serici materiam, membræque bestiolæ. Capite præfecto extumescit initium gulæ, & plane exhibet obtusum nymphae caput. Exempto intestino cum contentis fecibus in abdomine con-

spiciuntur specie lumbricorum concrementis quædam lentæ & glutinosæ, aliæ flavæ, aliæ albæ, & duæ quidem magnæ cæteræ parvæ, tam similes lumbricis ut nihil desit, nisi pellis & vita. Utrinque desinunt in acumen acutum. Situm autem in ventre talem habent, ut uterque apex versus sit ad caudam, corpus verò reductum & geminatum. Dicas pensum esse complicatum. Si exordium filationis est ab apicibus, necesse est, ut ad os à cauda revocentur. Existimo parvas & albentes portiones imbecillius sericum stupamque præbere, magnas verò firmitus. Exemi hos lumbricos, vidique in charta statim exsiccati, & fragilem duritiem induere, perinde ut bubulum gluten solet, ut tendines animalium & intestina, Homogeneum totum est, & pelucidum corpus hujus materiæ, quam nullus hominum queat in tam tenuia subtiliaque fila diducere, sed bombycibus hic labor est, ut araneis sua tela, relinquendus & solis dicandus. Corium exterius foris quidem albedinem plumbeo colore mistam habebat, sed intus subducitur cuticula partim livida, partim aurea splendente, ut in halece. Circa ventrem, ubi disponebatur materia serici, sat crassa substantia erat nerveis constans ductibus, & textura continente pinguedinem albam nerveis tunicis implicatam: talis postea etiam conspicitur in nymphis & necydalis, estque in his vulva & genitale membrum. Sub illa substantia plumbeæ sunt propagines in pedes dimissæ, tanquam tendines, aut chordæ. Pellis hæc manente matrice & genitali membro, intra bombycium exiit cum omnibus prominentibus membris: ita ut nympa & papilio inde natus nihil assument ex bombyce præter alvum cum intestino, & in his existentibus nervosis partibus. Humor autem in intestino & genitalibus subsistit sat multus. Unde postea & feminis materia, & excrementitia proluvia alvi. Veruntamen qui in intestino est humor, crudus adhuc est, & partim viret, partim flavet, crassus quadantenus, quadantenus aquosus. Si quis pinguedinem à nerveis tunicis genitalium separaret, & chartæ illinat, cum resiccata est, sebaceam friabilemque inveniet. Putes conferendam esse cum lactibus piscium. Pater ergo in bombyce foris quidem hæc membra esse, pedes triplices, squamosam ventris coarticulationem, pectus, caput, os, anum, pellem, caudam, plectrum: intus autem intestinum, vitales arterias, vel si mavis, nervos, carnem albam pectoris, genitalia, inter quæ & intestinum continetur, serici materia, & præterea panniculos membranasque nerveas, quibus continentur membra.

Cor habeant, nec ne, aliis investiget. Necesse tamen est aliquod tale principium esse

esse, idque non in capite; nec alibi præterquam in confinio pectoris, unde vis vitalis per totum distribuitur. Et maximè tamen elucet motu nervorum, vel arteriarum (uti libet appellare) in dorso ventris, non pectoris, usque ad pectus caudæ. De nymphis & necydalis posterius dicam. Nunc de praxi ferici ducendi quæ observaverim addam.

Cum abstinent pabulo, & ut dictum est, locum folliculi construendi explorant, circa alvi exitum plerumque maculam virentem aut lividam habent, cætero corpore albo, cum virore, vel livore, vel spiceo. Vidi tunc etiam crebro consistere inter vagandum, & ore veluti hircere, sicut ruminantes vaccæ, cum ex ingluvie revocant cibos ad masticandum. Consentaneum est bombyces tunc cornari materiam ferici ad os convertere & protrahere. Si includas cucullo chartaceo, rosionis sonus subinde per integrum diem auditur, & tunc in conum cuculi demittitur excrementum primo siccum, pilulæ nigræ viridis, aut luteæ forma. Penultima pilula plerumque viret, ultima lutea est & flavioïa. Numerus pilularum pro excrementi copia est. Nam deprehendi in una charta modo duas pilulas, modo plures, usque ad duodecim diversicoloris, utpote nigras, virides, flavas, easque non stellatas, sed rotundas. Cum ultima pilula lutea exit aquositas item diversicolor & consistentia dispari. Alicubi enim crassior est, alicubi dilutior, habens aliquid puniceæ & flavendinis, virisque.

Saniem tamen quandam dicas subcruentam vel fuscā, qualis apparet in charta pura, ubi tamen interdum notes etiam viriditatem pollutam flavedine, interdum quid cretaceum. In vitro lixivii faciem exhibet. Ne vero dubites, ore an alvo reddatur, scito, ore tantum expediri fericum, alvo excrementa, quamquam etiam ex ore emittant humorem tum morbidi, tum strangulati aut compressi. Deprehendi autem bombycem liberum è posterioribus utrumque excrementum reddentem. Ab aliquibus multus liquor excernitur, à nonnullis paucus. Qui multum vacuantur, videntur debiliores esse, & minus ferici collegisse. Nam plerique parva bombycia texunt, non tamen omnes. Quali fericum sit futurum colore, ambiguum est. Nam contemplatione capitis, tergi, ventris, pedum facta, plerumque sum deceptus divinando. Nam non ejusdem coloris fericum ab omnibus ducitur, sæpeque stupa & postrema tunica albet, medium fericum aureum est. Putabam spiceos bombyces flavum, albos album reddi-turos, sed falso.

Nam album ab utrisque promebatur. Semel atque iterum scopum attingi, & vati-

cinatus sum, citrinam foeminam tale edituram filum; quale tamen etiam tractum est ab illo bombyce, cujus venter albo plumbeus erat, macula frontis flava. Vidi & foemellam totam albam, album fericum fingere. In parvis angustisque chartis, juxta proportionem tamen vermis, minores fiunt folliculi, sed spissiores & minus stupæ. Notavi tamen in amplioribus etiam parvos folliculos. Qui non inclusi libere sibi locum eligunt, in stupa temeraria multum absumunt filorum. Unde jactura est in ferico. Nam bombycia plerumque sunt minora, & minus dense stipata. Si velis attendere, rationem texturæ accurate cognoscere in his potes. Etenim postquam aliquamdiu vagati sunt, & modo hic, modo ibi exordium operis facere tentaverunt (id quod sedulo corporis nisi præstant, dum hærentes pedibus posterioribus, caput & totum pectus sursum, deorsum ante retro, & ad latera, varie movent, sicubi sese offerat commodus bombycii affigendi locus, nec visu, sed tactu hoc peragunt: sunt enim hebetes oculis) tandem stamina producunt, & firmamenta domus, eaque simplicia aut multiplicia, prout stabilimentum requiritur firmum. Si juxta pavementum id sit, posteriore parte inhaerent huic, sin in alto, pendent eadem, seu à ramis, seu aliunde. Nam pectus & caput liberè vertunt, sique opus est, etiam posteriorum situm mutant. Ita conficitur vestibulum seu prodromus. Jam autem sicca excrementa ab alvo sunt reddita, vestibulo absoluto, ita ut jam vermis securus sit, tutusque ab insidiis externis: stercus ultimum excernit cum liquore, de quo ante.

Et hoc sæpe polluitur stupa, per quam tamen defluit, ad fundum. Exonerata alvo, parumper quiescit textor, & nudat podicem quasi laboraret tenasmo. Tunc revocat veri ferici materiam, eamque continuat usque ad extremum halitum, & bombycii absolutionem. Paulatim tunc stipat fila ex amplo, in angustum, ita ut fiat forma ovalis, in cujus capacitate sese possit vertere. Os, pectus, & anteriores pedes in continuo sunt motu. Posteriora hærent, transferuntur tamen ad aliam plagam, cum ad basin vel apicem formandum sese accommodant. Qui in imo juxta pavementum folliculos texunt, videntur insidere pavimento nudo, sed paulatim sibi subtexunt fila, & universum folliculum pariter ubivis stipant, præterquam in acumine, ad quod in angustius non possunt perungere. Itaque hujus fabrica magis ab initio fingitur, sed basis magis in fine, quamquam nec hæc negligatur in exordio.

Itaque cum fila explicantur retexendo, apex nudatur primum, & relinquatur in-

terna tunica forma digitalis tegumenti. Texunt ita ad diem tertiam: Et adhuc potes laborantes videre secundo, si folliculum soli vel luci obvertas. In cucullis chartaceis basis sursum versa est, apex deorsum: Et rarior illa apparet binis diebus. Tertio demum densatur: & tunc vermis exiit senectam, fitque nympa, id quod facile potest deprehendi, Nam cum adhuc texunt, adhærent, nec percipitur lapsus brutus. Cum vero nympa evasit, quasi lapillus inclusus esset, moto folliculo, nympa cadit: Et hic brutus casus durat, usque dum in necydatum mutata fuerit.

Tunc enim expletur capacitas iterum, & necydaus hæret folliculo exitum quærens. Unus autem vermis, sub mea cura unum folliculum texuit, cujus prodromus in inclusis chartæ, solida tunica est, in liberis variis modis ultro citroque dispositis & diductis constat filis. Alii vero animadverterunt in uno folliculo etiam duos quin & tres inclusos fuisse. Verum tamen cum angustior futurus esset locus, sectus illi folliculus communis tribus est, & in eo inventi bombyces coarctati, adeo ut speciem trium digitorum conjunctorum retulerint. Liberati postea singuli aliquid pensî, parum tamen denuo edidere.

Notandum est, animadversum esse, quosdam bombyces, in charta nullum sericum fecisse, sed statim in nymphas abiisse: quod illis evenire crediderim, qui lactuca pascuntur, licet non omnibus, aut quibus pabulum minus justò datum est, aut qui morbo correpti non potuerunt colligere serici materiam, quam sicut adëps, ex sanguine abundante sepositus, fieri existimo.

Eveniunt & alia monstra, de quibus suo loco.

Omnium folliculorum oblonga quidem & ovalis est forma. Vidi tamen unum album, ferè exactæ rotunditatis, ita ut utrinque basin haberet sphericam absque acumine. Erat parvus cum suo prodromo, sed tamen spissitudinis justæ. Verum bombyx in eo non abiit in nympham, nec necydatum absolutum, ut mox exponam.

Illud videtur dubium esse, num sericum ex alvi exitu promant, an ex ore, quanquam semper ore & anterioribus pedibus distribuunt. Non leve argumentum est, quod juxta caudæ fulcra in imo ventre conspiciatur quoddam rimæ vestigium, & extremitas utraque materiæ sericiæ in ventre respiciat illum locum. Adstipulatur & egestio excrementorum in ipso operis initio.

Sicut enim cum infantem inclusura est puerpera, quidquid sordium est in vesica & recto intestino, id compressum expellitur, ita in bombyce, à serico foras centenden-

te fieri quis existimare possit. Ita instante labore venter tumentior apparet; à ventre incipit maturitas flavitie designata. Ea exit primum, ubi prius maturuit. Erucæ & bombyces insuper lanugine quadam filosa, circa pedes junguntur pavimento. Nonnulli inter texendum conspiciuntur à dorso initi, ut è ventre sericum extrahatur, & digeratur ore, pedibusque facilius. Hæc poterant afferri, pro prima sententia. Sed hanc falsitatis redarguunt alia firmiora. Nam ipse oculorum obtutus contestatur, quiescente ventre filamenta ore deduci, eaque viscositate sua adhærentia retracto collo, paulatim protrahi. Itaque non tantum in dorsum reclinati bombyces sic filum trahunt, sed & prostrati in ventrem, ubi tamen vermis totus libere sese vertit. Deinde nec ano, nec rima sub cauda exire potest. Nam ex serici loco ad intestinum nulla est via. Et rima caudæ, quæ designat genitalia futuri necydali, obducta est pelle. Insuper, antequam sericum exeat, crebro ganniant bombyces, quasi vomituriendo pellicerent ad fauces materiam. Nec intumescunt circa caudam, sed in medio ventris. In capsula etiam chartacea, cum nullum in pedibus appareret filum, solo ore vidi promoveri & affigi, quin secundo Junii, cum attente spectarem sibi machinantem bombycium, principium fili prehensum ex vermis ore, madens extraxi in justam prolixitatem, pedibus & ventre plane à serico nudis. Ita erucæ ab ore suspenduntur, inde emissò filamentò. Nec aliter aranei & campe arborum sua faciunt vellera. Et hæc quidem de hac quaestione.

Cum folliculus est absolutus, mutato bombyce in nympham, rapiuntur vellera, selectis prius ad instaurationem generis, maribus & foemellis ad arbitrium. Sexus discrimen aliqui ex colore bombyciorum dignoscere jubent, aliqui ex magnitudine: Et sane aliquid est in hac re argumenti. Nam quia foeminæ plerumque majores, etiam majus struunt domicilium: Veruntamen aliquando fallimur, quia feri potest ut mas firmus, majorem architectatur folliculum, quam foemina debilis. Et vidi pares quantitate, vidi etiam foeminarum alibi enutritarum bombycia longe minora meis masculis. Itaque concurrere signa ipsius bombycibus notata oportet, de quibus supra. Cæteri folliculi in aquam ferventem injiciuntur, nymphæ intereant, vel suffocentur calore clybani, post exemptum panem, adhibita cautela ne comburantur. Tunc stupa detracta, famulæ, vel socii laboris præsto sunt, qui exordia florum expediant, quibus inventis injiciuntur plures in pelvim aquæ frigida, aut tepida, assidensque ministra instrumentotratatorio continuo devolvit filâ, triginta vel qua-

quadraginta aut etiam plura simul juncta. Si qua rumpitur stamem, focii est, requirere principium & reddere explicanti, id continuatur, donec usque ad interiorem tunicam perventum fuerit, quæ cum difficillime retexatur, exiccata discerpitur in stupam & carminatur.

Dum ita replicantur fila, pulverem multum in aërem emittunt, & cernere etiam in fundo vasis est quasdam sordes è staminibus prolapsas. Sedulo attentabam num una opera possem absque ruptura totum expedire folliculum abstracta stupa, quæ ob variam implicationem, infirmitatem & diversa principia non potest continuo ductu retexi. Affecutus sum votum tantum in medio serico, nam prodromo quod proximum est, etiam rumpi facile. Sed medium tenacius est. Ultima tunica ponderaddito (nam tunc nymphea prolabitur) explicata à me est cautissime usque ad pelliculam parcam, quæ vix unguem pollicis adæquabat. Qui folliculi basi ad diametrum respondent apici, felicius evolvuntur: Difficilius incurvati & gibbosi, & quorum apex strictionem habet. Nam hic filum hæret & implicatur, ut vix citra rupturam metum cedat. Apex primum nudatur & devolvitur totus usque ad medium folliculi.

Unius bombycii filum continuum lineæ præscriptæ longitudinem septies millies, in alio octies implevit & amplius. Non tamen par est omnium densitas, & magnitudo, id quod etiam ex distractione in cuticulas videre est. Quædam enim vellera diduxi in duodecim quædam in octo plus minus exiles tunicas. Sylvestris bombyx prodromum habet simplicem tunicam & paulo crassiorem folliculum. Itaque etiam tenuiores facile cedunt prementibus digitis, densiores resistunt.

Cum fatiscit apex fere usque ad medium, unde fat amplum est foramen elapsuræ nympheæ, procidit cum senecta ultima, in qua caput & pedes omnes. Pleurumque hujus senectæ caput apici folliculi obversum est, ut intelligamus eam exutam esse, dum vermis consummato folliculo per angustias sese stringit, vertitque sursum.

Nympheæ vertex respicit basin, caudæ apicem: eumque bombyx plus quam duplo longior fuerit, nymphea ad parvam staturam contrahitur, ut vix impleat longitudinem internodii secundi in digito medio viri. Vivit illa vitæque indicia evidenter exhibet, motu reflexuque apicis seu caudæ cum tangitur. Si formam externam respicias, squamosum vermem dicas, ut qui caput velamento occultaverit. Squamæ sunt fusæ, tanquam fumo inquinatæ, octo numero usque ad confinia verticis. In singularum lateribus, bina sunt puncta umbilicalia, ex quibustendines, seu vin-

cula ad necydalum pertingunt. In vertice est macula alba quasi ibi os necydali transluceret cum punctis tribus parvis nigris. Inde à parte anteriore typipedum & cornuum sunt, à posteriore versus latera vestigia alarum. Si interiora quoque contemplari libet, quarto die ab occultatione, antequam transeat in necydalum, aperire potes. Videbis nihil aliud, quam capacitatem unam communem, inque hac tres distinctos humores, unum aquosæ dilutæque consistentiæ, coloris flavi. Hic per totum spacium æqualiter diffunditur. Alius rubet, sanguinolentum dicas: Hæret hic in parte superiori, qua futurum caput, & pectus est. Cordis rudimentum esse judices, quia postea in necydalo vidi talem quandam massam per se mobilem more cordis, si modo cor huic bestię est attribuendum. Tertius humor est albo-luteus, refertque ovum gallinaceum in aquam ferventem injectum discussumque vel lac caseatum, si quid lutei addas. Ubi foris alarum pedumque cernuntur vestigia, latitat phlegmatica visciditas apta constituendis membranis.

Nulla videas membra distincta, vitam beneficio nerveæ tunicæ proximè externo cortici subjectæ inesse puto. Nam & bombyx ea parte exquisitum exhibebat sensum, motumque arterialem & cordis; planè utriculorum humoribus confertum appelles: qui tamen collatus ad chrysalidem, postquam erepsit necydalus, longe est crassior, ut corticem dicas tunicis intus & visciditate tenace vestitum. Inde postea est lanugo necydali, alæ, pedes, cutis, & cætera interna. Ita in gulam ventremque abiit bombyx, cuius unius cura antea fuerat detentus, nihil tamen hic viroris apparet, qui multus erat in bombycis jam texturi instans.

Pars itaque excreta est ante folliculi exordium, pars mutata in alium succum. In apice caudæ etiam erat quiddam viscidum instar crudi albuminis. Rudimentum partium genitalium judicabam. Nam eo rejecta est matrix, & vasa spermatica, quorum principium conspicietur, etiam in bombycis ventre. Humores in charta pura excepti & arefacti nigredine infecti erant, quasi atramentum furoris miscuisses. Sebacea tamen substantia albescebat adhuc, & alicubi enitebat macula subrubens, & crocens, cum albo puncto, cretaceæ consistentiæ: Itaque colligere erat nigrorem illum dumtaxat aquosi flavique humoris fuisse, quod etiam solus in charta, ubi densior concreverat, splendebat, ut nitens atramentum. Cæteras nympheas partim spoliatas omnium serico nudasque, partim simplici tunica adhuc inclusas, partim in toto bombycio salvas, nulla alia tractavi cura, nisi quod in ca-

psula positas in fenestrâ limine dimitterem. Destinixeram tamen loculamentis diversis, quas foeminas, & quos mares putaveram, nec me fefellit iudicium, excepto uno tantum. Ita à prima inclusione, usque ad exclusionem processerunt dies viginti sex aut septem, in musæo meo exposito Soli promeridiano, tempore æstuoso Junii, quale erat anno nonagesimo nono. Nam undecimo Junii sepulta foemina, exiit necydalus octavo Julii. Qui mas nono Junii texere inceperat, quinto Julii evasit papilio.

Eodem duæ feminæ exhibant in folliculis albis majusculis, & unus mas ex citrino minore. Sexto Julii sub auroram (nam omnes mane prodeant) mas fuscus hirtusque ex mediocri alboque bombycio enisus est; foemina vero alba teneraque ventricosa, cum magnis alis: ex folliculo citrino subviridi. Ita & ante, secundo Julii ex aureo folliculo mas prorepebat, & foemina ex albo. Hi decimo Junii inchoaverant bombycium. Cum ex integris folliculis erupturi sunt necydali, non amplius movendo sentitur brutum pondus, & tunc frangitur, circa dorsum thoracis aurelia, postea multus humor limpidus, albusque, ore effunditur, & permadescit locus, qua sunt foramen facturi. Per hunc foras annisu quodam & labore contendunt. Vidi octavo Julii foeminam exeuntem. Ea tantum liquoris præmittebat, ut in capsulam decideret notabilis gutta. Tunc capite emicabat intus nixa pedibus. Post caput paulatim hos exerebat, statimque comprehenso pavimento sese fulciens, circulos alvi conando sensim protrahabat, ut primo extracto, cum vellet secundum proripere, sese contraheret tota parte anteriore, quasi sic prehensum circum sequentem una evocaret. Veruntamen consentaneum est ista contractione dilatatum esse magis foramen: ut postea alvus minore cum labore prodiret.

Huc facit etiam varia ad latera conversio. Interim crassiores necydali, & plus humoris in ventre habentes, exprimunt aliquid inter eluctandum, & folliculum pertusum, tum intus, tum circa foramen foedant alvi spurcitie marmorosa. Qui minus laborant & tenuiores sunt, purum relinquunt. Videas tunc caniciem totam non nihil madentem à liquore ex ore effuso ad pertusionem facilem.

Solent etiam alicubi quiescere, & sæpius ventrem inflare, diducere, atque iterum contrahere, quasi luxata membra reponerent, & ad legitimum situm revocarent, Adeo autem diducuntque laxantque circulos, ut junctura emineant impletæ citreo liquore, quasi inflatæ essent. Nymphas nudatas, cum intus absolutus papilio est, triduo, vel biduo ante, sese videas crebro movere, quasi rupturas vincula, qui-

bus alligatur aureliæ necydalus. Earum unam tunc cultello, unguibusque aperui ipse ut viderem congruentiam extremorum lineamentorum cum suppositis membris. Id fiebat quarto Julii, cum jam circiter dies viginti à serificio præterissent. Remota squama prima, juxta principium pectusculi in tergo prodibat; in conspectum circulus superior ventris tener, cutaneus, hirsutiae humente tectus, brevi tamen & complanata ut vix pateret oculis lanugo. Sub dispositione alarum lateralium, quam in aurelia compares omoplatis, veræ alæ necydali latitabant binæ junctæ, & altera alteri imposita.

Omnes erant breves, tenuesque, utpote nondum perfectæ quantitate. Inter alas thoracis posterior nodus eminebat, prolixiore pilositate utrinque stipatus, sed nondum plane tectus.

Alis & rubore hoc expedito, perveniebam ad deorsum flexas lineas superiores, sub his erant cornua: sub sequentibus vero in pectore pedes recumbebant, oblique versus alvum compositi & directi. Sub alba macula in nymphæ vertice, necydali hirsutus vertex & pregma est, cui proxime adjacet aculeorum typus forma duorum punctorum atrorum. Hinc sequitur nota oris satis extans initio propter humiditatem, & speciem habet spongiosorum punctorum alborum duorum, quæ tanquam in Leonino labio fissura dividuntur: Alvus tota est instar fuci albi.

Pili in ea opprimuntur humiditate, & lævigati apparent. Constant circulis, ut & bombyx & nympa. Non autem expediebam totum necydalum, sed ipse seipsum suo nisu protrahabat ex reliqua aurelia. Videbam quo conatu sese absolveret à vinculis alvi, quæ instar albarum chordarum è punctis circulorum dependent, & in aurelia vacua relinquuntur. Hæret & podex arctius. Itaque apex aureliæ contrahitur versus pectus introrsum. Erat autem mas cum alis & villis imperfectis. Eum reliqui in capsula. Quievit usque ad diem sequentem. Tunc paulatim inaluit, & hirsuties conspecta est exactius. Alæ quoque creverunt, & tunc alacrior paulatim factus, admissusque tertio die concubitus peregit strenue.

Necydalorum quæ species sit, tum ex dictis patet, tum superius satis est expositum: Illud addendum est, quod alvus in aurelia contractior sit, & foris distentione inflationeque crebra tertia parte fiat longior, & major. In aurelia est rupturâ trifida à vertice per dorsum thoracis. Et ibi prodit necydalus. Cæteræ partes sunt integræ.

Omnibus jam necydalis natis reliquis ante decimum quartum Julii, duo folliculi integri remanserunt, quasi nihil reddituri, licet densi admodum essent. Unus masculus sphaericus parvus, alter foemineus

aeus duplo longior & satis amplius, paululum circa dorsum vermis in gibbum elatus, uterque albæ stupæ, sed serici subviridis in citrio; quanquam dilutior esset color in illo. Cum sphaericum cultri acie dividerem, cadaver in conspectum prodibat semibombyx, & seminymphea foris. Nam anterior pars planè bombyx erat, posterior nymphea, liquidem non totam exuerat pellem, sed tantum ejus posteriorem portionem, quæ juxta aderat in folliculo.

Dispositio cadaveris; erat incurva, ita ut priores pedes in pectore fere tangerent posteriorum par primum. Hic enim inter primam posteriorum syzygiam & secundam ruptum erat corium, ita ut nymphea esset galeata pristinis exuviis, in quibus caput pectusque cum sex pedibus, & portio ventris cum primoribus duobus. Remota pelle, & aurelia, intus absolutus stabulabatur necydalus mas, isque vixerat, argumento, quod dum conaretur exire biduo antequam secarem, folliculum liquore perfudisset; imo & jam 19. Julii cum liberarem penitus, motus indicia in ventre & pedibus luculenta præbuit: Causa cur non potuerit, sese exuere & prodire, deprehensa est in cranii bombycis pertinace cohaesione, ut & in pedum anteriorum, lorica firmiter connata.

Itaque licet in dorso thoracis rimam tam in aurelia quam senectæ fecisset, tamen extrahere caput & pedes non potuit. Sic ergo paulatim elanguit. Animadverti hic naturæ ingenium. Nam cum in exuenda senectæ exarmentur priores pedes, & posteriores etiam plane secedant; tamen ibi relinquit vestigia, sub quibus postea renascuntur alii. In veterum autem bombycis loculamenta, alarum binnæ insertæ erant, totumque necydali caput cum cornibus cranii galea includebatur. Talis mas erat. Foemina omni vita casta adhuc monstrosior apparebat. Perfecto opere sericii (quod erat bombycium majus, & duorum articulorum articularis digiti longitudinem adæquans, sed longe tenuius masculo; intus album & leve splendensque, foris subcitream villorum) exuere pellem bombyx conatus erat, indeque protraxerat totum dorsum, quod valde protuberabat, anterioribus in circulum contractis; sed ab oscillo se liberare ob pertinacem symphysin non potuerat. Itaque ibi senectæ caput, nympheæ vertex, & necydali conjuncta conspiciebantur; quæ conjunctio retinebat senectam in ventre, ne potuerit penitus avelli, & destrincti. Ideo & cohaerebat, cum alvi acumine, non aliter ac si quis sacco fuisset inclusus; & circa caput astrictus; facto vero in tergo foramine dorsum extraxisset quidem, sed adhuc hæreret capite, & podice, ita ja-

cens incurvus & exanimis. Sic se habebat senectæ. Ex hac prominebat & aurelia, quod attinet partem superiorem. Ex aurelia vicissim necydalus fere totus eluctatus erat, fracto putamine in dorso, solutaque regione; sed capita cohaerebant indivulsa, sicut & alvi extrema.

In ventre exorto magna copia ovorum conspiciebatur colore flavo. Nam foemina statim etiam intra aureliam ovorum formam in sua matrice absolvit, sed quæ sine maris aspergine sint infœcunda. Itaque etiam vidi ova parturientem eam, quæ nullum marem fuerat passa. Conspicuum hinc fuit, quomodo natura exuat primum veterem bombycis pellem cum forma; postea transeat in nympheam, cujus aurelia vicissim exuta prodeat necydalus. Triforme hoc monstrum erat dignumque contemplatu. In eo notasses etiam aureliam ea parte, quæ alæ erant designatæ, nigram fuscamque, quasi afflata fumo fervente fuisset: deinde quantopere conata fuerit foemina necydalus exire, perspicuum erat ex ovis eminentibus ex interstitio circulorum squamosorum.

Cohærent aliis ventris circuli interveniente cuticula tenui, contigue. Sed in hoc adeo erant circuli disjuncti, ut Zona juncturæ latior esset circulo. Apex alvi, senectæ, & aureliæ, ad lucem transparentabant, ita ut cernere exacte posses confinia. Ad dimidiam verò aureliæ capacitatem pertingebat extremitas necydali circa dorsum hirsuti, licet imperfectè, quem admodum & alæ nondum affecutæ legitimum incrementum. Et hæcenus de monstris.

Necydalo vegeto tenax vita est, præsertim in pectusculo. Nam & capite & alvo abscissis, alas motitat strenue, & pedibus discurret, idque usque in alterum diem aut amplius. Secta foemina in alvo matricem exhibet ovis plenam, adeo ut post quadringenta jam edita, nihilominus superfuerint plura. Insistere & involuta esse subtilissimæ tunicæ videbatur.

Apparebant & nervosi quidam ductus, instar meatuum intestinalium. In medio ventris vesicula extabat, continens terreum succum coloris ravi seu fulvi. Hæc vesica per se continua systole & diastole agitabatur. Vitæ principum ibi tanquam in corde esse judicabam. Circa collum matricis; nodus geminatus albus, nervosus, qualis vesica animalium esse solet, durus splendensque cernebatur, idque intra ventrem. Nam de mammosis processibus externis postea. Nodulus unus major erat, alter minor. Collum vulvæ est instar tubi, cui succulento foris astant utrinque flavi noduli mammarum instar. Circa collum ambitus cum retinaculis

corneis, latis, inque summo obtusioribus, quibus genitale maris vicissimprehendit. Pectus carneum est. Caput membranosum & corneum. Cornua triquetra eminente dorso albo, pennis vero utrinque demissis, ut fieret triangulus. Si vivis præfices succus quidam translucidus ex dorso, seu culmo pennati cornu exit, intusque meatus apparet. Ita se habebat foemina quam vivam aperiebam. Mortua nihil in ventre exhibuit præter cavitatem notabilem alvi juxta pectus, deinde humorum ilum vitalem. In vesica, quanquam nunc non amplius vividum, tandem matricis evacuatae reliquias nerveas & membranas. Maris superiora congruunt cum foemineis. Ventrem si feces, rubeum humorem multum intus inveneris, & præterea liquamen quoddam nervis plenum, cui connectitur meatus genitalis.

Genitale autem habet peculiare, carens & cæteris quæ foeminæ sunt propriæ. Ejus historia hæc est. Sub cauda lanugine prolixiore stipata, foramen est notabile, cum ambitu membranoso duricie corneæ, in duos quasi dentes diviso. In hujus ambitus medio collum genitalis est trifidum, cum extremitatibus corneis. Circa hoc dispositi sunt aculei punicei (cornei processus omnes punicei sunt ad nigrum accedentes) duo superiores hamati, seu in uncus recurvati, ut sit forma videntia unci, ut cornua caprearum deorsum reflexi: inferior unus rectus. Hi aculei proximi sunt collo membri. Paulo citra in ambitus medio alii tres stimuli sunt parvi. Tot retinaculis comprehensam foeminæ vulvam attrahit, sibi que jungit adeo firmiter, ut si distrahere congressos velis, citius videatur ruptura ventris & circulorum compages, quam remissura coitio, id quod sæpius attentavi. Sed & hinc pertinaciam conjunctionis æstimare licet, quod viderim totos dies æstivos una manere, & noctu, nescio qua hora, consentaneum, versus auroram, disjunctos perceperim, mane inventis ovalibus vermiculis pluribus, ipsis autem seorsim quiescentibus. Frigidæ aquæ injecti nihilominus coherent, sale insperso & muria caudarum juncturae durarunt: aqua chalchantina similiter addita non sunt divulsi. Immerfi marem aquæ, foemina in margine sicco relicta, etiam injecto atramento & sale in aquam, sed vixit, & coitum retinuit. Tandem ita reliqui per noctem in aqua, mane aliquot centuriæ ovorum in vasis fundo erant, ipsi necydali natabant vivi. Alteri mari in congressu præcidebam caput; non avulsus est.

Divisi pectus à ventre; hic hæsit donec per vim abstraherem. Caput & pectus, ut divisæ muscæ diu vixerunt, diutius tamen pectus. Hic mas in coitu ita dissectus in

ventre similiter habebat humorum lutosum, spadiceum, cum quadam substantia intestinali, sublutea, membranosa.

Mas natus quarto Julii ob imbecillitatem quinto mortuus, sectusque nihil aliud continuit alvo. Alioquin vita necydali septem aut octo plurimumve dierum est. Ut enim dixi est pertinax; adeo ut cum confringerem quatuor ictibus principia alarum & pectus; post etiam alvum aliquoties, tamen vita manserit quasi inviolata, licet spiritu tandem dissipato, altero die ut plurimum ita tractati moriantur. Coitum mas ferventer appetit, parva mora post exitum ex aurelia; idque sæpius exonerato ventre, nonnunquam tamen etiam nullo humore emisso, & hoc evenit etiam in foemina. Qui vegetus est, post primi dici congressum, interveniente noctis quiete altero die repetit eandem foeminam. aut in quamcunque inciderit, adeo ut ter quater peragat coeundi vices. Foemina quoque toties marem admittit: quanquam non semper ova promat. Non enim gignit, nisi ova in se habeat, licet rore masculino concepto.

Post solutionem à congressu statim deponuntur ova ordine alterum post alterum, ubi videas quasi cum conatu & contractione alvi protrudi, excludique ex matricis collo exerto, adeo ut pavementum tangat. Numeravi quadringentis plura ex una foemina, ex aliis ferè quadringenta, quæ tamen dissectæ adhuc multa in sua matrice habebant. Quod ergo Vidas de centenis scribit, id de macris parvisque necydalis potest intelligi, quales ego vidi evasisse ex neglectiore nutritione, alii triplo fere majoribus. Quidam mares emittunt alvi proluviem ante coitum semel, & iterum post secundum congressum. Interdum mares soluti, nec dum satiati, incipientem ova ferere foeminam interpellant, & coeunt de novo, quanquam foemina per vim cohæreat, cupiatque contracta alvo & pedum posteriorum deterfione solvi. Ita una ante concubitum 17. emittebat, post primum soluta centum nonaginta quatuor & tunc iterum coiens; post quatuor horas revulsa, edebat 245. inde appetente mare humorem tanquam ex siphone ejaculabat, iterumque congressa, & liberata adhuc ova pluravice nis. Quæ ova quarto Julii erant edita colore citrino, septimo evadebant punicea, & inde plumbea. Detinebantur in capsula post fenestram pomeridiano soli exposita. Sterilia tamen colorem non mutabant, sed subsidebant duntaxat. In necydalis solutis observas aliquoties motum tremulum, qualis est à rigore & hortore febricitantium. Neque tamen feбри laborare dixerim. Sed eam concussionem esse puto, ex alteratione & promotione seminalis materiæ,

exhalante inde vapore & nerveas partes convellente. Ultimus necydales pumilio vigesimo quarto Iunii inter duo folia moritexens folliculum parvum prodiit decimo tertio Iulii, in quo præterquam quod minimum fecisset bombylium, etiam hoc peculiare erat, quod non exiret in basi folliculi sed juxta apicem facto foramine, contra ac alii omnes, mas autem erat, qui non timebat conjungi cum femella jam ter marem passa & vix spiritum trahente. Bis autem coitu impleto postea projectus est. Alæ etiam videbantur pictæ aliter ac cæterorum. Nam cum reliquorum sint lineis in longum & latum distinctæ, tanquam limbis, hic quidem quatuor ejusmodi lineas plumbeas in latum acceperat, sed inter secundam & tertiam, versus sinus alarum extimos, interjectus erat parvus quidam circulus, non exactus, lividus, cum puncto albo in medio. Verum enim vero tam ingeniosa natura est in hoc insecto, ut cum plura observaveris, scripserisque, semper tamen restent notanda plura.

Differentiæ. Quantum ad *Differentias* sumuntur illæ à loco & colore. Sunt *Indæ*, *Hispanæ*, *Calabræ*. Illæ pollicis humani magnitudinem excedunt, domusearum capitis. *Hispanæ* Italicis minores, majores & præstantiores folliculos texunt. *Calabræ* majores & plus serici largiuntur. Alibi quæ visuntur, magnitudine omnibus istis cedunt. *Coloris* ratione, sunt albæ, cineræ, subflavæ. Aldrovandus tribus tabulis eos depingit. In prima priori loco depicta femina est, & tota candicat, exceptis posterioribus pedibus, qui flavescunt. *Secunda* tota est albocærulea, mas. *Tertia* ex albo læviter flavescit, & pedes habet omnes candidos. Hic album texuit folliculum. *Postrema* ita picta est, sicut nonnunquam sese contrahunt, vel metu vel frigore. *Prior* folliculus totus erat candidus, & à candido bombyce textus. *Secundus* pariter candidus est, & bombycis feminae opus. *Tertius* totus fere viridescerebat; maris opus, postremus feminae, ejusdem coloris. Qui in secunda tabula ponitur quartus, gemellus est, à mare & femina una laborantibus factus. vulgus hoc folliculorum genus doppiones vocat. *Tertius* quodammodo lacertæ vel alterius animantis caput æmulabatur oblongum, deinde paulatim extenuatum in acutum declinabat. Primi aureo sunt colore, uterque etiam monstrosus, quoniam ovales non sint. Quorum unus amygdalam efformare videbatur, cortici suo etiamnum involutam; alter malum Armeniacum. Tales vulgo nobis Venturini dicuntur. In tertia tabula primo loco habes Bombycis jam serico gravidæ integri iconem, secundo supina parte sectam, sericum velut quædam intestina demonstrantem, tertio sericum exemptum, quarto, quinto, sexto, di-

versas figuras Chrysalidum, prout nimirum, magis vel minus perfectæ sunt. *Septimo*, *octavo*, & *nono* Bombycum diversa exuvia; *decimo* folliculos duos invicem coherentes, *undecimo* folliculum planum, & compressum; *duodecimo* alium folliculum oblongum, ex quo Papilio jam jam erumpere tentat, *decimo tertio* Chrysalidem ex qua exiturus Papilio media sui parte propendet, decimo quarto folliculum, qui cerasum magnitudine vix excedit, postremo semichrysalidem, quæ ex folliculo pyri figura erumpit.

Usum in cibis invenere. Vir doctus; Germanos milites fixas comedisse scribit. Cohortales aves appositis impinguntur: apponi possunt, si de ægrè habentium salute desperaveris. De *Educatione* Aldrovandum consule. Sericum, de quo alibi, combustum, putrida vulnera mundat; cum sale mixtum, dentium rubiginem abstergit: cor corroborat: ideo confectioem Alkermes ingreditur. Funiculo ex eo facto; si viperæ suffocentur, in angina Medici feliciter utuntur.

Chrysalidos seu *Aureliæ* nomen, ovo Aristoteles tribuit. Omnes enim Eruca, quæ folliculos texunt, cum se iis includerint, figuram prorsus mutant. Nam cum prius molles essent, pedibus instructæ & moverentur, ederentque: tum indurescunt, pedes non apparent amplius, non moventur, nisi ad tactum, & veluti ovi speciem accipiunt. Mirum autem est *Æsculapides* à Philosopho vocari: cum plurima etiam sint viridia, nec pauca pallida. *Necydala* dici, alibi monuimus. Cum verò in Aureliam Eruca transiit, infantis fasciis involuti formam imitatur, facie humana propè, cum mitra & cornibus.

Aldrovandus quatuor Icones unica tabula dedit. *Prima* insolentis, & forsitan monstruosæ est figuræ cum ob enormem magnitudinem, tum maxime, quod in capite annexam habet velut promuscidem. Tota aureo colore resplendet, sed annulos habet nigros. Ejusdem coloris sunt Chrysalides, five Necydali Bombycum, ex quibus quoque unam depinximus, eam autem, quæ secundo loco posita est. *Tertia* coloris est viridis, nonnihil ad cæruleum vergentis, punctis toto corpore maculata aterrimis. Hujus generis Eruca folliculos non texunt, sed in Chrysalides immutaturæ, eo quo hic pingitur, modo super aliquod lignum, foliumve aut etiam lapidem extendunt, & solis ardore dein mutantur in papiliones, eos autem, qui ex albo viridescunt. *Quarta* etiam viridis est, sed atri instar resplendet, depicta est prone, & supine, item à latere.

Habet & novus orbis æmulum bombycis alium vermem, *temictli* dictum: qui se, postquam in justam magnitudinem adole-

Arst. 2. de generat. anim. mal. c. 1.

Aldrov. H. Inf. 2. c. 25.

Vide & apud Mousertum.

Nieremb. lib. 12. c. 16.

vit, in membranam feralem ab ipso filis intextam condit; & deinde ac si parum esset; suapte sponte detrusum in carcerem exhalasse animam, se libitinamque suam à surculo aliquo suspendit, ut procedente tempore, in volatilem papilionem vertatur, ac insperatas subeat transformationes.

ARTICULUS IV.

De Curculione.

Curculio; quia in Papilionem abit, Erucis subjungitur. Nomen per *αὐτί-συχον* accepit, teste Varrone, quod nihil penè aliud in eo quam gula videatur. Græcis est *κῆς* & *μῖδα*, fortè & *ρεῖζ*. Multa eorum vere prodeunt examina, ubi frumenta recens demessa, eaque madida, antequam occalluerunt, reponuntur, vel ubi granarii fenestræ Austrinis flatibus, sunt oppositæ.

Columella
R. R. 2. c. 10.

Inveniuntur tam in faba, quam in tritico. Unicum *ortus* remedium, frumenta benè & commodè recondere: & fabam, cum in area exaruerit, confestim priusquam luna incrementum capiat, excussam, inferre. Cato, areas anurcâ subigi præcipit: Columella eadem, parietes subacto luto, obliniri jubet, &c. Perimuntur salugine in qua allium decoctum est, si ea pavimenta & parietes irrigentur. Refugiunt fabinam hedera, lupuli falicarii flores, juglandis folia, absynthium, abrotanum, nigellam; &c. Naporum semen miram in prosternendis vim habere, nostra & avorum memoriâ observatum est. Quia dulce & oleosum, appetitur: eo distenti, intereunt. Plura de iis vide in vermibus frumentariis.

Columella
R. R. 12. c. 2.

TITULUS II.

De Insectis terrestribus non alatis multipedibus.

CAPUT I.

De Asello.

Insecta multipeda non alata sunt, *Asellus*, *Scolopendra terrestris*, & *Julus*. *Aselli* vocabulum insecto huic Latini imposuere, non quòd asino sit similis, sed quòd ad colorem ejus accedat. Quidam, *Cutionem* & *Porcellionem* vocant. Plinius *Centipedem* dixit. Aristoteli est *ὄνικος*, Medicis Græcis *ὄνικος*, Theophrasto *ὄνικος*, Dioscoridi *κασκαρῆς*, Absyrtio *ὄνικος*, Asiaticis, Galeno teste, *κῆς*, seu à forma fabæ, cui similis dum se in globum contrahit: seu quod è fabarum folliculis & culmis prodire soleat. Plinius *κόλον*, à cutis callo & duritie vocat: alii *ῥελον* sed perperam.

Nomen.

Galen. 3. de
loc. affect.
lib. 11. de
simp. fa-
culis.

Insectum est parvum, inquit Mouferus, digitum transversum vix longum, semidigitum ferè latum, colore livido nigricante. Quatuordecim illi *pedes*, utrinque septem; singulis pedibus unica junctura, vix perceptibilis: duæ breves *antennæ*, quibus viam tentat: latera circa pedes ferræ modo dentata. Tactus se in globum colligit.

Description.
Mouferus
Theatri
Inf. 2. c. 8.

Subtegulis, & hydriis, planè asininum colorem refert; quatuordecim illi pedes utrinque septem; singulis pedibus unica est punctura; vix perceptibilis; duas habet breves antennas, ut viam tentet; tactus se in globum colligit; vel (ut Galenus loquitur) ad fabæ similitudinem; unde *κῆς* nomen indidit: latera circa pedes ferræ modo dentata: subtegulis, valis aquariis, in medulla arborum exesa, inter corticem & caudicem putrescentem nascitur; uti etiam sub petris, ex humido putrescente nati. Deinde coeunt, & à coitu ova deponunt (unde vermis) candida, splendentia; margaritulis similia multa, & eodem loco coacervata, ut anno 1583. observavimus: tepido humore vivunt, in rimis parietum aut ædium latebris hyemem transigunt. Ex ovis primum vermes duriusculi excluduntur, qui aliquantisper fere immobiles hærent & albicantes; tandem parentum more, liquorem atque rorem fugunt. In calidis regionibus & ficcis etiam reperiuntur; sed ibi nocturno røre vaporeque refarciunt, quicquid per diem humoris fuerat exhaustum. Galenus hoc *Asellum* pacto describit. *ὄνικος καταικίδε ζῶον ἐστὶ πολὺ πᾶν ἐν τοῖς ὑδατοῖς ἀργείοις, καὶ ἐν τοῖς καπρῆσι γενόμενον; καὶ δὲ τὰς δακτυλῶν ἐπερὶ σφαιρέδιον.* Aristoteli fuisse eum cognitum id probat, quod pediculum marinum huic similitum dixerit, demptâ caudâ.

Generatio.

Uusus eorum est in Medicina, multiplex.


Aperiunt, attenuant, discutiunt. *Urinæ* difficultati auxiliantur, si ex vino triti potentur. *Calculus* pellunt, si duo triti, cum stercoris murium & columbarum semidrachma, hauriantur. In regio morbo ex mulso Galenus propinat. In *asthmate* ab Asclepiadè, si combusti, cum melle fumantur, commendantur. Fidem Hollierius & Agricola firmant. Oculorum ferè omnes morbos, ab adnatis vel innatis ortos tollunt, catarrhactâ excepta, si recentes benè contriti, ex convenienti liquore fumantur, vel extra adhibeantur. Nihil de aurium dolore, parotidibus & strumis dicam. Vivi *paronychiæ* applicati medentur. *Panos* cum resinæ terebinthinæ tertia parte tollunt. Unguentum ad hæmorrhoidas dolentes utilissimum, ex unguenti populei unc. j. olei rosacei, in quo decocti sunt aselli unc. j. f. croci gr. 4. paratur. Alii cum adipe & butyro coquunt, & ovi luteum addunt. Olei violacei unc. iij. in quo quatuor aselli ebulliere, ad tertiæ partis consumptionem,

Dioscor. M.
M. 2. c. 37.

Plin. H. N.
10. c. 8.


Bombijces Aldrov Seidenwurm

Tab. 1





Folliculq



B. sese Contrabens



Tab. 2



Tab. 3






Scolopendraz Mouf.
Scol. Maxima Terrestr



Asellus Mouf.



Scolopendraz Terr. Aldro.



Iulq Glaberi Mouf.



I. Kirfutz





ptionem, falsum humorem extra inunctæ reprimunt.

De Calculo quod dixi, cœtum Lauremburgius pronunciat : cui & Hartmannus adstipulatur. Sequitur post assumptum medicamentum totius corporis calor : sitisque molesta, & circa pubem dolor affligit. Præparationem apud Lauremburgium peculiari tractatu vide. Comeduntur à lacertis aquaticis, ranâ terrestri, & serpentibus. Ad Asellos pertinent Pollin & coyayahoal. Mirificam vim excludendi spicula pollin habet. Insectum est parvulum, centipes: tritum & impositum, aculeos & sagittas ocyus extrahit. Prædurus vermis est coyayahoal, aliis tzinchoillin, aliis ichcaton dictus, supernè fulvus, pede numeroso purpurascens. Arefactus, tufus, & aqua dilutus, maxillisque quotidie bis illitus, dolores dentium placat.

CAPUT II.

De Scolopendra terrestri.

Scolopendræ nomen ex eo datum, quòd σκολοπη aculeum habeat εν ἑδρα, volunt nonnulli. Quidam, Hepam, Centipedam, Millepedam, Porcum lutosum, & Multipedam dixerunt. Aristoteli est σκολοπενδρα, Theophrasto σκολοπία, Dioscoridi à serpentum interitu σφιοκτένη. Varino & Hesychio ἀμφιδελφάρον, aliis σήψ, nonnullis μυρόπας & πολόπας; vulgo Græcorum σκολοπέτρα dicitur. Nicandro ideò ἀμφικαγής, biceps, quòd pari facilitate prorsum capite, retrorsumque ducente cauda incedat.

Plurimos pedes habere, & pennis carere, Agricola scripsit, quod Julopotius debet coloremque eis æneum, corpus tenue, & latum, tres digitos aut ad summum quatuor longum addit. Asplenii folio similem Aldrovandus facit. Moufetus tantum à Julo differre vult, quantum locusta marina ab Astaco. Robertus Constantinus in cauda cornigeram comminiscitur.

In truncis arborum, aut lignis, vel palis terræ infixis, & gignitur & vivit. Amotis egreditur; aliàs plerumque latere solet. Circa radices gladioli reperiri apud Theophrastum habemus. Olim Rhytientes & Obterietes sedibus suis pepulerunt, si Æliano & Plinio fides est. Ex frequenti exitu; serenitatem aeris rustici præfagiunt. Ad morsum ejus, locus undique livescit, putrescit, intumescit, & vini rubri facibus similis videtur. Contra eum commendat, intra, salem ex aceto; Ægineta trifolium asphaltites cum vino: Actuarius nepetam cum eodem; Dioscorides, rutam sylvestrem, radicem dracunculi tritam; serpilli ramos & folia; Aëtius absynthium & mentham cum vino. Quidam morbum reme-

dia respuere credunt. Extra, locus scari- ficari, mox profundè incidi debet. Venenum per cucurbitas extrahitur. Tum succum centaurei minoris cum tertia parte vini dulcis, ad mellis consistentiam coctum imposito, & corium superligato, per octo aut quatuordecim dies; locum tandem cum spongia vino calido intincta foveto, & Scolopendræ morsum certò curabis. Reliqua apud Plinium & Dioscoridem vide.

Habent tamen & in Medicina aliquos usus. Oleo decocti capillos cum levi pruritu auferunt. Cimices suffiti interficiunt, &c.

Aldrovandus Ophioctonen diversam à vulgari esse credit. De cætero, aliquot ipse species observavit. Prima est colore amethystino, albis ruberrimisque punctulis maculosa. Altera lutea, maculis obscuris insignita. Tertia minor, colore rubicundo, per tergus atro. Quarta vulgaris, aurei coloris ad castaneum nonnihil vergentis. Ultima viginti instructa pedibus, proceriusculis & longissimis antennis, colore subferrugineo.

Moufetus tres species exhibet. Prima est maxima, terrestris Scolopendra, ea quam vides crassitie & longitudine est, color totius corporis ex fusco nigricante splendens. Singulis incisuris pedunculus appendet luteus, id est in singulis lateribus sexaginta prorsum & retrorsum æqua facilitate promovet. Nam & caput versus ingreditur & in caudam; ideoque à Nicandro & Rhodigino biceps dicitur. Partem inter caput & alvum non simplicem sed multiplicem habet: quo fit ut præcisum hoc genus vivere possit. Irritatus hic Scolopendra tam acriter mordet, ut Ludovicus Atmarus (qui nobis eum è Libya dono dedit) quamvis Chirotecis duplicique linteo munitus, vix eum manu petentem ferre potuerit: altè enim in linteum os forcipatum adegerat, diuque pendulus vix tandem excuti permisit. Horum alium ex novâ Hispaniolâ allatum linea quædam flammea medium per dorsum ornat, atque æneus later pilorumque color commendat: habet enim capillares pedes, atque armatim se tollens celerrimè currit. Hoc summa admiratione dignum est, quum natura huic animalculo caput minimum dederit, memoriam tamen, vimque rationis æmulam, neque congio, nec urceo sed amplissima quadam mensura tribuisse: cum enim innumeri adsint pedes, quasi remiges, & à capite veluti elavo alii permultum distant; novit tamen quisque officium suum, & pro imperantis capitis mandato, in hanc vel illam partem se conferunt.

†

Ufus:

Ærius l. 7.

Differentiæ:

Moufetus: l. c.

Hartman.
Praxis chy-
miatr. pag.
160.

Nieremb.
lib. 13. c. 18.

Idem p. 22.

Nomen.

Aldrov. H.
Inf. 2. c. 25.

Mouf. 2. c. 8.
Dioscorid.
l. 6. c. 43.

Description.
Agricola de
Animalib.
subterraneis.

Aldrov. l. c.

Natura.

Theoph. H.
p. 7. c. 11.
S. l. 8. c. 9.

Ælian. H. A.
15. c. 26.

Morsus.

CAPUT III.

De Iulo.

Moufetus
Theophrasti In-
sect. 2. c. 8.
Nomen.

Iulos Græci, mea quidem sententia, inquit Moufetus, non à lanugine, sed à nucum juglandium atque avellanarum veluti caudis, quarum villi callo compactili infixi, Julos hos repræsentant: unde & ipsi Ἰούλοι nomen sortiti. Ego Latine Julum dici non nescio, sed triremem quoque dicere auderem. Quandoquidem Lycophron Paridis triremes numerosis utrinque scalmis celeres ἰσλοπύγας vocat. Eandem similitudinem Nicander Scolopendris applicat, unde pariformes esse Julum ac Scolopendram facile apparet. Hos Hispani Centopeas, Itali Centogambi: Angli (ex me forsàn) Gally worme dicturi. *Numerius* Lumbricosterrestres nigros Julos item vocavit Athenæo teste libro 7.

-----Ἰούλοι

κέκλυται μέλανες γαλήνην ἐν πτερὰ γαίης.

Nihilominus nisi fuerint etiam multipedæ, in Julorum numerum nomenque non venient. Sunt autem Juli breves, (ut dixi) Scolopendræ pedum numero non a seculum tantum atque Erucarum gentem, sed omnia alia insecta vincentes. Julorum *alii glabri*, cernuntur, *alii hirsuti*. Glabrum unum vidi in lactula capitata, parvi junci fluviatilis crassitie, atque ea quam videtis magnitudine: caput illi nigerrimum, dorsum aurea tinctum flavedine. Venter ex cæsis argentatus; incisuræ pedesque capillares totidem, ut oculos & memoriam faciliè fugerent. *Secundus* totus nigrescebat, alba linea excepta, quæ à capite ad caudam usque recta per dorsum ducitur. *Tertius* obsoletius flavescit; caput illi rubescit, uti & pedes; antennæ autem & nascentes juxta caudam setæ livescunt. *Quartum* si corpore nigrius punicantem feceritis, pedibus autem & antennis levius, facile rem expedietis. Horum alios è musco arborum corticibus innascente prodeuntes, alios sub ollis truncisque putridis latitantes cepimus. In hirsutos non plures incidi quam duos. *Primus* hac figura & forma albicans, in muro repit; pili brevissimi innascentes nigri fuerunt. *Secundus* ventre sublivido dorsoque inamœna flavedine maculato: est illi os punicatum, ocellus niger, pili canescentes. In arboribus effœtis, atque annosis inter corticem & lignum latitat, atque etiam inter fæxa musco villosa ac

denso obducta. Omnes Iuli tactu se in gyrum colligunt & convolvunt.

An sint venenati equidem ignoro: sed si fuerint, sanè perbeatum Pennium, qui varie ipsis nuda manu irritatis ac læsis, in morsus sanusque evasit. Georgius Agricola æneicoloris Iulum, (sed is Scolopendram vocat) his verbis recenset: Scolopendra admodum exigua, in truncis arborum, aut in palis terræ infixis, (undè nomen invenit) gignitur & vivit; quibus amotis vel commotis egreditur, aliàs omnino latitura. Pennis caret, sed plurimos habet pedes. Si quando repit, corporis partem mediam, veluti arcum intendit: si bacillo alia vere tangatur, se contrahit: color illi æneus, corpus tenue, nec latum, tres transversos digitos longum, ad summum quatuor. Alia item specie, iisdem ferè locis reperitur, corpore exili & terete, filiferè crassitie, spadicei coloris dilutè: pedibus adeò numerosis atque exiguis, ut eos numero complecti ἐκ τῶ ἀδυνάτων sit, quatuor digitos transversos longa est: sub ollis degit & asseribus putridis. Avicennæ Scolopendra, (qui etiam Iulus) solummodo 44. pedes habet, palmam longus, tam exilis ac tenuis, aures ut intrare possit libro quarto Fen. 6. tractat. 5. capite 19. Hujus (inquit) aut nullum aut languidum venenum est, nec magnum dolorem excitat: qui floribus Asphodeli, vel sale cum aceto mixto statim sedatur. Iuli nostrates, (inquit Gesnerus) si in ædibus fuerint, ad Saccharum Thomæ, id est purissimum (ceu ad optimum caseum mures,) congregantur. Bruerus noster (perritus ac industrius naturæ explorator) Scolopendras se in Anglia vidisse, & habere referet noctilucas, in ericetis muscosis toto corpore fulgentes. Cui licet, mentienti nescio, ultrò credam: eò tamen magis, quod Oviedus idem in nova Hispaniola per agros; & Cordus in Germania in cellis humidis observasse se scribunt. Mirum est quod Plutarchus refert, bestiolam asperam multis pedibus celeriter ambulantem, multo cum semine ab Ephebo Athenis ejectam, libro 8. Sympos. probl. 9. Iulus cellarius in pulverem crematus, mirifice urinam provocat. Merula. Iulorum humor cum cruore ex afellis expresso, ad albuginem oculorum tollendam divinum & efficax remedium. Arnold. Brev. 1. capite 18. Atque hætenus de Iulis, de quorum naturâ Hesychii, Aristotelis, Nicandri, Lycophronis & Ardoyni varias opiniones prætereo, quia variæ non veræ.

HISTORIA NATURALIS

D E

I N S E C T I S

LIBER III

De Insectis Terrestribus apodibus.

CAPUT I.

De Vermibus in genere.



ETHÆC DE INSECTIS terrestribus pedatis volumus. *Apoda* sunt *Vermes*; *Teredo*, *Lumbricus terrestris*, *Tinea*, *Limax*.

Vermi nomen inditum, quod se in multas partes vertat ac torqueat: vel quod verat, seu ad partes oppositas se trahat, ut Isidoro placet: nisi fortè ab *ἐρπω* deducere malis, quod *reperere* significat. Græcis est *σκώληξ*, aliquando *δερμίδι*.

Mater omnium non tam putredo est, ex humidi nimia abundantia, cum calido juncta exorta: quam semen vel seminale principium, quod idoneam materiam nactum, & à calore ambientis excitatum, sese exerit, & vitales operationes exercere incipit. Unde accidit, ut & in illis quæ putrescere nequeunt reperiantur: molitoresque dum suorum lapidum lavorem stylo castigant, vermes ibi natos reperiant.

Nulli generi oculo esse Plinius asseruit: levissimum quibusdam vestigium Galenus. Sentire, gustare datum. Percepto sonitu lateſcunt. Amara refugiunt, dulcia requirunt & fugunt. Repunt, in arctum corpusculi sui partes colligentes, & posteriora attrahentes, quod *ἐλκυσσάδω* propriè Græcis. Motu undarum moveri Galenus dixit. Nullum iisdem ingenium vel memoria. Unde quidam *obliviosos* dixere. Medio corpore dissecti, utraq; parte vivere videntur; iisdemque aluntur, ex quibus constant.

Cedunt aviculis & aliis animalculis in cibum, sed & ab Indis omnigeni comedi dicuntur. Crudos vorare, Lopezius testis est. Quæ de Schamir verme, cujus in findendis lapidibus ad templi Salomonici structuram usus, Iudæi scribunt, nugæ sunt. Multæ eorum *Differentiæ*, sive magnitudinem, locum, colorem, sive alia attendimus: Sunt *parvi*, *mediocres*, *longi*, & quidem ita ut ad cubitos se extendant. Sunt *nigri*, *rubri*, *igneo colore* micantes. Quidam rubicundo circulo propè caput insigniuntur. Habent alii caudam; carent

eadem alii. Anno M.C.C. LXXXV. Scorpionum instar caudati in Prussia vagabantur. Intra diem tertium puncti extinguebantur. Author libri de Natura, *aurei coloris* quosdam esse ait, qui statim ac nati sunt à parentibus alantur, deinde absque cibo vitam transigunt, ut quasi immobiles jaceant. Constituto tempore reviviscere addit. Vestiuntur nonnulli pilis, quidam non item.

Apud Mechoacanenses, *Itzuagua* vermis, qui & *Sipantipe* dicitur, duobus corniculis rubris iter præterat, nigro fuscoque variegatus. *Tlaxquipillin* Mexicanis seu marsupium terræ vermis quidam niger dicitur, cujus pulvis inſperſus medetur lepræ. *Coyayahoal*, aliis *Tzinchoillin*, & *Ichaton*, prædurus vermis est, superne fulvus, pede numeroſo purpurascens. Arefactus, tufus, & aquâ dilutus; maxillisque quotidie bis illitus, dolores dentium placat. Anno M.C.IV. ignei vermiculi, incertâ specie, in Italia per aërem vecti, ceu densæ nubis objectu, solis etiam lumen humanis oculis auferabant, &c. Nos secundum subjecta, in quibus nascuntur dispescemus.

Nieremb. H.
Exot. 13. c.
16. 21. & 22.

CAP. II.

De Vermibus in specie.

ARTICULUS I.

De Vermibus qui in plantis nascuntur.

PUNCTUM I.

De Vermibus arborariis.

Vermes alii plantis, alii animalibus, alii homini innascuntur. Nihil de lapidibus dicam. Plantarii vel sunt *Arborarii* vel *Fruticarii*, vel *Leguminarii*, vel *Fruentarii*, vel *herbarii*.

ARBORARII, quidam lignum, quidam corticem, nonnulli folia, flores, & fructus exedunt.

Ligni-perdes dupliciter distinguuntur, vel ab ipsis arboribus, vel lignis: infestant

Mouſſet
Theatri Inſeſt.
ſect. 2. c. 19.

R

non-

Nomen.

Generatio.

Natura.
Plin. H. N.
L. 11. c. 37.

Galen. de
Diff. puls.
l. 1.

Usus.

Differentiæ.

nonnulli ficum, alii forbum, alburnum, esculum, Cinnamomum, Platanum, Quercum, &c. Eorum qui in *ficis* existunt, alii ex ipsis nascuntur arboribus: alius item paritur, qui vocantur *Ceraſtes*. Quum enim vermium magna pars specie formave inter se differunt, discrimen tamen præcipuum in his est, quod in aliâ arbore fructu venati, translati in aliud genus servari nequeunt. Ceraſten autem & in olêa nasci, & in fico parere asseverant. Habet itaque & ficus suos vermes, & illos quoque emittit, quos alienos receperit. Omnes tamen in Ceraſten figurantur, sonumque edunt parvuli stridoris. Syontinus duo illi cornua in capite assignat. Cum erodendo tantum loci excavaverit, ut semetipsum circumagere possit *ὡπερ οἱ μύσχοδοι*, aliud animalculum progignit, & unam speciem in aliam (erucarum more) transmutat.

Et *Sorbus* arbor infestatur vermiculis rufis, pilosis atque ita emoritur. *Mespilus* item in senecta vermes tales procreat, sed grandiores quam in aliis arboribus, ut Theophrastus refert. *Alburnus* vermem profert Thripiformem, ex quo Culices deinceps vel Phalanarum species nascuntur, *αἰχμαδῆναι* *ῥῶα* *πιδ* *ξύλοφάγα* Hefychio, quia Pyros sylvestres acriter infestant.

Vermiculus in *Esculo* arbore (*Galbus* à Suetonio dictus) miræ est exilitatis, unde qui primus Sulpitorum Galbæ cognomen tulit, à summâ fragilitate ita vocatus est. Carabum *Platanus* producit, (testibus Hefychio & Aristotele) vermem cancris marinis similem, sed sex tantum pedibus donatum. *κασιόβρο* *σκαλῆξ* Hefychii hoc modo nascitur: (Theophrasto autore;) ligni Cinamomi ramulos binum digitorum longitudine abscindunt; recentesque bovinis tergoribus insuunt; tum exinde lignis putrescentibus vermiculos nasci ajunt, qui lignum corrodunt, corticem nullatenus tangunt ob acrimoniam: lignum hoc in ædibus Penni visum est, à vermiculo erofum, quod cinerei fuit coloris; non valde durum, insipidum prorsus, & inodorum, contra quam Lusitani aliquot mercatores, & medicastri simplicium ignari, affirmant.

Raucæ vermes *Quercus* radici innascuntur, usque nocent. Olea (inquit Plinius) male ponitur, ubi quercus effossa fuerat: nam relictæ in quercus radicibus raucæ vermes, ad oleæ radices transeunt, atque eos infestant.

Corticarii vermes pauci à veteribus nominantur. Decempedem illum *Clopt* dictum superius descripsimus.

Folia arborum & flores depascunt *Syrones* dicti, quorum crassities quantilla sit ex eo cogitare possumus, quod inter folii tenuissimi membranas fodiendo serpit, sal-

va utraque epidermide. Post aceti lumbricos: (inquit Joachimus Camerarius) nullum vermiculum vidi adeo compressum. Cuniculi, quos agit, subtilissimas aliquando lineas & fibras referunt; folia cerasi & mali maculata plurimum lædunt, atque post fatietatem excidunt, & videntur ex multis feminibus peponum secundum latum conglutinati formati, nisi quod longè sint minores. Ab his emortuis aliud prodit insectulum, veluti & hi ab alio.

Syronibus perfimiles *ἀνταροι* quos Angli tam in lignis, cortice, folio, floreque & fructibus arborum, quam caseo & cera genitos, mites id est minutulos sive atomos appellant, à Syronibus eo differunt, quod ex multis Acaris constare videntur. Acarus autem ipse globosum, album, sepes, & pedicillo simile est animalculum; tam nullius ferè substantiæ, ut inter digitos pollicemque fortissimè compressus, ob exilitatem lædi sentirive nequeat. Antigonus eum & Aristoteles *ἀλῶ* *πέρμιον* vocarunt, id est Jovis promum; eam fortè ob causam quod crassissima vini dolia rostro perforat. Et sane nisi Jovis ei aliquid inesset aut divina virtutis, quomodo tantæ vires in tam pusillo & pænè nullo corpusculo cernerentur? In *fagi* quoque *foliis* tubercula parva reperiuntur, in quibus vermiculi exiles.

Fructus etiam arborum (ut Theophrastus loquitur) est *σκαλῆξ* *βροτ*: etiam cum adhuc crudus est, ut in Sorbis, Mespylis, pyris, malisque cernimus. Oliva tam in cute quam nucleo vermes *νάροπας* vocatos patitur: unde haud contemnenda pestis Theophrasto dicitur, quæ non solum succum & oleum absorbet, sed etiam nuclei tam duri ossa exedit. In *Gallis* perforatis vermiculi etiamprehenduntur, ipsa intima medulla geniti; è quibus postea muscarum & culicum quorundam genus oriri, Valerandus Doures Pharmacopæus Lugdunensis authore est. In *Quercus* item glande & pomis illis fungosis vermes aliquando nascuntur; eoque anno famem & annonæ caritatem Astrologi præfagiunt. *Nucibus* avellanis vermes inesse notius est, quam ut de iis contendam: præsertim æstate humida, & vento ex Austro flante. Mirum est quod Ringelbergius libro experiment. scribit: Hos vermes lacte ovillo ad serpentis magnitudinem enutrirî posse. Cardanustamen idem confirmat, modumque nutritionis, septimo de rerum varietate ostendit. Vermiculi in *ficibus* arefactis similes iis qui in avellanis nascuntur, capite nigro, reliquo corpore ex luteo albicante, sed minores. *Conos cedri* vermibus esse obnoxios comperi, (inquit Bellonius) quemadmodum & pineos. Cecindelam fœminam crassitie referunt, digitum transversum longi, capite formicæ, sed magis compresso; incisuris duodenis; pedes *juxta* caput

Vermer Arbores Holzwürm Mouf.



Vermes Fructuum fleguminum Mouf.


Vermes Hominum Menschenwürm Aldr.



Spülwurm



Limaces

Schnecken





caput utrinque tres, antennæ circulares binæ, venter crassus, cauda mucronata. In præduris quoque & lignosis *opaliperi-*carpiis, semen inest latiusculum & sæpè, vermiculis exesum: quorum veluti aurelias ibidem reperiens. Nulus denique fructus nominari possit, quem non tinea aut vermibus inficit: imo ipsum aliquando Manna (ut Poëtæ fingunt, Deorum, ut Scriptura asserit: DEI filiorum cibus) putredinem & vermem admisit, quum, præter Jehovah mandatum in crastinum reponeretur.

Huc refer *Nopal Ocuillin*, seu Tunarum vermes, *Axocuilin*, & *Cuchipilutl* Indorum. De illis ita *Nierembergius*. Familiare est hucxutlæ, provinciæ Panicensis, tunarum genus, folia ferens longa, & angustiora cæteris, intra quæ solent vermes generari lineis candidis cyaneisque distincti, mirabilis facultatis in curanda infania, si bini tusi, & resoluti ex aqua semel intra fumantur; aut si inveteratus sit morbus, bis aut ter: inducitur enim è vestigio somnus, permissusque æger dormire, paulo post mente constans expurgiscitur, atque resipiscit. Sunt autem hi vermes innoxii, neque ullum inferre nocumentum solent, si intra corpus deglutiantur: quo fit, ut intrepidè possint propinari. Addunt, paralyticis atque epilepticis eadem mensura conferre.

De *Axocuilin* ita idem. Plurimum usum vilissimæ etiam naturæ hîc videbimus. Nascuntur inquit *Franciscus Hernandus*, in arboribus guampatli, aut aliis, quâs nostri ob similitudinem prunos vocant (cùm tamen ad myrobalanorum Arabicorum pertinere genus alicui fortassis videri possit) vermes quidam hispidi, *axocuilin*, seu ferentes axin; pallentes, vix longi binos latos digitos, ac pennam crassi anserinam. Hos indigenæ ab arboribus deturbatos permittunt ad ignem ex aqua elixari ac disciqui, donec comminuantur, & adeps ejusdem coloris, axin nomine, supernatet atque emineat. Colligunt hunc ad usus multiplices incolæ, & conformant in globos, è butyro vaccino parari solitis haud absimiles, olei odore & lenitate, & ad omnia, quibus oleum conferre solet, præstantissimos, non tamen in nutrimenti usum adhuc venêre. Dolores, quamcunque partem corporis obsederint, sedant: nervos tenfos laxant, emolliuntque, discutunt tumores, aut, si natura in id potius propensa sit, maturant: erysipelatis desinentibus conferunt, ulceribus ferunt suppetias, convulsisque, nec non enterocelis, addita resina ac picietl, collectionesque cujusvis generis brevi admodum minuunt atque discutunt.

Cuchipilutl ita describit *Nierembergius*: Vermis genus est juxta moros aut fallaces versans, bombycis magnitudine, & pænè forma, sese illius instar Octobri men-

se firma convolvens membrana, ac prodians Aprili, conversus in papilionem. Suspendant hunc Indi infantium cunis, atque ita somnum illis conciliari credunt. Unde imposuere ei nomen. Idem in pulverem reductus, ac ex vino proprio, quod pulque vocant, totus potus, Venerem stimulat. Mexicanis agris provenit, & ex his quas dixi arboribus victum sibi quaerit.

A lignis in quibus prodeunt sumptas differentias, si attendas, vel innascuntur virentibus truncis, qui *δῆκες* dicuntur: vel in aridis & exsuecis qui *εγγυλα*, vel in solidis & siccis qui *Thripes*, vel in lignis calidioribus qui *Termites*: vel in solidis & siccis qui *Cossi*: vel in navium tabulis qui *Teredines*.

Δῆκες fortè *ἀπὸ τῆς δάκνεναι* nomen sumpsērunt, adeò ut sæpè ad earum radices magna pulveris vis, mordent enim & mandunt viyas arbores, quasi ferratione facta, conspiciatur: caput huic deforme, varium, tegmine coopertum, quod exerere & contrahere pro lubitu potest. Pedes habet in posteriore parte caudam versus, sicut *Cossi* in pectore; reliquum corpus tunica arenosa tegitur, quasi putamine; qua exuti moriuntur, ut cochleæ testis nudatæ. Tempore à natura constituto, in thecam aureliæ similem obdurescunt, sed quæ bestiola pennata inde provenit, nondum animadvertimus. *Cosso* longe major ob nimiam edacitatem, & minus delicatus. Pici martii, aliæque ligniperæ aves rostro virentes arbores percutiunt, & sono concavitates investigantes, eo loci perforant & pertundunt, donec ad mordellas istas pervenerint, ipsasque deglutiverint. Valdè enim delectantur hoc cibi genere, ejusque gratia integros aliquot dies in perfodienda arbore infumunt.

εγγυλον in ligno furdo reperitur, & pumicofo, quod ne baculo quidem percussu sonum edit: Cerastræ Theophrasti, & pityocampæ Medicorum valdè cognatus, nisi quod trestantum utrinque pedes consecutus sit. Virosum illi & pertinacem odorem, & vim valde septicam tribuit *Gesnerus*.

Θερμῆς à terendo dicti videntur, vulgares satis vermiculi ac frequentes, parvi, corpulculis albidis, capitibus nigricantibus vel ex rubro infuscatis, pedibus sex juxta column tenuissimis, exilibus, & cum rubedine non magna nigricantibus; vermiculo avelanæ nucis structurâ corporis persimiles, sed medio minores atque breviores; nigra ligna non amant, sed albicantibus duntaxat (qualia sunt Alburni, Coryli, Betulæ, Cinamomi, Platani) innascuntur: quæ jam arida solidaque perterebrant, & absorpta humiditate cariem inferunt.

Termitem producant ligna solis nimio calore torrefacta; qui (Servio autore) ex

ipsa medulla genitus, matrem tantum absorbit; ossicamque & corticeam substantiam non attingit. Ingratum sanè animalculum, tantoque aliis vermibus deterius, quanto cordiarborum, & vitali ipsi fonti perniciosius; vivunt enim aliquando cute & ossibus spoliata: atqui medulla absorpta, statim pereunt, nec mederi tanto valet vulnere natura. Corporis effigie Cossos referunt: sunt autem minores multo, & non parum molliores.

Cossi rugosi admodum sunt corporis, unde & Consules quidam Romani Cossi vocabantur. Majores Cossi ferè minimum digitum crassi videntur, & tres digitos transversos longitudine adæquant; colore albicante, crucis majoribus ferè similes: quare à Plinio prægrandes Cosses dicuntur, pedes utrinque tres, non procul à capite penduli, brevès, exiles, nigricantes. Corpus annulis duodenis constat, versus caudam semper minoribus & pellucidis; caput crassiusculum, colore nigro, duæ in fronte laminæ; juxta os sunt exiguae quasi setæ aculeatae; singuli annuli in lateribus, singulis punctis rubentibus modicè cavis notantur. Tardigradum valdè est animal, & motus vix perceptibilis; qua de causâ ventricosos & desides cossos appellat Festus. Oculos habet parvos valdè, dorsum teres, ventrem nonnihil concavum, colore albicante dilutum; obesuli videntur & valde molles, lignis noviter sed intempestivè cæsis innascuntur; si verò diutius resecta fuerint, plurimamque humiditatem amiserint, minores oriuntur Cossi, magnitudine solum à majoribus diversi. Veteres in Ponto & Phrygia, (ut Plinius & Hieronymus tradunt) iis quasi delicatioricibo vesci solebant, atque eum in usum farina saginabant, ut vermiculi quoque atiles fierent. In medicum etiam usum veniunt Plinio teste; sanant enim ulcera, lac augent, homas illiti percurant, id quod Albertus quoque confirmat.

Teredines, capite ad pastionem grandissimo, rodunt dentibus, perforantque robora, vel sono teste. Hæ tantum in mari sentiuntur (Theophrasto teste) nec aliam putant teredinem proprie dici. Horum alios tam longos in navibus Venetorum quæ diu in Alexandriæ portubus constiterant, repertos meminimus, ut cubitum longitudine, pollicem crassitudine æquarent. Quales etiam inclytus ille Franciscus Drakus, alter quasi Maris Neptunus, in nave sua orbivaga (canè jam penè spongiosa) domum reduxit. Vidimus alias Teredines unciam longas vermi farinario persimiles. His corpus teres, caput ex luteo splendente, parum rubens, os forcipatum, à cuius quasi labris parvæ spinulæ nascuntur; pedes utrinque terni; incisuræ corporis undecim, aliquantum rubentes: re-

liquum corpus dilutè livescit cum splendore; quo majores sunt, eò ex phaniceo obscurius splendent; quò verò minores, eò intentius albicant. Itali Byssam, Hispani ab edulio Bromam vocant: exedit enim naves & perforat; unde Aristophanes in Equitibus tiremem exesam, loquentem, introducit his verbis *τὸν τερηδῶνα οὐ πῆλιν τὸ πῦρ καὶ μετὰ πῦρ*. Sic etiam Ovidius i. de Ponto. Estur ut occulta vitata teredine navis. Teredines non naves tantum, sed & ædium trabes infestare. (Pace Pennii dixerim) ex Homeri Scholiaste (O. diss. λ.) constat, cuius hæc sunt verba: Melampus, cui Draco aures purgaverat, ut Brutorum sermonem intelligeret, ob boves Iphicli abactos in carcerem conjectus est. Ubi cum intellexerat ex Teredinum colloquio, parum superesse de trabe, efferri se iussit, ne illa decidente vitam finiret. Atque dum à viro & muliere sublimis factus efferretur, domo corruente, uterque reversus periit. Patet id etiam ex Comico- rum Latinorum facilè principe, quam Philolachen adolescentem his loquentem verbis introducit:

*Atque illud sæpè fit: tempestas venit,
Teredo ades ingreditur, & vermis malus.
Venit imber, lavit parietes, perpluunt
Tigna, putrefacit aër operam fabri, &c.*

Magnis hi præsertim nocent arboribus, nempe Quercui, pyris, malis, castaneis, larici, juglandibus, fagis, mespilis, ulmis & latifoliis salicibus: in quibus immaturè cæsis, & plantatis, pinguedo quædam mollis & mala oritur (alburnen & alburnum saltuariis dictum) omnium Teredinum seges & fomentum. Quo ficciores, amariores, oleosiores, atque duriores sunt arbores, eò magis à Teredine liberæ creduntur: tamen aliquando cupressò, juglandi, Guajaco, & Tiliæ, Ebena etiam ipsi, vim facit. Modus autem generationis ipsorum in lignis hujusmodi est. Plerique innascuntur, non foris se inferunt; depascuntque sua principia, ut ex quibus constant, ex iisdem constare pergant. Materialis causa & conjuncta, est dulcis & alimentarius lignorum humor putredine infectus, quemadmodum ex pituita dulci lumbrici intestinorum nascuntur. Putrescit autem dulcis ille humor duplici de causa. Dyscrasia scil. vel continui solutione: per Dyscrasiam qualitas corrumpitur; per vulnera vero, non tantum innatus effluit, & se effundit humor, sed alienus quoque per pluvias caliginesque illatus putredinem efficit. In vetulis, raris, & siccatis per ætatem arboribus, maximi sunt vermiculi, tum quia humidum radicale magis minuitur, tum quod Dyscrasia colorque & humor peregrinus magis augentur: quemadmodum

modum & series plerumque dira scabies, & fyrones acarique crebrius infestant. Sub lunâ exposita ligna citius vermiculantur, ob nimiam aëris humiditatem; sub solē autem calidiore, ob nimium ardorem. Qui verò innascuntur, hi omnitempere generantur: Illatitiis autem, & ex femine culicum, muscarumve natis, verpotissimum atque æstas amica sunt: hyeme enim congelati pereunt. Cœlum quoque & solum magnam vim habent, ligna quippe Hibernica rarius putrescunt, ex Solis virtute; quemadmodum & Arabica, ex cœli.

PUNCTUM II.

De Vermibus fruticariis.

Mouset, l. c.

Vermes fruticarii, Salicem, Illicem, Juniperum, Cynosbatum, & reliqua infestant. In *Salice* humiliori, (præsertim quando gallæ tuberculosa erumpunt) nonnunquam quasi rosæ inveniuntur, quæ vermibus scatent, uti etiam in lentiscoli foliis accidit.

Illicis (inquit Quinquéranus) duo genera: alterum arborescens, alterum frutex exiguus, sesquipedali proceritate. Lætissimè viret, foliis lævioribus præfulgidis, spinarum vallo ambitis numeroso, stolone affurgit in modum rosarii: à nostris Fagi appellationem fortitus, quamvis nullam fagi imaginem repræsentet. Provenit locis planis quidem, sed in altitudinem evectis, exilibus & sitientibus collibus, sed infœcundis. Vere medio rorati imbris frutices, *Coccum* hoc modo ordiuntur. Ubi imus scirpus se in duo brachia fortitur, in horum medio primum omnium increscit rotundum quiddam magnitudine & colore pisi, hoc Matrem vocant, quod ex eo cætera grana producuntur. Matres porro habet ut plurimum quinque quælibet cespitum familia, quæ ineunte æstate æstuque minutissimorum vermiculorum catervam profundunt, fatiscuntque in summitate. In animalia prorepat nova soboles colore candida pro se quisque in sublime. At ubicunque vermiculi vel germinantis furculi axellis occurrerint, decident, & incrementis aucti Milli magnitudine fiunt. Inde liberius adolescentibus, albus color in cinericium transit, jamque non animal, sed Pisum rursus apparent. Tuncque ea grana maturitatem adepta colliguntur, jam coloratis vermiculis foeta: dum asportantur mercatoribus, ambiens pellicula præ teneritate rumpitur. Vermiculorum quidem qui circa vaginulam habentur pretium in libram quamlibet, aureus solatus: in granorum vero quæ adhuc eorum partem retinet, hujus quadrans. Torpent interim vermiculi, ac immobiles jacent. Cæterum,

quum primum tempestivitas adest, in lintea præcipitati Soli exponuntur. Tum libato colore statim prorepunt, atque aufugere nituntur, sed à custode, qui continuus assidet, concussu lintei in medium eoque rejiciuntur, donec emoriantur. Tanta quidem dum hæc fiunt, totoque mox triduo, odoris suavitate ac gratia, ut non Cibetæ, non Moscho, non Ambra, sed ne Citriorum quidem floribus concesserit. Si quæ verò grana legentis effugerint sedulitatem, ea mox alatorum animalium numerosum exercitum in auras effundunt. Observatum est uno anno ex campo lapideo, in Arelatensi agro, hunc proventum undecim aureorum millibus æstimatum. Hæc Quinquéranus.

Similis Cocci parandi ratio, etiamnum meo tempore (inquit Carolus Clusius) in Gallia Narbonensi, atque etiam in Hispania observabatur. Areas enim sub dio habent ad id destinatas eminente aliquantulum margine; quibus linteo panno instratis Coccum effundunt, custodibus eum bacillis summo fervore Solis perpetuo assidentibus, & extrema lintei concutientibus: ut vermiculos effugere properantes, in interiori lintei partem repellant. Verum Petrus Bellonius lib. 1. obser. cap. 17. aliam præparandi Cocci rationem refert. Cocci baphicæ (inquit) proventus in Cretâ magnus est: Pastores & pueri eam colligunt. Inveniunt mense Junio in exiguo quodam frutice ex Illicis genere, quæ glandem fert, sine pediculo inhærens illius fruticis stipiti, colore ex cinereo albicante. Quoniam vero istius fruticis folia spinis horrent, uti Aquifoliæ; pastores ferulam sinistra gestant, quâ ramulos deprimunt & inclinant. Dextra falcem putatoriam, quâ ramulos demetunt, à quibus vesiculas rotundas, exigui pisi magnitudine auferrunt, qua parte ligno adhæserant apertas & hiantes, plenas exiguis rubris animalculis lende minoribus qui per hiatum istum effugiunt, & vesiculam vacuum relinquunt. Pueri Coccum jam relictum ad Quæstorem deferunt, qui ex dimenso ab illis redimit. Is à vesiculis animalcula cribro segregat, deinde ea summis digitis lenitèrprehendendo in pilas efformat ovi gallinacei magnitudine: Etenim si nimium comprimeret, tota in succum resolverentur, & color periret. Itaque duo infectionis genera, unum pulpæ, alterum vesicularum, & quoniam pulpa inficiendo magis utilis est, ejus pretium quadruplo majus quam vesicularum.

In summis *Juniperi* furculis, exiles è croceo rubentes, Gesnerus observavit. In *Cynosbati*, sive rosæ sylvestris spongia vermiculi nascuntur albicantes, ex quibus Aristoteles Cantharidas provenire scribit. Post duos menses, (inquit Gesnerus) in hy-

pocaulsto fervata spongia magnum numerum vermiculorum viventium effudit. Spina item, & sentis, Rosa, Erica, Genista, Colutrea, Rubus Idæus, Myrtillus, Capparis, uva crispa, Carpinus, Oxyacantha, ligustrum, *viteæ*, glycyrriza, omnis denique frutex, & suffrutex à vermibus exeditur: neque Ricinus ipsè (Jonæ, divino illi vati, nimum exæstanti umbram præbens) ab hac peste legitur immunis.

PUNCTUM III.

De vermibus leguminariis & frumentariis.

Montenius Theatr. 2. c. 20.
Legumina sunt *σικωληνέες*: sed quomodo id eveniat incertum est. An quoties diffundi nequit humor ob æstum & squalorem, ut Theophrastus innuere videtur? An potius dicendum à sicco humorem appeti, humorem autem illum refugere tanquam adversarium? Sic pendentes arido parieti videmus guttas. An calor nimius corrumpit naturalem, cum calorem, tum humorem intus contentum? Sanè eò modo putredinem induci, morbidissima Æthiopia testis est. Fabas depascitur vermiculus, Midas Theophrasto, Hesychio *κλελθ* vocatus. *τρώξ* καὶ *κναματρώξ* vermiculus leguminaris dicitur, sed præcipuè in Pisifervans, & ab erosione nomen obtinens: qualis etiam in Cicere, posteaquam pluvii ab eo elota fuerit falsugo; ut præter Hesiodi Scholiasten Phavorinus & Theophrastus statuunt, leguminibus dulcioribus sæpè innascuntur, tum ob alimenti aptitudinem, & Elementi verminantem naturam. Dulcia enim vermes citò generant, generatosque nutriunt & signant.

Frumentarii dicuntur: qui tritici, filiginis, panici, avenæ, orizæ, milii, & fecalibus radicibus, stipulis, calamis, spinisque victitant. Eorum alii amylo vescuntur frumento, ut Farinarii, alii integro & mola nondum confraeto, ut Curculiones. Farinarios Angli Meale-wormes appellant, teredini similes, sepedes, capite parvo & spadiceo, corpore annuloso, & pro farinæ diversitate vario colore: proba enim & albißima farina, albos generat; vetustior flavos; macra & furfuribus immixta etiam fuscus. Cardanus eos Blattas frumentarias vocitat, sed (ut sæpè fit,) incogitanter. Furfure nutriti mirum est in quantam excrescant multitudinem, & ex decem trecentos brevi videas. Apud panni lanei textores quo vis ferè tempore inveniuntur: hic enim ex furfuribus, aceto & axungia mixturam faciunt, undè copiosissime nascuntur. Integri frumenti, sive tosti, ut in βύνη Aëtii (quam Mault Angli, cerevisicæ matrem,

appellant) sive crudi, strages curculio: sic enim rectissime meus Comicus, et si Virgilius atque Varro Gurgulionem, & Curculionem scribant.

κλς Græcis dicitur, Animal tirostrum. Triticum præcipuè sed etiam alia quæcunque vastat frumenta; præter cassam tenuemq; membranulam nihil reliquum faciens; nam ut Georgicorum vates, populatque ingentem farris acervum, Gurgulio. Ad Scarabei minuti faciem formatus, rostrum habet sibi peculiare, & trifurcum. Corpus aliis nigrum, aliis subfuscum, aliis, & majoribus subviride, cujus medium isthmus coarctat. Bestiolæ tanta est siccitas ut primo quoque tactu levissimo in pulverem abeat. Vere maxime generatur paucorum dierum spacio, antequam examina faciunt apes. Nascuntur (inquit Theophrastus) ex alia grani parte; quod vero reliquum est, pro cibo utuntur: rustici nostri *σητοφάγον* hoc animal in parietum rimis ac inter tegulas ova ponere pro explorato habent, unde per procreationem nova soboles. Tria de his bestiolis mira memorant. *Primum*, quod licet ab initio paucæ fuerint, brevi in infinitam sobolem propagantur. *Secundo* quod inter tegulas ac in rimis parietum triennium ac amplius ferè sine cibo vivunt.

Tertio, si una cum hordeo vel tritico per triduum submergantur, tandem exemptæ reviviscunt. Syliardus noster (diligens naturæ observator) *Curculionis* propagationem ita describit: Quum formicæ ariste culmen exederint, ascendit curculio, & per exiguum illud foramen, ovum unum vel alterum, (rarissimè tertium) deponit, magnitudine ferè grani milii, oblongum fulvum, liquidæ materiæ & fulvæ plenum: ex quo deinceps novus prodit Curculio. Datur in hoc insectulo uterque sexus; siquidem coeunt antequam hanc injuriam inferunt. Petrus Comestor ex fabarum corruptione provenire affirmat, cui præter Guillerinum de conchis nemo subscribit, ne curculionem cum Mida malè confunderent. Præter vulgo notum hunc Curculionem Joach. Camerarius è Germanorum horreis duos ad Pennium alios misit, ventre longe turgidiore; quorum unus subcineritii, alter viridis coloris. Est etiam in tritico (inquit Scaliger) Curculio quidam erosus, quem fortè Plinius Scarabei frumentarii nomine subintellexit.

Circa Lentzburg oppidum Germaniæ in agris reperitur Insectum, quod alii vepet, nonnulli Korne worme, quidam Kornevele appellant. Dicitur esse adeo venenosum & noxium, ut agricolæ aratro relicto obvium illud persequantur, & interficiant. Et rubro parvo nigricat inter segetes habitans, & grana comedens. Vermes in vitibus nati *Cocci* illos vermiculos æmulantur, quales in Pimpinellæ radicibus colligi

colligi putat, imo pertinacius instat Brassavolus.

PUNCTUM IV.

De vermibus Herbariis.

Herbarii nascuntur, in Violis, Cynara, Ocymo, Saccharo, Lupulo, Asphodele, Pimpinella, Dyssaco, Carlina, &c. *Violarum* vermes minutissimi conspiciuntur, & nigri, celeri repentes cursu; ut Jacobus Garetus, Pharmacopola diligentissimus, & simplicium cognitione inter paucos celebris, observavit. E radice *Cinarae* prodit vermis Hexapus, eruciformis, albicans, capite ex nigro rubescente. *Cinarae* radices qua rodit nigras reddit; ac tandem interire facit: tales item *Raphanus* producit.

Referunt, (inquit Cardanus) vermem in *rutæ foliis* inventum, lacte ovillo, eodem modo quo *Avellaneus*, ad magnitudinem non parvam enutriti. Vermiculus filius roris, Ocymique hospes, corpore ferè erecto, posterioribus pedibus haeret, dum prioribus locum, capet. Ex *arundine* saccharina, saccharum paratur, omnium quidem salium dulcissimus, & (ut vulgus medicorum existimat) putredinis omnino expers. Tamen fretus Scaligeri clypeo, in saccharo pusillum vermem, longum, pulicis colore, & (si rostrum adimas) Curcullioni persimilem nasci asseveramus; & saccharinum propterea meritò dicimus. Hujus item Bellonius mentionem facit.

Videtur etiam rara admodum generatio ejus Insecti quod Germani (utor Cameraarii verbis) Mayen-wormlein appellant. Quippe mense Majo sæpè cadunt rores infalubriores, qui si in lupuli folia incidunt, vertuntur in animalia, Hoppen dicta. Eorum aliquot inter millia unum interdum videris aliis longe majorem (quamvis ipse pediculus obesiorem vix superat) culutei circa ventrem circuli, dorsum striatum, cauda satis protensa, color maximam partem corporis subniger. Huic cum ros deficit alimentarius, reliquos sui gregis sigillatim devorat semper à proximo incipiens. Bombycum instar cutem mutat demum ubi totus ferè perlucet, deposita ultima tunica, capite & pedibus per gluten quoddam tenue folio affigitur atque ita emoritur. Hunc vermem lupularium vocare quid impediatur?

In *Asphodeli* caule vermis gignitur *Asphodelis* cum herbâ florere incipit, ex hujus Scapulis alæ sensim excrescunt, atque tum volueris factus, lares deserit. In *Persicariae* Siliquosæ & Cardui sylvestris geniculis extuberantibus, vermiculi nascuntur albicantes, ut in floribus *Pseudocaliae* purpurascens sublutei, in *Pimpe-*

nellæ radice miniati. *Apio* foeminae vermes lanuginosos; in *Fungis*, & *Brassica*, graciles, nigricantesque in *Acori* radice albidos sæpè vidimus. In radice *Emulæ* sive *Helennii* virentis & crescentis, vermis albus decem vel undecim articulis conspicuis oritur, ad pennæ anserinæ crassitiem; capite parvo & nigro, pedibus sex brevissimis, & colore anthracoco. Indorum reges (Aliano teste) in planta quadam vermem repertum igne tostum, secundis mensis adhibent, & pro cibo suavissimo blandissimo laudant.

In *Dyssaci* capite vel caule vermiculum vidimus exiguum, capite parvo pedibus sex nigricantibus, incisuris decem vel undecim. Primum caulis medullam illam spongiosam depascitur, eaque deficiente, per inopiam pabuli commoritur. Mensis Octobris initio facilè invenitur, quamvis Marcellus in Dioscoridem, insigni sanè audaciâ, id denegat. Hic est ille, ni fallor, quem Tatinum appellant veteres. Galedracon vocat Xenocrates plantam leucanthemo similem, (inquit Plinius) Caule ferulaceo, alto, pinosque capite, & oviformi: in hoc unâ cum ætate vermiculos nasci tradunt, in dolore dentium perutiles. In radicibus *Carlinae*, (quæ planta in excelsis Sabaudia montibus luxuriat) vermiculus reperitur, in quibusdam nascens, in aliis adolescens, in plurimis alatus, & avolare paratus. Albus est, in aliquot divisus articulos, oculis nigris conspicuus. Animalculi in potenti herba geniti usus in re Medica forsan eximius est: cujus curiosis secretorum naturæ indagatoribus disquisitio committatur.

ARTICULUS II.

De Vermibus qui in animalibus nascuntur.

Vermes in animalibus qui exoriuntur, superius quoque cum de pediculis ageremus attigimus: nunc omissa addantur: de quibusdam duntaxat qui in piscibus & quadrupedibus reperiuntur, agere placet, *Pisces* quod concernit, *Mullus* ideo sterilis est, quod in ejus utero vermiculi, postquam ter peperit, inveniuntur, qui semen absument, si Athenæo credimus. *Cyprini parvi* nigrum sub branchiis aliquando gerunt, qui eos in tabem deducit. Duodecem veluti uniones, inquit Bellonius,ervi magnitudine, carnosos tamen, candidos, & calli duritiem habentes, in quibusdam *Cernuis*, (sic vocat, teste Gesnero, percas fluviatiles) conspexi: quorum unusquisque vermem inclusum, gracilem, oblongum ac teretem contineret: qui ex venis mesaraicis dependerent inter colon & ileon,

Athen. Di-
nos. 6. c. 16.

on, ad eos anfractus, in quibus lactes esse solent. Circa Basileam omnibus dulcium aquarum piscium generi innascuntur, Leuciscis imprimis, quos Schwalen ibidem vocant. Albifunt, longi, convoluti.

Aestate afficiunt: & ex ventris durtie, magnitudine, & albore deprehenduntur. Quatuor lumbricos, in secunda Leucisci Rondeletii specie Gesnerus invenit; vivos, candidos, latos, exigua crassitie. Major, digitos ferè decem longus erat, latus dimidium. Idem sub finem Maij, in Cypri- no lato, aliquot offendit, ad digiti longitudinem, unum albicantem. Sed & *Gobio* vermiculos in ventre gestat.

Ex *Quadrupedibus* laborant iisdem, Equi, Oves, Lupi, Capræ, Boves, Cervi, Canes, &c. *Equis* in quavis ferè corporis parte exoriri possunt. Paschalius ventris facit crassos & albos: gutturis, breves, rotundos, & crassos, qui etiam aliquando in intestinum rectum descendant: inter costam natos, longos, & capillorum instar tenuis. Ruinus quatuor *lumbricorum genera* in eorum intestinis exponit. *Crassos* & breves, in modum pistachiorum sanguineos. *Longos* rotundos & albos, qui terebibus in humano corpore respondent. *Parvos* ac tenues, *Tarme* Italici, qui quandoque cum facibus egrediuntur. *Ascarides* fortè. Nam se foramini recti intestini copiose ingerunt. *Breves* denique & crassos instar fabæ, pilosos, qui se interiori recti intestini parti applicant. Brassavolus in pullorum ventriculo, ingentem copiam rubrorum & seminigrorum Ferrariæ reperit, feminis cucurbitæ forma. Ruinus propè stomachum, in equis mortuis, plusquam centum, pistachii ferè magnitudine, sanguineos, qui prima stomachi membranaerosa, ad secundam pervenerant. In *ovium* hepate reperiri, nullum dubium. Adhærent & bifidus eorum ungulis. In cava vena diebus canicularibus, Coiterus invenit. *Lupis* in vulneribus & ulceribus facillime oriuntur. Ideo fortè lapides, ne lædantur, pertimescunt. *Caprarum* gregiarum caput, multis vermibus juxta cerebri basin naturaliter affixi, scripsit Trallianus. *Boves* sub lingua, nec non inter cutem & carnem sapissimè affligunt. In cerebro *Cervino* semina cucurbitulæ æmulantur, in aqua mortui videntur, in vino reviviscunt. Propè vertebra nati, iis qui carnes foedant, similes sunt. *Canes* sub lingua vexantur, *πασα* vel *αλλα* Græcis. Alii, nervosam quandam congeriem dicunt, quæ canicularibus inflammata, rabiem concipere opinantur.

Huc pertinent *μύσες*, qui in carnibus nascuntur: *Tarnia* qui in lardo. *Meldera*, qui in caseo. *Cleri*, qui in favis apum. Habent & Locustæ, postquam pepererunt, circa fauces suas, qui eas strangulant. In-

venti & in phalangio duo. Qui in mortuis corporibus reperiuntur, vel ulceribus Chirurgorum aliquando incuriā, *βλαψ* Hippocrati & Plutarcho, *σάρα vermina* Lucetio, *κακὰ ὄντλα* Suidæ, dicuntur. Sunt vel caudatæ, vel caudarum expertes. Gallinæ utrisque vescuntur. Democritus eorum ex Oraculi consilio usu, & Theognosti Democratii ductu, à comitali morbo liberatus est. De *Fuga*, & quomodo occidantur, veterinarios vide.

ARTICULUS III.

De Vermibus qui in homine.

DE vivo homine res est. Nam ex cadavere exurgere certum: natumque aliquando ex medulla spinali serpentem, Camerarius author est. In variis però illi membris reperiuntur. In *Cerebro* nascit, testantur, Hollerius, Thomas à Vega, Cornelius Gemma & alii. Frequens id olim in Hungaria & Germania: quique laborabant in phresin & maniam incidere solebant. Unicum in allio, quod cum vino sublimato exhibebatur remedium. Vir apud Benivenium robustus è dextra nare palma longiorem eiecit. Prodiere ex *auribus* in peste, iique crassi sed non ita longi. Hinc *ὡς σκωληκίδων* Dioscoridi.

Vidit & Valescus de Taranta duos vel tres, granorum pini magnitudine, crassiores tamen. Sub lingua nasci, Montuus author est. In *Dentibus* Sinones à quibusdam vocantur. Battæo Syriæ Monacho ex nimia inedia, enatos fuisse, Sozomenus tradit. Per *oculi* iteriorem partem puellæ trimæ vermem semipalmarem, album, eductum, Amatus Lusitanus scribit: Stabulari aliquando in aspera arteria, Avenzoar, in pulmone, Aloysius Mundella, in vesica & renibus, Dodonæus, Rondeletius, Fernelius & Jocatius; in utero, Priscianus & Garzias Lopus, testes sunt. Ejectus ex petore per tussim; egressus per penis meatum & quidem spontè unus: minxit quidam Perusinus parvos & latos: Italus quidam elychinii crassitudine, vivos & rubentes, vide & apud Mousetum exempla. Exiit per uteri collum magna multitudo. Prodiit & ex polyposis naribus postquam foliorum tabaci succo cruciaretur. De eorundem mixtu, Tulpium consule. In brachiis, cruribus, furis, & cute reperiri, Dracontia puerorum, Niguar seu Toni Americanorum, & Indorum Orientalium, ostendunt. Quid plura? Nec cor fortè liberum erit.

Dari enim & in sanguine lumbriciformia animalcula, corpus exesura apud Plinium habetur. Cum semine ejectos, apud Plutarchum. Et qui non nascantur ibi vermes, ubi angues bifidi flagellati, ut in Appendi-

Ruin. de
morb. e-
guor. 4. c. 1.

Trallian. l. 3.
17. 2. c. 3.

Vincent. l.
39. c. 6.

Holler. l. 1.
cap. 1. Vega in
c. 5. de locis
afflictis Ga-
leni
Gemma in
appendice o-
peris Cosmo-
crit.
Beniven.
Exemp. c.
100.

Mont. tomus
4. c. 19.

Sozom. H.
Eccl. l. c. 34.

Lusitan. c. 7.
VII. cur. 63.

Mundella
Dialogo 4.
Dodon. ad
Beniv. c. 78.
Rondelet. de
diagnos. morb.
c. 17.

Mousetus
Theatri Inf.
2. c. 30.

Tulp. obser. 2.
c. 49. 50.
351.

Plin. H.N.
26. c. 13.

Appendice ad serpentes diximus; inventi sunt.

In intestinis qui hæerere solent, sunt *Latiti*, *Teredes* & *Ascarides*. Priores omnes ætates infestant, Græcis ἐλμίνθαι παταεῖαι, & κηελαι, Latinis propriè Teniæ. Per tota enim aliquando extenduntur intestina, corollæ in se ipsam ductæ instar. Tricenum pedum esse notat Plinius, Platerus quadraginta vidit. Partes eorum non ita exactè semen cucurbitæ referunt, sed ubi abrumpuntur, & moram aliquando jam semimortui trahunt, pars quæ ad latera tenuior, putrescit: quæ verò in medio veluti nodus, figuram feminis cucurbitæ vel cucumeris refert. Quatuor historiæ apud Fabricium

Hildanum vide. Ad hos illi, qui σπινειδῆς seu *cucurbitini* vocantur pertinent. Ideo quibusdam alterum Teniæ genus. Ex partibus multis, quarum singulæ semen cucurbitæ referunt, constant. Ex his illum fuisse putato quem Lusitanus describit, quatuor cubitorum, latitudine femiunguis exigui, albus, capite verrucoso, ex quo totum corpus procedebat, quem mulier Illyrica tussicula vivum. eiecit. *Teretes* σπογγόλοι, seu rotundi Græcis, si magnitudinem spectes, sunt aliquando, longitudine sesquipedali, quinque pedum sæpe, nonnunquam palmam non excedunt: si colorem, sunt, rubri, flavi, nigri, ex parte albi vel fulvi, & virides: si constitutionem, visus est rubro capite, pisi magnitudine, lanuginosus, cauda lunata: visus dorso lanuginoso, pilis rubris confito, &c. Platerus octodecem ulnarum exsiccatum habuit, quem Moufetus vidit. Trecentorum pedum longitudine ejectum, Plinius auctor est.

Ascarides ἀσπὶς ἑσπεῖν, quod mordicationem & pruritus excitent; vel ab ἀσκα-εἶω moveo, dicuntur. Veteres *jumentarios* dicebant, quod sæpius in equis, & boum genere apparerent. Sunt lumbricis terrestribus similes, sed unciam raro superant. In extremo languore reperiuntur.

Dantur præter hos & *Monstrofi*. Benivenerius unum pedibus quatuor, cauda novæ lunæ instar falcata, digitorum duorum longitudine observavit: Gabucinus, nigrum & pilosum: Capriana, binis cornibus flexilibus, & centum utrinque pedibus subviridem, & qui mire progrediebatur. Rondelet. Scolopendræ similem, sine oculis. Schenckii filius variantem, rostello acuto sanguineo excrevit. Rusticus apud Wierum octopedem, rictu oris capiteque anati simillimum Anguillæ similem, &c.

- Plura apud Aldrovandum & Moufetum invenies.

CAPUT. III.

De Teredine & Lumbrico terrestri.

DE Teredine pedata, superius cum de vermibus plantariis ageremus, egimus. *Depedis* meminit Agricola, quem ab æneo colore *Rupferwurm* vocat. Serpit, inquit, quia & pennis caret pedibus. Crassitudo ipsi quasi parvæ anserinæ pennæ, longitudine scolopendræ. Teres est; sub lignis putridis natus, & plerumque juxta scolopendram inventus.

Aldrovandus quatuor teredinum genera constituit. *Unum* Plinii & Theophrasti, quod dentes habet & duntaxat in mari in lignis reperitur. *Alterum* Vermiculus dictum; *Tertium* Thris, *Quartum* Cossium quem vermem multipedem in lignis quidam faciunt. Ipse observavit vermem pili longitudine in ligno nascentum, colore album, figura fere Erucae sylvestris similem. Linea in dorso à capite ad caudam usque conspicua, more Erucarum repentem; fere, undecem in singulis lateribus, punctulis quibusdam castaneis, ore nigro ex duobus veluti introrsum se curvantibus dentibus confecto; qui admodum constringebantur, plusculis prope os pedibus. Ex ore succus quidam viscidus, lentusque emanabat. Hunc vermem *Cossium album* existimat.

Multæ tamen sunt arbores quæ teredinem non sentiunt, ut tilia, quamvis corticis & foliorum succus dulcis sit, ob odorem; buxus, ob duritem; abies circa germinationes decorticata; Mori materiem æternam Theophrastus reliquit. Alexandri verò Magni comites prodiderunt, in Tylo rubri maris insula, arbores esse, ex quibus CC. annis durantes inventas, & si mergerentur incorruptas. In eadem esse fruticem baculis tantum idoneæ crassitudinis, varium, tigrium maculis, ponderosum: & cum in spissiora decidat, vitri modo fragilem &c.

Lumbrici terrestres Græcis γῆς ἐντέρεα, δειλόν, ἀλάκται, Siculis γερᾶναι, quod terram comedant; Latinis *Intestina terræ*, Monardi *Oniculi* & *Nisculi* dicuntur.

Duo ipsorum genera Lumbricis intestinalibus quidam sunt similes, alii *Ascarides*. Illi colore sunt interdum subalbido, interdum subsanguineo: & pluviis cadentibus subito è terra prodeunt. Hos qui parvi, non unius ejusdemque coloris dicit Agricola. Sunt candidi, lutei, sæpiusque aratre excitantur. Vassant sata radicibus subsectis. Ad eos pertinent *Zuccarole*

Italidis dicti, crassi, longi paulò minus digitum. Sub aëris æstum, è terta prodeunt. Terra pingui aluntur, & dulci radicum succo. Ex eodem nasci, Gaudentius Merula scripsit. E terra egresfos coivisse observavit Aldrovandus. *Tangunt se tandem modo, inquit, plusquam dimidia fere corporis parte, atque ita arctè sibi invicem adherent, ut non nisi pedum duriusculo calcatu & frictione abstant. Videtur autem uterque cum coeunt, unus lumbricus in medio corporis paulo crassior cæteris.* Pluviam præfagiunt, si pertusa quasi terebello humo, affatim foras erumpant. Terra namque ab Austro & aëre vaporoso madefacta, perfacile iis transitum largitur. Inserviunt in esca piscibus, avibus, turdis in primis & cornicibus. Sed & gallinæ iisdem victitant. Haud spernendi & in *Medecina* usus. Profunt ad ictēritiam tollendam si pulverizati in vino vel commodo vehiculo exhibeantur: contra arthritidem scorbuticam vagam, si cum fabina, aristolochia, &c. exhibeantur: in nervorum vulneribus si triti imponantur: in calculo si ex vino passò bibantur. Mercurialis in lactis defectu nutritibus cum nucleis pini, amygdalis, semina petroselinæ, feniculi, rapis, &c. exhibet. Ex iisdem oleum lumbricorum componitur. Lixivio, & amaris aquis occiduntur. Aqua verò, in qua semina cannabidis decocta sunt, ad superficiem proliciuntur.

CAPUT IV.

De Limace.

Aldr. Hist.
Inf. l. 6. 10.

Limacis nomen testudini terrestri perperam Albertus imposuit. Distinguit & à Cochleis Plinius & quoties cochleas vocat, nudas adjicit. Nominis rationem locus suggerit. In limo enim nascuntur. Nec apud Græcos peculiare nomen habent.

De *Forma, Genere & Differentiis*, ita scribit. Aldrovandus. Limacum, seu nudarum Cochlearum, aliæ magnæ sunt, aliæ parvæ: Magnæ Germanis à colore ruffæ dicuntur (quanquam in hoc genere etiam nigrae sunt) de quibus sentire scriptores quidam docti putant, cum ad medendum cochleas nudas postulant: Parvæ gregatim folia sectantur, & hortos infestant, cinerei, aut fusci coloris, & hæ quidem semper nudæ sunt, quod sciam. Plin. Limaci magnæ similem esse scribit echinum. Sunt vero partium distinctiones, ut Scaliger annotavit, in hisce animalculis admodum obscuræ, quæ hic exprimuntur primo loco, ex cinereo nigricant, albis per tergus maculis, cornicula exerunt, quatuor è capite, quibus iter prætendunt. *Tertia* tota nigra: postrema cinerea albis maculis per


dorsum, iisque longis varia. Albertus in eorum extremo sitos habere oculos asserit. Plinius cochleas hæc nudas sive Limaces non tamen omnes in capite lapidem gere memoriam prodidit, idque verum esse docuit quotidiana experientia: nonnunquam ossiculum, ut post patebit, idem Plinius nominat. Cardanus Limacium lapidem vocat his verbis: Limacius lapis in capite Limacis, quæ cortice non integitur, solet generari. Hunc ut ostendere possum candido colore, & aspera superficie esse oportet, quod ex aquæ substantia coactus sit, & ob id etiam parvus, quod in parvo animali inventus. Lapillus quem ego propriis manibus eximi è capite nudæ cochleæ, postquam in multis frustra quæsissem, albidus erat fabæ ferè magnitudine, multò tamen humilior, compressusque magis, modice transparens, inæqualis, admodum glaber, parte altera planior, altera velut in oculum protuberans durus, sed dentibus friabilis, ita ut in arenulas atteratur. Venduntur, & alii lapilli multò majores, magis protuberantes, minus candidi, obscuri intus foveam habentes, sed ejusmodi è nudis cochleis eximi non puto. Noctu potius, quam interdum animalia isthæc ad pascua exeunt, degunt autem non modo in campis & hortis, sed in cellis vinariis, larinis, cloacis & aliis subterraneis, uliginosisque ædium locis.

De *Usu* hoc habet. In Africa quasi ^{Usus.} dam edi, si Brasavolæ credendum. Ex iisdem in Medicina, sale gemmeo aspersis, & cum aqua Limonum infusa insolatis, donec quasi in unguentum abeant, Cosmeticum ad faciem lævigandam fieri. Illinitur, & mox aqua florum fabarum abluitur. Profunt in *ulceribus pedum*, si vivæ comburantur, cinis cum thure & albumine ovorum superlinatur: in *hernia*, ruffæ in primis, si emplastris illinantur: in *verrucis & ganglis* tollendis, si ex bene salitis liquore colligatus, iisdem affricetur. Producent in juvenis pilos ruffæ, si ex exenteratis & sale aspersis unguentum fiat. In iisdem, ex fero acido tepidè propinata, sanguinis per venicam & anum excretionem cohibent.

Lapillus qui in capite, quartanam solve ^{Plin. H. N. l. 30. c. 15. l. 29. c. 6.} re solet. *Ossiculum* quod in dorso reperitur, ad dentitionem alligari jubent. Inter duas orbitas inventæ, per aurem cum ebore trajectum, vel pellicula canina ad alligatum, doloribus capitis medetur. Mizaldus stranguriis prodesse scribit: nec non parturientibus, loca ipsa laxando.

†
*

HISTO-



一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

HISTORIÆ NATURALIS

D E

I N S E C T I S

LIBER IV.

De Insectis aquatibus.

TITULUS. I.

De Insectis aquaticis pedatis.

CAPUT. I.

De Insectis aquaticis paucipedibus.

ARTICULUS. I.

De Squilla, Locusta, Scorpione, Notonecta, Cicada, Anthreno, Forficula, Lacerta, Corculo.



INSECTA aquatica, in Pedata & Apoda distinguuntur. Illa vel paucos vel multos pedes habent. Paucipeda sunt, Squilla, Locusta, Scorpio, Notonecta, Cicada, Anthrenus, Forficula, Lacerta, Corculus, Musca aquatica, Cantharis, Scarabeus, Tipula, Attelabus Arachnoides, & Ligniperda seu Bellonii Phryganium.

Squilla primus, quod sciam, meminit Rondeletius, sed crustatae duntaxat. Pedes ternos utrinque habet Cauda in duo longa & tenuia veluti fila desinit, caput rotundum & compressum quatuor corniculis instruitur. At Moufetus plura genera observavit, & icones expressit. Squilla insectum, inquit iste, à Squilla pisce parum differt, nisi, quod & breviores multò antennis, colorem magis spadiceum vel terrestrem potius obtinuit. Horum alii testa fragili obducuntur, alii plani sunt & nudi. Testacei in rivulis praesertim, degunt, arundinum vel gladioli radicibus adhaerentes; colore sunt subflavo, nonnunquam autem albicante atque cinereo. Sex tantum pedibus incedunt, reliqui hic appendices pinnarum munere funguntur. Nudi, vel molles sunt vel crustacei: Molles figura haec constat satis, modo caput spadiceum; reliquum verò corpus obsoleto cinere tinctum imaginemur. Crustaceorum genera omnia articulata sunt, sed aliis globosi articuli, aliis alii: globosi

effigies graphicè hic representatur, si ipsam leviori spadiceo mollius attigeris. Talis primi & secundi non globo si color. Tertia autem species dorso nigricat; ventre fusco: at omnibus os forcipatum & apppositi pertinax. Quartus prioribus tribus pedibus se movet, ceteris appendiculis pro remis utitur. Collum illi & antennae forcipesque minio dilutius illitæ; corpus fuscum, vel magis cinereum. Quinto caput longè nigerrimum; corpus planè malicorio simile. Sextus à népal^o videtur, ea quam vides forma & colore cinereo. His omnibus oculi duri, picei, membrana vitri modo perlucida obducti, qui non minus continuo moventur, quam quadrupedum aures. Assultant illi protinus, ut Squillæ pisces, in coitu, & ubi licentia audacia crevit, implent famellam. Hoc tempus speculatus index morsu levi significat: illa ore compresso quicquid inclusit exanimat, partemque socio tribuit: coeunt enim ore, cancrorum more & locustarum. Quem verò in Medicina usum sortiuntur, nequeo ex scriptoribus vel Empyricis ullis, quibus vel ignoti Squillæ vel despecti videntur, recensere. Id tamen constat, mense Aprili & Majo, nihil ad pisces inescandos utilius haberi posse.

Locusta piscem imitatur. Colorem habet pallentem cum virore. Scorpionum palustrium tria vidit, atque habuit genera Moufetus. Primus nigricabat nonnihil, reliqui arenam candicantem referebant.

Notonecta non ventre ut alia, sed spina innatant. Horum alii oculi, scapulae corpusque nigricant, alii virescunt, alii pyropum, alii picem referunt. Rarò duos ejusdem videris coloris.

Cicade fluviales, & ventris latitudine & pedibus natant, utrinque ternos habent, postremi longissimi sunt. Hoc à terrestribus differunt, quod capite sunt magis exerto, & cervicis aliquid habere videantur.

Anthreno fuscum ubique corpus, oculis piceis exceptis.

Forficulae idem ferè color, sed magis saturus, carere oculis videtur, sed intus conditis cernit atque dijudicat objecta.

Lacerta varii coloris est, & piscatorum gaudet intuitu. Circa rupes Britan-

nica non infrequens, ubi piscibus infidiatur.

Corculus cordis effigiem, pedibus capiteque demptis, scitè exprimit. Ocellos habet perexiguos & nigros; tibiae sex colores, duobus digitis instructos.

ARTICULUS II.

De Musca aquatica, Cantharide, Scarabæo, Tipula, Atelabo, Arachnoide, & Ligniperda

Rondel. de
fluvialil.
c. 40.

DE *Musca aquatica* ita Rondeletius. Muscas volantes, in aquæ extremitate sæpè vidimus æstâte. Oculis sunt magnis pro corporis magnitudine, dorso rotundo, ventre plano, senos habent pedes, posteriores majores ad corpus in aqua impellendum. Inter natandum geminas alas extendunt. Quare & in aëre volare, & in aqua natâre possunt. Natant ventre in cœlum converso, contrario situ volant. Utrumque per vices faciunt. Venter lineis nigris & viridibus distinguitur, his pisces infidiuntur.

Aldrov. H.
Inf. l. 7. c. 1.

Vide verò quæ de iis in Muscis diximus. *Cantharides*; in paludibus circa lacum prope Bononiam, reperiuntur, quæ per superficiem (placet hæc & sequentiâ verbis Aldrovandi describere) aquæ modo irrequieto huc illuc circa eundem ferè semper locum mira celeritate se trajiciunt: nec in summo tantum, sed etiam profundius feruntur. Magnitudine, & forma Cimices referunt. Crurcula senu habent subruffa. Vaginæ è nigro virides, præsertim ad solem, & splendentes alas tegunt sed non penitus: ad caudam enim alarum extremitas prominet, quæ cum in aqua celeriter feruntur ut solent, mirabili candore, splendoreque conspicuo argentum vivum quodammodo refert: Unde, & *Pygolampides*, si quis appellat, nomen ipsorum naturæ conveniens posuerit. In aërem si prorepserint, volare etiam possunt. Icon earum hæc est. Cum de Scarabæis ageremus, diximus etiam aquaticos dari. Eos audio esse majusculos corpore lato, compressoque, & à Germanis *Wassergugen* appellari, & in quarumvis aquarum fundis reptare. Sed videre eos mihi necdum licuit. Observavi verò Insectulum quodpiam; vel ex Scarabæorum, vel ex *Cantharidum* genere: Rustici violam aquaticam dicunt *Cantharide* minor est, forma oblongiori, angustiorique utrinque in acutum desinens, atterrimo splendens colore, duas juxta rictum appendices breves habens, seu cornicula, senos pedes colore ferrugineo. Observavi & aliud Scarabæi

aquatici genus; Scarabæo stercorario minori per omnia simile, nigerrimum, coleopteron, gressu, corsive, celerrimum, saliens etiam dorso impositum, maximo nisu in aëra se vibrans, subsultim in ventrem se convertit: pedes habet inæqualis magnitudinis: priores breviculi ad gradiendum tantum apti sunt, duo postremi, cum ad natandum servire debeant remigum loco, multo sunt longiores: aliis verò illis communibus, æqualis pedum omnium est magnitudo. Hujus icon postea dabitur una cum *Tipulis*. Inveni & aliud in horti publici vasis aqueis, in quibus plantæ aquaticæ conservantur. Insectum è Scarabæorum genere, superiori in eo plurimum differens, quod anteriores pedes haberet duplicis usus, nimirum ad natandum & gradiendum. Sagacissima enim natura latissimos eos fecit in medio, haud aliter, ac avium aquaticarum pedes sunt, & ne latitudo (rotunda, ac cava) ad ingressum non esset inutilis, eosdem in extremo rursus fecit exiles, robustos tamen & hamatos, ut eis unâ cum duobus subsequenteribus, qui contigui sunt, ac æque longi, ea carentes latitudine, ad progrediendum uti posset. Postremi pedes duplò sunt longiores, in extremo velut in pinnam molliusculam desinunt, in medio ventris siti, longè à primis, qui sunt in pectore. Horum quoque duplex est usus, ad natandum, seu potius ad natatum regendum, tanquam pinna aliqua, aut cauda, & cum cubat in dorsum, (apricatur enim libenter, & apricantem ego cepi) ad insiliendum. Salit enim cum in dorsum cubat, iis sese ad saltum à terra elevans. Cum cubat in ventrem, vel omnibus pedibus insistit, hosce posteriores tanquam ad incessum inutiles per terram trahit. Coleopteron est hoc insectum vagina testum durissima, ventre quoque durissimo, ac propè osseo, color ejus ex atro ad castaneum nonnihil vergit. Antennas à lateribus capitis erigit adeo exiles, ut visum pene fugiant, castanei coloris. In summa elegans animal est.

Tipularum, quæ etiam *Macropedii*, *Pedones*, & *Gruinæ* à pedum longitudine, *Moufetus* quatuor, Aldrovandus duas observavit differentias. *Prima* *Moufeti* species est tibiis longissimis araneo sylvestri similis, corpore ferè ovali, cinereo albicante, alis argenteis, oculis nigerrimis prominentibus, antennulis duabus brevissimis, cauda mucronata: volat subinde (ut *struthiocamelus*) quasi gradiendus: aliquando tamen in aëre volat, sed nec longè nec diu. Lucis adeo est appetens, ut lucernæ amore sæpè conflagret: autumnò in pascuis & pratis frequens cernitur. Sed hæc de mare. *Fœmina conformis* videtur, sed paulo nigrior, & caudæ mucronem quasi demorsum obtinet. Has Angli, Schep-

Mouf. Thea.
ari Insect.
l. i. c. 11.

Schepherds vocant: id est opiliones, quia tibi oves vescuntur ibi sapius apparent. *Secunda* Tipula caput magis habet, oculos prominentiores, antennas quatuor exiles, corpus luteo nigroque colore varium, alas obscuriores. *Tertia* ferè similis, sed corpus totum luteum 6. vel 7. maculae nigrae magis adornant; habet item tam mas quam foemina caudam trifurcatam. *Quarta* species rara & perelegans videtur, capite & maxime ore furcato, scapulis turgidis, brevioribus pedibus, corpore duplo cæteris crassiore, dorso nigricante, ventre & lateribus croceis, cauda mucronata & nigra. In sepibus versatur æstate, rarius in campis reperitur. Coeunt dictæ tipulae averfis caudis, atque ita volant; recurvantur tamen quandoque velut in complexus. Aldrovandus bina Tipularum genera observavit. Prius in aqua stagnante scrobis, foveæve, cui cannabim macerandam immergunt rustici Bononienfes, quæ ab eo usu Maceratolo vocatur, inventum, longum erat integrum palmum, colore fusco. Attelabo sive locustæ apteræ non absimile, nisi quadrupes fuisset. Antennas binas, sed articulatas, propè medium, extremo nonnihil deorsum reflexas, ac hamatas unico anicularum unguiculis simili, quibus obvia apprehendit, altera nempe articulo reliquæ antennarum longitudine annexas. Capitulum exiguum ante exigua appendice, velut corniculo acuto armatum, figura fere trigona, ocellis utrimque eminentibus atris; ac splendidis immobilibus instructum. Alarum est pennis quaternis longis, & angustis, subtilissimis. Caudæ loco appendices binas longissimas filamentorum instar, statim ab ano dispartitas gestabat. Pedes quaternos, singulos tribus articulationibus distinctos, nempe ob longitudinem, sed imbecillimos, quales ferè Araneis sunt, anteriore corporis parte, pectore locatos. Unde cum in aquis degant, Belgæ & Germani, ut audio suo idiomate Waterfpiennen vocant, id est araneas aquaticas. Collum à capite subest oblongiusculum, quod à ventre paulum latiore excipitur, & ipso tandem in acumen paulatim extenuato. Dorsum ei erat planum, quod alis tegitur, ac ferruginei coloris. Venter supinè utrimque in fulcum conspicitur exculptus, prominente medio tereti, seu cauliculo herbæ cujusdam, ut polygoni foeminae internodiis, ac geniculis quinque quos annulos vocant, secto. Horum singulorum interstitiis macula, seu punctum nigrum conspicitur. Cum itaque quadrupes sit hæc Tipula, ab ea quam se pedem Festus esse dicebat, plurimum differt. Sed & hanc observavit. Mira corporis levitate, & pedum agilitate aquis quoque inambulat, oblongiusculum, & angustum, sed priore multò minus, & multis ab illa parti-

bus discrepans. Sepes est nec alatum, nigrum toto corpore; sine cauda, sed antennas exiguas, veluti filamenta subtilissima ante gerens, quibus etiam ingreditur nonnunquam. Est, & aliud genus inter hanc, & majorem medium Vere, ut Aprili aquis supernatans, ac repens, corporis figura majori planè simili, sed & multò minus, oblonga caudæ appendice carens, & maculis in ventre, quarum loco in mediis alis nigris albidam teretè gerit.

Attelabum arachnoidem nominat Aldrovandus insectum quoddam, Aranei speciem ferens, sed sex tantum pedibus dotatum, colore cinereo, ac vulvæ, seu fundi lutosi (in quo sese occulit, aut summa superficie ejus sedet, aliquando reptans, nonnunquam natans) adeò simili, ut nisi linceis oculis data opera diligentissimè intuenti eum deprehendere, aut observare non liceat. Rictu ferè est Locustæ, ocellis utrinque altè satis extantibus, cætero corporis habitu non male araneum referens, alvo tota annulis pluribus secta, parte pro-na compressa, supina nonnihil rotunda, ita ut mediam quandam formam inter Araneum, & Attelabum, seu locustam apteram brevem habeat.

Ligniperdam aquaticam non videtur Aristoteles agnovisse. Etenim festucas, lignave colligere eam scribit, quibus sese induat, atque cum post eis spoliatur, emori, cum ejusmodi animal, quod Ligniperdam aquaticam nominavit, spoliatum suis festucis, quæ variis ex partibus herbarum constant, minimè moriatur, sed subinde novas festucas recolligat, in quarum vertice exiguum ligni, at non cujuslibet, sed quod levitate sua aquis supernatare cognoscit, portiunculam supra cervicem suam, ne mergatur, immiscere novit: alioqui à terrestri nihil vel parum admodum differt. Bellonius Phrygium vocare videtur, & sic de eo scribit, Phrygium fluviatile æque, ac marinum dejectamentum, Galli Charree appellant, quod cinereum excrementis sit persimile. Pisciculus est, aut potius vermiculus, quo piscatores utuntur pro esca: sic appellatus, quod phrygana, id est, fremia, sive festucas, sive thecæ, aut tegumenti lateribus, filo tanquam araneæ ab ejus ore dependente (novit enim nere ut aranea) agglutinans circumponat, ex quibus augescens, casam ampliorem sibi construit. In quo pinnoterem imitaretur: nisi pinnoteres sibi ipsi domum facere nescirent. Senos utrinque pedes habet, quibus in aquæ etiam rapidissimæ rivulis incedit: nare etiam nescit. Estque animal tenue, oblongum parvæ Erucae simile, quem avidissime appetunt Trutæ. Est enim profluentibus aquis, ac torrentibus frequens: Eo etiam pisciculi, si sua theca, seu involucro nudetur, affatim capiuntur. Chrys-

sippus Philosophus, inquit Plinius, tradit, Phrygium alligatum remedio esse quartanis: quod autem esset id animal, nec ipse descripsit, nec nos invenimus, qui novisset.

Quid de eo sentiat Gesnerus, vide apud eum & Aldrovandum.

CAPUT. II.

De Insectis aquaticis multipedibus.

INsecta aquatica polypoda sunt *Tinea*, *Pulex marinus*, *Pediculus marinus*, *Asilus aquaticus*, *Scolopendra marina*, & vermes in tubulis delitescentes.

Aldr. Hist. Inf. l. 7. c. 2.

Tinea vermes sunt perparvi, & quia convolvi solent, minores aliquando, colore albo, *pedibus* plurimis per totius corporis alveum contiguis, & mollioribus. *Cauda* oblonga in alveum definit. *Oculi* sunt perexigua puncta alba, cum centro longe minutissimo. Reperiuntur in fontibus bonis & frigidis, Martio præsertim mense. In terra propter pedum seu molliem seu multitudinem (nam & ab ore veluti pedes prominent) progredi nequeunt: in aquis, corpore in latus alterum inclinato currunt; & nisi fallor, retrorsum quoque incedunt. Cum aqua epotæ ventrem inflant; & largo haustu vini pelluntur. Forte & therebintinæ, oleo, butyro, lacti & fero cederent. Gesnerus Galli easdem cum Scrofulis quas Agrovellas vel Escroelles vocant esse putat. Multipedes sane faciunt, corpusculo brevi, cauda reflexa, inveniri que in fluviis, puteis & fontibus.

Arist. Hist. Anim. l. 4. c. 10.

Rond. de Piscib. l. 18. c. 27.

Pulex marinus, qui Aristoteli *ψύλλον γυλάτιον*, Rondeletio est tenui crusta instructa bestiola, quæ facie homines ridiculos pictos, aliis partibus locustas repræsentat: & tam parva ut particula corporis nisi ab oculato, discerni non possit. Gignuntur, inquit, in profundo mari tanta fecunditate, ut escam ex pisce confectam, si diu in imo manserit, totam corrodant. Aldrovandus hunc inter crustata refert. Niphus cum *Scolopendra marina* confundit. Kiranides minimum animal, quo piscatores utantur, esse dicit: salireque per litus. Moufetus *Asellum marinum* vocat, & sic describit: *Pulex* sive *Asellus marinus* squillam molliorem refert, nisi quod quatuor tantum pedibus (pace Gesneri dixerim) donatur, & frequentibus longisque salibus se liberat, à numero pedum. *Asellus* dicitur à saltu, Aristotelis *pulex*: à dorso gibboso, *Scrofula* nuncupatur: color illi lividus cum nigredine. Longitudo fluvialium digitorum transversum: latitudo, semidigitum non superat: marinorum major dimensio, qui litore refluyente, & in aquis

dulcibus sæpe conspicitur. Venatoribus item spectatoribusque mirum agilitatis præbet exemplum.

Hunc cum *Psyllio* herba decoctum, & de collo suspensum rigorem tertianarum fugare; cum aqua marina aspersos, pulices pellere; tres in lapide pforite, qui & porus, sculptos; sub calamo viridi manentes, cum radice herbae *psyllii* reclusos, contra morbum comitalem, amuletum esse scribit Kiranides. Meminisse eorundem videtur Plinius, cum dicit: *Adeo nihil non gignitur in mari; ut Campanarum etiam æstiva animalia, pernici molesta saltu, aut quæ capillis maxime calat, existant: & circumglobata escæ sæpe extrahuntur: qua causa somnum piscium in mari noctibus infestare existimatur.*

Rondel. de piscib. l. 18. c. 28.

Pediculus, qui Aristot. *ὄβειρ γυλάσιον*, duplex ex Rondeletii sententia est. *Unus* qui in mari, quod à Cyrene ad Ægyptum, circa Delphinum est: qui omnium pinguis pabuli copia evadit, quæ à Delphino suppeditatur. *Alter* est, quem hic depinximus, majoris fabæ magnitudine & latitudine, scarabæo terrestri similis, corpus ex aliquot tabellis, veluti locustæ vel squillæ cauda constat: ante os duo cornua breviter habet: utrinque pedes multos, incurvos, in acutum definentes. Piscibus ita hæret ut eripi non possit. Sugit ut hirudo, nec prius abscedit, quam tabidum & exsuccum piscem reddiderit. Reperitur cervici mugilum, luporum, & saxatilium piscium affixus. Aristotelis esse demonstrat ibidem. Bellonius perperam *Asillum* seu *Oestrum* vocat. Octo utrinque pedes habere, octonistabellis in tergore loricari, priorum pedum ungues ad caput, posteriorum ad pedes converti, *oculos* parvos, nigros, & aliquanto eminentes habere, *Erythrini* etiam dentalibus ac fargis vesci, in orbem se contrahere; prægnantem denique plærumque inveniri, addit. Est & aliud animalculum marinum, cujus hic iconem appono. *Ἐπίλη* quoque Numenii huc spectat, littoralis vermis & fossilis, longis pedibus constans, repens & inescandis piscibus idoneus.

Asilus marinus, quem *Oestrum* marinum veteres à naturæ similitudine, quæ ei cum terrestri communis, vocant, *Ligures Prusam* pro ore tubulum seu fistulam habet, pro corporis ratione longam. Utrunque sitæ sunt veluti manus duæ, quæ ad os flectuntur, sequitur alvus cum incisuris, cui affixi sunt sex pedes duo, qui in extrema alvo sunt, crassiores sunt & longiores, qui sequuntur utrinque locati, paulo minores, reliqui duo, qui magis in lateribus sunt, omnium minimi. Ore sive fistula, scorpionis terrestris caudæ, pedibus, ejusdem brachiis similis est, alvo & magnitudine, araneo. Ut *Polypii* acetabulis, ita hic

Rondel. de Insect. c. 8.

Mouf. de Inf. 2. c. 39.

hic ore adhæret parti molliusculæ & pingui sub pinnâ ita tenaciter, ut avelli integer non possit. Sanguinem exugit hirudinum ritu, usque dum præ plenitudine decidat & moriatur. Cur in summo tantum æstu, & Caniculæ tempore pisces dictos infestet, id in causa esse puto, quod æstate tantum nascatur, autumno pereat. Cur sub pinna hæreat, in causa est partis mollitudo, pinguitudo, & sanguinis copia. Reliquo corpore Thynni cute quidem lævi integuntur, sed illi subsunt squamæ duriores.

Arist. H. A. 2. c. 14. Quantum ad *Scolopendras*, Aristoteles, *ὡς πελαγίας τὰς εἰδὲς τῶν χερσαίων, aspectu terrenis similes* esse dicit; in saxosis locis gigni, colore magis rubro esse, pedum numero terrestres superare, gracilitatem crurum si excipias, serpentum more non in altis gurgitibus nasci, adjicit.

Rondelet. de Insect. c. 2. Rondeletius, duas species proponit. Prior minor est, colore plane rubro, dodrantali magnitudine, in saxosis locis degit. A capite ad caudam pedes habet plurimos: in flexis & volumina sese contorquet: nunc longior, nunc brevior, nunc gracilior, nunc crassior efficitur. Altera est superiore multò longior, utpotè quæ ad cubiti longitudinem accedat, tenuior, colore ad candidum vergente. A capite ad caudam pedes utrinque habet plurimos, veluti superior. Aldrovandus addit ex Gesnero tertiam, colore miniaceo. Gesnerus videtur quædam ex his in dubium vocare, dum Aristotelis descriptionem attendit. Minores terrestribus facere Aristotelem: Brasavolum verò ad se misisse duos pollices longam, apud se vix duos digitos æquare: Rondeletii longè majores esse, Marcellum Virgilium terrestribus longiores facere. Quod forma attendatur, longè aliam caudæ capitisque in terrestribus vidisse. Ut sit, in lacertorum marinorum, ut & acum ventriculo sæpè eas reperit Rondeletius: ita ut exinde, iisdem hos pisces vesci colligi possit: & quia in alto mari vivant, in littoribus aut littorum saxis easdem vivere, falsum sit. Appetere nidorulenta; hamum devoratum simul cum interaneis dejicere, dejecto, ista iterum intro recipere; piscatoribus quòd si hamum attigerint, nullus piscis ad hamum post accedat infestam esse; attactam adurere, naturæ ipsius est. Moussetus in limosis stagnis, & ubi ostreae sagiuntur, latere scripsit. Nonnus psyllothrum ex thuris, atramenti futorii anaunc. ij. scolopendr. unc. iij. tritis, & cum calæis pulvere committis commendat.

Rondelet. de Insect. c. 5. De Vermibus in tubulis nascentibus, ita Rondeletius: Nascuntur in saxi marinis & super concharum vetustarum testas, tubuli vel Siphunculi testacei, rotundi, asperi, candidi, intus lævissimi, quorum alii recti sunt, alii contorti & replicati. In his procreantur & vivunt vermes, qui fo-

ras se exerunt hauriendæ aquæ gratia. Hi colore, substantia, scolopendræ rubræ similes sunt, figura & magnitudine nonnihil differunt. longissimi enim digiti magnitudinem non excedunt. Pars posterior folii myrtei modo in acutum desinit. Priore parte utrinque pedes habent, veluti scolopendræ, unde fistula prominet in extremo obtusa rubæ modo, & perforata, qualem in asilo marino depingemus, eâ aquam trahit. Horum vermiculorum testa Pharmacopæi nostri utuntur, in compositione unguenti citrini pro dentali. Huic similem testam etiam dentale vocant, quo in eodem unguento utuntur. Hujusmodi aliquot picturæ superiori aspersimus.

TITULUS II.

De Insectis aquaticis apodibus.

CAPUT I.

De Hirudine.

Absolutæ insectorum aquaticorum pedatorum historia, ad apoda progredimur. Hæc vero intra *Hirudines*, *Stellas*, *Hippocampus*, *Uvam marinam*, *Oripem*, *Lumbricum marinum*, *Setam*, *Vermem Indicum*, & alios consistunt.

Hirudinem quidam ab hærendo, quòd corporibus hæreat, alii ab hauriendo Latinis dictam esse putant. Dicitur Latinis & *Sanguisuga*. Græci *βδέλλα*, & quidem *ὑδαπὴν, λιμναίαν* dixere, sine dubio, à *βδέλλα*, *βδέλλα, ἀμέλγω, ἐκπέζω, ἐκμύζω*. Hesychio dicuntur *δεμῆλαι* & *βλέττες*, & *δελλαίαι*, secundum Elienses. Eidem *βαίτω* *βδέλλα* est.

Duorum est generum. *Marina* nempe, & *Lacustris*. Illa, Rondeletio describente, digiti est magnitudine, cervice graciliore, cauda paulò crassiore. Os & caudæ extremum Polyporum acetabulis similia sunt, ut eorum adhæsione sese trahant. Corpus insectorum modo ex multis annulis circulisve constat, sed duriore cute quam palustres, quod in causa est, cur non ita in globum se contrahere, nec ita se colligere possint, sed caudam tantum & caput proferunt, & retrahunt. Interna omnia continuo ductu producta & indistincta. In luto vivit, virus olet, cibo idonea non est: pisces tamen lutosi & litorales ea vescuntur. In oleo antiquissimo decocta aurium dolorem sedat. In oleo amygdalino, vel Chamæmelino, dolorem hæmorrhoidum. In vino, vulneribus nervorum & convulsionibus utilis est. Ustæ alopecias cum aceto curant.

Lacustres circulis velut inter se colligatis constant, quorum opera quandoque in globum contrahuntur. Ossibus & pinnis carent.

carent. Os illis trianguli instar, id vulnus inflictum ostendit. Villanovanus fistulam in ore more culicis tribuit. Alii in majoribus acutius, in minoribus rotundum, in omnibus foramen in medio exile, observare. Ab ore ad alvum continuus est meatus. In mortuis longitudo circiter digiti. Lineis & punctis nigris notantur omnes, reliquo colore variant. Varias differentias fortiuntur. Sunt quæ caput magnum habent, coloris rufi, variis filamentis distinctæ, lanuginosæ, & venenatæ. Sunt & aliæ tenuiores, capite brevi, ventre rubro, quæ in aquis puris habitant. Albertus Nigrarum & planarum; nec non quæ in dorso virgulas rubeas & aliquantulum rugatas habent &c. meminit. Apud Helvetios *Minores* sunt nigræ, *maiores* subvirides, striis per longitudinem subflavis aut ruffis, in quibus puncta aliquot nigricant. Visæ *Veneriis virides*, maculis hinc inde nigris respersæ. In fluentibus aquis, *albas*, perexiguas, ore utrinque in circulum lato, sed altero duplo latiore, quales vel piscibus nonnunquam adhærent, invenies. In Mauritaniæ quodam flumine septenum cubitorum, quæ per gulam perforatam respirant, inveniri, Strabo prodidit. In jecinoribus boum similem hirudini lacustri vermem, alii. Mousetus in *perforatas*, quas Europa non novit, & *Imperforatas* distinguit.

Mouset. de
en. sect. 2.
l. 41.

Ad *Naturam* earum pertinet, in paludosis & turbidis aquis ut plurimum, in saxosis, arenosis & clavis, raro inveniri: exputri nasci, nec scitur an coeant: autumno condi, per hyemem latitare, circa Calendas Maij, aut paulò antè, & quidem non nisi tepido aëre apparere. Eadem, sanguine visitant. Ubi corpori adhærescere, non citius avelluntur, quàm expletæ decidunt: imò quantò magis trahuntur, tantò fortius insident; donec rumpantur. Caudæ & ori innitentes moventur. Cannæ inclusæ, retrorsum exeunt: & quia os valdè acutè & in tenuitatem se extendere possunt, per angustissima etiam elabuntur.

Vfus Hiru-
din. 441.

Magni sunt in evacuando sanguine in Medicinâ usus. Fugiendæ rufæ, magnorum capitum, virides, nigræ, & quæ in limosis nimis agunt. Laudantur, quæ ex aquis fluentibus rufæ rotundæ, colore jecinoris, parvorum capitum. Præstantissimæ putantur, quibus venter rubet, dorsum viret, præsertim si ex aquis fluentibus fuerint. In Germania præferuntur majores, ex nigro subvirides, striis per longitudinem ruffis, in quibus maculæ nigræ sunt. Applicantur in vulneribus venenatis, capitis, colli, jecoris, lienis, genitalium membrorum: &c. morbis.

De præparatione, & modo utendi, abundè apud Medicos invenies.

Huc spectat, *Lumates* molestissima hi-

rudinis species, inter herbas & montium arbores vivens, semidigitum longa, & impensè tenuis. Adhærent iter agentibus, subeuntque quosvis humani corporis meatus, etiam angustos & fœdos, neque prius discedunt, quàm humano fatientur sanguine: tunc enim spontè cadunt, ac minus infestant Sole vigente. Remedium est, arundinibus quibusdam præacutis eas avellere, aut sese tueri intra aquas, confidendo saxis, si quæ fortè adsunt; aut pyram construere, atque interponere ignem.

C A P. II.

De Stellis.

Datum Insecto huic *Stellæ* nomen, quòd stellas imitetur. Græcis est ἀστὴρ, Myrepso ἀστέρον, modernis Græcis αστήρ, ut Gillius notavit, vel potius, ut Rondeletio visum; ἀστέρας, quod pali lignei infixi modo, radios habeant. Sylvaticus, Sydis marinum vocat: Cremonensis, Magiarastrum marinum.

Aldrov. H.
Insect. 6. c. 18.
Nomen.

Os ipsis versus caudam, in medio radio- rum situm, inque gyrum quinque digitos ostendere, author est Bellonius: Excrementorum nullum exitum, & ore excerni quæ supervacua sunt, Rondeletius. Durior corio five callo omnes integuntur, ideo Aristoteles cum aliis testaceis recensuit.

Descriptio.

In marinis littoribus sæpè conspeximus: vaganturque in mari, ut polypi, brachia deducendo, nunc antegradiendo, nunc in orbem convolvendo, & suctu acetabulorum, Echini modo, lapidibus adhærent. Conchas aggrediuntur & devorant. Quinque in dissecto ventre cochleas invenisse scribit Rondeletius, tres integras, duas cum testis suis confectas. Adeò fervida ejus natura est, ut quicquid sumserit, id licet illicò ab ea extrahatur, biscoctum, (δισκοκτῶν) appareat. Plinius dicit, tam igneum fervorem ei esse tradi, ut omnia in mari contacta adurat, omnem cibum statim peragat. Extra aquam torpescere, prodidit Bellonius: in aquam immerfas, & supinas instratas, promuscides in extrema plusquam quinque millia exerere cernet, & in pronam partem moveri.

Rondelet. de
Insect. c. 10.

Natura.

Arist. H. A.
5. c. 15.

Plin. H. N.
9. c. 6.

Essè quasdam in *cibis*, ex Bellonio colligimus. In *Medicina*, Hippocrates, nigras cum brassica & vino odorato adversus uteri strangulationem propinat. Apud Myrepsum inter suffimenta contra epilepsiam recensetur. Inter psilothra à Galeno numerari, certum: & Gesnerus, carunculam, in quibusdam edulem esse scribit, reliquam substantiam pilos deperdere. Lavem, ad peritonæi rupturam, cum ononide, felici cum successu applicari posse existimat.




Ufus.

Rondelet. de
Insect. c. 14.

Dis-

Nierem. H.
E. 13. c. 19.

Insecta Varia ad loca sua referenda



Phisali

Mouf.



Cincindel.



Vermis fari-
na.



Teredines.



Eruc



Eruc







Eruc.






Stello

Mar.







Differentiæ *Differentiæ & Genera* si attendamus, sunt plura. Sunt parvæ, magnæ: sunt, quæ flavescunt, nigricant, cinerascunt: sunt aculeatæ, læves, longæ, breves. Optimè vero, in eas quæ quinque radiorum sunt, & quæ plurium distinguuntur. Illæ *Cartilagineæ*, *Testaceæ*, *Læves*, *Pectinatæ*, *Echinatæ*, *Arborescentes*, *Solares*.

Cartilaginea pronè & supinè exhibetur. Supinæ partis marginibus puniceis, reliqua pars intima, & quæ hisce marginibus continetur, sanguineis maculis & albis, veluti in quodam marmoris genere, conspersa. Pronè vero partis margines admodum sunt sanguineæ: quinque in medio rimæ, in singulas partes abeuntes, maculis autem cœruleis, ea pars, quæ margines undique contingit, insignitur: hæc aliæ sequuntur propè medium maculæ rubicundæ.

Testacea dicitur, non quod verè testacea sit (nam exsiccata, cum cortice teri manibus, quamvis ægrè, potest) sed quod duritiæ corticis, magis quam aliæ stellæ, quas unquam observavi, ad testacea accedat. Hæc corticæ candicat, spithamam longa quoquo versum dimensâ, nempe ab uno radio ad alterum, qui è regione est.

Distant autem extremitates cujusque radii à proximis mediam spithamam aut paulo amplius. Posset etiam non immeritò tuberosa, & verrucaria nuncupari, nam superiori parte in singulis radiis tubera, & verrucas habet.

Lævis est duplex: *Rondeletii* nempe, aculeis enim omni ex parte, atque asperitate caret. Radii longi sunt rotundi, flexibiles, murium caudis persimiles: eorum integumentum cortici serpentum simile est: & ob nigrarum albarumque macularum varietatem, spectaculum jucundum. In medio corporis trunco circulus cernitur, intra circumferentiam quinque maculis rotundis: & inter has stellulæ pictura distinctus, à cujus circumferentia quinque radii exoriuntur. Oris compositione à cæteris non differt, nec victus ratione. Brachiorum longitudine, & vario flexu celerrimè natat. Et *Aldrovandi* qui duas ponit. *Prima* est, pronâ parte & supina colore Lapidis lazuli: in medio punctulis nigris, & circulis aureis novem radiorum, ac totius corporis ea magnitudo est, quâ cernitur. Prona pars variis coloribus delineata, cujus medium, & colorem, & figuram pentaphylli æmulator.

Secunda multo præscripta minor, undique colore ferruginea, sed nigris aspersa maculis mediam spithamam, aut amplius longa.

Pectinatarum quinque sunt species. *Prima* *Rondeletii*, primæ ejusdem similis, iisdem demptis, quæ sequuntur. Radii circa ro-

tundum corpus dispositi, in exortu suo angulum acutum non constituunt, sed obtusum. Aculei, quibus latera muniantur, rari, recti, pectinatim dispositi, unde pectinatam stellam appellavit *Rondeletius*.

In totius corporis centro stellula quædam expressa est, à cujus ambitu lineæ quinque per medium radiorum ad extremum usque protensæ sunt, radii initio satis lati sunt. Rara est hæc species, orè, dentibus, moribus, facultatibus aliis similis est. *Secunda* cujus figura exprimitur (folio 748.) marginibus albis pectinatim non rectè, sed obliquè dispositis: interius sanguineis undique conspersa maculis in centro stellulam habet admodum rubram, sed radiis constantem, tota pedem longa est. *Tertia* nulla elegantior, ejusdem cum prædicta magnitudine, colore, ac tuberculis spinosis admodum varia. Nam in medio est os, instar echini, quinque denticulis vix conspicuis constitutum, hoc continet stellula septem radiorum, quæ interiori parte nigra ferè est, exteriori verò cærulea, hanc circulus ambit albus, seu area alba; quam alia ruffa, seu carnea, hunc deinceps circulus circundat ex undecim tuberculis constans in supremâ parte acutis. Singuli autem radii tres habent tuberculorum ordines singulos viginti quinque, aut triginta tuberculis constantes.

Quarta est haud dispari cum præcedenti longitudine, radiis albo cœruleis, marginibus pectinatis ferrugineis: in medio stellula est, ex sex punctatis radiis constituta.

Quinta quæ quinque radiis inæqualibus & hirsutis constat.

Echinata est corpore exquisitè rotundo, parvoque constat; & radiis quinque, sed brevioribus, unde fit, ut minor sit cæteris. Illi è parvo circulo, in quo crucis figura delineata est, veluti è centro, exoriuntur tenues frequentissimis aculeis horrentes, quâ de causâ echinatam *Rondeletius* nominavit, in lateribus dispositis. Radiorum flexuoso motu, serpentum ritu, repit hæc stella, & sicco posita eos movere nequaquam desinit, quousque in partes disjecerit, quæ separata etiam moventur per flexus: ut Vermium partes, & Lacertorum caudæ abscissæ. Os habet ceratum.

Reticulata est duplex. *Rondeletii* & *Aldrovandi*. Illa à retis sive Cancellorum figura reticulatam, sive cancellatam nuncupamus, & quia inter distinctiones, retibus, vel cancellis similes extant tubercula quædam rotunda, tuberosa etiam vocari potest. Inter majores stellas reponenda est, brachia enim ad pedalum longitudinem perveniunt, crassiora sunt aliarum stellarum radiis. Aculeis parvis utrinque eadem munita sunt. Os habet cæterarum modo. Eleganti illa & reticulata distinctione spectabilis est, & inter anathemata collocanda

*Rondelet. de
Inf. p. 123.*

Hæc tuberculis rotundis cæruleis gemmæ Turcoiæ æmulis, radiorum marginibus hirsutis & pectinatis: quilibet radius supina parte apparet conus pinus ideæ oblongior. Prona autem parte fertis, tum luteis tum cæruleis. Singuli radii habent cauliculum tenuem per medium transeuntem.

Arborescens à frondium & ramorum multitudine. Huiusmodi duas vidit Rondeletius. Unam permagnam apud Guilhelmu Pelicerum Monspeliensem Episcopum, ad Lerinum iselam captam, alteram ex Italia ad ipsum delatam. Ab aliis omnibus stellis plurimum differt. Radios quinque, sive truncos habet, in medio os cum quinque appendicibus, quæ multis parvis dentibus horrent, pars ea depressa est, & submissa, ambitus tumet, in quolibet radiorum intervallo foramen, seu rima conspicitur. Quilibet radius statim in binos finditur, hi rursus in binos ramos dividunt, atque ita deinceps, quousque ad tenuissimos, & capillorum tenuitatem referentes deventum sit. A quolibet oris angulo linea albicans prodit, & per omnium ramorum medium producta est, alioqui tota stella nigricat, & tenui, atque admodum durâ, sed asperâ cute tegitur, ramuli omnes intro flectuntur; quod argumento est hos tanquam cirros ad cibum captandum conditos esse, quibus undique dispositis in orbem præda elabi non potest. Id spectaculum aliquando Rondeletius in mari studiosè contemplatus est. Stellam parvo filo alligatam in mare demittebat, in quo expansis ramis natabat, sed prædam aliquam appropinquare sentiens, brachiis omnibus contractis amplexabatur urticæ ritu. Rara est hæc stellæ species, & propterea inter anathemata suspenditur.

Solaris Sol marinus Rondeletio, qui solis refert picturam. Differt à stellis quod in his è medio corporis trunco veluti è centrordiæ enascuntur, in hoc vero ex corporis rotundi circumferentia, breves, minime asperi superiore in parte, sed veluti ex squamis compositi, in lateribus verò parvis aculeis rigentes, albi ad extremum usque gracilescentes. Corpus illud rotundum in medio rosæ pictæ figuram expressam habet. Ore victu, facultate à stellis non differt.

Stellæ quæ plurimum sunt radiorum, vel sunt septem radiorum, vel decem vel duodecim.

Septemos quæ habet, parte gibba colore ferrugineo obscuriore, spinosis, & parvis quibusdam tuberculis scabra, ac inæqualis, radiis in extremo lævi distortionem inflexis, parte concava ochræ ferè dilutum colorem exhibet ad ferrugineum minimum quid tendentem. Extremitatem laterum, quibus cum medio corpore, tum brachiis juxta eorundem longitudinem sectis committitur, margine crenis, seu denticulis quibusdam albicantibus sunt asperi. Longitudo totius, ac latitudo in peripheriam æqualis est, palmi

unius cum dimidio. Singuli verò radii tres propemodum digitos sunt longi, qui longissimè à se mutuo palmi unius intervallo distiti sunt.

De illâ quæ *decem brachia* habet ita Columna; Nova & perelegans hujus stellæ forma, ab aliis omnibus differens, nec adhuc descripta: nostro littori frequens, ita ut nec ulla retrahantur retia quin ipsis implicata, & simul cum piscibus in foro etiamnum invehatur. Hæc admodum fragilis est, ut viva ne ab rete excipiat potius frangi patitur, ita illi se implexa cirris continet. Non vis ulla in extrahendâ stella est adhibenda, cum radii sint geniculati, atque genicula conjungens cartilago sit admodum tenuis, quæ de re facillimè genicula dissolvuntur, nec quamvis radii omnes sint disrupti, emoritur, nisi longo post intervallo. Hujus color subrubens est; forma vero ab aliis stellis dissidere videtur. Hæc enim parvum admodum corpus habet: radios quinque sed singuli in binos dividuntur, ita ut decem prima facie, videantur: semipedem longos, nec majores huc usque vidi: stellæ diameter pedem æquat. Radii vero omnes geniculis parvis constant, atque singula genicula formam trianguli habent, lineæ quidem secantes nunc in dextram, nunc in sinistram partem conjunguntur, spirarum modo, quæ alternatim angulos oppositos conficiunt. E singulorum vero triangulorum basi, cirri etiam, ut bases quoque utrinque alternatim producuntur, simili modo geniculati, minimi digiti longitudine, & canabini filii crassitie, quibus maximè implicatur, graditur, & apprehendit: Horum superiores parum longitudine, sicuti & crassitie alios inferiores ad extremum usque superant. E centro ipsius alii tenues cirri filii etiam crassitie, & eodem modo geniculati, majores digiti longitudine exeunt, quorum superiores inferioribus minores sunt, atque contrario modo, quo radii majores curvantur, quibus escam apprehendere, atque mos adducere censeo, in quorum umbilico visitur inesse, ex adversa parte corpus conspicitur rotundum, læve molle, cujus interiora propter tenuitatem considerare nequivi: ipsa verò facillimè disjungitur à stella: lævis est tota, sed aspera tactu videtur propter geniculorum, & cirrorum multitudinem crusta integitur duriuscula, ita ut offe is geniculis, sed non admodum duris, compacta videatur. An splendeat, ut alia noctu, cum vivam domi habere non possem, experiri non potui. Hæc Fabius Columna.

Postrema duodecim habet radios qui quidem singuli singulos habent caules cæruleos per medium transeuntes, à quorum utroque latere sunt striæ, seu lineæ transversæ, sanguineæ frequentes: in medio quoque circulus ejusdem coloris, undique radiorum margines denticulati, colore-

Stellæ & Asterium Marina: Meerstern Aldr.



Hippo-

campus

Mouf.

Hippocampus: Meerhaan Mouf.



Hippoc. Aldr.

Vua Marina Meertraubel Aldr.

天不假年

春風吹雨

花開柳綠

燕剪輕盈

魚肥蟹美

秋風送爽

loreque albicante. Tam variae, & multiplices stellarum formae conspiciuntur, ut quaerendi & contemplandi nullus sit futurus finis.

CAPUT III.

De Hippocampo & Uva marina.

Aldrov. H. Inf. 6. c. 16. **H**ippocampo, ab *ἵππος* & *καμπή* nomen datum est. Repando enim est corpore, & in arcum se curvante, erucasque cauda maxime refert: reliquo verò corpore, equum imitatur. Marcellus voce *ἵππος*, magnitudinem denotari putavit. Nonnulli *gallum marinum*, quidam Salamandram marinam dixere.

Rondelet. de Insc. 9. Ita eum nobis Rondeletius descripsit. Hippocampus toto corpore incifuras habet, dodrantalem magnitudinem non superat, saepè minor reperitur, pollicis est crassitudine, rostro oblongo, tubuli modo cavo sine scissurâ, ab inferiore ejus parte operculum foramini opponitur, ad claudendum, vel demittitur ad aperiendum: oculos habet rotundos, satis prominentes, in capitis vertice pili erecti sunt, qui adeo tenues sunt, ut non in mortuis & exsiccatis, sed in viventibus tantum Hippocampis, & natantibus appareant, quemadmodum & qui in reliquo sunt corpore. Toto capite, collo graciliore, ventre protuberante, equo valdè similis est.

Post oculos quo in loco in cæteris piscibus branchiae esse solent, pinnulae duae articulis similes sunt, maxime ob situm, utrinque unica. Branchiae vero nullae sunt, neque testae neque detectae, sed supra dictas pinnulas duo sunt foramina sursum spectantia. Sub ventre rimulas duas habet. Ex una alvi excrementa, ex altera ova foras emittuntur. Cauda reliquo corpore tenuior est, quadrata, cum exochis aculeatis, toto etiam est corpore similiter aculeato, veluti ex cartilagineis circulis compacto, ex quibus aculei extant, membranulis intermediis, ut nulla caro appareat. Colore est fusco punctis albis notato, ventre albicante. Ventriculum pro corporis ratione satis

magnum habet, hepar rubrum; similiter ova rubra, cor exiguum. Caudam quovis modo inflectas, & qualem vivo figuram tribueris, talem mortuus & exsiccatus servat.

Veneratum, sed solo ventre Aelianus *Ælian. H. Anim. 14. c. 16.* prodidit. Qui ex vino decoctum bibit, primo singultit, mox sicca tussis afficitur. Venter superior intumescit; per nares aquosa pisculenti odoris egeruntur: oculi sanguine suffunduntur, &c. Qui evadunt, aquam, mente capti, summo studio prosequuntur. Remedium, acetum in quo sepia suffocata est, Aëtius ponit; Veneficæ eum in amatoriiis usurpant.

Ufus eorum singularis in canis rabidi morfu est, ut apud Aelianum habemus. Plinius *Plin. H. N. 32. c. 6. 7.* leporis marini venenum restinguere potos; alligatos Venerem concitare ait. Galenus *Galen. l. 11. simpl. 6. 41.* ustos alopecius prodesse scribit. Vehementer vermes, si torreantur, & cum aqua absynthii propinentur pellere Rondeletius ex Græco quodam habuit.

Rondelet. de Insc. c. 25. *Aldrov. H. Inf. 7. c. 17.* *De Uva marina* ita Aldrovandus: Piscatores nostri, inquit Rondeletius, ova sepiarum racematim compacta à pediculo uno dependentia, earundem atramento asperso Uvam marinam nominat. Est etiam Uva marina zoophyton, diversum sane ab eo, quod nobis depinxit Rondeletius, cuius imaginem, cum de zoophytis agimus, tradituri sumus: de hoc loquitur Plinius cum scribit. Rerum quidem non solum animalium simulachra (mari) inesse, licet intelligere intuentibus uvam, gladium, feras. Nos verò & hocce egregium aspectu animal Insectum potius, quam alterius cuiuspiam generis Uvarum racemum verè referens in Oceano deprehensum damus depictum, & ad vivum delineatum, ea magnitudine, qua depictum videtur in hac tabula: acinis sane undiquaque refertissimum, quorum alii cœrulei: alii amethystini: alii rubentes, capite duobus corniculis Limacis instar præmunito, movetur motu progressivo.

Et tantum de Insectis. Si quid interim scitu dignum observatum fuerit, addi poterit impofterum. Quia verò ita Historiam Animalium absolvimus,

SOLI DEO ESTO GLORIA,

in sempiterna secula, Amen.

I N D E X

In HISTORIAM NATURALEM de INSECTIS. Prior numerus Histriocæ descriptionis paginam, posterior Tabulam Iconismi demonstrat.

A Nelytra Bipennia. Pag. 45.
 Detecipennia. p. 1.
 Quadripennia. p. 1.
 membranacea. p. 1.
 farinacea. p. 28.
 Anthrenus. p. 95.
 aquaticus. p. 139.
 Apis, Nomen, p. 1. t. 1. Descriptio, Locus, p. 2. Generatio, p. 2. Vitus, Aetas, p. 3. 4. Volatus, Sonus, Odoratus, Auditus, Antipathia, Morbi, p. 4. Ingenium, p. 5. Vfus, p. 6. Differentia, p. 6.
 Apis amphibia. p. 8.
 Aquamulsa. p. 10.
 Araneus, tab. 18. Nomen, Descriptio, Locus, Vitus, Generatio, p. 97. Antipathia, Ingenium, Nocummenta & Remedia, p. 98. Vfus, p. 99. Differentia, p. 99.
 Ascarides, p. 137.
 Asellus, Nomen, Descriptio, Generatio, p. 126.
 87. t. 23.
 Asellus arvensis, p. 95.
 Asilus. t. 8. Nomen, Descriptio, Natura, Differentia, p. 56.
 aquaticus. p. 64. 144.
 Attelabus, p. 140.
 arachnoides. p. 141.
 Aurelia Aldrovandi. p. 125. t. 22.
 Axacoulin. p. 131.
B Estiola alata Moufeti. p. 65.
 Blattæ, Nomen, Descriptio, Vfus, Differentia, p. 82. t. 15.
 Bombylius. p. 43. 44.
 Bombycis æmulus Temistili dictus. p. 125.
 Bombycum historia. p. 114.
 Bombyx. p. 114. t. 22. 23.
 Bruchus. p. 64. t. 11.
 Buprestis, t. 14. Nomen, Descriptio, Locus, Vitus, Venenum, Differentia, p. 78. 79.
 Buprestis Dodonæi vera. p. 66.
C Antharides, Nomen, Descriptio, Locus, Vitus, Generatio, p. 14. t. 76. Nocummentum, Differentia, p. 77.
 Cantharides aquaticæ. p. 140.
 Cera, Nomen, p. 14. t. 2. Descriptio, p. 14. Locus, Natura, Differentia, p. 15.
 Chrysalis. p. 44.
 Cicada, Nomen, p. 22. t. 10. 11. 12. Descriptio, p. 22. Locus, Vitus, Generatio, p. 23. Aetas, Canus, p. 24. Natura, Vfus, Differentia, p. 24.
 aquatica, p. 139. t. 10.
 Rondeletii, p. 65.
 Cicindela, Nomen, p. 80. t. 15. Locus, Generatio, p. 80. Vfus, Differentia, p. 81.
 Cimex, Nomen, p. 89. t. 17. Descriptio, Locus, Generatio, p. 89. Fuga, Vfus, p. 89.
 Cimices sylvestres. p. 25. t. 16.
 Genera varia. p. 25. 26.
 Congener Tauri volantes Brasil. p. 75. t. 15.
 Corculus. p. 139.
 Colli. p. 131.
 Coyayhoal. p. 127.
 Crabrones, Nomen, p. 20. t. 1. Descriptio, Locus, p. 20. 21. Vitus, Generatio Antipathia, p. 21. Vfus, p. 22.
 Cucujo. p. 79.
 Cucupilul. p. 131.
 Culex, Nomen, p. 57. t. 10. Descriptio, Locus, Cibus, Generatio, Natura, p. 58. Remedia, Vfus, Differentia, p. 59.
 Curculio. p. 126.
E Phemeron musca. p. 57.
 Erucæ, Nomen, p. 105. t. 19. 20. 21. Natrimen- tum, Generatio, Natura, p. 105. Vfus, Damnum, Remedia, p. 106.
 glabræ Moufeti. p. 106. t. 19. 20.
 hirsutæ densiores pili Mouf. p. 107. t. 19.
 rariiores pili Mouf. 109.
 Erucæ Aldrovandi Tabulæ primæ. p. 110. t. 21.
 secundæ. p. 110. t. 21. tertiæ. p. 110. t. 21.
 quartæ. p. 112. t. 21. quintæ. p. 112. t. 21. sextæ. p. 113. t. 22.
F Orbicinæ. p. 93. t. 16.
 Forficula. p. 83. t. 15.
 Formica, Nomen, p. 84. 85. t. 16. Descriptio, Locus, Vitus, Generatio, Natura & Ingenium, p. 84. 85.
 Antipathia, p. 186. Vfus, Damnum & Remedia,

Differentia, p. 187.
 alata. p. 84.
 Fucus, tab. 1. Nomen, Descriptio, Generatio, p. 16.
G Ryllus, Nomen, Differentia, p. 64. t. 10.
 Gryllotalpa Moufeti, Nomen, Differentia, p. 64. t. 10.
H Erivora. p. 53.
 Hippocampus. p. 146. t. 28.
 Hirudo lacutris. p. 143. t. 27.
 marina. p. 143. t. 27.
 Hothsicht Tigur. p. 63.
 Humifugæ. p. 53.
I nsecta aptera octo pedum. p. 95.
 duodecim & quatuordecim pedum. p. 105.
 aquatica. p. 139.
 apoda. p. 143.
 multipeda. p. 142.
 paucipeda. p. 139.
 pedata. p. 139.
 Insecta Coleoptera f. Vagiapennia. p. 60.
 Terrestria apoda. p. 129.
 pedata non alata. p. 85.
 paucipeda. p. 85.
 multipeda non alata. p. 126.
 Involulus Plauti. p. 179.
 Ips. p. 179.
 Julius. p. 128. t. 23.
K yfferwurm. p. 137.
L acerta aquatica. p. 139. t. 25.
 Lendes. p. 93.
 Libellæ, Aldrovandi: Moufeti. p. 26. t. 17.
 Ligniperda. p. 140.
 Limax. p. 138. t. 24.
 Locusta aquatica. p. 139. t. 25.
 Locustæ, tab. 10. Nomen, Descriptio, Locus, Vitus, p. 60. Generatio, Actiones animales, Vfus, p. 62.
 Aldrovandi. p. 64.
 Moufeti. p. 62.
 Lumbrici terrestres. p. 137.
 aquatici. t. 27.
M alis Scarabæus. p. 74. t. 13.
 Mantes Africana. p. 137. t. 10. 11.
 Italica. p. 137.
 Mel, Nomen, Descriptio, p. 9. Electio, p. 9. Vfus in cibis, p. 10. in medicina, p. 11. Differentia, p. 14.
 Moloës Paracelsi. p. 74.
 Mulsum. p. 12.
 Muscæ in genere, tab. 8. 9. Nomen, Descriptio, Locus, Vitus, Generatio, Sympathia & Antipathia, Aetas, Volatus, Ingenium, p. 45. Vfus, Differentia, p. 46. 47.
 Muscæ Aldrovandi Tabulæ primæ. p. 48. t. 9.
 secundæ. p. 48. t. 7. tertiæ. p. 49. t. 9.
 Muscæ Moufeti aquaticæ. p. 50. t. 9.
 terrestres. p. 52. 53. t. 9.
 militares Luciano *εγωμνίδες*. p. 53.
 struioptera. p. 54.
 Etnoptera. p. 54.
 Chelidonia. p. 54.
 feticaudæ Moufeti. p. 54.
 unisetæ. p. 54. t. 9.
 bisetæ. p. 54. t. 9.
 bipiles. p. 54. t. 9.
 tripiles. p. 55. t. 9.
 quadruples. p. 55. t. 9.
 Muscæ rariiores speciei. p. 56.
 scoriuræ. p. 56. t. 9.
 quadrupennes. p. 56. t. 9.
 Musca Chryfopis dicta. p. 56. t. 9.
 Tabanides. p. 56. t. 9.
 Muscæ terrestres Moufeti *ζωοφύγοι*. p. 52.
αζωοφύγοι. p. 53.
 Musca aquatica. p. 140.
N Hamdii. p. 101.
 Notonecta. p. 139. t. 25.
O estrus. p. 56. t. 8.
 Orfodacna. p. 25.
P apiliones in genere, Nomen, Descriptio, Locus, Vitus, Generatio, Natura, p. 28. Vfus, Differentia, p. 29.
 Aldrovandi Tabulæ primæ. p. 29. 30. t. 4.
 secundæ. p. 30. 31. t. 4. tertiæ. p. 31. 32. t. 4.
 quartæ. p. 32. t. 4. quintæ. p. 33. t. 4. sextæ. p. 33. t. 4. septimæ. p. 33. 34. t. 4. octavæ. p.

34. t. 4. nonæ. p. 35. 36. t. 5. decimæ. p. 36. t. 5. undecimæ. p. 37. t. 5.
 Papiliones Moufeti. p. 37. t. 6.
 diurni, magni Mouf. p. 40. t. 6.
 medii. p. 42. t. 6.
 minimi. p. 43. t. 6.
 Papilio Bombycum. p. 43. t. 22.
 Indicus. p. 29. t. 4.
 Pediculi alati. p. 84.
 Pediculus, Nomen, Generatio, Vfus, p. 89. Differentia, p. 90.
 marinus. p. 142. t. 25.
 Perlæ vulgò dictæ, Differentia, p. 26. t. 17. 4.
 Phalangia. p. 102. 26.
 parva Bellonii. p. 105.
 Phalacæ magnæ Moufeti. p. 37. t. 6.
 mediocres M. p. 39. t. 6.
 minimæ M. p. 40. t. 6.
 Pinguiculus Agricolæ. p. 74.
 Pollin. p. 127.
 Portapefo Infubr. p. 72.
 Propolis. p. 15.
 Proscarabæus. p. 74. t. 13.
 Pschedosphæca. p. 19. t. 2.
 Pulex, Nomen, Descriptio, Vitus, Locus, Ortus, Natura, Fuga, Differentia, p. 92.
 marinus. p. 142. t. 25.
 Puplices. p. 105.
Q uici Brasil. p. 68. t. 13.
R eduvius. p. 91.
 Ricinus. p. 91.
S carabæi, Nomen, Descriptio, Locus, Vitus, Generatio, Natura, p. 66.
 Scarabæi Aldrovandi. p. 70. t. 14.
 Moufeti majores Cornuti. p. 67. t. 13.
 minores non cornuti. p. 69. t. 13.
 Scarabæus aquaticus. p. 140. 74.
 Scolopendra terrestris, Nomen, Descriptio, Natura, Morfus, Vfus, Differentia, p. 127. t. 23.
 marina. p. 143. t. 27.
 Scorpio, tab. 18. Nomen, Descriptio, Natura, & mores, p. 95. Locus, Vitus, & Generatio, Venenum & medela, p. 96. Antipathia, Vfus in medicina, Differentia, p. 96. 97.
 alatus. p. 84. t. 15.
 palustris. p. 139. t. 25.
 Sphondylis. p. 94.
 Cordi. p. 66.
 Squilla. p. 139.
 Staphylinus. p. 95.
 Stella, Nomen, Descriptio, Natura, p. 144. Vfus, Differentia, p. 144. 145. t. 27. 28.
 Syrones. p. 89.
T abanides musca. p. 56. t. 9.
 Tabanus, Nomen, Descriptio, p. 56. t. 8. Differentia, p. 56.
 Tagliadizzo Ital. p. 79. & 78.
 Talpa Ferrantis Imperati. p. 95.
 Tambeiva Brasil. t. 15.
 Tarantula. p. 102. t. 26.
 Taurus volans Brasil. p. 74.
 Tenamaznanapalao. p. 64.
 Teocuilin. p. 78.
 Teredines. p. 132.
 Teredo. p. 137.
 Termites. p. 131.
 Thripes. p. 131.
 Tineæ. p. 91.
 Tinea. p. 142.
 Tipula, Baffermücken. p. 140. t. 3. & 25.
 Tunga Brasilient. p. 105.
 Tryxalis Moufeti. p. 65.
V ermes, Nomen, Generatio, Natura, Vfus Differentia, p. 129.
 arborarii. p. 129. t. 24.
 fruticarii. p. 133.
 Leguminarii & frumentarii. p. 134. t. 24.
 farinacei. p. 134.
 Herbarii. p. 135.
 in animalibus nati. p. 135.
 Homines. p. 236. t. 24.
 tubulis nascentes. p. 143. t. 26.
 Vespa, Nomen, Descriptio, Locus, p. 17. Vitus, p. 18. Aetas, Vfus, Differentia, p. 18. 19.
 Uva marina. p. 246. t. 28.

HISTORIÆ
NATURALIS
DE
SERPENTIBUS,

LIBRI II.

JOANNES JONSTONUS

Medicinæ Doctor Concinnavit.



AMSTELÆDAMI,

Apud JOANNEM JACOBI FIL. SCHIPPER.

ANNO MDCLVII.

PERILLUSTRI ET REVERENDISSIMO
DOMINO, DOMINO
A R N O L D O,
DIVINA PROVIDENTIA MONA-
STERII DUCALIS LIBUSIEN-
S I S A B B A T I,
Domino & Patrono suo gratiofo,

Hanc de S E R P E N T I B U S Historiam Observantiæ
ergo offert

J O A N N E S J O N S T O N U S,
Medicina Doctor, Zibeniaci Dominus.

HISTORIA NATURALIS

DE

SERPENTIBUS:

LIBER I.

De Serpentibus Vulgaribus, seu Minoribus.

TITULUS I.

De Serpentibus in genere.

Nomen.
Ambros.
de Serpen-
tibus lib. I.
c. I.



Serpentis vocabulum, vel à ser-
pendo, quod occultis acces-
sibus, non occultis passibus,
animal hoc progrediatur, vel
à Græco *σέρπεν*, nisi Festus
fallit, descendit. In genere sumptum, om-
nia illa, quæ vel citra usum pedum repunt,
vel tam exiguos habent ut reperere quam in-
cedere videantur, complectitur. Dicitur
etiam priscis *Serpula*, si Festo credendum;
aliis *Coluber*, seu quod in lubricis tractus
flexibus sinuosis labatur: seu quod umbras
colat, ut apud Virgilium legimus: quan-
quam alii pro serpente domestico accipi-
ant, alii pro serpente aquæ, ut Theophras-
tus, Gaza, & Ponzettus sumant. Dicitur
& *Anguis*, quod semper quasi angulosus &
plicatus conspiciatur: quanquam Servius,
aquaticis duntaxat hoc nomen tribuit, alii
etiam terrestribus. *Thyrum Echydram* &
Draconem vocari, passim apud authores in-
venies. Græcis veteribus est *ὄφις*, moder-
nis *ὄφιδ*, sine dubio *ὄφις*, seu quod
acutum cernat, seu quod oculis apertis
dormiat: Hesychio *ἀργας*, Argivorum Dia-
lecto. Unde Pausanias Mercurium *Argi-
phontem* dixit, quod sit *ὄφιοντις*, id est ser-
penticida.

Virgil. Ge-
org. I. 3.

Descriptio.

Lacertis valde sunt similes. *Caput* qui-
busdam leve, grave aliis, quibusdam latum,
angustum, album, nigrum, nonnullis fla-
vum variegatum. Sunt qui illud tam velo-
citer in utramque partem vertunt, ut in-
tuenti bicipites vel amphicephali videan-
tur. *Aures* etsi habeant, non eminent tam-
en; recte cavernas ad audiendum, Plinius
vocavit. Sed nec meatus narium, *nares* recte
appelles, quod non ita explanati sint. *Oculis*
sunt durioribus. *Palpebras* superiores non
movent, inferiore tantum connivent. *Collo*
carent. *Dentes* pectinatum cœunt. *Cortice*

tanquam pelle teguntur. *Caudam*, ut in se-
quentibus agemus, variam gerunt.

De *Internis partibus* & *Anatomicis* ita ha-
bet Ambrosinus: Primitus *caput* serpentis
osse unico tegitur conretusi figura, sicuti
astruit Cardanus. Imo in hoc osse oculo-
rum foramina natura non inculpsit, quod
ideo factum est, ne facile læderentur, dum
humi serpunt. *Dentes* habent ferratos, &
acutos, quemadmodum paulo ante in de-
scriptione, hujus animalis fuit exaratum.
Sed ut notat Edoardus Wottonus duo sunt
in suprema parte, dextra, levaque longissi-
mi, tenui fistula, instar aculei Scorpionum
perforati, per quam postea venenum, data
occasione, ejaculantur. *Lingua* serpentum
tenuis, longa, atroque colore referta est;
ideoque longius potrahitur: In summitate
vero est bifida, & secundum nonnullos pi-
losa, seu potius exilis instar pili, ut in capite
de lacertis fuit explicatum. Plinius lin-
guam serpentum *trifurcam* vocavit, qua
tanta celeritate illam vibrant, ut tripli-
cem linguam exerere videantur. Sub
lingua in quibusdam cuticula invenitur,
quæ tanquam *vesicula* dentes operit, in qua
venenum occultatur, quod postmodum
mordendo per cavitatem dentis commu-
nicant. *Cor* exiguum longum, & figuram
renum repræsentans, postremæ adhæret ar-
teriæ, & natura valde calidum est: Ob hanc
causam tradebat Galenus Serpentes inter
cæteros animantes maxima audacia esse
refertos. *Arteria* est admodum longa, & ju-
xta os suam trahit originem, ita, ut sub lin-
gua esse videatur. Imo linguæ quodam mo-
do videtur præminere, qua ipsa contrahi-
tur, neque eodem loco, ut in cæteris ani-
malibus, permanet. Hæc postea deservit
in *pulmonem* quo angues ad differentiam pi-
scium, utuntur: Quo circa notabat Plinius,

Card. I. 2.
rerum va-
rietat. capi-
29.

Edoardus
Wottonus
I. 2. de dif-
fer. Anim.

Galen. in
libro de A-
natomia
vivorum 2.

serpentum & piscium omnia esse similia, præter pulmonem, quem natura serpentibus & non piscibus largita est, cum pisces loco pulmonis branchias adhibeant. Hic pulmo simplex est fibrosus, fistulis divisus, prælongus, fungosus, & cordi non multum proximus. *Lingulam* vero quam Græci *ἐμ-
γλώττιδα* vocant, arteria superpositam angues non habent, sed ipsum meatum, ad libitum, modo contrahunt, modo laxant, idque præstant, ne aliquid in pulmonem delabatur. *Ventriculum* habent serpentes veluti amplum intestinum canino similem, nempe angustum, & figuræ longæ. *Intestinum* vero spiris carens tenue, & longum ad meatum usque excrementorum protrahitur. Nam interanea serpentum partibus internis lacertorum similia sunt, sed viscera, propter longitudinem, & angustiam corporis ita longa & arcta sunt, ut vix à se invicem dignosci possint. *Iecur* igitur longum est, & simplex, *lien* exiguus, & rotundus qualia viscera etiam in lacertis observavimus. *Fel* præter natricem, omnibus serpentibus, intestinis adhæret, & nigro quodam, liquidoque excremento refertum est, sicuti in vipera foemina nuper conspicati sumus. Hoc excrementum, in comparatione ad corporaturam animalis, est valde copiosum. Quare merito tradebat Plinius, serpentes, nec non pisces copioso fellis excremento redundare. *Vesica*, & *renibus* serpentes carere notat Aristoteles, veluti, & alia, quæ pennis, squamis, & cortice integuntur, præter testudinem. Hoc autem inde nascitur, ut

Vincent.
lib. 20. c. 3.

Arist. l. 1.
de gen. An.
cap. 5.

autore Vincentio in speculo naturali visum, quia humiditas anguium, sicut & avium pauca est, ideoque in squamas, quoad serpentes, & in pennas quoad aves degenerat. Amplius vim fætificam natura his animalibus velut, & piscibus impertita est, cum pene, & testibus careant. Scripsit enim Aristoteles, eos *pene* carere, cum non habeant crura; nam hic à cruribus originem habere dicitur. *Testes* vero propter corporis longitudinem non sunt sortiti. sed meatum, more piscium obtinuerunt: quandoquidem propter longum iter genitura facile refrigeraretur, & infæcunda evaderet. Hoc sæpe iis contingere solet, qui longo pene à natura sunt donati, quamobrem infæcundi redduntur, cum semen ob mentulæ longitudinem refrigeratum infæcunditatem pariat. Verum loco prædictarum partium genitalium, natura his animantibus *bimos* communicavit *meatus*, qui à septo orientes lateris spinæ ab utraque parte perreptant, & utrinque superne juxta spinam junguntur, atque ita ad os excrementi finiunt. Hi meatus, tempore congressus, humoris fætifici pleni conspiciuntur, attrituque mutuo candidum semen effluit, quemadmodum in historiis piscium fuit memoratum. *Mamma*

in anguibz non observantur, quia *lac* non habent, cum in ovo lacteus ille cibus ingentus contineatur. *Vulva* seu uterus ex sententia Aristotelis in omnibus serpentibus bifidus videtur prolixior, ab uno inferiori meatu ad utrumque spinæ lateris deductus, in quo ova generantur; indeque continua quadam serie exire solent. Circa ossa anguium docet Aristoteles hæc esse naturæ spinarum: quare spina dorsi illis, ritu piscium, inest. *Vertebrae* cartilaginosa, & flexiles sunt, sicuti natura horum animalium ex postulabat; Nimirum ut quoscunque motus, & corporis flexiones facilius excercere possent. Tot *costae* insunt anguibz, quot dies mensē complere solent: Unde Plinius in singulis anguibz costas tricenā enumerabat. Cæterum in confirmationem eorum, quæ hætenus de anatome Serpentum explicata sunt, addemus illa, quæ de inspectione anatomica hujus animalis observavit I. Gregorius Macer, qui scribens ab Gesnerum retulit, se in serpente interfecto primo inter cutem, & carnem, subtilem quandam & pinguiusculam membranā invenisse, quæ tamen cum ipsa cute descendeat. Secundo dum scindens animal ad meatum excrementorum pervenisset, fæces gravissimo odore excrementa humana superantes invitus olfecit. Detecta cute, membra interna partim avibus, partim piscibus communia esse vidit. Nam trachea arteria longitudine quatuor digitorum, parvis, & gracilibz circulis insignita ad pulmonem usque descendeat, cui cor, & cistis fellis adhærebat. Postea *Iecur* ad instar hepatis lucii piscis in longitudinem extendebatur. Deinde pinguedine candida intestina erant referta, quæ à faucibus usque ad podicem more intestinatorum piscium progrediebantur. Infra hepar utrinque juxta intestina vera nervosa longo ductu descendeat, cui ova pellicuculis albis recta inhærebant, ut in gallinis videre licet, sed situ distincta, quia longo ordine ducuntur. Numerus in quolibet latere erat triginta, & duorum ovorum, quamobrem ratione cordis, pulmonis, & asperæ arteriæ serpens avibus valde assimilatur. Ratione hepatis intestinatorum & abdominis Serpens cum piscibus convenit. Verum postea ratione cistis fellis, & dispositionis ovorum, Serpens ab utrisque nempe tam ab avibus quam à piscibus dissidet. Hætenus Ambrosinus.

Nullos esse in Ebuso insula prodidit Plinius, in Creta Aristoteles & Solinus, in Britannia Cardanus, in Laponia, alii. In Hiberniam allatos interire, imo terra illius regni conspersos, exanimari, Angli prodidere. Navibus in Bugum fluvium delati, edito sibilo alio confugiunt, si scriptoribus Polonicis fides. Bellonius tamen nonnullas in Creta species observavit: rationes vero Car-

Arist. l. 3.
de partib.
An. c. 9.

Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

Locur.
Plin. H. N.
l. 35. c. 19.
Cardan.

Bellon.
obs.

Scalig. Cardani de Britannia, à Scaligero confutatae sunt. Frequentes sunt in Ophiusa, Melitæa, Thessalia, Apulia, Arabia, Numidia, Æthiopia. Septentrionalibus regionibus, Helvetia, & Italia. *Ophiusam* seu Colubariam ob serpentum copiam inhabitabilem factam Plinius refert. *Melitam*, in qua terra *Gratia S. Pauli* dicta nascitur, eorundem fecundissimam notum. *Thessalia* in tantum abundat, ut nisi à Ciconiis vorarentur, incolae sedibus pellerent. Oppidi S. viti in monte *Apulie* Gargano cives, alio migrare coegerunt, ut apud Leandrum legimus. In *Arabia* circa thuriferas arbores versantur: inde in Ægyptum avolant. In *Numidia* morsibus eorum venenosis plurimi quotannis moriuntur. In *Æthiopia*, si Pierio credendum in gyrum invicem volvuntur, ut montis speciem intuentibus repræsentent. In *Africa* agricolæ præaltas induunt ocreas, ne à serpentibus qui ibi copiosi, appetantur. In *Indiis* sunt maximi. In *Septentrionalibus regionibus* per campos & sylvas vagantur. In Lombardia & agro Ferrariensi multas inveniri species, Scaliger author est. Celsus minus ibi venenatos tradit. Maxime vero caulas, casas rusticas, cavernas, prata, sylvas cædvas, & arbores amant. *Ælianus* sane circa paludem sitam juxta *Ephesiam* metropolin, cavernam serpentibus plenam inveniri narrat. Apud Septentrionales, in cavatis betulæ radicibus resident, & hyeme talem juxta radices calorem efflant, ut arbor folia non deponat. In terra etiam tophacea latibula parent. De *Ulmo* inter Brachianum & Romam, in qua serpentes stabulantur, ita *Kircherus*: Ab his montis spiraculis deorsum versus quindécim fere passuum spatio descendentibus, occurret ulmus, arbor sateminus spectabilis, sub qua specus, seu caverna quædam, vulgo *la Grotta delli Serpi*, duorum hominum capax, fistulosis quibusdam foraminibus in cribri formam perforata cernitur, ex quibus ingens quædam principio Veris diversicolorum serpentum, nulla tamen, ut dicitur, singulari veneni qualitate imbutorum, progenies quotannis pullulare solet. In hac spelunca Elephantiacos, leprosos, paralyticos, arthriticos, podagricos, similibusque desperatis membrorum affectionibus laborantes nudos exponere solent, qui mox halituum subterraneorum calore in sudorem resoluti, serpentum propullulantium totum corpus infirmi implicantium succuque linctuque, ita omni vitioso virulentoque humore privari dicuntur, ut repetito hoc per aliquod tempus medicameuto, tandem perfectæ sanitati restituantur. De hac spelunca cum varia à variis inaudissem, & jam dudum ingens me rei tam prodigiosæ veritatem exacte & κατὰ τὴν ἀποψήαν ex aminandi invasisset desiderium, tandem cum hoc

anno 1640. 8. die Decembris eas oras in negotio quodam Geodætico pervagarer, tam insignem veritatis indagandæ occasionem minime negligendam ratus sum: conducto itaque non viarum duntaxat, sed & naturæ montis perito duce, speluncam per avia & devia non sine periculo adii, & quæ de situ montis, de spiraculis sive evaporario, de caverna & serpentibus inaudieram, omnia vera esse cognovi, speluncam ingressus, eam utcunque calidam inveni, at serpentes non vidi, utpote eo tempore latitantes, spoliis tamen & exuviis eorum ultimus paulo ante memorata ita onerabatur, ut staphylodendrum, coluteam, seu vesicariam folliculis refertam dixisses, quæ serpentium, quorum mons scatet, geniminis luculentum præbebat testimonium, imò auribus ad meatuum officia applicatis, nescio quod obtusum murmur, aut quis sibilosus strepitus, si non aëris cum halitibus inclusis luctæ certe latentium anguium manifestum signum percipiebatur, &c. *πύμφοροι*, sunt Aristoteli, & herbis quoque vitant. Pulverem comedere ex sacris quidam concludunt: nec negandum, dulci gleba delectari. In Africa oniscis: in Oriente, teste Vitriaco, pipere albo nutriuntur. Exiguo interdum contentos cibo, & inediam bene tolerare, vel circulatores norunt, qui angues in capsulis, modico fursure pastos circumferunt. Hyeme sub cervicali, vel ad ignem, ad ver usque vitam protrahunt. Ambrosinus in vasculo per sex menses sine cibo conservavit. Aristoteles, devorato aliquo animalculo, totam ab eo nutritivam substantiam extrahere, reliquum per secessum excutere scripsit. Dum vorant ex longis brevissimi, & ex tenuibus latissimi sunt, ut quod deglutivere, melius in ventrem delabatur. Avibus devoratis, plumas & ossa evomunt. In regione Senegæ pullis psittacorum insidiantur. Vino, lacte, aqua, & ovorum vitellis delectantur. Hæc quidam ab iis deglutiri tradunt, si faucibus capiantur, mox ab ipsis in semet convolutis frangi, & cortices per inferiora dejici. Juniores orbe spiræ perstringunt, & fracto putamine, liquorem hauriunt. Vini incontinentes esse Aristoteli proditum. Ideo quidam vino circa sepes apposito, viperas venantur. Temperamento quibusdam sunt frigidi, calidi quibusdam. Illis Galenus imprimis, his Avicenna faver.

De *Generatione* serpentum duo occurrunt; Unde orti sint, & quomodo generent. De *Ortu* variæ sententiæ. Quidam Poëtæ ex sanguine Titanum à Saturno & Opi occisorum prodiisse fabulantur. Alii ex guttis capitis Medusæ sanguineis: Nonnulli ex putredine terræ, ex qua magnus illæ serpens Python prodiit. Nec absolum hoc. Nam & Nervi Scythiæ populi ob natos

Vitruv.
Arist. H. A.
1.8. c. 4.

Arist. H. A.
1.10. c. 4.

Arist. H. A.
1.2. c. 4.

Generatio.

Ovid. Met.
t. 1. 4.

Metam. 1. 1.

- Herodot. 1.4. ex terra serpentes, paulo ante Darii expeditionem solum mutare coacti sunt, Herodoto teste: & Amyclas, Italiae inter Terracinam & Cajetam civitatem, à serpentibus ex vicinis paludibus prognatis, deletam, Plinius asserere ausus est. In corpore humano nasci, in Historia de Homine dicemus. Ex sanguine quarundam avium confuso, Democritus prodidit, referente Plinio: ex salvia in sterquilinio putrefacta alii. In solido & vasto marmore inventum fuisse, Martini v. Pontificis tempore, ex Baptista Leone apud Pareum habemus: Causam Cardanus reddit. Ex cadaveribus humanis nasci, & corrupta spinæ medulla, apud Camerarium invenies. A tali ex plumbeo feretro profiliante, Avenionensem opificem læsum, apud Pareum legimus. Modum generationis aperuit ex Aristotele Plinius. Coeunt, inquit, complexu adeo circumvoluti sibi ipsi, ut unus existimari biceps possit. Consecta ova in terra incubant, & factum sequente excludunt anno. Continuata illa serie contexta, ut monilis instar videantur. Quidam & animal pariunt. Fetorem in congressu edere, apud Ælianum legimus.
- Ælian. H. A. l. 9. c. 49. Vox. Luca, l. 6. Vox ipsi est sibilus. Obtusum testudines, longum serpentes reddunt, stridere id Luciano: *ποσειδων* Apollonio in Argonauticis. Erectos ante lapsum incessisse, imaginantur nonnulli: serpere, quis non novit! Flexuosis impetibus incedunt, & caput, reliquo corpore quiescente, ob vertebrae cartilaginosas vertunt: sicque corpus suum longum & angustum in partes adversas respicientes, melius tueri possunt. Squamis quasi unguibus, & costis quasi cruribus innituntur. Græci de hoc motu verbum *εὐλίσσασθαι* usurpant.
- Aristot. de incessu animal. Animipathia. Plin. H. N. l. 7. c. 2. & l. 28. c. 3. Inimicitiam cum hominibus, plantis & animalibus gerunt. Quantum ad homines, omnibus contra serpentes inest venenum: feruntque ictos saliva, ut ferventis aquæ contactum effugere. Crates Pergamenus in Hellesponto circa Parium, genus hominum fuisse tradit, quos *Ophiogenes* vocant, serpentum ictus contactu levare solitos, & manu imposita, venena extrahere corpori. Varronis tempore, pauci ibidem erant, quorum saliva contra ictus serpentum medebantur. Similis & in Africa gens Pysyllorum fuit, ut Agatharchides scribit, à Pysillo Rege dicta, cujus sepulchrum in parte Syrtium majorum est. Horum corpori ingenitum fuit, virus exitiale serpentibus, ut cujus odore sopirent eas. Mox vero liberos genitos, protinus objiciendi sævissimiseorum, eoque genere pudicitiam conjugum experiundi, non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus. Simile & in Italia Marsorum genus durat, quos à Circes filio ortos servant, & ideo in-
- esse iis vim naturalem eam. Idem apud Strabonem invenies. Inter animalia gerunt inimicitias cum avibus, quadrupedibus, & exanguibus. Avibus. Nam aquile lapidem ætitem in nido deponunt, ne pulli à serpentibus lædantur. Eadem in montibus regni Morfili anguibus vescuntur. Notum, quam gratitudinem Aquila à serpente Spiritis arctissime complicata, rustico liberatori præstiterit, apud Ælianum. Pavonis clamore terrentur, Ciconie in Thessalia maxime immunes, quod serpentes interimant. Eiusdem in Italia pulli tribus annis continuis aliquando devorati fuere. Huc accipitres, ibides, quorum pennas timent, vulturnes, hirundines galli, & gallinæ pertinent. Ex quadrupedibus sunt Elephantii qui Spiritu cervorum ritu, serpentes à cavernis evocant: Leopardi, quorum odorem vitant, Cervi, qui seu tanquam medicamento, quod Isidorus tradit, seu tanquam pabulo, quod Belluacensis, seu levandi senii ergo, & ut pilos mutent cornuaque deponant, quod alii, serpentibus vescuntur. Sues etiam angues inventos edunt. Per eas ager Plombinensis à quodam serpente purgatus est. A foricibus brumali tempore infestantur, quod tum languore quodam laborent. Cum iisdem, testudo, ichneumon, lacerta, & Chamaeleon, ut propriis locis est dictum, congregiuntur. Catum quoque eis infestum, apud Aristotelem habemus. Ex Exanguibus, Locustæ species quædam *Ophiomachus* dicitur, quod cum serpentibus prælietur, eosque gutture arrepto interimat. Albertus *Ophimatum* vocavit. Cancræ serpentes ad Ephesiam metropolim, forcipibus arripiunt, dum paludes juxta Ephesiam tranare conantur. Aranei sub umbrosis arboribus appricantes, ictu inflicto vertiginosos reddunt: quod tamen melius de lacertis sumferis. De plantis hoc habet. Nec umbras quidem fraxini arboris ferre: ideo hæc prolixo naturæ beneficio, antequam à latebris egrediantur flores, postquam delituere, folia demum deponit. Smilo, in Trachinio solo, si appropinquaverint, interire. Foliiis quernis injectis, si Geoponicorum auctori credimus, perire. Octobrem florecentis uvæ averfari, nec tum temporis in vitibus inveniri. Veronica circulo inclusos flagellando, quia exire non audent, sese perimere. Odore alii deterri: rutæ, vero Lybicas in primis, animo linqui. Taceo trifolii quandam speciem, ut Plinius voluit, absynthium, artemissiam, abrotonum, libanotidem nepetham viticem, quam mulieres in Thesio-phoriis pulvinaribus substernebant; Helenium denique seu Enulam Campanam, cujus ideo Ælianus meminit. Therionarca in Cappadocia & Mysia nascente, omnes feras torpescere, fabulatur Plinius. Ab igne abhorreere apud Cardanum habemus.

Sympathia Amicitiam colunt *inter se*, quia in caver-
 nis sæpe conglobatim inveniuntur : cum
 Plin. in proæmio. *anguillis*, ut Gesnerus exemplo cujusdam
 Arist. H. A. pueri docet : cum *vulpibus*, quia in cryptis
 I. 2. c. 1. communem vitam degunt : cum *Cattis*,
 Plin. H. N. I. 16. c. 34. quia aliquando secum colludere visi sunt.
Hederam serpentum frigori gratissimam, ut
 mirum sit ullum honorem habitum ei. *Feniculo*
 Plin. H. N. I. 20. c. 23. degustato, senectutem facilius exuunt :
 & succo oculorum aciem, in latibulis fere
 amissam, recipiunt. Circa *sabinam* semper
 obverfantur.

Natura & Mores sequentia exprimunt.
 Plin. H. N. I. 2. c. 63. Terra serpentes homine percusso non am-
 plius recipit, pœnasque etiam inertium no-
 mine exigit ; venenum secundum quod-
 dam, in cauda habent, quod in vesicam ori-
 vicinam deducatur, quæ, priore etiam eje-
 cto, intra diei naturalis spacium alio im-
 pleatur. Quatuor frigidissimis mensibus
 latent, nec quicquam comedunt, imbecilli-
 tum adeo veneno, ut impune tractentur.

Arist. H. A. I. 2. 3. c. 15. Urgente canicula adeo æstuant, ut nun-
 quam fere quiescant : Plinius, cum sole est in
 Galen. I. 2. cancro, torqueri dixit. Vere, dum è late-
 affectis. bris prodeunt, exuvias deponunt, quas quidam
 Plin. H. N. I. 32. c. 5. *syphar*, alii *senium*, *γῆρας*, nonnulli ad
 Arist. H. A. I. 5. c. 17. *Plinii mentem*, *vernationem* vocant. Inci-
 & I. 8. c. 17. piunt à capite ut quasi, à decidentibus ob-
 cæcentur : diei naturalis spacio devolvun-
 tur ad caudam, totumque aufertur spo-
 lium, ut Aristoteles prodidit, pro ut fœtus
 membranarum involucris liberantur. De-
 gustato fœniculo in hominis conspectum
 prodeunt. Genuina ne hæc pellis, an ex
 muco & sordibus per hyemem contractum
 spoliū, ad Disquisitionem causarum per-
 tinet. Diuturnioris etiam sunt vitæ, seu
 quod exuvias deponant, seu quod parci
 sint cibi, seu in comparatione ad alias be-
 ftiæ. Diei noctem pervigilem conjungere,
 dum apertis oculis somnum capiunt, alii
 prodiderunt. Prudentia in eo notatur à
 quibusdam, quod totum corpus periculo
 exponant, ut caput illæsum servant. Illud
 facile pristinae sanitati vulneratum reddi-
 tur ; hoc attacto, moriuntur facile. Arun-
 dine percussi, mortuorum instar jacent : si
 frequenti ictu petieris totis viribus morde-
 re conantur. Stercus serpentum bene ole-
 re, facile concedi potest, si verum est, in-
 ter Calecutum & Cranganon inveniri, qui
 ab Ore suavissimum & mosci instar spirent
 odorem.

Venenum. Huc *veneni* consideratio spectat. In cysti-
 Plin. H. N. I. 11. c. 37. fellis istud, secundum Plinium, residet : in
 vesica quadam sub lingua, qua disrupta li-
 quor quidam biliosus emanat & corpus in-
 ficit, secundum Grevinum. *Tot eorum vene-
 na quot genera, tot pernices quot species, tot do-
 lores quot colores*, Isidorus dixit. Diversa ta-
 men operatio. Mares fœminis, fenes ju-
 nioribus, magni parvis, jejuni saturis, o-

mnes, æstate quam hyeme, sunt pernicio-
 flores. Deposito senio magis formidolosi
 feruntur. An aliquando veneno careant,
 disquiritur. Præ dolore ob amissum dis-
 rumpi, quæ Vincentii mens est, falsum.
 Breviore an diuturniore temporis spacio
 icti intereant, partim veneno, læso par-
 tim, adscribi debet. In Indiis Orientalibus
 sues vel canes à quibusdam admorsi, sex
 duntaxat horis supervivunt : hominès diem
 naturalem : remediis liberati, periculo va-
 cant si postea admorsi fuerint. Alibi, vel
 ipse halitus prætereuntes interimit. Quen-
 dam interiisse, cum se in aqua lignis prope
 serpentis cavernam excalectis, lavasset,
 Ponzettus author est. Scaliger Paravici-
 num quendam, non procul Dertona, ser-
 pente, in venatione hasta occiso, mortuum,
 prodit. Mathiolus in agro Tridentino vac-
 carum custodem in periculo, & morti pa-
 ratum, nisi theriaca & aliis refocillatus fuisset.
 Habet & *locus* aliquid. Ferociiores iis
 qui in plano montani, qui inter Arabica
 balsameta minus nocere creduntur. Vul-
 nere inflicto, stupet primo ager : mox vul-
 nus dolore afficitur, color mutatur, in-
 flammatur, rubet, livet, nigricat, & æ-
 ger totus ardet. De *Remediis* multa habentur.
 Vulcani in Lemno antistes, Umbro de gente
 Marubiorum apud Virgilium, Atyr apud
 Silium Italicum, virtutem Serpentum
 morsus sanandi possidere credebantur.
 Mira de Psyllis Lybicus Ælianus. Non valde
 si doluissent puncti, sola Saliva sanasse :
 ubi dolore premebantur, colluto aqua ore,
 bibendam tanquam salutarem dedisse :
 si nec hoc juvisset, accubasse agro &
 corporis sui contactu infregisse venenum.
 Certiora remedia sunt, quæ aliunde
 sumuntur. Laudatur capræ nigræ lac, si lo-
 cum affectum eo foveris. Puella quadam
 caseo capræ recenti ulceri imposito sanata
 est. Medullâ cervi perlinitus, ab eodem o-
 ptime defenditur. Vegetius in jumentis
 demorsis, stercore suillo recente utitur.
 Dioscorides fimum bubulum vehementer
 commendat. Quid si ipsemet serpens suos
 ictus sanet ? Herbarum huc facientium ca-
 talogum, apud Ambrosinum vide. Maphæum
 si sequimur, sunt in India arbores *Copaibe*
 dictæ, balsamum fundentes, quo læsi à
 serpentibus sanantur. Idem arbores ex
 nucum genere, si Plinio fides, faciunt : nec
 non in Græcia frutex, Epipactis nominatus,
 alii Embolinèn vocarunt. Ex *Compositis*,
 Theriaca Andromachi intra, extra, Confectio
 Hermetis, Emplastrum Epigonum, Oleum
 scorpionum, & divinum, de quibus Ambrosinus,
 laudantur.

Vescebantur iis olim, Troglodytæ, & *rsu in ci-
 Æthiopes*, si Herodoto credimus ; Can-
 dæi, qui & Ophiophagi inde, si Plinio ; A-
 rabes,

Ambrosi.
 de Serpent.
 p. 40.

Scaliger
 Exerc.

Mathiol.
 l. 5. in
 Dioscorid.

Wotton de
 Diff. anim.
 lib. 6.

Veneni re-
 media.

Ælia. H. A.
 l. 16. c. 28.

Maphæus
 Hist. Indic.
 l. 2.

Plin. H. N.
 l. 27. c. 12.

Herodot.
 Hist. l. 4.

Æl. H. A. rabes, si Solino. In Brasilia, carnem quorundam, qui brachii humani crassitudine, concidunt, & inter apparatus reponunt. In Cuba, inter regios apparatus censentur. Ova comesta per murænam redduntur innoxia.

Ussin Medicina.

In Medicina magni sunt usus. Totum si spectes, capite & cauda truncatis, interaneis abjectis, deglubiti, carne bene lota, & cum vino cocta, jure aromatibus condito, in lepra commendantur. Suffitu inveterati in mensibus provocandis Plinius utitur. Quidam cum floribus herbæ paralytis in oleo ad podagram decoquunt. Cinis combustus in fistulis sanandis vehementer commendatur. Baculus quo rana ab angue excussa est, parturientes adjuvat. Quantum ad partes, Oculum dextrum utiliter ad epiphoras alligari, dummodo serpens dimitatur, Plinius alicubi, author est. Cor si mordeatur aut alligetur, in odontalgia efficacis perhibetur. Iecur qui degustaverit, si credere fas est, à nullo serpente tangetur.

M. Paulus Venetus l. 2. c. 40.

Ambrosin. de serpent. l. 1. c. 1.

Porta Phytogn. l. 5. c. 12.

Tagaut. l. 1. Inilit. Chirurg. Porta Phytogn. l. 5. c. 12.

Gal. Euporist. l. 2. & l. 11. de simpl. medic.

Dioscor. M. M. l. 2. c. 17.

Plin. H. N. l. 28. c. 1. l. 29. c. 6. l. 30. c. 7.

Vssin in variis.

Felto sti Paulo Veneto, demorsos, à cane rabido sanat; parturientes, degustatum, felicissime juvat; & hæmorrhoidibus illitum opitulatur. De sanguine, ex lib. inominati, prodit Ambrosinus, pallida prælabia rubicunda reddere, faciei innectum ab omni macula fervare; dentibus illitum gingivarum factorem auferre. Pinguetudinem aliis ad luem veneream curandam Marthiolus admiscet: eadem, cum butyro majali lento igne cocta & percolata, ad paralytin & podagram conservatur. Pessis ad sterilitatem tollendam, cum felle tauri, Hippocrates miscet. Carnes ad extergendam cutim humanam valere, Porta persuadere conatur. Abensina in lepra eadem inhumat donec vermes enascantur: mox cum his exsiccat, & drachmam pulverizatarum cum syrupo de melle leprosis exhibet. Tagautius, strumis & elephantia si iisdem medetur: Porta vulneribus & nervis incisis quod dissecti brevi temporis spacio coalescant. Spolium insignium virium esse credidere antiqui. Ad casum pilorum conducere, ait Galenus; ad claritatem oculorum, si eodem fricentur, Plinius: ad odontalgiam in aceto decoctum, & dentes eradicandos iidem. Aurium dolori, seu in vino seu in oleo, coctum, prodesse Dioscorides & Theophrastus; cum capitibus papaveris Archigenes. Suffimentum partus difficultates solvit. Ex sententia Plinii, lumbis parturientis alligari debet. Villanovanus suffitu ex eodem, cum opopanax, myrrha, galbano, Castoreo, stercore columbino vel accipitris facto, fetum mortuum & vivum educit.

Olim iisdem in puniendis paricidis utebantur. Ægyptii in foveam serpentibus plenam eos conjiciebant: Romani, culeo,

cum simia, gallo gallinaceo & serpente insutos, in mare projiciebant. In India, teste Linschotano, à circulatoribus circumferuntur, qui eosdem ad instrumenti musici sonum tripudiare cogunt. Annibal, injecta magna vi serpentum fistilibus inclusorum in Romanorum classem, effecit; ut Antiochus victoriam reportaret. Adipe veterinarii ad equorum stranguriam utuntur: aucupes carnibus ut aves citius pennas mutent. Albertus multa ex partibus, sed nugatoria, conficit, quæ apud Ambrosinum vide. Orum quidam eques coram Claudio litigaturus, spe vincendi gestabat: deprehensus, tanquam veneficus, interfectus fuit. Senectam tanquam amuletum, in armillis quidam ligare solebant. Cardanus ad nescio quæ non, in certis constellationibus adhibet. Plinius cum sale, & serpillio tritam bobus in fauces, uva maturecente injicit, ut per totum anni curriculum valeant. Wottonus in armariis & cistis reponit, ut vestes à tineis immunes ferveret. Alii ejus pulverem inspergunt, ut apes ad alvearia revertantur.

Differentiæ serpentum multæ sunt, Primarias ad sequens caput rejicimus. Secundariæ, à quantitate, colore, loco, odore, noxa, aspectu, & aliis accidentibus sumuntur. De quantitate nota, Marem femina semper minorem. In plaga septentrionali, ineunte ætate, parvos reperiri, qui regem cristatum habeant, eodemque occiso dissipentur. In Thessalia parvum & hirsutum, si Belluacensi si fides, quem incolæ sacrum vocent, alium, sola voce animalia interimere. In India quoque magnitudine aliis longe inferiores, πικίλως τὴν χροάν versicolores, & ὡς περὲν Φαρμάκας καταχραφέωντες, quasi pigmentis distinctos. Alibi maximi sunt. Megasthenes scribit, verba sunt Plinii, in India serpentes in tantam magnitudinem adollescere, ut solidos hauriant cervos taurosque. Metrodorus, circa Rhyncadum amnem, in Ponto, ut supervolantes quamvis alte perneciterque alites haustu raptas absorbeant. Nota est in Punicis bellis, ad flumen Bagradam, (nunc Megerada) à Regulo Imperatore balistis, tormentisque ut oppidum aliquod, expugnata serpens, cxx. pedum longitudinis. Pellisejus maxillæq; usque ad bellum Numantinum duravere Romæ in templo. Huc Seneca respexisse videtur, dum scribit, Lenis & privata perniciēs non solas urbes movet. Quod late fure re capit, & omnes appetit, undique configitur. Serpentes parvulæ fallunt, nec publice consequuntur; ubi aliqua solitam mensuram transit, & in monstrum excrevit, ubi fontes potu infecit, & si afflavit, deurit, obteritque, quacunque incessit, balistis petitur. Circa mare rubrum longitudine x l. cubitorum, crassitie eidem proportionata olim

Egnat. ver. histor. l. 6.

Sueton. in histor. l. 6.

Differentiæ.

Belluacensi Speculi. l. 20. c. 11. Æl. H. A. l. 17. c. 2. Plin. H. N. l. 8. c. 14.

Val. Max. l. 1. c. ult.

Seneca de Clement. l. 1. c. 25.

Æl. H. A. l. 17. c. 1.

T I T U L U S I I.

De Serpentibus in specie.

C A P U T I.

De Serpentibus terrestribus.

A R T I C U L U S I.

De Vipera.

PRimaria ferè Serpentum Differentia est, in quantum in *Terrestres* & *Aquaticos* & *Dubios* distinguuntur. *Terrestres* sunt, *Vipera*, *Ammodites*, *Cerastes*, *Hæmorrhous*, *Septs*, *Aspis*, *Dipsas*, *Scytale* & *Amphisbæna*, *Cæcilia*, *Cenchrus*, *Acontia Dryinus*, *Elaps* & *Anguis* *Æsculapii*. His *Indicos* adde.

Ambrosin. de serpent. l. 1. c. 2. Nomen.

Viperam quidam ab eo quod *vipariat*, nomen sortitam putant: quasi à fætu exeunte, alvus matris laceretur: alii, & quidem verissimè, quasi *viviparam*, & per contractionem *viparam* & *viperam*, quod ova intra alvum concipiat, deinde fætum vivum enitatur. Græcis est aliquando per excellentiam *ὄφis*, ut in Oppiano animadvertere est, communiter *ὄφis mas*, & *ὄφισσα* fæmina, *παρὰ τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὴν γαμὴν ἀπὸ τῆς γυναικὸς*, quod ad interitum usque fætum contineat, cui fabulæ apud veteres fides data, vel *παρὰ τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὸ ζῶον*, quod animal intra alvum contineat, quod verissimum. Hodierini Græci *Echendras*, teste Bellonio, nominant. Itali *Marassos*. An rectè, alibi disquireretur. *Suessanus* *Scorzionem* vocat: *Nicolaus Florentinus* *Scorzonen*; quod vocabulum, apud Italos, omnibus serpentibus commune est. Arabes *Thyri* vocabulum ipsis imponunt. Unde *Andromachus* viperinos pastillos, ferinos appellavit, à Græco *τῆς* seu *τῆς* *Νεπᾶμ* non esse, certum.

Aristot. l. 1. de generat. Animal. c. 10.

Serpens est venenosus longitudine cubitali, sæpè prolixiore, colore subflavo, pluribus maculis consperso, *Mari* caput angustum & acutum, collum crassius, corpus tenuius. *Cauda* ritu aliorum serpentum gracilescit, non tamen acervatim ut fæminæ. Squamis circa extremitatem asperioribus tegitur, quasira percita erigit. *Meatus* excrementorum in cauda est ventri propinquior. Canini *dentes* duo, fæminis plures. *Galenus*, fæminas subflavi coloris, admodum agiles, collum maximè porrigentes, oculis subrubentibus, inverecondis, & ferini intuitus facit. *Aërius*, multis notis instar rotarum exornatas, magnitudine Cubitali cauda acervatim in tenuitatem desinente, alvo sinuosiore, & quæ caudæ innixa gradiatur. *Cardanum* si sequamur, erit præstantissimis viperis caput latum, erectum, & cavum, figura rhombi, oculi vivaces, berve corpus, & ad motum alacre. *Amatus Lusitanus* in Hispania cubitalem esse scribit, capite presso & acuto in quo verruca

Descriptio.

Galen. de Theriaca ad Pisonem.

olim observati sunt. In loco quodam Macra, visus, qui jugeri longitudinem æquaret, crassitie, si credere fas est, tantâ, ut equites ex utraque parte adstantes, seipsos intrui non possent. Posidonius id retulit. Porus Indorum Rex ad Augustum decem Cubitorium misit. In Malaber octonum pedum inveniuntur, puerorum amatores. Jacentes anguiline esse facie dicuntur, surgentes, eam adeò dilatant, ut ad humanam effigiem propius accedere videantur. Novem pedum pellum apud Clusium invenies. Tantam & Ambrosinus apud magnam Hetruriæ Ducem vidit. Idè non inepte forte Gillius scripsit, suum magnitudinem Calecuti æquare: cum præsertim edicto regio, ne occidantur cautum sit. Circa fluvium Senegæ capras, alibi cervos devorare dicuntur. Colorem si spectes, in septentrionalibus regionibus variegati vagantur. In India, si Ælianum sequimur, vittis à capite ad caudam pertinentibus, aliis æreis, aliis aureis & argenteis conspiciuntur. Thevetus quosdam rubescentes, cum squamis versicoloribus, alios instar foliorum lauri virides facit. Hujus coloris & apud Valesianos inveniuntur. Hefychius *Sauritas* vocat. A loco sunt aquatici, terrestres, quorum alii montosis, alii planis, alii quercetis, alii latibulis circa fagos, & corylos delectantur, & amphibii. Observavit Bellonius circa Abydenum portum genus quoddam, rubore in leucophæo refulgens, quod interdum in mari vivebat, noctu continentem, quietis causâ, petebat. *Odoris* ratione sunt quidam ex iis moscati, ut serpens Æsculapii, & *Cusso* Cypriorum, capite magno, & corpore exosse. Integrum agnum devorat: hoc absumpo, ad arborem se tamdiu fricat, donec ossa excusserit. *Noxam* si attendas, in Hispaniola innocui versantur: circa regiam Peruanam Cusco, incantationibus ligati, nihil damni, postquam ferè integrum exercitum delevissent, inferunt. Inter hos Nicander *Moluros* reponit. *Aspectu* sunt vario. Alii habent oculos prægrandes, ut Lybici: alii parvos & locustis similes: nonnulli sanguineos & luteo colore suffusos. Ad accidentia pertinet, quod quidam sunt ore acuto, quidam vasto. Nonnulli cono tanquam crista in vertice superbiant: nonnulli cornua habeant: quidam denique alas. Huc pertinent monstrosi, qualis unus biceps, in Musæo Bononiensi videndus, alter latissimi corporis, & compressâ caudâ, quorum icones damus.

Strab. Geogr. l. 15.

Æl. H. A. l. 17. c. 2.

Arist. H. A. l. 2. c. 14.

Ambrosin. de serpent. pag. 6.

conspicitur, dorso veluti quadam catena depicto.

Anatom.
Ambrosin.
Hilior. Ser-
pent. l. i. c.
2. pag. 117.


Anatomica ipsius Ambrosini verbis exequemur. Sic autem ille : In dissectione viperini capitis *cerebrum* subnigri coloris conspicitur, & adeo pusillum, ut vix quantitatem quatuor granorum milii adæquet, propterea hoc animal à quibusdam calidum, & siccum esse creditur : quod immodicus calor cordis à frigiditate cerebri temperari nequeat. *Auriculis* viperæ carent, sed earum loco quasdam cavernas habent : Etenim Plinius tradidit animalibus fætum vivum parientibus aures inesse eminentes, exceptis cartilagineis, vitulo marino, Delphino & viperis quæ quibusdam foraminibus pro auribus, utuntur. Quoad *dentes*, Gesnerus tradit quosdam viperinum caput secantes, quatuor oblongos dentes in superiori mandibula spectasse ; cum alii dentes tam superioris quam inferioris maxillæ, ob parvitatem, non appareant, sed maxillam acufricando asperitatem, & fridorem percipisse ; Hos pusillos dentes, tam in vivis, quam in mortuis viperis, nisi auferatur *vesicula*, in qua conduntur, nemo unquam intueri poterit. Baldus Angelus Abbatus quatuor dentes caninos tam mari, quam fæminæ viperæ attribuit, cum hoc tamen discrimine, ut mas duos habeat deciduos : Ideoque non admirandum esse putat, si interdum maris dentes duos tantummodo esse conspiciamus. Quamobrem Authores Nicandrum secutos proculdubio hallucinari statuit, quando pronunciat, demorfos à vipera mare, duo tantum ulcuscula, & à fæmina quatuor reportare : cum duos dentes maribus, & quatuor fæminis semper inesse crediderint. Et tamen vipera mas, antequam illi duo dentes cadant, quatuor etiam vulneribus possit patientes afficere. Hæc autem sententia si sit vera nec ne, indiget animadversione ; quandoquidem nostri circulatores viperas quotidie pertractantes, duos tantum dentes tam in mare, quam in fæmina se observasse referunt. Nos igitur decocto viperæ capite, & carne diligenter à craneo separato, duplex dentium genus conspicati & sumus : unum, quo hæc bestia se tuetur, & mordendo venenat ; alterum quo ad mordendum utitur. Hi autem sunt dentes quatuor supra triginta ab Antiquis non descripti : cum in gingivis occultati non appareant. Horum autem talis est ordo ; nam præter quatuor caninos nominatos, duodecim in superioribus maxillis, nimirum sex in utroque latere conspiciuntur ; suntque ad instar serræ versus gulam, & aliquanto majores dentibus armantibus inferiores maxillas. Inferiores dentes sunt viginti duo, nempe undecim in quolibet latere, quocirca quando authores memorant vulnera à dentibus vipe-

rinis inflicta, eos de caninis dentibus verba facere opinamur ; Cum cæteri dentes horum animalium illis ignoti fuerint. Quandoquidem veteres, harum ferarum *caninos* tantummodo dentes, descripserunt, quos vidimus perforatos, & vesicula veneno plena munitos, quæ novo toxico quotidie repletur, dum primum in ictu consumptum fuerit. Etenim quemadmodum in singulis animalibus aliqua semper generantur excrementa, quæ per partem determinatam extra corpus trudentur : Ita etiam viperæ venenosum excrementum per dentes evacuant, dum se defendentes, mordendo cætera animalia venenant. Hoc etiam præstat scorpio, qui in cauda aculeum perforatum instar dentium anteriorum viperæ possidet, & sub aculeo habet vesicam veneno plenam, quod punctis animalibus communicat. Neque mirandam est viperas caninis dentibus ad tutelam tantum sibi met à natura comparasse : siquidem accidit idem pisci pistrici rostrum hinc inde dentatum possidenti, quos dentes huic animanti nonnisi ad tutelam natura impertita est. Quod autem nostri viperarum venatores pronunciant, se tam in mare, quam in fæmina duos tantum dentes conspiciatos fuisse, inde natum esse credimus : quoniam cæteri in gingivis latentes non videantur : deinde hoc genus hominum tanquam rude, & imperitum nunquam anatomen harum bestiarum exercuit. *Pulmo* in viperis veluti vesicula oblonga membranosa, variisque meatibus plena, & aëre turgens observatur. Item *cor* grandiusculum apparet, & mobile in pericardio ; hocque quando animal alexipharmaco necatur concitatus movetur, quam si ferro interimeretur, ob repugnantiam alexipharmaci ad venenum. *Iecur* est oblongum vena admodum crassa per medium percurrente, quæ dimanans à corde ad extremam usque caudam serpentis progreditur. Ibi etiam visuntur *venæ* seu *arteriæ*, quæ à corde & hepate ad gingivas, seu vesiculas dentium ascendunt : cum in *vesica fellea* tanquam in propria lacuna contineatur hæc materia venenosa, quæ inde ad dentes defertur. Possumus autem necessario attestari hanc venenosam materiam in cysti fellis residere, quoniam neque hepar, neque cor, neque sanguis viperæ venenum participant. *Ventriculus* sub jecore latitat, cui *æso-phagus* adhæret cum aspera arteria ad pulmones usque descendente. *Splen* colo intestino annectitur. *Colon* flexuosum est, & in latere sinistro terminatur. *Rectum* autem intestinum à fundo ventriculi dimanare videtur.

Et tantum de viperæ anatomia Ambrosinus. *Severinus* in vipera à se secta sequentia observavit : Oblonga omnia *viscera*, item & ova. Primum exerto spolio ad cervicem,

Severinus
Zootom :
part. 4. pag.
359.


Vipera Mas.




Vipera Fœminina.



Ammodites.



Serpens Biceps.





vicem, aspera arteria per longum annexa pulmoni eodem ductu. *Cordis* substantia alba tota, nisi quantum auriculæ rubent, quarum sinistra amplior. Aqua in pericardio: Cor triangulare complanatum. *Fellis vesicula* non hepatis affixa, sed Ecphyfi. *Renes* oblongi duo ex multis quasi renibus conflati, inferiores hi visceribus omnibus, & prope anum. *Testes* oblongi, forma æmulantes Pineæ semen. Reperti in utero tres *catuli* viperini, qui à matre biduo jam mortui superstites inventi sunt, caudis micantes. Ad hæc *ova* multa ad vasa spermatica utrinque: hinc autem descendunt recte per medios renes. Intra caudam vesiculæ duæ plenæ viru illo. *Intestina* rubra, carnosæ præsertim superne convoluta in quosdam veluti nodulos. In *ventriculo* & intestinis herbaceum alimentum. *Ventriculi* tunica interne rugosa, rugæ autem rectæ, quæ postea diducta utraque tunica facile explicantur. Differentia sexus in hoc genere: Mari cauda longior, fæminæ brevior & latior. Mari sub caudam vasa quædam oblonga, interne spinosa, genitalia non dubito. In multis inveniuntur regionibus, Italia, Hispania, India, Melita, Cipro, Chio, circa Amyclas, ubi insanabilis earum morsus, & alibi. Aristoteles tamen in Creta nasci negat. Cordus in Germania nunquam conspicatus est. In insula Syagro Arabiæ promontorio vicina, magnæ reperiuntur, Marfi populi qui impune viperas tractabant, alibi generari negare. Delectantur in primis locis montanis: ideo circa Haliacmon Macedoniæ fluvium, & in Euganeis Patavinis montibus inveniuntur: aquis, populeis arboribus, & locis, quarum carnes Galenus pro antidoto reprobatur, quod ægrotantibus sitim intolerabilem faciant. Hyeme latent, non tantum sub saxis, immoti sive præsepibus, ut Aristoteles & Virgilius prodidere, sed etiam statuis lapideis, & terris. Rustici sane Itali, dum lignibus profundiora terræ tentarent, simul glomeratas sapissime invenere.

In montana Phœnicæ parte herbis vesci, & quasdam radices vorare, Pausanias prodidit. Non tantum herbis, sed & erucis, buprestibus, Cantharidibus, phalangis, mure araneo, stellionibus, scarabeis, bufonibus, Galenus: scorpionibus Aristoteles: picæ pullis, Albertus, Circulatores fursuribus in pyxidibus & capsis alunt. Venatores quidam decimo quinto quoque die potum cum herba quadam præbent. Vino delectari aliis visum: diu à potu abstineri, Bellonio. Frigidus videtur Aristoteles facere, quod hyeme latent: calidas, Galenus, Dioscorides & alii. Hyeme minus tales esse, facile exinde colligas, quia non mordent: æstate, & præsertim sub ortum Caniculæ vehementer æstua-

re, quia fervorem quandam præ se ferunt. Ex capite Cerberi natas, antiquitas olim fabulata est. Ex cinere vel putri materia oriri posse vel exinde colligitur, quod Julio Obsequente prodente, bello civili inter Augustum & Antonium durante, Pado effuso, ingens viperarum copia proruperit. Ex congressu maris & fæminæ progni, tam certum, quam falsum, cum muraena pisce congregi, vel maris caput à fæmina post congressum morsu avelli, quod apud Plinium legimus, cui Herodotus, Nicander, Plutarchus, Solinus, & alii adstipulantur. *Ova* prius uniùs coloris & mollia, instar ovorum piscium concipiunt, & quidem superne versus præcordia: tempore parturitionis, catuli sine ullis membranis quandoque quod eas scindant, aliquando iisdem obvoluti, prodeunt. Vere postquam concepere, fætum ad mensem Augusti gestant. Viginti, una die, & quidem singulos parere, apud Aristotelem habemus. Tres supra viginti ab una in pyxide servata prodierunt, quarum quæ à matre separata erant, inertes reddebantur, Johannes de Saviis pharmacopæus author est.

Cum multis occultam inimicitiam exercet vipera. *Sputo humano*, si hoc in ipsius ventrem penetret, interficitur. *Mulieris gnavida* si occurrat, abortum inferre creditur. Sola voce facit ut *mures* musculos suos alio deportent. Cum *osifraga*, & testudine dimicat. Illa sibi herba soncho simili providet: hæc origano vel ruta medetur. Cum *scorpione* congregi, & mutuo se conficere, Caspar Wolfius observavit. *Allii*, scordii, & alliariæ odorem vitare, apud Theophrastum habetur. *Arum* radix manibus affricata morsus viperarum arcet, si Avicennæ credimus. *Sinapi* iisdem adversari, idem affirmat. Ramulo *fragile* viter contactæ obstupefcunt, si Lacunæ fides est. Inter folia *fraxini* & prunas constitutæ, igni se potius credunt. *Solan* succo Galenus manus contra easdem madefaciebat. Rhafes viperæ oculos *smaragdum* intuentes liquefieri, & mox à capite effluere, reliquit.

Ad *Naturam* spectat, quod vere & autumnò spoliū deponunt: tempore vernali oculos fœniculo affricant, ut visus in canis vernis contractam hebetudinem tollant, & quod gravissimum odorem spirant. Fæminæ, quæ pinguior mare, acerbior morsus est.

Venenatum animal esse, superius diximus: signa varia occurrunt. Aulicus quidam apud Rhodiginum in colorem porraceum incidit. Purpurascens vel amethistinum aliquando contractum apud Grevinum habemus. Excitatur aliquando singultus, quod ventriculus veneni acrimonia vellicetur. Semp̄ ferè

Æl. H. A.
l. 9. c. 96.
Plin. H. N.
l. 10. c. 62.
Æl. H. A.
l. 1. c. 24.
l. 15. c. 16.
Arist. H. A.
l. 5. c. ult.

Arist. H. A.
l. 5. c. ult.

Antip.
thia.
Æl. H. A.
l. 2. c. 24.

Naturæ
Arist. H. A.
l. 8. c. 17.

Venenissim.

Locust.
Solin. in
Polyhist.
Aristot. in
Mirabil.

Martial.
Epigr. l. 4.
59.
Arist. H. A.
l. 10. c. 62.
Virgil. Georg.
l. 3.
Martial. l.
3. Epigr. 16

Vitellus.
Pausan. in
Bæot. Galen.
in Theriaca
ad Pisonem.

Temperamentum.
Arist. Gener.
animal. l. 1. c.
9. 10.
Galen. de
simplic. medic.
familiar. l. 11.
c. 2.
Generatio.

corpus intumescit, pustulæ ambustis similes erumpunt, sitis infestat, gingivæ cruore suffunduntur, jecur inflammatione vexatur, biliosi vomitus succedunt, vertigo, sopor, tremor, & urinæ difficultas, ut Dioscorides & Ægineta reliquit, oboriuntur. Ubi vero virus totum occupavit corpus, ungues ob caloris defectum livefcunt & corpus grandinem congelantem sentit. *Remedia* varia habentur. Amatus Lusitanus partem ictam scarificari jussit: emplastrum ex alliis cum theriaca eidem imposuit, & drachmas tres theriacæ in vino meraco propinavit. Ex animalibus laudantur Caro viperina quæ interaneis abjectis cocta, virus ad cutem pellit; cervi maris genitale, mustelæ venter salitus; cancri fluviales vel marini; sanguis fulicæ cum oleo potus; testudinis marinæ cum aceto; patientis urina hausta; stercus caprinum in aceto decoctum, vel in vino tritum, butyrum denique vetus. Inter *plantas* plurima quoque occurrunt. Anchusa manducata & in fauces projecta easdem perimit. Abensina radicem, folia, & corticem Aristolochiæ laudat; Crollius, aconitum cum vino tepido: Alii bistortam, quæ contortis suis radicibus, convoluti serpenti figuram representat: Matthioli Bryonia radicem, Citri semen & succum Rhamnis: Ferulam & juniperi baccas Dioscorides. Plinius Tragoriganum: Claudius Imperator, taxum arborem: semen viticis Ægineta: acetum calefactum & potum. Dorotheus Helius. Ex *Compositis* sunt plurima, inter quæ præcipua, Theriaca Andromachi, & Antiochi Philometoris; Antidotus Apollodori, rustici medici, Avicennæ & Galli, quam ex Arabia redux Cæsari obtulit. Pulvis viperinus quem nobis Medici describunt, plurimum quoque prodest. *Extra* applicantur, humani dentes in pulverem redacti: urina humana calida: Caput viperæ amputatum, & impositum: emplastrum ex ranis: simus caprinus in aceto dissolutus, & pellis recens ab eadem detracta: herba de Corso nuper apud Hispanos inventa, quam Cantabricam quidam autumant: radix ebuli in vino elixata: fraxini cinis cum succo foliorum permixtus: furfures cum aceto & ruta decocti: lignum colubrinum in Malabar nascens. Ideo ab incolis per arva decurrentibus, circumfertur. Laudantur etiam, melissæ folia eorumque succus: origanum viride contusum, radix personatæ in vino elixata: pix liquida cum sale: decoctum pulegii: serpillum cum aceto, & cætera, quæ in Ambrosino vide. Pareus theriaca antiqua in aqua vitæ dissoluta, usus est. Sunt qui cantus tibicinum pro remedio ponunt. Amatus Lusitanus cujusdam fontis mentionem facit, in quo si ægri demergantur, eva-

dunt. Fallopius observavit, (*verba sunt Ambrosini*) dum ruri versaretur, filium agricolæ à vipera in pede demorsum. Unde pater senex ad clamorem filii accurrens, arcto vinculo pedis digitum vinxit: deinde digito scarificato, cum non mediocri sanguinis effusione, jussit sibi locum ostendi, ubi à vipera filius percussus fuit: quo cognito, ut læsum pedem ibi natus figeret, imperavit; postea ducendo ferulam circa pedem, illius figuram obsignavit, & sumpto gladio, cretam intra vestigiū lineam radens, in vino dissolutam, filio propinavit: quo præsidio juvenis, vomitione & alvi fluore correptus, tandem sanatus est. Virus quoque à vesiculis gingivarum exentum & fel ejusdem insicere, Gesnerus auctor est, qui puellam quandam, quæ carnem cui viperina permixta erat, gustaverat, in opisthotonum & alia gravia symptomata incidisse scribit. Fel confestim animi deliquium generat. Semen citri saccharo conditum, scordium, cornu cervi, lapis busonites, hyacinthus, sapphirus, smaragdus, inter præservativa recensentur. Et olim & nunc in mensis habuere locum. Ægyptii, Troglodytæ, & Arabes, passim eas conquirebant. Cinni Indi ultra flumen, & qui montem Arthon incolunt, Æthiopes, Macrobbi, & Seres iisdem alebantur, ideo ad centum quinquaginta annos vitam prorogabant. Athenæus ritu piscium conditas apponit. Nunc in Italia à mulieribus ob pulchritudinem expetuntur.

In Medicina multus earum usus, ex iisque pulveres, sales, olea, extracta, tincturæ, & vina, parantur. *Caput* collo appensum contra gutturis affectus, & anginas celebratur. *Cerebrum* in pellicula ligatum dentitionem promovet. *Jecur* coctum à venenato morsu præservat. *Ossa* in purpurea sindone ligata, & portata, epilepsiam & vertiginem amoliuntur. *Spolium* medicamentis opthalmicis miscetur: ex sententia Hippocratis, in delenda impetigine commendatur. *Pellis* ad facilitatem partus valet, si dextro parturientis femori alligetur. *Pinguedo*, si diligenter præparetur, ad oculorum suffusiones, ambusta, coercendum pilorum sub alis exortum, cutis eminentias, in paralyfi, commendatur. *Carnes* quidam ad vitam prorogandam facere scribunt, quibus Renodæus refragatur. Alii cum feniculo decoctæ jusculo, visum imbecillum firmant. Ejusdem esu, servus Cratetis Medici, cui caro ab ossibus in morbo abscesserat, sanatus est, si Porphyrio fides. Plurimum ficare, & excrementa ad cutim detrudere, ideo elephantiacis, & aliis qui cutaneis morbis laborant, summe proficuum, apud plurimos Medicos invenies. Galenus aliquot exempla prodidit, qui cum vinum in quo

Remedia.
Amatus
Lusit. Cu-
rat, Cent. I

Plin. H. N.
I. 22. c. 20.
& 21.

Crollius
de signatu-
ris.

Dioscorid.
M. M. I. 3.
Plin. H. N.
I. 20. c. 17.

Galen. de
simpl. me-
dic. I. 6. c.
10.

Pareus I.
20. c. 16.

Fallop. I.
de tumori-
bus.

Æl. H. A.
I. 4. c. 7.

V. sus in Ci-
bis.

Plin. H. N.
I. 7. c. 2.

Athenæus
Dipnol. I.
8.

V. sus in Me-
dicina.
Galen. de
simpl. fac.
I. 6.
PortaPhy-
togn. I. 6.
c. 11.

Plin. H. N.
I. 29. c. 4.

Galen. I. 7.
de Comp.
Medic. I.
loca.

Porphyr.
negi d. m.
xvi.

Oribas. I. 2.
de morb.
c. 62.

Galenus
Simpl.
Medicin.

I. I. c. I.

vipera extincta bibissent, liberati sunt. Cardanuseadem phthificos curavit. Fuere qui Gallinas nutriebant, donec deplumarentur, quas postea agris exhibebant. Matthæum de Gradibus, & Gattinarium id fecisse proditum. Alii ex tali pastu ova propagandæ vitæ idonea, sibi pollicentur. Pulveres & alia quomodo darentur, vide apud Ambrosinum, qui ex authoribus collegit.

Ambrosin.
de Serpen-
tib. p. 162.

Pulverem sitim excitare, ipsi experti sumus. Ad aquas hydro picorum exsicandas adhiberi, apud Petrarum invenies. Cinis inter caustica à Fallopio censetur. Aquam Gallefii pharmacopæi ibidem vide. Baldus Angelus in dolium vini injectas, corruptum pristino nitore restituere, idque in cella Cardinalis Urfini accidisse, scripsit. Ad theriacam singulari ratione præparantur. Primus Andromachus adhibuit, Antoninus Imperator revocavit. Galenus egregie descripsit. Consule si placet Ambrosinum, sed & nos ante non ita multos annos, in schediasmate ad Theriacam Andromachi exposuimus, cum ejus Lesnæ in Polonia dispensationi præessemus.

Galen. de
Antid. l. 2.
de Theri-
aca ad Pilo-
nem, & ali-
bi.

Differen-
tiæ.

PortaPhy-
tog. l. 4. c.
28.

Amat. Lu-
fitan. in
Dioscorid.
Æl. H. A.
l. 9. c. 33.

Bell. ob-
serv. l. 2. c.
30.
Alpin. de
Medicina
Ægypt. l. 4.
cap. 8.

Nieremb.
H. Exor.
l. 2. c. 3.

Viperarum differentias, *Color*, & *magnitudo* dabunt. Ratione *Coloris*, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, rubras, rufas, albas, & nigras observavit. Cardanus rubræ crassæ & brevis. *Milort* ab Italis dictæ meminit: sed Matthioli, innocentissimum animal esse, domibusque familiare, addit. *Magnitudinis* respectu, in Hispania, nonnisi cubitales inveniuntur, si Amato Lusitano credimus. In regione Troglodytica, longitudinem decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiacarum pelles tomento repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico unico in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in principio, capite latiore & compressiore esse, & à cerastis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem illum, qui *Escarzo* Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedali, capite crasso & quadrato, ore magno & hiantem, lingua nigra & mucronata, & tarde incedit, in viperarum censum referri non poterit. De *Viperis Chiappa* ita *Nierembergius*: Genus viperarum Chiappa nutrit magnum, simile putrido ligno, pestilentem spiritum quatuor narium fenestris fundens. Quædam morsu equum intra diem occidunt, fuso per omnes juncturas sanguine. Sunt aliæ variegatæ, aliæ nigre & prolixæ. Quemcumque momorderint, perimunt: crescente luna mitescunt, decrecente irritantur. Aliæ sunt pallidæ,

nigris distinctæ lineis, inter distinctæ maculis albis, morso ab iis decedit per frustra caro. Alii tanta pestis superest, ut si fuste contingantur, subeat virus usque ad brachium. Aliæ hujus sunt conditionis, ut si mordeant mane, morsus evomens sanguinem pereat, sub vesperum, non sunt lethales. Visus ibi serpens, in cujus utero inventi triginta & unus fætus.

ARTICULUS II.

De Ammodyte.

Refertur hic tum ratione figuræ tum partus ad viperarum genera. Vocatur à Latinis *Ammodytes* vocabulo à Græcis desumpto, qui & ἀμμοδύτην, ψαμμοδύτην, ἀμμοδιώτην, per ypsilon, & ἀμμοδιτήν per jota appellant: ibi ποτε ἀμμος & τε δύνειν quoniam arenam subeat: hic ab ἀμμος & διορύττω perfodio. Aëtio est *Cenchrias* vel potius *Cerchnias* ab asperitate miliari, quod cauda ipsius instar graniorum milii dura sit. An ἀμμοβάτης apud Lexicographos sit ab eo diversus, vel ἀμμόβατης apud Suidam difficile est dicere. Nonnulli Ammoditem, Centriam, aut Centritem, ob duritiem caudæ dici debere innuunt. Cum κέντρα quædam lignorum & lapidum vitia dicantur ut apud Theophrastum videre est: & Plinius, in quibusdam arboribus veluti in marmore, centra quædam, id est, durities clavis similes, & feris inimicas esse asseveravit. Ut ut sit, *cornutum* vocavi, quod eminentiam quandam cornu æmulantem supra nasum gerat; & *viperam Cornutam Illyricam*. quod in illa regione frequens sit, *monoceron* denique, propter callum qui summam oris partem exornat, certum est.

Nomen.
Ambrosin.
l. 1. c. 3.

Theophr.
H. P. l. 5. c.
3.

De ejus forma & Descriptione ita *Ambrosinus*. Olaus Magnus scriptis mandavit quoddam esse serpentes arenacei coloris, longitudine cubitali, maculis nigris distinctos habentes supra dorsum linearum vestigia: Deinde inter hæcce serpentium genera Ammoditem commemorat. Quamobrem Lucanus colorem arenaceum hujus serpentis contemplans canebat hunc in modum. Concolor exustis atque indiscretus arenis Ammodites. Est igitur fera hæc vipere perquam similis, capite tamen ampliore, & maxillis latioribus, & in superiore parte rostri, eminentiam quandam acutæ verrucæ similem gerens. Propterea vulgares, non injuria, cornutum serpentem vel cornutam viperam nuncuparunt. Aëtius quoque Ammoditem cubitalis magnitudinis, & arenacei coloris esse statuit. Immo pellem maculis nigris præditam, & caudam præduram ei assignavit: Has autem condiciones lector in icone, quam exhibemus melius & commodius meditari poterit.

Descriptione.

Locus,

In Lybia teste Solino, in multis Italiæ & Illyriæ locis, comitatu inprimis Goritienfi stabulatur. Quadramius observavit in Circulatorum capsulis, catulos ritu viperarum eniti.

Venenum.

De Veneni signis & remediis, ita idem Ambrosius: Olaus Magnus describens signa veneni hujus serpentis ea esse protulit, quando particula demorsa non solum ingenti dolore & tumore afficitur, verum etiam quando virus à vulnere effluit, & propterea si patiens tertia die non perit, quandoque ad septimam usque diem vitam protrahit. At Inter cæteros Authores, clariora hujus veneni signa assignat Matthiolus, dum percussos ab Ammodite, festina morte opprimi scribit, & à vulnere eorum, qui tam brevi tempore non obeunt, sanguinem primo dimanare, labiaque vulneris intumescere, deinde paulo post sanium effluere, capitisque gravitatem, & animi deliquium generari. Imo addit homines etiam robustos ab hoc serpente ictos triduo interire, & celerius qui à femina fauciantur. Quamvis observaverit nonnullos ab hoc serpente percussos ad septimam usque diem vitam protraxisse.

Remedia.

Præsidia hoc venenum castigantia, inprimis communia laudat Abensina; deinde tanquam Alexipharmaca, castoreum, cinnamomum, & radicem centaureæ cum vino exhibet. Item radicem Aristolochiæ longæ, & Gentianæ probat, postmodum pro emplastris parandis, mel exsiccatum, & tritum, radices gracatorum, centaureæ, semen lini, harmel, lactucæ, & volubilis præscribit. Verum Matthiolus admonet primo appositis cucurbitulis ambitum vulneris scarificandum esse, injectis tamen vinculis artissimis partibus superioribus. deinde tanquam præsidium peculiare mentam ex aqua mulsâ potam, castoreum, casiam, & succum artemisiæ, cum aqua commendat. Præterea theriacam in potu exhibet, eademque vulnus linit, & tandem emplastris attrahentibus utitur. Imo in hac affectione cataplamata nomis, & ulceribus serpentibus conferentia summopere celebrat.

ARTICULUS III.

De Ceraſte.

Ambros. l. 1. c. 4.
Nomen.

Excipit hic Ammodyten serpens, quod in locis etiam arenosis libenter stabuletur. Nomen à duabus eminentiis, *ἀμμό* & *ὄδιον*, quæ in fronte cochlearum instar, sed solidiores habet, sortitus est. Aristoteli Thebanum colubrum, dici placitum est Bellonii. Olao est *Cristalis*, Alberto M. *Cristalis*, Sirtalis & Triscalis.

Bellonius obf. l. 2. c. 24.

Descriptio.
Plin. H. N. l. 8. c. 23.

In Descriptione veriatur. Plinius corpore Ceraſtis eminere cornicula sæpe quadri-

gemina scribit: quorum motu reliquo corpore occultato sollicitent ad se aves: Tolidem & Solinus habet. Albertus octo. Bellonius duo instar granorum hordei supra oculos, gemina minuta cornua imitantia, ponit. Addit, dentes viperinis similes, dorsum lineis quibusdam puniceis variegatum habere. Aetus cubitalis magnitudinis, longissimum, duorum cubitorum, corpore arenacei coloris, juxta caudam desquamato, partibus ventris per ordinem squamatis, reliquit.

Solin. P6.
lyhilt. c. 40.
Bellonius Obf. 2. c. 54.

Invenitur in Lybia, cujus mediterranea arida & sabulo referta sunt. Olim in Ægyptum migrasse, & magnam regionis partem inhabitabilem reddidisse, prodidere quidam, & ex his Lucanus. Bellonius dum Cairo in montem Sinai iter faceret, copiosos conspicatus est. In viis per quæ plaustra aguntur, frequens stabulatur, obviosque aggreditur & perimit.

Locus.

Lucan. Pharsal. l. 9.
Bellon. obf. l. 2. c. 56.
Natura.

Duo ipsis congenita adscribit Bellonius, nempe, quod ritu viperarum foetus edant vivos, & quod inter omnia serpentum genera diutissime sitim tolerant. Gressu flexuoso volutari, quoniam breves & crassi sunt, mole corporea arenis obruta, exertis cornibus aviculas allicere, ut superius dixi: Pssyllos populos non attingere, adjici præteritis potest.

Æl. H. A. l. 16. c. 28.

Demorsus à Ceraſte, parte affecta intumescit, & duritiem quandam instar capitis clavi cum pustulis experitur. Mox sanies modo nigricans, modo subpallida effluit: mens alienatur: visus hebescit, inguina & poplites dolent. Tensis genitalibus convulsus obit. Inter remedia ponit Dioscorides membri præcisionem. Ægineta & Areteus scarificari & ferro ut inuratur jubent. Celsus rutam ex aceto coctam, & neperam cum sale & melle permixtam laudat. Plinius pice cum polenta quandoque utitur, interdum Castoris testibus cum panace & ruta in vino. Quomodo id Pssylli frangant, apud Ælianum habemus. Cornu ad præsentiam viperæ, napelli, aut fellis Pardi exudare, Grevinus & Petrus de Abano affirmant.


Venenum.
Dioscor. l. 6.

Æl. H. A. l. 19. c. 28.


Datur apud Nicandrum genus Ceraſtæ mutilum vel quod cornibus careat; sed sic Ceraſtes appellari non posset: vel quod non tam patenti habeat: & quidem grandioribus quam alii maxillis instructum est, Maxillare vocatur. Forte illud quod superius ex Matthiolo in Illyrico inveni-ridiximus, Thair Ægyptiis dictum, & quod in theriaca, ut Prosper Alpinus scripsit, adhibent. Herodotus circa Thebas Ægyptias cornutorum serpentum, parvi corporis meminit, qui sacri dicuntur. Sed quia innoxii, ad Ceraſtas referri non possunt. Nos duas hic in Iconibus species exhibemus. Secunda ad Sere-

Differen-
tia.


Cerastes Greuii Aldrou. Gehörnichte Schlange.



Cerastes ex Libya Aldrou.



Hæmorrhous Parei.



Seps Parei.





Serenissimo M. Hetrurix Ducem ex Lybia allata est, una forte ex illis, de quibus *Falconerius Anglus ad Gesnerum* ita scribit: Allati fuerant ex Cairo tres serpentes ad nobilem quendam Venetum, qui diligentissime in vitro magno & arena prope focum servabantur. Tres numero erant, quorum unus ferme erat triplo reliquis major, isque *femina*, quæ tum forte quatuor, aut quinque ova in ipsa arena edidit magnitudine fere ovi columbini; longitudo erat trium pedum, crassitudo fere brachii: *caput* duos digitos latum, idque compressum. *Oculorum* pupilla nigra, reliqua parte albo quorum ciliis utrinque prominebant cornicula duo brevia non carnea ut in quibusdam aliis, sed vere cornea. *Collo* erat pro magnitudine corporis tenuissimo, & satis longo. Totus parte superiore tectus erat *squamis* cinereis. Suprema squamarum parte nigricantibus, *cauda*, in extremo extenuata, & subfusca. Aliis duobus eadem erat forma, nisi quod cornua adhuc non extabant. Dixerunt esse filios illius majoris.

ARTICULUS IV.

De Hæmorrhoo.

Ambrosin.
de serp. l. 1.
cap. 5.
Nomen.

HÆMORRHŌUS, Græcis & fæminine *ἡμorrhόις*, & masculine *ἡμorrhόος* ἀπὸ τῆς ἡμῶν, & ῥέω, quod ad ejus ictum sanguis ab omnibus corporis humani meatibus effluat. Isidoro est *Aspis hæmorrhōis*, Arnoldo *Afrodinus*, Sylvatico *Afudius*, Avicennæ etiam *Sabris*, & *Alfordius*. Olaus tria differentia genera esse putavit. *Thonium* Nicandro dici, quod locis illis Ægypti, quibus Thonis imperavit, delectaretur, Rhodiginus author est.

Rhodig.
Antiq. lect.
l. 16, c. 9.

Description.
Ælian. H.
A. l. 15.
c. 13.

Descriptionem hujus serpentis, apud Ælianum, Nicandrum, & Paræum habemus. *Corpore* est pusillo. *Oculis* igneo quodam fulgore ardentibus, *Cute* splendidissima, *dorso* multis albis & nigris notis maculato, *cervice* angusta, *Cauda* prætenui, cum corniculis supra oculos. Avicenna ei *dentes* æquales tradit. Nicander ita describit:

Nicand. in
Theriac.

*Unum longa pedem, totoque gracillima tractu,
Ignea quandoque est, quandoque candida forma,
Constrictumque satis collum, & tenuissima cauda.
Bina super gelidos oculos frons cornua profert,
Splendentum quædam radiorum albertia luce
Sylvestres ut apes, populatricesque locustæ.
Insuper horribile ac asprum caput horret, &
instar
Ipsius oblique sua parvula terga Cerastræ
Claudicat, ex medio videas appellere dorso,
Parvum navigium tenit imam lubrica terram.
Abvius & haud alio tacite trahit ilia motu
Ac per arundineum si transeat illa grabatum.*

Locis.

In Ægypto & illis locis quibus Thonis

imperabat, vivere superius dictum. In India reperiri, ex Diodoro Siculo colligi potest. Is enim in eo tractu quo Alexander Porum persequabatur, inventos fuisse serpentes, parvos equidem, sed quorum alii æreis virgis specie erant simillimi, alii densam & hirsutam cristam arrigebant, ad eorumque morsum toto corpore sanguineum fadorem dimanasse, scribit. Particularem locum si attendamus, saxorum cavernas incolere solent.

Ælian. H.
A. l. 9, c. 43.

De *Natura* hoc occurrit, segnem admodum in incessu & pigrum esse: naturaliter, non aliter ac navis dum mare sulcat, incedere; more undæ, quæ assurgit & deprimitur: & fæminam à mari gressu ita distingui, quod hæc cum interne circa caudam firmet, cum mas ventri tantummodo innitatur, & collum serpendo extendat. Quæ de obliqui incessus causa, & Canobo Menelai gubernatore veteres nugantur, apud Ælianum & Nicandrum vide. Nemo alias hujus fabulæ meminit.

Natura.

Ælian. H.
A. l. 15.
c. 13.
Nicander
in Theriacis.

In ejus morsu, (*verba sunt Mathioli*) color loci percussus fit cruentus, ex quo ab initio nihil præter aquosum quoddam, effluit: ventriculus dolore afficitur: deinde sanguis non solum ex foraminibus morsis, sed etiam ex naribus fluit: spirandi difficultas subsequitur, & si quæ in corpore obductæ fuerint cicatrices, recrudescunt. In *morsu femina*, anguli oculorum & radices unguum sanguinem fundunt: immo sanguis ab omnibus corporis meatibus manat, & tandem dentes, putrefactis gingivis excidunt. Eadem Nicander, Galenus, Lucanus, & Ælianus prodidere. Immedicabiles quibusdam ejus morsus, alii partem scarificatam candenti ferro inurunt: quidam statim præcidunt; deinde cataplasmatibus valide attrahentibus utuntur. Dioscorides ad sistendum sanguinem emplastrum ex foliis vitium coctis & cum melle tritis primo imponit, post portulacam cum polenta antequam sanguinea urina prodire incipiat. Mathiolus allium & vinum dilutum, cum theriaca, exhibet: vulnus aqua frigida abluit, & demum, regionem vesicæ spongiis calidis fovet. Plinius, flores & mora rubi commendat.

Venenum.
Mathiolus
ad Dioscori.
l. 6, c. 50.

Galen. de
Theriacæ
ad Pisonem.

Lucan.
Pharsal.
l. 9.

Ælian. H.
A. l. 9, c. 43.
Nicander
in Theriacis.

Circa Differentiâs nihil fere occurrit præter ea quæ Nierembergius de *Indico hæmorrhoo*, & Kokob scribit, Pifo & Marcgravius de *Cucurucu*, ille de *Ibiracão* habent. De *Hæmorrhoo* ita Nierembergius: Habet novus orbis suum hæmorrhoum, *Abucyatli* dictum, similem teutla cotzuchqui, nisi quod sonalibus careat, majorem hæmorrhoo antiqui mundi, sed ejusdem veneni. Per omnes corporis meatus & cicatrices profundunt sanguinem morsu. Est alius qui etiam per juncturas prodige cruorem facit. De *Kokob* sic idem: Offenditur in agris Jucata-

Differentiæ.

Nieremb.
H. E. l. 1.
cap. 2.

nensi-

Nieremb.
H. E. l. 12.
cap. 49.

nensibus, quidam serpens ad hemorrhoidis nostratis pertinens genus, quatuor longus dodrantes, fusco colore; sed cyaneis & rubescentibus maculis consperso. Hujus ictus adeo pestilens est, ut intra horæ unius spatium cogat ictum hominem sanguinem rejectare, & intra diem unum ex omni corporis parte effundere, atque ita demum mori. *Antidotum* esse inquiunt siliquastrifuccum liquori tabaci permixtum, ex quo alia contusa atque resoluta sunt, epotumque. Saxorum colit cavernas, & in his cubilibus educat prolem. Egressus antrum, cum strepitum audit, impetum facit in obvios.

Marcgr. H.
B. l. 6. c. 14.

Cucurucu Marcgravius vocat, quem Pifo *Cucurucu* Brasiliensis dicit scripsit. Ille novem pedes longum facit, squamis flavescentibus, ac per dorsum maculis nigris grandibus variegatum. Nimirum, in toto flavo macula est grandis, in nigro duæ flavæ, in quibusdam nigris etiam unica flavæ, & sic continue. *Cl. Pifo*, amicus & condiscipulus noster, qui per aliquot annos illas oras lustravit, ita describit: Cucurucu est anguis crassus, cineritii coloris interius flavus, externis maculis nigris distinctus, & iisdem ut *Cascavel* squamis vestitus; novem & interdum duodecim pedes longus. Maxime est venenatus, & plurimum metuentus, licet caro ejus præparata à Barbaris comedatur. Præcipuum illi venenum in capite, ideoque Brasiliensis intercepto quantocius caput amputant & cooperiunt humo: Ab illo ictus, corripitur vertigine, tremoribus, torminibus, animi deliquiis, febribus ardentibus, quibus sudor frigidus ac ipsa denique mors, intra diem naturalem, aliquando & celerius succedit. Præter enarratas qualitates, peculiare est huic serpenti, quod morfu ejus virulento, venæ erodi videantur, tantamque inflammationem & ardorem efficiat, ut sanguis bulliens mox è naribus, auribusque, imo manuum & pedum unguibus promaneat. Huic malo si quæ Medicina detur, ipsius serpentis, qui morsum intulit, caput emplastri forma, vulneri applicatum: Tum & Folia Tabaci recentia, leviter tantum ab ignis flamma tacta, mirabiliter profunt, cauterii loco. Idem præstat contra hujus, aliorumque Serpentium morsus radicis *Caapiæ* decoctum. Deinde succedunt sudorifera, vel ipso statim initio convenienter exhibita, ut sunt radices Jusepebæ, Urueu, Malvisco, Jaborandi, &c.

Pifo loco
citato p.
43.

De *Ibiracoa*, ita idem. *Ibiracoa* Brasiliensibus serpens est variegati coloris, albis, nigris, rubrisque maculis insignis. Ejus morsus est admodum venenosus, & pessima symptomata infert, haud secus, quam Cucurucu, ut à Brasiliensibus accepi: quippe sanguis quantocius à morfu, ex auribus,

naribus & oculis profluit, & nisi statim subventum fuerit, moritur vulneratus. Si virus nondum ad cor abierit, carne ipsius anguis cocta cum radice Jusepebæ, Jaborandi, Malvæ Iseo, Caapebæ, Cappybæ, additis summitatibus Nhambi, ex vino interne exhibitis vulnerati restituuntur. Addatur externum remedium, ex capite ipsius feræ contuso, & cum *Ærva de Cobre*, aliisque ejusmodi ante enarratis præparatum.

ARTICULUS V.

De Sepe.

SEps, quibusdam, non male Sepes, Græcis σήψ, & quidem fæminino genere dicitur. Sine dubio παρά τὸ σήπειν τὰς ἀληγ-γένας, quod vulneratorum ab hoc serpente caro, statim putredinem concipiat. Ideo nonnulli ex Scaligero, non male *Putriam* vocare. Dicitur & σηπιδών, quamvis Nicander Sepis & Sepedonis diversis locis meminerit. Nec vel iste diversas Sepis & Sepedonis descriptiones habet, nec morsus Sepis symptomata ab Aëtio recitata, ab accidentibus Sepedonis ictus, quæ apud Nicandrum leguntur, differunt. Ideo Gesnerus, & Grevinus pro synonymis sumere. Avicenna *Selsir* vocavit.

In *Descriptione* variatur. *Abensina* eum capitelato, collo parvo, cauda brevi, ventre rotundo, tergore lineis diversi coloris variegato facit: *Atius* duorum cubitorum longitudine, ore acuto, albis notis maculatum. *Ælianus* eidem quatuor dentes, quos Volaterranus, recurvos facit, qui tunniculis quibusdam occultantur, adscribit, *Pausanias* cinereum colorem, & macularum ποικιλότης, alvum majorem. *Nicander*, colorem hirsuti tapetis assignat, quem Scholiastes varium, Grevinus, pallidum interpretantur.


Invenitur in regionibus Syriæ & Arcadia. Legimus namque apud Pausaniam, Egyptam Elati F. Arcadiæ Regem, incautum ab eo interemptum fuisse. Dum currit, brevior cauda videtur: quem tamen obliquo majorem tramite ducit. Colorem in eorum quæ attigit similitudinem mutat. Venenum, quod ad morsum illico tabe destruit, ex dentibus ejaculatur. Ossâ cum corpore dissolvere, Lucanus scripsit. Dicitur Nicandro δῖψιος, vel quod sit ξηγός, vel quod faciat διψᾶν τοῖς δακνυμένοις: vel ob siccitatem, vel quod percussis sitim adferat. De signis veneni ita Lucanus:

*Mors erat ante oculos, miseriq; in crure Sabelli
Seps stetit exiguus, quem flexo dente tenacem
Avulsitque manu piloque affixit arenis.
Parva modo serpens, sed qua non ulla cruenta*



Seps Aetii ex Matthiolo.




Aspis Vulgaris.



Aspides species colore ferrugineo.




Aspidis species colore ferrugineo. Vipera parva Vulgo dicta.



Dipsas Grewi.



Ibyara Serpens Margraf.





Tantum mortis habet; nam plage proxima circum

*Eugit rupta cutis pallentiaque ossa retextit:
Iamque sinu laxo nudum est sine corpore vulnus.
Membra natant sanie; sura fluxere, sine ullo
Tegmine poples erat; femorum quoque musculus*

*Liquitur & nigra distillant inquina tabe.
Disiluit stringens iterum membra, fluuntque
Viscera, nec, quantum toto de corpore debet
Effluit in terras, serum sed membra venenum
Decoquit; in minimum mors contrahit omnia vi-*

*rus.
Vincula nervorum & laterum contexta, carumq;
Pectus, & abstrusum fibris vitalibus omne
Quidquid homo est, aperit pestis: natura profana
Morte patet; manant humeri, fortesque lacerti
Colla caputque fluunt; calido non ocysus Austro
Nix resoluta cadit, nec solem cern sequetur,
Parva loquor corpus sanie stillasse perustum,
Huc & flamma potest, sed quis rogos abstulit ossa?
Hec quoque discedunt, putresq; secuta medullas,
Nulla manere sinunt rapidi vestigia fati.
Cyniphias inter pestes tibi palma nocendi est:
Eripiunt omnes animam, tu sola cadaver.*

rum oculi à quibusdam carunculis comprimentibus impedirentur, ut Abensina, vel à σπιγερ, quod est, more serpentis bestia fibilare, & se gyrare, propter acutum nempe fibilum, vel ejus corporis longitudinem, ut aliis, impolitum est. Quidam Serpentem Niliacam & Ægyptiam dixere, quod Ægypto sit peculiaris: Propertius sacrum colubrum, quod in simulachris Isidis adhiberetur, dixit, alii Hypnalin à somni inductione. Quatramius Marassum vocavit, quod viperarum instar, vivos catulos pariat.

Descriptionem apud Nicandrum habemus.

*Descriptio
Nicand. in
Theriacis.*

Tam procera, (inquit) extensa queunt quam brachia duci

*Tantaeque crassities est, quantum missile telum,
Quod faciens hastas docta faber expolit arte;
Pro truciū horrifona taurorum, & cade leonum.
Squallidus interdum color albet, sepe virenti
Cum maculis sepe est cineres imitante figura;
Nonnunquam ardenti veluti succenditur igne
Idque nigra ethiopum sub terra, quale refusus
Nilus sepe lutum vicinum in Nerea volvit.
Præterea geminae calli instar, fronte caruncle
Herent sanguineis scintillant lumina flammis
Turgida squallet item cervix, grave sibilat ipsa
Bestia, dum certam vomit ira canticata mortem
Quatuor hinc intra maxille concava dentes
Radices fixere suas quas junctæ a quibusdam
Pelliculis tunica abducit, triste unde venenum
Effundit, si forte suo hæc approximet hosti.*

Belluacensis ei cæruleum colorem, dentes extra labia, ut in apro, exporrectos, adscribit. Agricola longitudinem & crassitudinem mediocri anguilla, Wottonus senum pedum, assignant. Plinius, duos

*Plin. H. N.
l. 11, c. 37.
Æl. H. A.
l. 9, c. 4.*

dentes in supera parte dextera lævaque longissimos, tenui fistula perforatos, ut scorpionum aculei, venenum infundentes. Ælianus tenuissimis quibusdam tunicis indui scribit, quibus inversis venenum effundatur, effuso, illæ ad pristinum statum redeant.

Locus.

In Gallia nullas divagari Bellonius author est: plurimas in Hispaniæ insulis Christophorus Andreas. Calidiore aëre gaude, recertum, ideo Africam, & ripas Nili in primis incolunt. Olaus in septentrionalibus regionibus observavit, scabrosa cute, cinereo colore, oculis scintillantibus, longitudine trium vel quatuor cubitorum.

*Symphasia
& Amphipathia.
Nicand. in
Theriacis.
Æl. H. A.
l. 3, c. 22.
& 6, 38. &
10. 47.
Lucanus
Pharsal. l. 4
Arist. H. A.
l. 9, c. 5.*

ARTICULUS VI.

De Aspide.

Serpenti quem Aspidem vocamus nomen, vel ab aspergendo, quod venena morfu aspergat, ut Isidoro placet, vel ab asperitate cutis, ut Arnoldo; vel ab aspicendo, quod acutum intueretur, nisi eo-

C

Aspi-

Dioscorid. Inter remedia, portulaca & acetum mulsum à Dioscoride; à Plinio, cortex & bacca lauri, oxymel, piscium salforum cibus, dummodo vesperi vomitu rejiciatur; ab Aëtio, spongia aceto calido imbuta, & morfui applicata, laudantur.

Differentia. Inter Sepem & Sepedona, ut supra diximus, vix aliquid est discriminis, etsi Scholiastes Nicandri, Sepi colorem coccineum, Sepedoni varium assignet. Videntur tamen reperiri serpentes qui ad eundem referri poterunt. Meminit Aristoteles cujusdam pusilli, quem quidam Sacrum vocant, quem & reliqui serpentes, etiam magni vitant. Hujus morfu omnia putrescunt.

Æl. H. A. l. 8, c. 7. Legitur quoque apud Ælium, virum quendam solo serpentis attactu periisse, & vestem ægri paulo post putruisse. Huc & Aguasen pertinet, de quo ita Nierembergius: Subita pestis Aguasen serpens duas spithamas longus duntaxat, fusco colore, lato capite atque compresso: adeo vero lethali est ictu, ut intra dimidiæ horæ spacium interimat, decedente carne vulneri vicina, ac misere putrescente. Versatur montosis locis, editis, atque arentibus. Alexiterium ejus Pangaguasen; Nascitur in Philippicis.

Ambrosin. de Serp. l. 1, c. 7. Nomen.

*Aspides ut Pharias cauda solertior hostis
Ludit, & intas incerta provocat umbra,
Obliquasque caput vanas serpentis in auras
Effuso tuto comprehendit guttura morfu,
Lethiferam citra sanie[m] tu[m]c irrita pestis
Exprimitur, faucesque fluunt pereunte veneno.*

Suidas.
Agricola
de animal.
subter.
PortaPhy-
togn, lib. 7.
c. 24.
Plin. H.N.
l. 21. c. 31.
Athenæus
H. A. l. 4.
c. 54.

Argoli serpentes aspides interimunt, i-
deo iussu Alexandri M. Alexandriam de-
portati fuere. Ranarum fætus cauda infi-
gnes persequuntur. Gallinæ ea die qua *cimi-
ces* comedere; ab iis non tanguntur. Fumo
ari ita inebriantur, ut torpidæ evadant. De
Halicacabo ita *Plinius*: Nec illud præteribo
aspidum naturæ Halicacabum in tantum
adversam, ut radice ejus propius admo-
ta, soporetur illo sopore enecans vis ea-
rum. Ergo trita ex oleo percussis auxilia-
tur. De amore aspidis maris erga anse-
rum custodem puerum, & fæminæ rivali-
tate commotæ erga eundem odio, vide A-
thenæum.

Natura.
Isidor. O-
rig. l. 12.

Ad *Naturam* pertinet, quod Isidorus scri-
bit, ad incantatoris vocem alteram aurium
premere alteram cauda obruere: nunquam
marem nisi comite fæmina è spelunca egredi-
di; alterutrum ab aliquo occisum, occiso-
rem etiam in turba quærere, quo aliqui
affirmant; visum imbecillum ob caruncu-
lam, de qua superius, seu tubercula fronti
adhærentia habere; & levissimo strepitu au-
dito, quasi ex somno excitatas sese erigere,
quod apud Nicandrum legimus. In iracun-
dia præcipitibus tumet collum. De *ovorum*
naturâ prodit Bartholomæus Anglicus, par-
va, rotunda, livida, viscosa, fætida, summe
venenosa, & filamentis quibusdam conglo-
bata esse, quæ si à Rubetâ vel alio veneno-
so animali foveatur, vermen procreari, qui
visu & halitu more Basilisci, primo foven-
tem; deinde alios etiam animantes perim-
mat. Mansuescieri, apud Ælium legi-
mus. Cicurantur cibo; cum infantibus vi-
vunt, & crepitu digitorum vocatæ ex ca-
vis prodeunt. Mensam etiam, in qua tem-
peratæ vino & melle farinæ ipsis apponun-
tur; circumstant, ac reliqua omni spirâ in
terrâ relictâ, caput allevantes circumlam-
bunt, sensimque explentur. Egregie de il-
lo *Plinius*: Unicus huic tam pestifero ani-
mali sensus vel potius affectus est. Conju-
ga ferme vagantur: nec nisi cum compare
vita est, itaque alterutra interemta, incre-
dibilis alteri ultionis cura. Persequitur in-
terfectorem, unumque eum in quantoli-
bet agmine populi, notitia quadam infe-
stat, perumpit omnes difficultates, per-
meat spacia, nec nisi ab omnibus arce-
tûr, aut præceleri fuga.

Venenum.
Nicand. in
Theriaca.


Ictus Aspidis tam subtilis est, ut visum
effugiat: ideo mors Cleopatræ difficilis e-
rat cognitu. Tumor circa vulnus nullum;
post ictum statim sopor insurgit, oculi ca-

ligine suffunduntur, facies pallet, frons re-
frigeratur; icti assiduo hiant, & tandem
convelluntur. Actuarius ægi colorem in
viridem & herbaceum permutari asserit.
Inter remedia, Aristoteles & alii solam
partis mutilationem ponunt. Visum haud
paucis, si centaurium in vino tritum æger
evomuerit, perituum certo; victurum;
sin secus. Mercurialis plagæ exustionem
suadet; Pareus, quod sanguinem in venis
& arteriis congelari putet, tenuiorum par-
tium, medicamenta, si pars nigricet am-
putandam censet. Tentari tamen remedia
tam *simplicia* quam composita possunt. In
illis sunt, organum virens cum vino tri-
tum; allia cum Zytho; aristolochia cum
rosis; apium cum mero. De aceto ita *Pli-* Plin. H.N.
ninus: Nuper cum ab aspide calcata percuf- l. 23. c. 1.
sus, utrem aceti ferens deposuisset, sentie-
bat ictum alias illæso similis. Intellectum
ibi remedium est, potuque succursum. De
Citris videri Ælianus poterit. Objecti a-
spidibus rei, evasere quod id pomum co-
medissent. Huc urina impubium, quam
Plinius laudat, fel mustelarum, stom- Plin. H.N.
achus ciconiæ, urina & sanguis testudinum, l. 28. c. 6.
lapis Malacensis & histricis pertinent. Ex
Compositis sunt, Theriaca magna Androma-
chi, Antidotus Antipatri, & alia. Quidam
compositionem ex foliis tapfi barbati, ca-
ryophyllatæ, leucoii rubri, pari pondere
sumptis, quæ in aceto acerrimo & urina
hominis sani decocta, parti extra applican-
tur: Aëtius pro fomento aquam marinam
adhibebat; quandoque post scarificatas
cucurbitulas, centaurium cum myrrha &
modico opio apponebat.

Mâris in *Cibis* inservire, capite abscisso, *V. fus.*
& cauda ad digitos quatuor, interaneisque *Galen. ad*
exemptis, cute detracta, & corpore aqua *Glauc. l. 2.*
abluto, Galenus prodidit. *Medicinam* si spe- *c. 10.*
ctes, Plinius ad visum clarificandum ejus *Galen. de*
membranam cum adipe alterius animalis *Composit.*
permiscet. Galenus emplastri Androma- *medic. f. g.*
chi meminit, ad discutiendas strumas & *l. 6. c. 14.*
podagras, quod ex aspidibus vocatur,
quod cinerem ipsarum recipiat.

Differentiæ Aspidum apud auctores sunt *Differen-*
variæ. Apud Galenum est *χερσαία*, terre- *tie.*
stis, quæ loca mediterranea incolit, *χελ-*
ιδων, *hirundinaria*, quæ hirundinem colore *Galenus l.*
æmulatur, & circa Nili ripas excubat: *de Theria-*
χελιδων *spuatrix*, quæ sputo animalia inter- *ca ad Pilo-*
ficat. Prioris longitudinem quinque cubi- *nem.*
torum æquant. Chelidoniæ colore albo &
nigro refertæ sunt; Pryades cinereo ad au-
reum inclinante asperguntur. Illæ quatuor
horarum spacio in animalium perniciem
operantur. Istæ, instinctu quodam natura-
li, cum flumen debet crescere per dies tri-
ginta alta petunt, & momento interimunt.
Hæ cinereæ & virides præter morsum sali-
vam habent venenosam, & adeo tenuem,
ut


Scytale.



Amphisbæna Greuii.




Cæcilia Blindſchleich.



Cæcilia Vulgaris.




Cenchrus Veterum Belloni.




Acontias Taculus. Angelfchlang.



Acontias Alter.





ut angustissimos etiam cutis poros penetrare possit. Galenus, exprorecta cervice, & certa intervalli longitudine venenum exspuere scripsit: quod & apud Porphyrium invenitur. Ab his admorsi, motu privantur post continuos saltus soporantur, & cum torsione colli, spasmo, pulsu inordinato, & absque dolore vita privantur. Bellonius in Italia apud Brutios serpentem callum in fronte tuberculi instar gestantem vidit, quem aspidem veterum esse putat. Dioscorides unam tantum aspidem describit. Strabo duas Ægyptiarum species facit, quarum una, spithamalis sit longitudinis, & οὐχὺν ἀνέστησεν, chelidonia forte; altera, unius orgyæ, sub qua pryas & terrestres sine dubio continetur. Apud Ponzettum tres sunt, *Sicca* nempe, & longior quæ oculos carbonis instar micantes habet. *Caput elevans*, & constrictis dentibus sputum ejaculans: & *Hirundinaria* quarum icones exhibemus. His addere placuit, *parvam*, coloris ferruginei; & alteram colore subviridi maculoso insignita, quæ Italis *aspido tormento* quod morfu tormentum adferat. In America quoque inveniuntur, quæ caudæ aculeo feriunt. Prope Bononiam ejusque villam Malalbergo dictam, habentur varii coloris, quæ dentibus vulnerant, & oblongo caudæ aculeo ferire nituntur. Rustici faucii partem tumefactam ligant, & adhibitis præfidiis tridui spacio liberantur.

ARTICULUS VII.

De Dipsade.

Ambrosin.
I. 1. c. 8.

Nomen.
Isidor. Orig. 1. 12.
Æl. H. A.
1. 6. c. 51.

Agricola
de Animal.
subterra-
neis.

Descriptio.
Æl. H. A.
1. 6. c. 51.

Aspidem sequitur *Dipsas*, quam Solinus inter species aspidum numeravit. Nomen à siti quam ictu suo infert promeruit. Unde Isidorus *Situlam* vocavit. Dicitur etiam μελάνηρ, à nigra cauda; ἀμμοβάτης, quod per arenam incedat; πρηστήρης quod ictus ejus veluti flamma adurat; κάρυστος, ob eandem rationem. Videtur tamen inter *Presterem* & *Dipsadem* aliqua esse Differentia, ut Agricola prodidit. *Præster* percussus immobilem veluti quadam syderatione, menteque alienum reddit: mox pilis defluentibus, & urgente pruritu, alvi que fluxu, patientem absomit: quod de *Dipsade* scriptum non invenias. Dioscorides solam nominum causam Differentiam ponere credit.

Isidorus tantæ exiguitatis esse credit, ut non videatur, dum calcatur. At Aëtius *longitudinem* cubitalem, quæ paulatim ex crassa in tenuem definit, *corpus* albicans, sed simul maculis rufescentibus partim nigris variegatum, ei assignat. Sostratus *caudam* duabus lineis nigricantibus insignitam: *Abensina collum* magnum, & *tergum* ad extremitatem nigricans, & *caudam* valde tenuem.

Nascuntur in Africa & Arabia, ut Ælian^{us} prodidit: in Lybia & Syria vagari apud Lucianum & Abensinam legimus. Plurimumque apud Garamantas Píllis finitimos inveniri, Galenus autor est.

De *Natura* hoc occurrit, inter ova Struthionum in arenis condita stabulari: sic Garamantas, qui illis fictilium & pileorum loco utuntur, adoriri. Acri quoque ardere siti & fere inextinguibili. Ideo os siccum habere fertur: & veneno suo totum in corpore humorem absumere. Aulus Tuscus Catonis miles nullo aquæ potu, nec etiam proprio sanguine satiari potuit.

De *Signis* veneni, nimia inprimis & inextinguibili siti non est quod multa dicamus, quia jam de ea egimus. Aqua nec per lotium, nec per sudorem exit, sed intus detenta, abdomen ita tumidum reddit, ut hydropem mentiatur. Reliqua symptomata cum iis quæ à morfu viperæ conveniunt. Lucanus eleganter de iis:

*Ecce subit facies letho diversa fluenti,
Nasidium Marfi cultorem torridus agri
Percussit Prester: illi rubor igneus ora
Succendit, tenditque cutem, pereunte figura;
Miscens cuncta tumor toto jam corpore major;
Humanumq; egressa modum super omnia membra,
Efflatur sanies late torrente veneno.
Ipse latet penitus congesto corpore morsus,
Nec lorica tenet distenti corporis auctum.
Spumeus accenso non sic exundat ahenò
Undarum cumulus, nec tanto carbasa Coro
Curvare sinu, tumidos jam non capit artus
Informis globus & confuso pondere truncus:
Intactum volucrum rostris, epulasque daturum
Haud impune feris non ausi trudere busto,
Nondum stante modo crescens fugere cadaver.*

Morsum immedicabilem esse, Dioscorides prodidit: posse tamen ad inunctionem partis affectæ & scarificationem procedi. Galenus Theriacam Andromachi vehementer laudat. Abensina vomitum provocat, & diuretica commendat; exterius vero, emplastrum ex sale, calce, & oleo componit. Plinius decoctum ex foliis lauri laudat: nec non falsamentorum cibum mero subinde hausto, ita ut circa vesperam, vomitu subinde reddatur.

De *Differentiis* nihil fere occurrit. Solinus aspidis speciem esse putat, Dioscorides toto genere differre existimat. Aëtius ad illud viperarum genus reducit, quod in maritimis locis stabulatur. Grevinus à vipera maculis parvis in cauda, & quod citius mortem inferat distinguit. At Marfi populi Aëtio accedunt, & degentes in solo uliginoso, viperas; in falso, *Dipsadas* nominant.

Locut.
Galenus 1.
11. de sint.
plic. medi-
cin. facult.

Naturâ.

Lucan^{us}
Pharf. 1. 9.

Venentim.
Dioscorid.
lib. 6. cap.
50.

Plin. H. N.
23. c. 8.

Differen-
tia.
Grevin. de
venen. cap.
14.

Galenus 1.
11. de sim-
plic. medi-
cam.

ARTICULUS VIII.

De Scytale.

Nomen,
Ambrosin.
l. 1. c. 9.

Serpens Latinis Scytale dictus, Græcis quoque σκυτάλη, σκυταλῆς, aut πῶ σκυτάλιον seu à forma τῆς σκυταλῆς, quæ vox baculum significat, seu à longa & terete figura, quod σκυτάλην lorum coriaceum aut baculum æquet, dicitur. Quidam *Ceciliam* vocant, quod ineunte vere ex antro egressus, feniculum fugiat, ne visum recuperet.

Descriptio.

Forma est tereti & ita æquali, ut ubi caput vel cauda sit, discerni vix possit. Magnitudinem ligoni terrestri Nicander comparat, Quidam in tergo varia macularum *ποικιλότην* distingui tradunt. Unde pictum serpentem Mantuanus vocavit. De ipsius & Amphibænae discrimine ita Nicander:

Nicand. in
Theriaca.

*Bifronti similem reperis scytalem Amphibænae,
Pinguior est tamen, & cauda quæ nulla fere exit,
Crassior, ut quantum solita est comprehendere
lignum, (nem,
Curva manus strictum, quoties tenet ipsa ligo-
Tam prolixa, vagans, plurio quam reptile celo,
Quod fecunda genus sua gignit viscera tellus.*

Natura.

In descriptione ejus errat Lucanus, & Solinus forte ex eo. De *Natura* hoc duntaxat habemus, tergo fulgere, forte, ut quia tarde progreditur, spectatores alliciat: primum nondum dissipato brumæ rigore egredi, & spoliū deponere: ne visum recipiat, à feniculo abstinere: (Gillius tamen oppositum scribit) nec ictu mortem inferre. Inflammationem duntaxat infert, qualis ab apum & vesparum aculeis prodire solet.

De Differentiis nihil occurrit. Olaus M. cum Amphibæna confundit.

ARTICULUS IX.

De Amphibæna.

Nomen,
Ambrosin.
l. 1. c. 10.

Amphibæna nomen ab ἀμφί & βῆνω, quod geminum ut caput ita incisum habeat, venit. Dicitur alias Amphicæphalos. Hefychio ἀμφίσμανα Ethymologo ἀμφίσμανα, Alberto *Amphiselene* & *Armena*, Latinis quibusdam Utrimque grada.

Descriptio.

Descriptionem apud Nicandrum habemus.

*Post hanc exigua tibi subdimus Amphibænam
Duplice conspicuam (monstrum mirabile) vultu,
Cujus perpetua cacum caligine lumen
Quod latas utrinque genas, porrectaque menta
Plus aliis alto serpentibus agere tendat;
Terreus est illi color, & densissima pellis,
Plurima quam varie distinctam signa figunt.*

Exigua dicit, quia parvus & imbecillus serpens est. Hefychius cubitalem & decurtatam caudam habere scripsit. De duplici vultu ingens est controversia, *Ælianus*, *Plinius*, *Lucanus* & *Mantuanus* affirmant, *Matthiolus* negat, Hefychius dubitari ait. Dari tamen bicipites serpentes in Differentiis dicemus. Color terreus illi est, quem Græci φαῖον, Latini pullum appellant. Cæcum addit, quia tam latas habet genas, ut oculos quodammodo premant. Notis in tergore pictam, nemo classicorum authorum dixit, & in Nicandri textu, pro περιστεγές, περιστεγές legendum est, quod idem est quod περιστεγές, Circulatis enim tractibus serpit.

Reperitur in Lemno, sed in Lybia maxime, si Luciano credimus. Germaniæ ignotam Agricola fecit.

De *Natura* hoc occurrit, mulierem gravidam si Amphibænam transierit abortire: & ante cuculi cantum egredi, & sibi lo etiam interficere. Quidam ore eniti febulati sunt. *Ælianus*, caudæ loco alterum adhibere scripsit.

Morsum ejus ea quæ è punctura apum proficiscuntur, insequi *Aëtius*; quæ à viperæ ictu, *Dioscorides* prodidit. Id forte in principio fieri solet; hoc, temporis successu. Remedia ex capite de viperæ peti possunt. A vite citissime interimmi, apud *Rhodig.* *Antiquar.* *lect.* l. 26. c. 33. *Vfus.*

De Ufu egregie scripsit Nicander.

*Hæc ubi jam crevit cadentes ligna coloni
Sectam deglabrant oleastri ex arbore virgam
Quale pedum strictis præbenti pellibus anguis.
Insertam obvolvunt, quas certis deinde diebus
Exarere sinunt, cantantes ante cicadas
Utilis hic baculus frigentibus artubus esse
Fertur, ubi ex animis digitos torpedō fatigat.
Tunc quia constrictos & eorum vincula nervos
Calfacit immisso fovet, extenditque calore.*

Quod de nervis scribit, proditum est *Æl. H. A.* *l. 8. c. 8.* etiam *Plinio*. *Ælianus* vero habet, corium fugandis serpentibus & venenatis infervire. Dantur quædam in India Occidentali, quas incolæ *Maquizcoatl.*, & *Tezaub-coatl* vocant, quasi angues abusus, quod raro conspiciantur, selqui digitum longi, & minimi digiti crassitudinem æquantes. Coloris sunt argenti, nitidi, ac veluti translucidi. Gradiuntur in utramque partem. In Brasilia quoque est serpens *Libyam* Brasiliensibus. *Body* Tapuyis, dictus. Vulgo fertur duo habere capita fed falso: inde autem error promanavit: quia tam caudâ quam ore ferit & inficit suo veneno: nec facile caudâ à capite discerni potest, quia ejusdem sunt figuræ & magnitudinis: Minimi digiti crassitiem æquat, & longitudine unum pedem

Marcegrav.
Hist. Bras.
l. 6. c. 13.

dem & duos digitos circiter. *Color* est albus splendens instar vitri, & annulis & elegantibus lineis notatur, coloris brunni aut ærei. *Oculos* habet minimos & vix conspicuos, hærent in cute, instar punctuli acuti facti. Non procul ab extremitate *caudæ* anum habet, instar reliquorum serpentum. Contra venenum illius nullum dari remedium affirmant Lusitani. Sub terra vivit & illam fodiendo eruitur, victitat formicis.

Ambrosin.
lib. cit.

Huc spectant tria hæc quæ apponimus serpentum genera. *Primum* Brasilianum, quod biceps est, & cancri modo incedit. Alterum caput tam est amplum ut toti corpori adæquetur, alterum proportioni corporis respondet, ut Josephus Acosta prodidit. *Alterum* Taprobanense apud Ramusium, quadrangulæ forma, s. quatuor capitibus instructum, ut unum orientem, alterum occidentem, tertium meridiem, quartum septentrionem spectet. Unicuique oculus inest, & quo se unum gradiendo convertit, eo & alia feruntur. Animal est multipedum, sanguis vulnera citissime consolidat, *Tertium* in Hungaria reperitur, breve, duorum palmorum longitudine, nulla cauda, & æquali per totum corpus crassitie, utolim Vitus Hungarius Gesnero narravit. De *Amphisbæna marina* in mari Anglico capta, refert idem, bina capita, geminis ornata oculis habuisse, quorum unum ab altero vix distinguipoterat. Quatuor, addit, lineæ coloris amethystini totum corpus exornabant: quæ quidem lineæ, undiquaque flosculis quibusdam erant decoratæ pulcherrimis, instar florum pseudosycomori.

ARTICULUS X.

De Cæcilia.

Nomen.
Ambrosin.
l. 1. c. 11.

Nomen *Cæciliæ* à cæcitate inditum est. Albertus & Isidorus Cæculam vocant. Niphus Cæriallam. Græcis dicitur *τύφλωψ* & *τυφλίνος*, Hesychio *κωφίας*, quasi furdaster, quod hebetis sit auditus. Nicander *ἀπήμεανον* vocavit, quod nullam noxam inferat. Germanis est Blindtschleiche, modernis Græcis Tephloti, Tephiliti, & Tephlini, prout annotavit Bellonius.

Description.

Fusci & obscure maculosi est coloris, cum subrufo exiguo vix notabili. Color hic ad latera magis varius est, cum nigricantibus maculis diluta purpura distinctis, tanquam in marmore porphyrite obscuriore. Totus venter atro colore saturo nigricat. Sub collo & parte proxima color est glaucus, maculis quibusdam nigris variegatus. *Dentes* minimi, asperi, & qui vix apparent, in inferiori mandibula plures & magis conspicui. *Lingua* bi-

Gesnerus
de Serpen-
tibus.

fida. *Oculos* an absolutos habeat, explorare in mortua non potuit Gesnerus; observavit tamen, totum oculum ab inferiore palpebra tegi, cujus foramen in comparatione ad reliquum corpus, erat perexiguum. *Ælianus* *Caput* murænæ simile habere scripsit. *Femina*, aliquando capta ex Gesneri descriptione, erat dodrantalis, crassitudine scytalis, cute admodum nitida. Meatus in medio ventris apparebat, quo compresso, ova velut immatura exhibant. Infra ad caudam meatus erat excrementi: Oculorum cavitates magis quam oculi conspiciebantur. Deinde squamæ majusculæ magis caput quam reliquum corpus tegebant.

Tam velociter repit ac lacerta Chalcidica. Fætus vivos more viperarum enitur. Percussa una à Gesneri uxore, fætus vivi ejeti sunt. Præ multitudine fætum, uterum ipsis aliquando dehiscere, Plinius & Aristoteles prodidere. Virus bubus esse lethale apud Columellam legimus, Remedio caro ciconiarum, quæ Cæciliis vorant.

Natura.
Arist. H. A. 1.
l. 6. c. 13.
Columella R. l. 8.
c. 17.

In Medicina adhibuit Osualdus. Theriacam namque ex Cæciliis & aqua theriacali paratam, pro fudorifero in pestilentia exhibebat.

Vfus.
Gesnerus
in Epist.

Bellonius in *Terrestrem* & *Aquaticam*, sed nullo argumento nixus distinguit. Potest in *Vulgarem* & *Crassiore* dividi, quarum icones damus. Lusitani *Cege* nomen, serpenti indiderunt, quem Brasilienses *Ibyara*, Tapuyæ Bodty vocant, Crassitiem minimi digiti æquat, longitudine unum pedem & duos digitos circiter. Color est albus splendens instar vitri, & annulis & elegantibus lineis notatur, coloris brunni aut ærei. *Oculos* habet minimos & vix conspicuos, hærent in cute, instar punctuli acuti facti. Non procul ab extremitate caudæ anum habet, instar reliquorum serpentum. Non facile cauda à capite discerni potest, quod ejusdem sint & figuræ & magnitudinis. Tam cauda quam ore ferit. Sub terra vivit, & eam fodiendo eruitur. Victitat formicis. Contra venenum illius nullum remedium dari, affirmant Lusitani. Videtur mihi inter Cæciliam & Amphisbænam ambigere.

Differen-
tiæ.

Marcgravi.
H. B. l. 6.
c. 13.

ARTICULUS XI.

De Cenchro.

Cenchri nomen Latini à Græcis desumpsere. Dicitur enim his *κεγχρῶς*, *κεγχριδῆς ὄφις*, ut apud Dioscoridem legitur, *κεγχρίνης*, & *κεγχρίς*, ut apud Nicandrum: *κεγχρίνη* apud Varinum: *κεγχρίτης*, & *κεγχρίας*, ut apud Lexicographos. Dicitur vero ita à milio, seu quod quibusdam notis milii instar exornetur:

Nomen.
Ambrosin.
de serpent.
l. 1. c. 12.

feu quod tempore tantum milii appareat, ut Ethymologus reliquit: feu quod florente milio sit perniciosior, ut Aëtio placet: feu quod calorem milii plantæ referat, ut Avicennæ & Olao Magno placuit. Ideo ab aliquibus *Miliaris* appellatur. Nobis prima derivatio placet. Nicander eum *λεονίσα* vocat, vel quod squammæ ejus instar Leonis Lybici sint variis notis distinctæ: vel quod cauda erecta, more leonino se ad pugnam paret: vel quod more leonis sanguinem humanum exorbeat. Quidam Jaculum dixere, sed perperam, ut in sequentibus apparebit. Avicennæ est *Famusus Amcis*, & *Aspis diversicolor*. Alberto, *Amchis*, *Centris*, *Miliaris*, & *Falivisus*, An *Serpa Serena* serpens Siculus, subalbidus, longitudine humanum corpus, brachium circa carpum crassitudine æquans, venenosus ut Massarias ad Gesnerum scripsit, referri ad eum possit, difficile est dictu, cum nullas notas apposerit.

Descriptio. Longitudine est duorum cubitorum figura crassa in tenuem abeunte, & colore viridi, ad luteum tendente, qui maxime juxta alvum apparet. Lucanus marmor serpentinum Thebis advectum pluribus maculis æmulari scribit. Nicander quoad crassitiem & longitudinem nihil determinat, quod & grandior & minor reperiatur: totum vero maculosum esse ait.

Locus. Inveniuntur in Lemno, & Samo, in qua mons Mosychlus. Hinc Nicander:

*Atqui cum rapidis fervescens Solibus æstus
Ardet in horrida se sylvarum devia confert,
Imbelleque rapax venatur prædo bibentes:
Percepsive Sai juga, frondosive Mosychli,
Sub viridis quando frigentibus abietis umbris,
Securi recubant, grege circum errante magistri.*

Venenum & Remedia. Morsum Cenchri symptomata quæ in morsu viperæ occurrunt, excipiunt: sed in primis aquæ in ventre inferiore, qualis in hydropo generari solet collectio, ut Nicander notavit: ut Dioscorides & Ægineta, putridum primo ulcus, post partium tumor, tandem lethargus. Erasistratus jecur, intestinum colon, & jejunum ingenti putredine corripit credidit. Remedia ex illor. Censu sunt, quæ viperino morsui adversantur. Commendantur præterea, satureja sylvestris, radix menthæ saracenicæ, gentianæ, & aristolochiæ: maxime vero Ciconiæ caro, & reliqua membra.

Natura. Maximo æstu per montes vagatur: rubos & spinas fugiens per rectum tramitem incedit: & animalia caudâ implicat, aperisque jugularibus venis sanguinem sorbet.

ARTICULUS XII.

De Acontia seu Iaculo.

Serpens hic *ἀκοντιάς* Græcis ἀπὸ τῆς ἀκον-
τῖς quod jaculi instar se vibret. Hefy-
chio est ἀκόντις, Nicandro ἀκοντίλη, Vari-
no ἀκοντιζός. Latini *Iaculum* vocavere; Au-
thor libri de Natura, *serpentem volantem* ob
celere motum; Aëtius *Cenchritem*, *Cen-
chriam*, & *Aspidem acontiam*; quidam *Cher-
sydrum*: Sylvaticus *Acoran*; Abensina *Co-
fezati* & *Altararat*. Lemni incolæ *Sagitta-
rium*.

Is quem Bellonius vidit, erat tres pal-
mos longus, & digitum crassus. Colore ci-
nereo, sub ventre albo, juxta dorsum
squammatus, juxta ventrem laminis muni-
tus. A cervice nigra duæ albæ lineæ per lon-
gitudinem dorsi ad caudam usque percur-
rebant: deinde, maculis nigris oculi figu-
ram æmulantibus distinguebatur, ut bene
lenticularis à quibusdam dictus sit. De eo
cujus icon in Musæo Senatus Bononiensis
habetur ita Ambrosinus: Est crassitudinis
baculi, longitudinis trium circiter pedum.
Caput habet magnum coloris cinerei, reli-
quo corpore fusco præter ventrem, qui ad
colorem minus obscurum vergit.

Non inveniuntur in Germania, ut Agri-
cola prodidit. In Ægypto & Lybia reperiri,
Lucianus & Marcellinus prodidere. Visti
in Norvegia ab Olao Magno, à Bellonio in
Lemno & Rhodo. An in Calabria & Sici-
lia occurrant, quod Matthiolo relatum, du-
bium. Qui inde à circulatoribus deferun-
tur, & Boæ ac Serperigenæ nominantur,
pinnas longas & acutas à capite ad medium
usque corpus gerunt, quibus sese in altum
attollere possunt.

Morsum majora quam viperinum ictum
symptomata insequuntur; putredo in pri-
mis & carniū defluxus. Remedia ex capi-
te de vipera peti possunt.

De *Natura* hoc duntaxat constat, tam in
locis viarum publicarum abditis, quam in
arboribus, capite intra frondes occultato,
degere: jaculi modo serpendo ruere, & qui-
dem tam valide, ut spacium viginti cubito-
rum transiliat; & humi jacentem, ante-
quam insiliat, primo sese contorquere.

Fel ejus habet in Medicina usum. Aëtius
ex eo cum lapide scythico trito collyrium
parat, contra diuturnas suffusiones.

Albertus duplicis generis esse scribit. Alios
mortem sine sensu inferre. Alios
diuturno dolore fatigare. Ut vero hoc
incertum, nec cujusquam autoritate
probatum; sic certum est, non unius ge-
neris esse. *Texminen* enim, quem & *Micoatl*
vocant, serpens est apud Quanahuacenses,
prælongus & tenuis, cujusmodi et-
jam caput cernitur, ventre livido, dorso
fusco.

Nicand. in
Theriaca.

Nomen.
Ambrosin.
l. i. c. 13.

Descriptio.
Bellonius
Observat.
lib. 2. cap.
16.

Lucanus
Pharal. l.
9.

Locus.

Nicand. in
Theriacis.


Venenum
& Remedia

Plin. H. N.
l. 20. c. 22.

Natura.

Natura.
Æl. H. A.
l. 8. c. 13.

Nieremb.
H. E. l. 1. c.
29.



Dryinus Stinckschlang.



Elaphs



Anguis Aesculapii Vulgaris.



Anguis Aesculapii

niger Aldrov.

fulco. Vibrat se ex arboribus in homines & hominum oculos. Virulentus est, nec ultra canum assurgit. Recta incedit, corpus minime in spiras convolvens. Ille quoque qui in agro Tigurino rustici brachium ita læserat, ut carne nudaretur, baculi crassitudine, & trium vel quatuor pedum longitudine ex genere Jaculorum erat. Bononiensium etiam Acontias à jaculo Bellonii differt, Ambrosinus alterum vocat. In Hungaria quoque qui *Decurtati* vocantur, de quibus superius quædam, in homines eminus, jaculi modo insiliunt. Apud Indos in campis & locis subterraneis inveniuntur, qui velocissimis saltibus serpunt, & homines eo potissimum tempore, quo prolem educant, aggrediuntur. In Hispaniola habentur perexigui, coloris viridis, qui sola cauda arborum ramis hærent, reliquo corpore propendentes, prætereuntos lædunt. Apud Sabæos versantur coloris rubicundi, longitudine palmi, qui in homines insiliunt, nec tantum ictu, sed & tactu nocent. Scholiastes denique Nicandri sub nomine jaculorum non tantum hos de quibus egimus venire scribit: sed & illos, qui celerrimi & innoxii sunt. Huc pertinet serpens *Polpoch*, de quo ita *Nierembergius*: In agris provincie Jucatanensis offenditur monstificum quoddam serpentium genus, tres dodrantes cum maxime longum, brachium crassum, aut fulco exsaturatoque tinctum colore, sed à capite ad quinque unciarum longitudinem nigro & candenti varium, lato & compresso capite, oculis magnis & splendentibus, & cauda quæ reliquo corpori crassitudine non cedit, non dissimilis scorpionis, nec unguis terrore ælurorum magnitudini cedit. Nec vero uno tantum modo maleficum est animal, sed cauda pungens, & ore mordens. Visuntur magna ex parte hi serpentes arbores amplexi: cum vero ictu virus jaculari volunt, si solo consistant, visum hominem è longinquo insectantur, cauda supra caput contorta atque convoluta se rotantes in eum, atque ita brevi saltibus attingentes; Cum vero arboribus inhærent, ita caudam capiti adjungunt, ut arcus representent figuram, & jaculi sagittæve more, sese non sine strepitu qui sentiri possit, jaculentur atque contorqueant. Ictus est exitialis intra tres dies ictæ partis carne decidua atque putrescente: ossibus vero nudatis, & in colorem fulvum vergentibus, & adeo fætido odore exhalante, ut omne rapacium avium genus invitetur ad carnificinam. Ajunt indigenæ ictu ejus non inferri vehementem dolorem, sed universi corporis sensum potius heberari atque torpescere, atque ita ictum hominem velut temulentum mori. Sibila edit cothurnicum cantui haud dissimilia, quæ præterquam quod longius audiuntur, nomen serpentis, quod

polpoch esse diximus, exprimunt, non sine vehementi formidine atque fuga indigenarum.

ARTICULUS XIII.

De Dryino.

A Contiam excipit Dryinus, tum quod ^{Nomen. Ambros. l. 1. c. 14.} ejus icon cum jaculo Bellonii belle conveniat: tum quod Scaliger eundem à jaculo ob similitudinem non discreverit. Nomina plura obtinuit. A Scaligero & Greveno dicitur *Querculus*, aliis *Ilicinus*. A Græcis, vocatur *δρυῖν*, & *δρυῖν*, à *δρυς*, seu ^{Æl. H. A. l. 9. c. 42.} quod in quercubus lateat: seu quod à crabronibus vexatus continuo in quercum confugiat: seu quod squamis cortices quercus æmulantibus tegatur: *χέλυδρ*, quod aspera cute ad instar testudinis sit munitus, *κύνιδρ*, *Alidrat* cuidam scriptori seu *Cherisidal* qui addit fumum à terra excitare, & non nisi in interioribus Africae reperiri, *Andrias* Olao; *Durissos* Abensinæ, *Glandosa* Alberto, *Dendrogali* modernis Græcis, ut Bellonius prodidit. Quidam & *Bryinum*, & *Hydrum* seu *Chersydrum* dictum esse volunt. *Bryinum*, quod relictis interdum muscosis locis (*βρύον* villosum illud in arborum truncis dicitur) prata petat humida, ubi moluridas locustarum species, & partus ranarum imperfectos venatur. *Hydrum* quod per humecta convallium loca libenter divagetur.

In *Descriptione* in diversa abeunt authores. Nicander *Caput* ei Natricis capiti æquale assignat, *tergus* album. Agricola longitudinem & crassitudinem mediocris anguillæ, *tergus* cinerei coloris, in capite convenit. Wottonus illi tribuit longitudinem duorum cubitorum, *Corpus* obesum, squamas asperas, in quibus parvæ muscæ nidulantur; colorem tergoris subatrum, *caput* hydro æquale sed latiusculum, nec ita acuminatum. In tantam aliquando molem ex crescere Bellonius scripsit, ut sacco impositum rusticus per duo milliaria, quin interdum quiesceret, ferre non potuerit. Idem spoliū fœno replevit, quod humani cruris crassitudinem adæquabat.

Veneni proprietatem accurate descripsit Nicander, his verbis:

*Quod si cui prehensum Dryinus talumve pedemve
Luserit, à toto se spargens corpore fertur
Tristis odor, surguntque nigri, quæ plaga tumores,
Comprehensam morfi quadam caligine mentem
Mæstâq; tristitia, & lacrymabilis opprimit angor
Et periens nimio flaccescit forma dolore:
Usque adeo pascens absomit membra venenum,
Quin etiam obfuscans obducit lumina nubes
Et misere affectum perdit lethaliter ægrum.
Sunt etiam ejusdem qui morfi dentibus anguis,
Instar balantum soleant clamare caprarum*

Sive

Nomen.
Ambros.
l. 1. c. 14.

Æl. H. A.
l. 9. c. 42.

Bellonius
Observat.
l. 3. c. 51.
Nicand. in
Theriacis.

Agricola
de Anim.
subter.

Wottonus
lib. 6. de
Differ. Animal. cap.
20.

Bellonius
Observat.
l. 3. c. 51.

Ælianus
lib. cap.

Nieremb.
H. E. l. 12.
c. 48.

Sive orium, & gravibus torti cruciatibus angit. Pallidus urine liquor it, torpensque veterius Ingruit, & crebris quasi singultibus agit. Tum Nunc similem fellis vomitum, nunc sanguinolentum Ejiciunt, ipsumque malum facit arida labra, Postremoq; gravem fundit per membra tremorem.

Æl. H. A.
l. 4, c. 17.
Porta Phytogn.
l. 4, c. 2.

Symptoma illud de balatu, ab Aëtio, Ægineta, & aliis confirmatur. Ælianus omnes illos affectus Dryini morsui adscribit, qui in Chelydro occurrunt. Videntur ei quereuum radices resistere. Inflexæ enim hæ & circumvolutæ, a summo ad imum sensim deficientes, corpus gradientis Dryini imitantur, ejusque characterem ferunt. Dioscorides Aristolochiam cum vino laudat: Grevinus organum contusum & morsui impositum, lixivium cum oleo, & theriacam probat.

ARTICULUS XIV.

De Elape seu Elaphe.

Ambrosin.
H. S. lib. 1.
c. 15.
Nomen.

ELops seu Elaps inter innocuos serpentes à Nicandro ponitur. Quidam *Ἐλαπίων*, quod visu destituatur dictum opinantur: & fortasse cum Cæcilia confundunt. Alii ab *ἐλαφ* Cervo deducunt, seu quod more Cervorum sint meticulosi seu quod celeri cursu ferantur. Bellonius cujusdam serpentis in insula Lemni meminit, quam *Laphiati* vocant, eundemque cum eo qui veteribus Elaphis arbitrat. Facit & Fallopius cujusdam quem *Cervonis anguem* vocat mentionem, ut & *Cervæ anguis*: sed cum illum Caprimulgum, hunc Anzam, quo nomine apud Patavinos anguis Æsculapii venit, vocet, diversos ab isto concludendum est.

Bellonius
Observat.
l. 2, c. 51.
Fallop.
de tumoribus
l. 4, & 22.

Description.

De Descriptione ita Ambrosinus: Monachi qui commentati sunt in Mesuem promulgarunt serpentes quosdam cervinos similes esse nigris illis, qui multis in regionibus, & potissimum in Apulia sunt notissimi, neque multum veneni participant: quapropter per hos forte Boas intelligere voluerunt. Nos in Musæo Illustrissimi Senatus Bononiensis, quod olim fuit doctissimi Ulyssis Aldrovandi, invenimus coloratam iconem serpentis, longitudinis trium pedum circiter, cujus venter lutei est coloris, & tergus coloris Leucophæ, cum tribus lineis nigris à capite ad caudam usque percurrentibus: sub icone hæc nomina extant scripta: Elope, vel Elape, forte Nicandri, Elaphis quorundam, Laphiati, incolis Lemni insulæ apud Bellonium. Elephantias, forte & Cervone. Quamobrem ut lectores hujus animalis figuram contemplari possint, illam hoc in loco exhibemus.

Plin. H. N.
l. 32, c. 5.

Morsum ejus volvulosa tormina sequuntur, si Aëtii Elaps, cum nostro idem

est. Contra eum, communia auxilia, illa in primis quæ urinam cient, profunt: Nec non fassamentorum cibus.

ARTICULUS XV.

De Angue Æsculapii.

Anguæ Æsculapii nomen à tutelari Æsculapii nomine inditum est. Dicitur & *Anguis* simpliciter & quasi per excellentiam: quod forte solus inter serpentes beneficus & innocuus sit. Æliano est Pareas, Græci *παρεία* & *παρεια* scribunt, seu *παρά τὸ πεφυλαγμένας καὶ μεγάλας παρείας ἔχειν*, quod maxillas quodammodo turgidas habeat seu à *πίρροιον* quæ vox aliquanto *πρᾶον* mitem & mansuetum significat. Lucanus Phariam vocat: nonnulli Pagerinam. Apud Hesychium & Varinum legitur *πύρριος* à colore sic dictus, quem cum hoc eundem esse vehementer dubito.

Descriptionem si spectes, oblongus est sub lutei aut potius porracei obscurioris coloris, sed magis circa tergus nigricantis, Pars inferior albescit paulo in se subviridis. In quibusdam nota quædam forma crucis ex quæmarum ordine apparet, si aliquibus credimus. Ælianus lato ore esse dixit, Ovidius illum qui Romæ pestilentie tempore cristis insignitum, poetica forte licentia. Maxillæ dentibus utrinque multis valde acutis armantur. In cervice duæ parvæ eminentiæ conspiciuntur, inter quas locus vacuus. Sceleton hic exhibemus. In eo sequentia M. Aurelio Severino observata. *Larynx* nulla, sed *arteria aspera* caput teres, & tonsus, ut fistula, ubi linguæ radix inde inchoans, in confinio scilicet terminantis maxillæ inferioris. In tunica peritonæide, vesiculæ plurimæ oviculorum instar. *Hepar* multo superius ventriculo. Huic quidem finienti non illi adhæret *vesicula fellis* è vena cava descendens. Alterno latere splen pusillus, pisum referens, ruber. *Ventriculi* fundus corpus universum disternit ferre. *Renes* infimi utero proximi, his cava quinque binos insignes ramos mittit. *Intestinum* fere unum, quamvis Baldus Angelus Abbatius colon distinguit. *Uteri* cornu cavæ applicitum. *Glandula* oviformis supposita lien, fundo ventriculi adhærens; glandulæ autem cholidochus, perforans ipsam ad intestinum.

Invenitur plerisque in locis, Germaniæ, Italiæ, Hispaniæ, Poloniæ, &c. in Asia etiam Africa & America. In Italia tam familiariter cum hominibus vivunt, ut & in lectis inveniantur. Idem sæpe & in Lemno insula accidit, ut apud Leonem Allatium habetur.

De Natura dici potest, benignum quidem esse, & mitem, sed qui irritatus feriret. Plinius per mensem luna instigari scribit,

Am.

Ambrosin.
H. S. l. 1.
c. 16.
Nomen.
Æl. H. A.
l. 8, c. 12.

Description.

Ælian, lib.
cit.
Ovidius
Metamorphos. l. 15.

Zootom.
Democrit.
p. 363.


Locus.
Allat. in l.
de opinio-
nibus.
Græcorum.

Natura.
Plin. H. N.
l. 29, c. 4.

Boicininga.




Boicinininga aliter.




Boiguacu.



Ibiboboca.



Iararaca.



Amore pinima.



Ambrosius juvenis cujusdam exemplum adfert, qui cum eum complicare in nodum conaretur, ita admorsus est, ut copiosus sanguis proflueret. Excrementa ejus moschi odorem spirant: vix tamen omnium, aut omni tempore. Romæ in domibus olim pascebatur. *Nisi incendiis semina exurentur, non esset fecunditati eorum resistere inquit Plinius.*

Plin. l. c.

V. s. s.
Plin. l. c.

De Usu ita Plinius: *Prodest vivus comprehensus, & in aqua contusus; si foveatur ita morsus. Quin & inesse ei remedia multa creduntur, & ideo Esculapio dicatur. Democritus quidem ex his monstra quedam conficit, ut possint avium sermones intelligi.*

Differen-
tia.

Duplicis sunt generis. Alii pallidiores: alii, nigredine perfusi quorum icones damus. Wottonus totidem Syriacorum facit. Alii aris referunt colorem: nigricant alii. Morsum tumor duntaxat & levis inflammatio excipit. In Africa; ejusque in Mauritania monte Ziz qui vagantur, prandii tempore micæ de mensis cadentes legunt. Tales & apud Pyrenæos Bigerones haberi, testatur Scaliger. In Norvegia vaccino aut ovino lacte aluntur, & plærumque in infantum cunis, fidi ipsorum custodes dormiunt: verum si quando incendio domus deleantur, aut pestilentia incolæ pereant, in antris conditi ita se propagant, ut incolis graves sint. Hujus generis ille fuit, quem Marfus quidam Venetiis circumferebat, à Gesnero descriptus. Capite erat eleganti & subflavo, corpore nigricante maculis purpureis distincto. In lateribus linea quædam secundum longitudinem conspicua erat, quæ paulo supra caudam terminabat, & infra caput, per spaciū palmi incipiebat. Longus erat dodrantes quatuor cum dimidio, ex plaga orientali delatus. Venenatum non fuisse inde patet, quod circulator, caput ejus ori indere soleret. In Angue super omnes tenuissimo quem propter innocentiam Neapolitani dicunt *Angioleta*, Bononienses *Bisognola* sunt hæc singularia. Cor cum cæco quodam angulo ad basin assurgens, qui cum toto corpore & alligato vase figuram refert calcei. *Hepar* bifidum, tum in longum, tum in latum. Uteri cornua sicut & in caprimulgo angue; talis etiam vulva & vesiculæ duæ spermaticæ hinc atque hinc ad eam formam.

Scaliger in
Exerc.Severin.
Zootom.
Democrit.
pag. 368.

ARTICULUS XVII.

De serpentibus terrestribus Exoticis, Indicis imprimis.

P U N T U M I.

De Boicininga, seu Tentlacocauhqui.

Exoticis serpentes varii sunt, quos hic sub sex punctis trademus. Sub primo

ponimus *Boiciningam*, quæ & *Boicinininga* & *Boiquim*, Brasiliensibus; *Ayug* Tapuyis, Lusitanis *Cascavela*, & *Tangedor*, Belgis *Ratel-flange* / Mexicanis *Tentlacocauhqui* dicitur. Tres ipsius descriptiones dabo, quia Icones variant, *Marcgravii*, *Pisonis*, & *Nierembergii*. *Marcgravius* est serpens quatuor pedes & tres digitos longus, Corpore in medio crassiori, versus utramque extremitatem vero attenuato; in medio autem ubi crassissimus, brachium humanum prope cubitum crassitie æquat. Venter illius est planus: Caput compressum, sesquidigitum longum & latum. Oculi parvi: lingua teres & bifida. Inter cæteros dentes, quatuor habet reliquis longiores, falcatos, albos, acutos instar spinæ, quos retro condere & gingiva occultare potest. In pelle squamas habet, verum haud talis duritiei. Totum dorsum insignitur catena pallide flava, hamulis illius figura cubica constantibus, fimbriatis nigro: spatium autem intermedium inter quemlibet hamulum fuscescit. Latera corporis flavescunt cubis nigris ordine positae variegantur: nimirum duplex ordo cuborum nigrorum in quolibet latere, & cuilibet angulo hamuli catenæ dorsalis, respondet cubus unus lateralis unius seriei, alter alterius seriei respondet, interstitio duorum hamulorum catenæ dorsalis. Venter squamas habet grandiores reliquis, quasi parallelogrammas, pallide flavescentes. Caudæ autem in extremitate adnatum est corpus parallelogrammum, paululum compressum, constans quasi hamulis catenariis singulari modo invicem aptatis, ut cymbali modo serpens sonum eo edat, & è longinquo audiri possit. Quot annorum serpens, tot partes habet crepitaculum hoc. Serpens decem annorum habet crepitaculum hoc longum duos digitos aut paulo plus, latum quoque plus quam semidigitum. Substantia constat lævi, glabra, pellucida, sicca, coloris ex albo & cinereo subfusciscentis. Serpens est apprimè venenatus; nec Antidotum cognitum contra illud virus.

Marcgrav.
Hist. Bras.
l. 6, c. 14.

De eodem serpente ita *Piso*: Primo serpens ille *Bocinininga*, quem *Cascavel* & *Tangedor* Hispani nominant, propterea quod sonitum instar tintinnabuli cauda edat, in triviis juxta ac deviis locis cernitur, tamque celeriter proreptans, ut volare videatur. Huic tam pernicioso colubro, benigna natura, cautionis quasi gratia, nolam addidisse, ut illius sonitu, admonitus quilibet tempestive sibi caveat à vicino hoste. Brachii est crassitie, longitudine interdum quinque pedum, lingua bisulca, dentibus longis & acutis, colore fusco, & ad flayum vergente. Quotannis articulus, quo infestare solet, in cauda crescit, cujus extremitate in anum hominis immissa, mortem infert

Piso de
Med. Bras.
l. 3.

D

fert

fert confestim; venenum autem quod ore vel dentibus inferri, multo lentius viam tollit. Ex vulnere mox sanies cruenta effluit, caro livet, ulcusque paulatim serpit. Ad remedia extrahentia, vulnus dilatantia, scarificationes, cucurbitulas, & si pars læsa intercipi possit, ad vincula festinandum, idque junco Jacape cui remedio maxime fidunt Brasiliani, sin minus, cauterio utendum est. Interim dum veneni qualitas ad cor penetrat, curandum ut interius præmuniatur Tipiocæ haustu, sudoresque evocantibus insistendum. Præsentissimum præ cæteris remedium, quod Barbaris, contra hujus aut qualiscunque serpentis morsus restat, est ipsius nocentis caput, quod contundunt, contusum emplastri forma vulnere calens applicant: cui remedio simul addunt, in omni fere morfu, salivam hominis jejuni, quæ perpetuo partem affectam demulcent. (Plinius l. 7. c. 2. Galen. l. 10. simplic. Scaliger in Histor. Animal. l. 11. c. 18. hanc salivæ vim quoque agnoscunt) Adeoque his duobus Antidotis nituntur, ut desperent, si in illis voti compotes non fiant. Ego hæc & similia remedia, quæ longa illis experientia dictavit, jubente necessitate, lubenter sum imitatus. Non intermittendo tamen ea quæ à veneranda antiquitate & authoribus nobis sunt relicta. Ne nimium temere hisce novitiis, aut pertinacius veteribus viderer adherere.

Nierenib.
Hist. Exot.
l. 12. c. 1.

Nierenbergius *Dominam Serpentum* vocat, & hæc de ea habet: Non sine naturæ usu reptilia sunt: nec minus majestatem creatoris humilitate sua exaggerant, non minus bonitatem peste sua. Scit pessimis Deus juvare, scit veneno mederi: liberalem medicina opem è noxiis istis usurpat. Exordium occupet atrox serpentum genus, *Tenthlacokauhqui*, seu *dominam serpentum* Barbari vocant, *viperam* Hispani, sive ob similitudinem capitis sive pestis. Anguis hic quaternos pedes aut amplius longus, & humanum, ubi mediocriter crassus est, latus: *dorso* eminenti; *viperino capite*, *ventre* ex albo-pallescente, *lateribus* opertis, candentibus *squamis*, fasciis tamen pullis per intervalla intermixtis, *dorsum* fuscum est, luteis tamen lineis sese in ipsa spina fecantibus insigne. Multæ sunt ejus serpentis *differentiæ*, non plurimum inter se distantes, & ictu mortem inferentes, nisi celerissime præsidii occurratur. In spiras, irritatus, aut contrectatus ac inæqualiter caput contorquet, sed ita sibi undique cavet, ut nulla non parte se vindicet ab injuria. Excogitatum est icta humare membra terraque obruere, & ita manere donec omnino cesset dolor, aut morbus sit curatus: prospero magna ex parte eventu. Per faxa fertur celeri cursu, at per terrestria plana que (quod mirum videtur) non adeo:

Ob quod Mexicanorum quidam à *vento* nomen indidere, vocantes *Hoacoati*. Quot annos natus est, tot accedunt caudæ perstreptentia sonalia; posteriore in parte caudæ vertebrarum instar connexæ. *Oculi* sunt nigri, mediocris magnitudinis. *Dentes* habet superna maxilla caninos, quibus jaculatur venenum: utroque autem latere oris quinque parvi dentes supernæ maxillæ insunt, sed qui facile conspici à quolibet aperto ore queant. Et sinuose graditur, ictus, toto corpore hiantibus rimis fatiscit, & viginti quatuor horis transactis à morfu animam dicitur agere. Apprehensos cauda, Indi, qui eos venantur, tuto tenent appendentes: tamen torquentes collum, perstreptentes sonalibus, corpus illuc hucque jactantes, ac nihil non molientes, ut pænas de venatore sumant. Narrant multi, quicum serpentem domi alere solent atque educare, annum integrum durare absque cibo ullo potuque, abscessumque caput decem aut amplius dies ferunt apud Panucenses in femoris crassitudinem, & longitudinem incredibiliter adolescere. Norunt cicurari posse permulti, qui eos domialentes habent in deliciis. Venenum jaculatur caninorum tubulis; cavi enim sunt. Nec desunt, qui affirmant, vivum parere etsi falso, quemadmodum ex aliorum narratione constat. Cum læsus irascitur, sonalibus concussis vehementer perstreptit, erigitque collum non sine adstantium timore, nec tamen mordet, nisi compressus aut incitatus. Caninis in usus medicos servatis, pungunt Mexicani Medici collum cervicemque, doloris capitis placandi gratia, pinguedineque animalis omnium fere nocentissimi, lumbos perungunt, sedando illorum dolori, aliasque corporis partes dolore infestatas, ac discutunt præter naturam tumores. *Edunt* Indi eorum carnes, ac verissimum esse statuunt, corticalium carnibus, esse præstantiores, ac gustu gratiores. Linteo convoluta quantum velis, tenui raroque, ita tepescit illa feritas, ut vel à puero quolibet circa formidinem, aut noxam ullam deferri possit. *Ajunt caput* hujus serpentis alligatum collo, instar viperini, gutturi morbo ferre suppetias; Febrientibusque medentur puncturæ serpentium omnium, quibus natura appendet sonalia, humano stercore duarum unciarum pondere, ex qua congruenti propinato, aut commanso, *picietl*, & admoto vulnere, item corniculis cujusdam arboris vulgaris novi orbi tufis, atque applicatis. Est etiam huic malo convenientissima Chipato ac provenit in calidis locis Novæ Hispaniæ ubique fere. Est & alius serpens *teut lacoutrauhqui* quoque nuncupatus, quinque dodrantes interdum longitudine superans, & humerum crassitudi-

ne,

ne, nec dissimilis alteri ejusdem nominis tum forma; tu veneni atrocitate, præterea etiam & sonalibus, in quæ finitur cauda: sed hujus color pullus est, vergens in luteum, pallidis maculis (quod alteri quoque contigit) oblique sese interfecantibus. Ajunt eam esse veneni hujus vim, ut non ictu tantum, verum contactu quoque officiat: unde sortitum nomen.

PUNCTUM II.

De *Ibiboboca* & *Boiguacu*.

Marcgrav.
Hist. Bras.
1. 6. c. 13.
Piso Med.
Brasil. 1. 4.

I Bibobocam & *Piso* & *Marcgravius* describunt. Ille ita de ea: *Ibiboboca* Brasiliensibus, anguis pulcher, Lusitanis *Cobre de Corais* appellatur, duos pedes longus, pollicem autem crassus, colore niveo, & nigris, rubrisque maculis variegatus. Morsus illius venenatissimus, non extemplo vitam depascitur, sed tarde se promovet. Sanatur emplastro è capite serpentis concinnato, & efficaciter appposito. Pulvis plantæ *Nhambi*, tum & succus foliorum *Caapeba*, & *Cajatia*, vulneri instillatus, extrahit virus.

Exactius paulo *Marcgravius* suum depinxit. Ita enim de eo: *Ibiboboca* Brasiliensibus, *Cobra de Coral* Lusitanis: serpens duos pedes longus & pollicem humanum fere crassus, ubi crassissimus; nam versus posteriorem partem teres est, & acutus, instar subulæ. Totus venter est albus & splendens: dorsum & latera tincta. Caput habet squamulas albas cubicas, ad oras nigras, hinc cinnabria sequitur macula, cujus squamæ per oras nigræ, & ita semper rubra macula est, hinc sequitur nigra, hinc alba, iterum nigra hinc rubra & sic deinceps. Rubra macula plus uno digito est longa, duæ albæ & tres nigræ simul sumptæ sesquidigitum longæ, æquales inter se: nigræ autem maculæ totaliter sunt nigræ, albarum autem oræ nigræ, venenatus est serpens.

Marcgrav.
Hist. Bras.
1. 6. c. 13.

Boiguacu aliquot species habet *Marcgravius*, quas ejusdem verbis exhibemus. *Boiguacu* Brasilianis *Cobra de Veado* Lusitanis. Erat pellis septem, & semis pedes *Rhylandicos* longa; in medio corpore undecim digitos lata, sensim versus caput & caudam in angustiore latitudine vergens, ita ut eo loco quo caput abscissum, tantum circiter quatuor digitorum latitudinem haberet, & in caudæ extremitate paulo minorem. Tota autem pellis squamis erat recta certa serie dispositis in ventre majoribus in dorso minoribus ut in omnibus serpentibus: Elegantissime autem erat variegata; nempe per medium dorsum secundum longitudinem maculis nigris, quam catenæ cujusdam majoribus partibus constantis figuram quasi referebant, ad latera autem utrimque palmum inter se distantes maculæ nigræ rotundæ fere, in qua-

rum centro albo macula itidem rotunda, magnitudinem autem hæ maculæ habebant majorem imperiali: inter hæc, attamen extra illarum ordinem, versus ventrem iterum utrinque duæ series minorum macularum nigrarum discurrebant. Ejusdem coloris & similibus maculis accipiebam *Septimo Augusti 1638*. Sed majorem priori, crassities enim corporis medii erat tredecim digitorum, longitudo autem octo pedum & supra. Ejusdem speciei unum accipi vivum tertio Augusti 1638. similibus maculis; longum quinque pedes & quatuor digitos; crassum vero, ubi crassissimus, semipedem. Carnem habebat albam anguillæ similem. Cor exemptum è corpore per quadrantem horæ subsiliebat. In postica parte corporis, septem digitorum intervallo ab extremitate caudæ duos breves ungues habebat quasi avium, circa anum nimirum. Duplicem ordinem dentium acutissimorum, in utraque maxilla. Caput latum & supra oculos in duo tubera elatum.

Ejusdem speciei ingentem accipio sexto Octobris 1638. inquit *Marcgravius*, cujus longitudo erat octo pedum & semis; crassities ubi maxima, quindecim digitorum: eratque valde nigro & albo variegatus. Carnem habebat albissimam & pinguem. Carnem sepelivi, & ossa post quadrimestre spatium exemi pro sceletio. Pellem tomento replevi. Spina autem dorsi ossibus constat, & costæ dura spina. Duplicem ordinem habebat dentium in utraque maxilla, quæ itidem duplex erat. Dentes sunt acutissimi, paulum incurvi, acus pectinum referentes, splendide albi coloris, instar matris perlarum politæ. serpens hic vocatur à Brasiliensibus *Boaguacu*, id est magnus; nam vidi qui integram capream deglutiverat. Non sunt venenati & caro illorum comeditur.

Alterius speciei mihi allatus decimo quinto Novembris 1639. cujus longitudo erat quatuor pedum & unius digiti crassities, ubi maxima, quinque digitorum. Squamis in ventre argentei coloris splendidissimi, reliquo corpore, nigro & albo variegati. Cauda quasi è sex annulis composita erat argenteis. Sex acutos dentes habebat in utraque maxilla.

Habui etiam ferrei planæ coloris & in ventre albi, longitudine trium pedum aut circiter, crassitie ubi maxima, duorum digitorum. Habitant in ædibus & ova galinarum exsorbent. Sæpius inveni in ædibus & extra plane virides, duos aut tres pedes longos, crassitie digiti articularis. Amplum his os & nigra lingua: suntque admodum venenosi, vocantur à Brasiliensibus *Borobi*.

Piso eundem serpentem paucis nobis ita exhibet: *Boiguacu* sive *Iiboya*. fer-

Piso Med.
Brasil. 1. 3.

pentium omnium facile maximus, pectus fere ut hominis crassus, Lusitanis *Cobre de Veado* dictus, quod Dorcades integras devoret, idque fugendo potius, quam mastigando. Ex horum genere quidam octodecim vel quatuor & viginti pedes reperiuntur longi: Cineritio, spadiceo variegato sunt colore. Non æque veneno, ut multi alii turgent. Carne eorum non solum Indigenæ & Nigræ, sed & nostrates vescuntur. Famelicus hic anguis vel ex dumetis proflit, caudæque suæ nitens, horrende se erigit & strenue cum feris & hominibus luctatur, & sibilat irritatus, vel ex arbore infidiose in viatorem desilit, eumque validissimis cingit amplexibus, ita ut vel sola complexione interimat: nec minus validi atque feroces existunt duo ingentes illi *Ambo* & *Cucumciu*, hominibus æque ac capreis infidiantur. Quippe omnes hujus generis solidis vertebis & costis præditos ex Anatomie animadverti. Ictus eorum vix censetur venenatus, & per se aliquando, etiam si nullo vel leviori saltem adhibito remedio, curatur. Ita ut hi inter non venenatos serpentes, de quibus passim auctores multa testantur, debeant numerari: quibus Caninana, Macina, & Vocia annumerare liceet, quod nihil vel parum saltem hominibus noceant.

Nieremb.
H.E. I. 12.
c. 43.

His similes sunt serpentes in Regno Senegæ, si Aloysio Cadamusto credendum est. Duorum enim pedum mensuram excedunt: alas, nec pedes habent ut serpentes, alioquin immensi, & tantæ quidem vastitatis, ut integras capras hauriant, nec lancinent, solide devorent. Ferunt incolæ, serpentes hujusmodi congregari statis anni diebus, & migrare in loca quædam, ubi formicarum est vis magna, quibus & color albicans quæ suapte natura humiles quasdam casas instar specus serpentibus extruunt.

Nam ore terram portant, & ferruminant absque calce. Diceret clibanos aliquos vel rusculam in ordine disposita. nam ex hujusmodi casis videbis centum & quinquaginta continenter subordinatas, ut alteram sequatur altera, miro naturæ ordine. Sed & contumax viribus serpens quidam est Thema, *cuilcabuilia* enim idem est, atque cum quinque pugnant, in obvios enim impetum facit, eaque vi opprimit, ut si collo semet se advolverit, strangulet interimatque, aut salvo homine ipse coluber disrumpatur suo obnixu. Qui hujus naturam novere, eum deludunt, opponentes arborem aut aliud ejus nexu disrumpatur, putans comprimere hominem, ut ita tandem convulsus intereat.

Nieremb.
H.E. I. 12.
cap. 41.

PUNCTUM III.

De Boitiapo, & Iraraca.

Boitiapo Brasiliensibus; Lusitanis *Cobra* Marçg. H. Bras. I. 6. c. 14. de cipo serpens septem aut octo pedes longus, brachium humanum crassus: Teres ac in postica parte instar subulæ acuminatus; coloris olivacei, in ventre flavescens. Vestitur squamulis elegantibus quasi triangularis. Victitat ranis; Est venenatus. Iraraca brevis est hic serpens raroque femicubiti longitudinem excedit, venis quibusdam in capite prominentibus instar viperarum, & haud aliter quam ille stridens: rubris & nigris maculis insignis, cæterum terreo colore: Ejus morsus venenatus non minora adfert symptomata, quam vel reliquorum serpentum, exceptis iis qui lente & clam vitam depascuntur. Ipsa fera postquam vulnus infligit, à cute, cauda, capite & intraneis repurgata, & in aqua radices Jurepeba, cum sale, oleo, porro, anetho & similibus cocta, à vulneratis comeditur, magnoque illis solet esse præsidio. Convenit denique præ cæteris, Caatia, quæ merito *Herva de Cobras* dicitur, quod foris & intus exhibita, hujus aliorumque serpentum morsus facile restituat. Idem feliciter præstant acini arboris Suibira, contusi & moribus applicati.

PUNCTUM IV.

De Caninana, Serpente mansuesceto, Apochycoat, & Alatis.

Caninana Serpens, ventre est flavo, dorso Piso. Med. Bras. I. 3. autem viridi; octo circiter palmos longus, inter minus venenatos habetur: ovis victitat & volucris: Capite & cauda resectis, ab Afris & Americanis comeditur. De peculiari illius Antidoto, nihil adhuc certi affirmare possum. Vulgaribus alexipharmacis sive Europæis, sive indigenis supra enarratis, malum si quod infert facile expugnatur. Familiare autem illud decoctum antidotale, ex radice Jurepeba, cum pauxillo salis huic aliisque moribus vel puncturis venenatis sæpe applicandum est, nec non fructus Ananas viridis, isque in cataplasmatibus modum contusus. Denique si necessitas ulterius urgeat, pars læsa scarificetur, moxque vivus gallinaceus pullus imponatur.

Alii vidimus ab Indis, ait Franciscus Nieremb. H.E. I. 12. cap. 40. Hernandus deliciarum gratia, colubros quosdam virides, qui allati ab agris, pollicari tantum magnitudine, in femoris crassitudinem amplexantur & adolecant. Ubi pro antro est illis dolium stramento indulgentiæ gratia emollium, ubi magna ex parte quiescunt, vivuntque, nisi cum edendi est

est tempus. Tunc enim egressi cubile, aut humeros heri amice conscendunt, benevole terrifici animalis amplexus tolerantis, aut è pistillis, in medio contracti in spiras, rotamque magnam æquantes, innocentissimi vescuntur oblati, atque quiescunt.

Nieremb.
H. E. l. 12.
c. 45. Serpens quidam est apud Pamerenses quinos prolixus cubitos, & quattuor digitos latus, Squamis nitidis, albo nigroque variantibus colore: *Apachycoatl* vocatur, & morfu minime exitiali.

Nieremb.
H. E. l. 12.
c. 36. *Alati* serpentes in Florida reperti alis eatenus instructi, ut possent tolli è terra & volare demissa viderentur. Americus Vesputius quoque invenit Indos piscatores, qui serpentem alatum craticulæ lignæ impositum assabant. In tuguriis complures ejusmodi serpentes vivos habebant, quorum pedes vinculis alligati, faucesque funibus contractæ erant, ne quid hominibus noxæ inferrent.

PUNCTUM V.

De Bojobi, Tetranchcoatl, Tleoa seu igneo, sanguineis & Trinbutili.

Piso, Med.
Brafil. 3. **B**ojobi Brasiliensibus, Lusitanis *Cobre Verde*, ulnæ est longitudine & pollicis crassitie, coloris porracei & pulchre micantis. Aedificiis gaudet, neque ulli nocet nisi irritanti: morius tamen illius venenatus, remedio quamvis eximio vix cedit. Radix autem illa nodosa herbæ Caapia confusa & ex aqua pota, summopere prodest, cæterisque herbis Antidotilibus, facile palmam in hoc casu præripit. Miles quidam gregarius anguem hunc inter arbutta latitantem, dum pede forte conterit, ab eo in femore demorsus, paucis post diebus, toto corpore tumefacto & livescente, deficiente radice Caapia, cæterisque remediis frustra adhibitis, præsentibus commilitonibus, quam miserrime exspiravit. Idem videtur cum illis de quibus supra ex Hernando.

Nieremb.
H. E. l. 12.
c. 35. *Tetranchcoatl* serpens est tres dodrantes longus, ac digitum crassus, cujus ictus pestilens est; *dorsum* nigrum, *venter* candescens ex pallido, & rubescens inferna cauda, *venter* autem & cauda punctis nigris conspersa, *caput* nigrum, ac torque circumcinctum luteo. Remedium morsus est, ictum locum fugere, sed commanso prius piciet, ne venenum noceat præsidium adferentibus, quod etiam velut egregium antidotum admoveere expedit vulnere: nec solum adversans illatæ noxæ, sed ipsis quoque serpentibus infensum & inimicum.

Tleoa seu *igneus coluber* anguis est sesquidodrantem longus, ac digitum crassus *squamis* albis, nigris, fulvis, fuscisque distinctus. *Caput* est viperæ nostratis capiti simili-

le, caudaque juxta finem subito attenuata, intervalloque binum tantum digitorum, quæ definit in sonalia. Lethalem infert morsum, urentemque unde evenit ei nomen. Cum incedit, in latera utrinque se convolvit, ac lento procedit gressu. Contra ejus morsum ajunt conferre tusam radicem herbæ, quam vocant ancola. Idem auctor scribit de thecoatl, seu ignito serpente: Coluber est sex dodrantum mensuram adolescens, triumque digitorum crassitudinem. Vivit montanis locis, & lethalem infert morsum: color est fulvus, sed dilupior circa ventrem, ac vergens in cinereum sinuose incedit, in utraque sese latera contorquens, vivit in montibus Tepotlanicis.

Sunt tamen *alii serpentes*, qui aspectu referant ignem, octo pedibus longi, colore sanguinei, qui noctu inflammati apparent, ut ignis aliquis videatur, quemadmodum Antonius Herrera prodidit. Scribit quoque Franciscus Hernandus vocari *cumcoatl* colubrum, qui nocturnis tenebris splendeat, qui & letifer morfu, quatuor longus cubitos, & brachium crassus.

Serpens est Panucinus, longus ac latus, albis & nigris distinctus maculis, *trinhuitili* vocatus, quod cauda, quæ præacuta est, lethaliter pungat.

PUNCTUM VI.

De quibusdam Veterum serpentibus.

PRæter hæc quæ jam enumeravimus serpentum genera, sunt & alia apud veteres obvia, quæ difficulter ad jam explicata referri possunt. Facit Ælianus cujusdam *Hyæne* dicti mentionem, quem utriusque sexus participem esse narrat. Altero anno marem, altero fæminam observari. Ad stipulatur eidem Orus. Nicander quasdam Libyas angues inter innoxios recensuit. Suidas scribit de *Argolis* serpentibus, quos Alexander Argo Pelasgico Alexandriam deferri, & in flumen pro extinguendis Aspidibus conjici curavit. Gesnerus *Mergolos* etiam nominat, ex Africa delatos; sed qui & quales sint, non addit. A Hesychio & Varino *ῥέας* & *αἰδ* & *ἰφε* nominatur.

Clitarchius etiam, referente Æliano, serpentes in India sedecem cubitorum generari scribit: alios etiam multo minores pigmentis distinctos. Vittas enim à capite ad caudem pertinentes habere, alias areas, alias argenteas, nonnullos rubras, alias aureas, easdemque celerrime pestifero ictu interimere. Meminit & alterius, punice coloris, quem forte *Porphyrum* Ælianus vocat, Strabo, apud Indos dodrantali magnitudine, capite candido, dentibus nullis, quem venatores in montibus meridiei obversis, ex quibus Sardijs eruitur,

iadagant. Non morder, sed vomitu / confusus locus subitam contrahit putredinem. Quapropter, cauda suspensus, duplex veneni genus eruat; alterum nigrum & speciem electri referens, quod à vivo ejicitur: alterum simpliciter nigrum, de ore animantis prodit. Illud grano sesami exhibitum, cerebrum per nares excutit: hoc tabem inducit.

CAPUT II.

De Serpentibus Aquaticis.

ARTICULUS I.

De Hydro seu Natrice.

Ambrosin.
l. i. c. 17.
Nomen.

Tantum de Terrestribus serpentibus, sequuntur *Aquatici*, nempe *Hydrus* seu *Natrix*, *Natrix torquata*, *Natrix rubetaria*, *Boa*, *Hydrus marinus*, *Scolopendra marina*, & quidam *Exotici*. *Hydrum* δὲ τὸ ὕδωρ ab aqua nempe dici, clarum est. Cretensis est *καρπὺς*; aliis *εὐδρῶς*, quod nomen generale est de illis quæ in aquis vivunt; Nicander interpreti *χερόδρῶς*, quod in aquis & terra divagetur. Latini vocant *Hydrum*, masculum, *Hydrum* feminam, cujus nomen *Ælianus* Dryinio imposuisse videtur, dum ait *Hydras* in *Cercyra* genitas, maligno flatu hominem persequentem reprimere; *Natricem* à nandi peritia; *Colubrum aquaticum*, quem tamen *Plinius*, dum jecur colubri aquatici & hydri tritum lithiasi subvenire scribit, ab *Hydro* distinguit; *Lutricem*, denique, quod apud *Gazam* legitur. *Beluacensis* & auctor libri de natura rerum, *Naderæ* serpentis Germanici meminit, crassitudine brachii, colore ventris luteo; & dorso virenti, halitu adeo noxio, ut in cortice virgæ recentem cassâ, & ori admotæ, vesicæ felleæ excitentur; imo fulgens gladius lingua veneno inficiatur, quod ad summitatem usque gladii deferatur. Pede hominis vulnerato, venenum statim in totum corpus penetrat. Ideo ictus confestim suspenditur, ne ascendere possit.

Descriptio.
Plin. H. N.
l. 29. c. 4.

Pulcherrimos serpentum in orbe terrarum *Plinius* facit; sed nullis serpentium inferiores veneno. *Nicander* caput planum & humile adscribit, & dum terrestrem squalidum prodit & decolorem, videtur aquatico pulchritudinem vindicare. Alioquin aspidem forma referunt; cervicem si excipias, quæ non ita lata conspicitur. Cinereo quoque sunt colore, & quibusdam maculis spectabiles, *Linguam* bifidam habere, (falso duas ponunt) commune illi cum aliis serpentibus.

Locus.

Stabulantur in *Cercyra* teste *Æliano*, in lacu *Mycleo*, circa *Terracinam* in Italia: in palude *Agnani* inter *Puteolos*, & *Neapolim*, quos ipsi vidimus; in aquis calidis

& *Thermalibus*. Ideo redemptores balnearum ad *Limagum lacum*; laminas ferreas crebris foraminibus pervias emissariis obdunt, ne alveos subeant. In aquis etiam corruptis plerumque reperiuntur. Adventante hyeme subterraneas cavernas eligunt, in iisque ad vernum tempus latent. In aquis autem præcipue versantur; exsiccatis terram petunt, victus conquirendi gratia. Extra aquas etiam ova parere, *Aristoteles* prodidit.

Gesner. de serpentib.

Arist. H. A.
l. i. c. i.

De victu hoc tradit *Virgilius*, piscibus & ranis vesci, gulososque esse. Unde *Nicander* λήχης vocavit. *Virgili* verba sunt:

Victus.

Virgil. Georg.
l. 3.

Est etiam ille malus Calabrus in saltibus anguis, Squamea convolvens sublato pectore terga, Atq; notis longam maculosus grandibus abrum. Qui dum amnes ulli rumpuntur fontibus, & dum

Vere madent udo terra ac pluvialibus Ausfris, Stagna colit, ripisque habitans hic piscibus atram Improbis ingluviem, ranisque loquacibus explet. Postquam exhausta palus, terræque ardore debiscunt

Exilit in siccum, & flammantia lumina torquens Sævit agris, asperque siti, atque exterritus æstu.

Recte ergo *Aratus*, ranas hydrorum bum dixit. Fallitur tamen sæpe ab *Ægyptiaca*, quæ *Cherfydrum* eminus conspicata, frustum arundinis transversum arripit & gestat ne deglutiri possit: nec ille tam aperto ore ut utrumque absorbeat.

Aratus in Phenom.

Ad Naturam duo spectant, venenum, & Natura lapis quem in capite gestat. De veneno abeunt in diversa auctores. *Cardano* nihil venenati habent, si per viperas undam incolentes, *Cherfydros* intellexit *Cælius Rhodiginus* in terra favorem, minus in aqua facit. At *Ælianus* ex *Apollodoro* tam perniciosum scribit, ut & cadaveris ejus contactus perimat. *Plinius* nulli hac in parte serpentum generi inferiorem dicit, ut supra allatum. *Columella* denique, exsiccata uligine, in qua Natrices morabantur, cæcos sæpe morbos contrahi, quorum causas Medici perscrutari minime possint, addit. Ut ut sit, *Dædalus* & *Euridice* *Orphei* uxor, ictu *Cherfydri* periisse traduntur. Lapis à deglubito evomi creditur. Quidam eum cauda suspensum foliis lauri suffiunt, & per Deum ut lapidem ejiciat, orant, quod non minus superstitiosum quam blasphemum est. *Hollerius* vas aqua plenum suspensum subjicit; lapis ejectus totam absumit. Sed de eo alibi.

Rhodigin.
Æl. H. A.
l. 8. c. 5.

Columella R. R.


De veneni signis ita *Nicander*.

Veneni signa & medicata.

Pessima quas fecit plagas hæc signa sequuntur. Arida tota cutis circum putret horribilemque Elevat aspectum, magni ignitque dolores Tandem hominem interimunt, mox plurima pustula surgit.

Ac

Chersydrus Greuii Hydrus Natrix.




Natrix Torquata.




Natrix Rubetaria.



Natrix Rubetariae skeleton.



Serpens Marinus.





*Ac alia ex alia bulle se parte rependunt
Et miserum diris turbant affectibus agrum.*

Adde his, vomitum cholerae fatidæ, quem vel tertia hora, vel tertio die mors excipit: vulneris dilatatio & nigredo, ex qua nigra & fatida sanies extillat, quod apud Aëtium & Abensinam habetur. *Morsui* Dioscorides origano trito & cum aqua subacto, vel Cortice Aristolochiae, radiceve querna, occurrit: Aegineta, nasturtio sylvestri, aut asphodeli fructu, vel semine feniculi: Plinius ipforum hydrorum jecore & eryngio: Apulejus verbenaca: Aëtius theriaca, mithridatio, & drachma nucum cupressi, cum aqua portione baccarum myrti, & melle aut vino: Celsus, panace, prasio, & satureja: Abensina, emplastro ex calce, calamintha montana, Cortice radiceis quercus & oleo parato. Pareus in quodam admorso, qui cum manu ori adnota, vulnus fuxisset, in tumorem quoque linguae, & brachii, cum dolore ingenti & syncope inciderat, theriaca ad sudores, & vulneris elotionem feliciter usus est.

*Usus in
Medicina.*

Magni est in Medicina *Usus*, si veteribus, & recentioribus credimus. Ex *dentis* calpium odontalgiam sedat, si eo scalpentur. Duo superiores superiorum, totidem inferiores inferiorum dolorum mitigant, alligati. *Adipe* Niliaci peruncti à Crocodilis non tanguntur. *Iecur* lithiasi medetur. *Spolium* fustitum uteri prolapsui & sedis prodest; quod ab Encelio proditum. Cinis in olla luto probe circumlita, igne sarmentorum vitis cremati, cum oleo permixtus ad strumas à Sylvio laudatur. *Lapis* hydropi vehementer conducit, si genuinus est. Talem esse scribit Gesnerus, si conchæ æneæ aqua plenæ circumligatus, quotidie cotylas duas, seu uncias decem ejusdem absumferit. Venenatos vermes fugare, Camillus Leonhardus Pisarenensis prodidit. Sumptum lapidem vesicæ perfringere fabulantur quidam.

Camillus
Leonhard.
l. 3. de la-
pidibus.

*Differen-
tia.*

Pauca de Differentiis occurrunt; Alii sunt *Vulgares*, quales sunt illi qui circa thermas Porrectanas versantur, & interdum ab ore fontis cum aqua exeunt. Aut sunt plane innocui: aut si nocent levem duntaxat tumorem aut inflammationem morsu inferunt. Alii sunt *Venenati*, & magnitudine pro ratione locorum differentes. In flumine enim Argæ ad Persicam Sittacem sito, copiosi sunt, capite albo, reliquo corpore nigro, quatuor cubitorum longitudine inveniuntur, qui interdum sub aqua latent, noctu aquantibus exitio esse solent. In lacu infano, qui ter singulis diebus saporem mutat, primo amarus, mox falsus, tandem dulcis evadit, vicenum cubitorum conspiciuntur. Anno M. CCC. XCIX. die vegesima quinta Maii, sub

Æl. H. A.
l. 16. c. 42.

Ponte Ursæ amnis vicenum cubitorum visum, Gesnerus ex Chronicis Tigurinorum M. SS. author est. In lacum Anianum mensè Junio multi invicem permixtorum globi, se precipitant. In Lybiæ desertis tam perniciosus est hydrus, brevis ille, cauda tenui, circa collum gracilis, ut omnino par-tis læsæ amputationem requirat. Agricola Boam, domesticam natricem appellavit.

Agricola
de Anin-
subterraneis

ARTICULUS II.

De Natrice torquata, & Rubetaria.

Natrix torquata nomen à circulis quibus tanquam torquibus superior animalis pars circumdatur, invenit. Scholiastes Nicandri πολυσεφείας vocat, seu multis coronis insignes: alii & μυάγρης seu μυό-*meas* quod muribus vescantur, & ὄροφείας, quod circa domorum tecta versentur, vocant. Apud Aristophanem, ὄφεις ὄρετροι, domuum custodes dicuntur. *Nerophis* est modernorum Græcorum vocabulum, *Serpens niger* à Matthiolo impositum nomen. In Italia aliqui *Carbonarium* vocant.

Ambrosino.
H. S. lib.
cit. c. 18.

Nomen.

Descriptionem ex Ambrosino dabo, de qua ille ita. Aëtius Myagrum veterum describere videtur, dum inquit; hunc anguem ex crasso in tenuem caudam abire, lato capite esse præditum, & mures comedere, neque mori necare, sed inflammationem tantum inducere. Hujus natricis iconem ad vivum expressam servamus in Museo Illustrissimi senatus Bononiensis, ubi tenuis conspicitur circa *collum* & *caput*, crassior penes circa *ventrem*, qui postea in caudam admodum exilem finit. *Color* tergi nigricat, circa alvum, color inter luteum, & viridem est medius lineis nigris virgatus, hujus autem nota insignis est in collo; nam maculae candicantes è pallido, instar torquis, circulum tamen non absolventis apparent. Inter utraq; maculas in summo cervicis angustum est interstitium duarum forma squamularum, ubi maculae utrinque quasi triangulari figura in acutum desinunt. Deinde maculae nigrae splendide utrinque etiam post torquem singulae conspiciuntur.

Descriptio.

De *Loco* & *Natura* & aliis pauca occurrunt. In pratis uliginosis, aquis, & sterquiliniis stabulari solent. Muribus victitant, & ideo circa Lucarnum atque Verbanum lacum non interimuntur, quod iisdem vineas purgent. Vaccarum ubera fugere, & postea sanguinem sequi, Flandri prodidere, quod veteres Boæ tribuunt. In finetis quandoque pariunt. Gesnerus quandam mensè Majo quatuordecem peperisse vidit; constitutione anni pluviosa, & iis gignendis commoda. Per ora dormientium irrepere, vapore lactis fervidi illectos, iterum egredi, quorundam traditio est,

Natura.

An-

An verum sit, homines in quorum os intrarunt suaviter canere, penes lectorem sit iudicium.

Differentie.

Huc *Natrix Rubetaria* spectat, quæ vocem sonoram & rubetarum æmulantem edit. Maculosa est valde, & venustate admiranda, sibiloque à rusticis agnoscitur. Poloni *Padalica* vocant. Ictus remedium patientis pedem, in terræ humidæ scrobe per diem naturalem sepelire. Iconem & skeleton exhibemus.

ARTICULUS III.

De Boa.

Ambrosin. H. S. l. i. c. 19.

Agricola de animal. sub. ran.

Thomasin. in præfat. ad III. viros Italia.

Severin. Zoot. Democrit. p. 36.


DE Boa serpente paucissima occurrunt. Nomen accepit, non tam ab effectu, quod bovem integrum deglutire possit: quam quod armentorum greges sequatur, & rigua vaccarum ubera fugat: & ita lacte bubulo alatur. Salmasius à voce *δύης*, quæ Æolibus Bæoticis *βύης* deducit. *δύης* vero urinatore est.

In ingentem excrescit molem, ita ut sub Imperatore Claudio ex sententia Solini, occisa fuerit, quæ integrum infantem in alvo gerabat. In Calabria in eam magnitudinem crescere posse, verisimile. Nam & M. Antonius Duccinus Episcopus Anglonensis ad Thomasin scribit, quadraginta & sex ab hinc annis in agro oppidi S. Archangeli, Anglonensis Jæcefeos, à pastore sclopi ictu interfectum, qui armenta & greges depascebat, cujus mandibulæ, duorum fere palmorum longitudinis, in templo Deiparæ de Urseolo appensæ exhibeantur. Morsu inflammationem duntaxat inducere, communis est opinio.

Huc *Anguem Caprimulgum*, quem Cervone vocant de quo duplex est M. Aurelii Severini quantum ad Anatomica, illa singularis, observatio, quam cum iconibus addo, referre libet. Prior se ita habet. *Larynx* exerta atque conspicua quacunque cordis diductione: sub larynge *lingua* per meatum ultro citroque recurrens. Quod sibilum ergo edit, ne quidem mirum. Hæc enim velut fistula coniecta in infernam genam mediam recto ductu videtur. *Dentium* ordo superne quadruplex, inferne duplex. *Oculi* veluti vitrei. *Aspera arteria* parte anteriori circulis cartilagineis, posteriori membrana tenui & ampla satis constructa. *Oesophagus* latissimus pro corporis ratione. *Ventriculus* item amplus, in quo repertæ aviculæ tres nidaceæ. *Cor* viscerum omnium primum & supremum apparet: Nam sunt & inferiores eo *pulmones*, qui cavi & fistulosi sunt, ductu eodem quo aspera arteria. *Magnæ arteriæ* descendentes reversivi duo rami, alter ad oesophagum, alter ad pulmones. *Vena cava* in parte hepatis cava: *porta* vero in gibba. Hæ postquam fines

hepatis exceßerint, committuntur, & non ante distinguuntur quam ad *testium* confinia pervenerint: ubi primum spermatica vasa promuntur: *Fellis* vesica longe infra hepar, duplicem ductum habet; alter à porta insertus τῇ ἐνφύσει per mediam quandam glandulam, forma & figura tonsillæ humanæ: cujus & à latere *splen* visitur parvulus satis & ex rubro candicans. Alter vero vesiculæ fellis ramus, ab eadem glandula ad basin dictæ vesiculæ procedit, media membrana cum corpore vesicæ adalligatus. *Testes* situ dispares, nam dexter superior, ad quem mittit aorta spermaticum & varicosum ramum, colore albidum unum; minores deinde alios huic oblique mittit inferne. Idem in sinistro. Sed ramus spermaticus à vena cava simplex est participatus ab utroque teste. *Renes* infra testes consistunt, ex multis quasi renibus conflati.


Ab arteria magna rami conspicui descendentes oblique ad testes utrosque. *Uterus* hac figura tibialium vestimentorum instar: *Cerebri* forma eadem est, quam observavimus. In alio *Caprimulgo angue*, hæc observata. *Pulmo* interne cavus, oblongus, veluti faccus ubi primum inchoat hepar, desinens mox per vesiculam ad renes usque descendens. *Fel* sub stomacho, convolutus gyris: huic adhæret *splen* (verius enim credo, quam glandula) ex albo rubescens, parvus tereisque, velut exile pisum. *Vesica* oblonga, flatu plena, sub visceribus naturalibus piscium modo, continuo ductu descendens à pulmonibus ad renes. Causam afferebat F. Thomas Campanella nostras, quod cum certis quibusdam motibus assurgat hic serpens, copia spiritus egebat, in longinquo alioquin corpore, quatenus attollere & sustinere se fursum posset. *Omentum* à fine hepatis ad usque anum. Inter nervosam & carneam ventriculi membranam *glandulæ* miliares. *Uterus* non intestino, sed huic intestinum incumbit qua cervicis medium. *Venæ* renis ramus in principium uteri, intra cujus membranas miro quodam artificio vesica latitat parva. *Masculorum* nota, cauda prolixior, crassior, solidior; maribus penes duo spinosi, quemadmodum viperæ. *Uterusque* item spinosus duplici cornu. Quorum utrorumque fines in acutum desinentes cum cauda finiunt, & pari ejusdem gracilitate. Aspritudinis finis delectatio. *Larynx* è faucibus exerta; credo equidem; eo naturæ consilio, ne per amplos deglutitus præfocaretur animal.




Domina

Serpentum

Nieremb



Mater Fornicarum Clus



Serpens Peregrinus amputato Capite Clus.






*Serpens Marinus flauī Coloris
Maris Suedici Aldro.*



*Scolopendra Marina.
Aldro.*




Scolopendra Marina amethystini Coloris Aldr.



Serpens Americanus

Indicus.



ARTICULUS IV.

De Hydro marino, & Scolopendra marina.

Ambrosin.
H. S. l. 1.
c. 20.
Hydrus
marinus.

Plin. H. N.
l. 9. c. 27.

Scolopendra.
Ambrosin.
H. S. l. 1.
c. 21.
Arist. H. A.
l. 2. c. 14.

Plin. H. N.
l. 9. c. 43.
Arist. H. A.
l. 9. c. 37.

Æl. H. A.
l. 7. c. 30.
Æl. H. A.
l. 4. c. 22.

DE Hydro seu serpente marino in Tomo de Piscibus libro primo, Titulo primo, capitis secundi articulo quinto dictum est: hic pauca duntaxat ibi omiſſa adjiciemus. Et de *Loco* quidem addi potest, nusquam in aquis dulcibus inveniri, & ab illis quos Aristoteles ibi reperiri ait diversos esse: tum quod illos parum ab aspidē distinguat: hi veri congruo corpore & colore sint similes: tum quod illi veneno noceant, hi innoxii sint: tum denique, quod illi pulmones habeant, hi branchias. De *Natura* hoc duntaxat occurrit, captum, si dimitatur, arenam rostro quamprimum adactō terebrare, subireque totum. Quantum ad *Differentias*, dantur qui & ē mari in terram egrediuntur, qualem circa Abydum in parvis quibusdam alveis seu canalibus falsis Bellonius invenit. Ejus qui in Balthico seu Suetico mari flavi coloris, teste Olao Magno versatur, iconem hic apponimus. Cum radice lilii adhibitum Plinius contra urinæ incontinentiam commendat.

Scolopendra marina propter similitudinem cum terrestri nomen obtinuit, quasi *εχιδνα σκολοπη* εν τη εδρα, quod in extremo, quod caudæ loco est, corniculum quasi radius atque impactus aculeus superemineat. Marinum anguem æmulatur, & terrestri secundum Aristotelem minor est, coloreque magis rubens: nisi in loco mendum cubet, quod Vottronius suspicatur, sic enim ne minorem quidem hamum deglutire posset, quod tamen facit. Gillius digiti longitudine se vidisse asserit. Alberto animal quadraginta quatuor vocatur, cum tot pedes habere videatur. De *Natura* hoc duntaxat occurrit, quod apud Aristotelem & Plinium extat, hamo devorato omnia interanea evomere, donec hamum egerat, deinde resorbere. Addit Gillius, ob tetrum odorem piscatoribus infestissimum esse, quod hamum ab ea actum, pisces vitent. Morsu urticæ instar urit, ut Ælianus prodidit: qui etiam adjecit, spiritu hominis interire, & rumpi. Duarum hic exhibemus icones, ad cubitum fere accedentes; quarum altera est *nuda* instar anguis, altera pedibus hirtis & coloris amethystini.

ARTICULUS V.

De serpentibus Exoticis Acoatl & Maripetis.

ACoatl dicitur serpens aquatilis (alii *Miocaoatl*, quod imitetur colore spicam Maizii) qui etiam vivum parere fertur. *Dentibus* parvis est, & innocenti morsu: longus quinque dodrantes, pollicem crassus: tæniis nigris & cyaneis alternis distinctus superne; inferne vero cyaneus est, capitis superna nigra, inferna lutea, latera cyanea. In paludibus regionum temperatarum invenitur.

De *Maripetis* ita idem: In Orientali India nonnulli angues, ut fallant instans senium aut fatum, post certum tempus petunt mare: ubi concussa in undas cauda, & velut flagellante, scinduntur in multos ramos velut pedes: qua astutia miro naturæ miraculo evadunt in genus quoddam polypi, tam simile illis quos Lusitani vocant *poluos*, ut fallant ignaros. Petrus Christophorus Borrus enarravit mihi (*verba sunt Nierembergii*) se vidisse quosdam Lusitanos, cepisse in India aliquos, rati *poluos* esse, ut iis sedarent famem: incolas tamen admonuisse ne facerent, noxios esse, nec *poluos* suos esse, & distingui pedum numero, nam angues illi impares illos habent.

Huc ponemus tum illos qui sesquipedales, eximii coloris, in Cuba insula vivunt, & *Boquatrara* vocantur: tum cum ejus iconem à Pellicerio observati Rondeletius exhibet. Terrestris anguis specie est, colore rubro; cum lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eamque lineam à capite ad caudam fecantibus. Scissura oris non admodum grandis, dentes acuti & serrati, branchiæ opertæ, squamosi piscis instar. In dorso à capite ad caudam fere, quædam veluti capillamenta tenuia, pariterque in alvo. Claudant agmen illi qui in flumine Americano Urquaja, quatuordecem passuum longitudine, duarum ulnarum latitudine, capitibus super undas eminentibus natant, & homines natandi vel bibendi causa flumen accedentes cauda involutos in eundem trahunt.

Nieremb.
H. E. l. 12.
c. 7.

Nieremb.
H. E. l. 12.
c. 44.

Beimbus
Venet. Hist.
stor. l. 6.

HISTORIÆ NATURALIS

DE

SERPENTIBUS:

L I B E R I I.

De Draconibus.

T I T U L U S I.

De Draconibus in genere.

Ambrosin.
A. H. S. l. 2.
c. 1.



Nomen.

Descriptio.

Plin. H. N.
l. 8. c. 13.

Leo Afri-
canus l. 9.
Locus.
Plin. l. c.
Sol. Poly-
hist. c. 33.
Philostr. in
vita Apol-
lonii.

Bellonius
Observat.
l. 2. c. 7.
Nicand. in
Theriac.

Raconis nomen non tam *μα-
ρά τὸ δράν ἄχος*, quod magnam
hominibus molestiam creet,
iis infensissimus; quam *παρα
τὸ δεῖναι*, quod visione valeat,
venit. Græci *Δράκοντα* vocant. Syrenas ali-
bi dictos apud Isidorum extat, & in Arabia
alatis tale nomen.

In *Descriptione* non bene convenit autho-
ribus. Abensina & Aëtius asperimis *squa-
mis* obfitos, magnis *oculis*, pelle *superciliorum*
loco eminenti, cum pelle *barbae* instar sub
mento, amplo *riktu*, *lingua* exerta, *dentibus*
magnis instructos faciunt. At Solinus adeo
parva ora habere scripsit, ut mordere non
possint: id est, non dehiscencia ad morsum:
Dentium quoque numerus in controverso
est. Claudius Minos sedecem ponit. Nican-
der triplici ordine dispositos. Eidem Dra-
co est colore nigro, ventre subviridi cum
palearibus sunt mento rufi coloris. Philo-
stratum si sequimur, montanorum juvenes
modicam gerent cristam, ætate provec-
ti grandiore, & crocei coloris barbam: pa-
lustris cristis carere. Plinius vero expresse.
Id modo mirum, unde cristatos Iuba crediderit.
Circa Atlantem media corporis parte cras-
fescunt, cauda & collo gracilimi.

In Africa inprimis & India reperiuntur.
Nam Plinius apud Æthiopes Azachæos,
Strabo apud Hesperios, Leo Africanus
in specubus Atlantis, Solinus in monti-
bus Æthiopiæ ardentibus meridici ob-
versis, Philostratus circa Gangem flumen;
Abensina in partibus Nubiæ; in provincia
Caraja Paulus Venetus, prodidere. In
Calecut multosadolescere, alii authores
sunt. Bellonius ex quadam Arabiæ parte in
Ægyptum alatos deferri scribit. Nicander
in Pelethroniis ad Pelium in Thessalia mon-
tem, vallibus quendam olim stabulatum.

Fuisse & ad Cracoviam, in historia Poloni-
ca legimus.

Famen diutissime ferre possunt. Semel *visus*,
cibum aggressi, difficillime satiantur, ita ut
rebus venenatis, herbis, pomis inprimis,
quorum succo alvum laxant, vescantur:
nausea ex illis vexati, lactuca sylvestri sibi
medentur. Ova serpentum spectanda arte
sorbent. Aut enim solida hauriunt, si jam
fauces capiunt, quæ deinde in semet con-
voluti frangunt intus, atque ita putamina
excutiunt: aut si tenerior est, & catuli ad-
huc ætas, orbe apprehensæ spiræ, ita sen-
sim vehementesque præstringunt, ut am-
putata parte ceu ferro, reliquam quæ am-
plexu tenetur sorbeant. Simili modo avi-
bus devoratis solidis (dicuntur hos spiritu
copioso de stabulis egressi attrahere) con-
tentione plumas & ossa revomunt. Aristot-
eles sumptum ovum iterum atque iterum
sibi admove, quoad summam partem re-
ctam statuunt, & tum, parum contractos se
colligere, ut distento corpore, haustum
ovum deorsum labatur, dixit.

De *Generatione* vix habeo quod scribam, *Generatio*,
quia & apud authores nihil fere occurrit. Herodotus capite maris in fæminæ os in-
serto coire fabulatur: mutuo complexu
congregi verisimile est. Afri ex lupæ cum
aquila congressu, Draconem erumpere, ro-
stro & alis patri, cauda matri similem, co-
rio serpentino, multisque maculis versico-
lore, nugantur. Quidam fætus vivos parere
docent; alii ova, quod de Ternatenfibus
Balthasar Diaz scripsit. Utrumque facile
concederem.

Inimicitias cum Aquila & Elephante ge-
rit; adeo ut Geoponicorum author prodi-
derit, non stabulari ibi Draconem ubi ster-
cus aquilæ inveniretur, auditoque alarum
ejus strepitu, in antrum aufugere, *Ælia-
nus*

Arist. H. A.
l. 9. c. 6.

Plin. H. N.
l. 10. c. 72.

Æl. H. A.
l. 2. c. 27.
Phile in
Jambis.
Arist. H. A.
l. 8. c. 4.

Generatio.
Herodot.
in Thalia.

Antipa-
thia.
Geopon. l.
9. c. 5.
Arist. H. A.
l. 9. c. 1.

ius scripserit. Dimicationem cum ea ita Nicander describit.

*Hunc petit invisum, magni Iovis armiger hostem,
Cumque genis parat acris suis ex æthere bellum,
Pascensem in sylvis quam primum viderit illum
Quod totos ferus is midos cum mitibus ovibus
Et simul ipsa terens, & vastans pignora perdit.
Non timet hoc serpens, immo quodam impete
durus,*

*Profiliens, ipsamq; Aquilam, leporemq; tenellum
Extrahit ex rapidis, vi fraudeque fortior unus.
Cauta malum declinat avis, fit ibi aspera pugna;
Ut queat extortam victor sibi tollere prædam,
Sed frustra elapsam, & volitantem hinc inde
volucrem*

*Insequitur, longos sinuum contractus in orbes,
Obliquoque levans sursum sua lumina visus.*

Plin. H. N.
l. 8. c. 11.

Quomodo cum Elephantibus dimicent, in horum historia scripsimus. Quæ de Gryphibus apud Philostratum habentur, fabulosa sunt.

Venerum.
Plin. H. N.
l. 29. c. 4.

Venerum habere nonnulli negant: solo interficere morfu. Alii aërem inficere habitu, cujus exemplum apud Aristotelem legitur. Tempore Philippi Regis Macedonum inaccessa ideo montis cujusdam Armeniæ via, extinctis demum Draconibus patuit. At Gesnerus & Stumpfius venenatos probant. Prope Niderburgum oppidum, cum se Dracones in quodam fonte abluissent, quicumque post ex eo bibere, alvo tumefacta moriebantur. Is qui Helvetiam à Dracone supra pagum Wilver stabulantem purgavit, sanguine ejusdem conspersus, occubuit. Morfum dolor partis & fætor excipiunt, vulnusque paucum fundit sanguinem. Laudat Plinius gramen, Aëtius remedia quæ in aliorum ictibus adhibentur, præscribit. Ponzello caput abscissum, pelle nudatum & impositum placet.

Plin. H. N.
l. 24. c. 19.

Mores.
Plin. H. N.
l. 8. c. 27.
Plin. H. N.
l. 8. c. 13.
Ælian. H.
A. l. 6. c. 4.

Circa Mores observa, vigilantes esse, & ideo non tantum auditus exquisiti, sed & visus acutissimi. Auri micis si quas invenerint, incubare, Philostratus prodidit. Rem aliquam aggressuri ingentem sibilum edunt. Vernam nauseam lactuce sylvestris succo adstringunt. In Æthiopia quaterni & quini inter se cratium modo implexi erectis capitibus velificantes, ad meliora pabula Arabiæ, fluctibus vehuntur. Indies majorem adipiscuntur vigorem, & ad extremam senectam perveniunt. Homines adorsuri mortiferas radices comedunt. Cicuarri denique solent. Heraclides Philosophus exarmatum habuit, qui gradienti & quiescenti canis instar adfistere solebat.

Vas in Cibi.

Æthiopes eis vescuntur, quod vitrei sint eorum carnes coloris & maxime refrigerent. Vesputius etiam, cum extra fortunatas insulas navigaret, populos quosdam similibus draconum animalibus demptis in cibo uti vidit. Ægyptii serpentibus vescuntur, ut Galenus scripsit. Quantum ad Medi-

cinam, commendat ad fugandas venenatas bestias adipem Plinius: eadem in ulceribus illatis utitur. Cum melle commisto, inchoantes caligines sanat. Caput si gestetur, à lippitudine præservare scribit. Os ex spinarum dentium dolores sedat. Reliqua nugatoria sunt. De lapide alibi agemus.

Differentia Draconum à magnitudine, loco, colore, figura & venefica qualitate sumi possunt. Magnitudo pro ratione natalis soli variat. Marcus Paulus Venetus decem cubitorum in provincia Carazon stabulari dixit. Tempore Philadelphi duo quatuordecem cubitorum ex Æthiopia Alexandriam delati fuere. Hieronymus unius XV. cubitorum meminit. Ælianus in Æthiopia XL. Octavianus Augustus L. cubitorum Romæ aluit, & populo ostentavit. Tempore Alexandri visus in India LXX. longus. Apolytares LXXX. cubitorum nutrit. Strabo, centum reperiri, scripsit: jugeri in Marcia juxta Iordanem longitudine, & tam altum, ut duo equites hinc inde locati se conspiciere non possent. Taceo Posidonius qui de quodam prope Damascum, centum quadraginta pedum scribit: Gellium, apud quem de illo, qui M. Attilii Reguli exercitum infestavit: Egnatium, qui de cujusdam intestino centum viginti pedes longo prodidit. Loci ratione sunt alii montani qui grandiores, & acriores, cristis insigniuntur: alii palustres qui tardi motus, caput vix attollunt, & cristis carent. Colorem si spectes, sunt Aëtio, nigri, rufi, cinerei; Nicandro ventre subviridi: Philostrato tergore nigri; Homero rubicundi: Pausaniæ fulvi; Lucano aurati.

Figure sunt variæ. Sunt auctori libri de natura rerum Draconcopades, facie humana, vultu venusto, reliquo corpore tortuoso: inter quos & ille qui primos parentes seduxit, censetur. Sunt suibus similes, corpore graciliore, rostro validissimo, dentibus aprinis, ut apud Aëtium legimus.

Sunt in Congo arietis magnitudine, alati, fulvi, oblongi rostri, crudis carnibus vitæciantes. Sunt ad Gangem, si Philostrato credimus, quorum oculi, lapidis preciosi instar, coruscant. Sunt apud Plinium, pedibus anserinis: apud Thebanos cornu munitissimi, in regione Carajam quidam qui tantum anteriores pedes habent: alii qui pedum loco duabus ungulis armantur, ventre enormi, rictu amplo. Dari Alatos nullum dubium; eosque membrana ab anterioribus ad posteriores instructos, quam in volando expandunt, dum quiescunt ad alvum colligunt. Sane tales Aristoteles in Æthiopia, Lucianus in Lybia, Iovius in Georgiana, Bellonius qui & cadaver conditum habuit in Ægypto, ponunt. Cardanus duos Luteriæ bipedes vidit. Solinus, circa Arabiæ palu-

Galen. de
Alim. fac
cult. l. i.

Differentia

M. Paulus
Venet. l. 2.
c. 40.

Ælian. H.
A. l. 17. c. 1.

Ælian. H.
A. l. 15.
c. 21.
Strabo
Geogr.
l. 16.

Philost. de
vita Apol-
lonii. l. 3.

c. 2.
Homor.
Iliad.
l. 12.
Lucan.
Pharsal.
l. 9.

Aëtius.

Plin. H. N.
l. 11. c. 47.

Lucian. de
Dipsadib.
Iovius. H.
l. 18.
Bellonius
obs. l. 2.
c. 70.

des versari observavit. Visus & in Florida tam exiguis alis, ut vix se à terra attollere possit. De iisdem quoque apud Pomponium Melam, Ciceronem, & Herodotum habetur: qui ab Ibidem in Ægypto perimi addunt. De *Venenorum* differentiis habet. In monte Atlante solo contactu interrimere, capite & cauda graciles, sed ventre adeo immanes, ut vix sint ad rependum idonei. In monte regni Narvingæ, qui in arboribus versantur, obtuitu perimunt. Unde quidam in *arboreos* & *Chamodracones* distinxere.

TITULUS II.

De Draconibus in specie.

CAPUT I.

De Draconibus non alatis.

ARTICULUS I.

De Draconibus non alatis apodibus.

PUNCTUM I.

De Basilisco.

DRacones optime in *non alatos* & *alatos*: illos in *apodes* & *pedatos* distinguemus. *Apodes* sunt *Basiliscus*, *Draco Pythius*, & quidam *Exotici Basiliscus* Latinis *Regulus* vel quod terrori aliis Draconibus sit, vel quod diadema in capite gerat, ut Festus, habet, dicitur. Sibilo ejus reliquos terreri, & prædam derelinquere, apud Ælianum legimus. *Descriptiones* ejus variæ habentur. Galenus facit flavum, triplici apice frontis decorum. Abensina, ad flavedinem & nigredinem vergentem, capite valde acuto, oculis admodum rubentibus. Plinius XII. non amplius digitorum magnitudine, candida in capite macula, ut quodam diadematè insignem. Grevinus ex Nicandro III. palmos longum, corpore flavo, tribus eminentiis superbum. Alas nonnulli tribuunt, sed exiguas & absque usu. Ille qui in Marchia, in Abbatis Zinnensis ditione prope Lucken-Waldam interfectus est, erat acuti capitis, flavi coloris, tres palmos longus, & valde crassus, cauda in latus turbinata, alvo notis candidis distincta, ore magno, tergore ad cyaneum tendente, prout eum Encelius descripsit. Addidit pastor, circa paludes divagari, ranis, serpentibus & aliis animantibus vesci, vaccas sæpe interrimere, & lacte delectari. Formantur & ex Raja, prout ex icone videre est. Servantur in Musæo Bononiensi. In Cyrenaica nasci prodidit Plinius: Africa proprium Ælianus dixit.

De *Generatione* vix quicquam compertum. Ex ovis Ibidem prodire posse, Ægyptiis creditum: ex ovo galli in lutamine sepul-

to Alberto: figura, gallo, cauda excepta, futurum scribit: ex ovo galli decrepiti, vulgata sententia; ex sylvestris Encelio proditum. Quid sentiendum sit alibi dicemus. Quomodo formari à gallo intra ovum possit, cum utero destituatur non video. Incubasse à gallinis posita, non diffiteor. Inimicitias gerit cum *mustela*, gallo, *insectis* & aliis *Serpentibus*. De *Mustela* ita Plinius: Huic tali monstro (sæpe enim enectum concupivere Reges videre) mustelarum virus exitio est: adeo naturæ nihil placuit esse sine pari. Injiciunt eas cavernis facile cognitæ soli tabe, necant illæ simul odore, moriunturque, & naturæ pugna conficitur. Mustelis tantum vinci dixit Solinus, quas illinc homines inferciunt cavernis in quibus delitescit. Vis tamen ne defuncto quidem deest. Ælianus galli præsentiam pertimescere dixit: ideo iterantibus per Africam comes. Mori quoque sic canentem audivit, addit. De *insectis* Solinus. Basilisci reliquias amplio festertio Pergameni comparaverunt. Ut ædem Apellis manu insignem, nec araneæ intexerent, nec alites involarent, cadaver ejus reticulo aurea suspensum ibidem locarunt. De *Gressu* habet Plinius, nec flexu multiplici ut reliquos corpus impellere, sed celsum & erectum in medio incedere. Cum movetur, media corporis parte serpere, media arduum & excelsum esse, scripsit Solinus.

Necat frutices, inquit *Plinius*, non contactos modo, verum & afflatos: exurit herbas, rumpit saxa. Talis vis malo est. Creditum quondam ex equo occiso hasta & per eum subeunte vi, non equitem modo sed equum quoque absumptum. *Solinus* vero tradit, non hominis tantum vel aliorum animalium exitiis datum, sed terræ quoque ipsius, quam polluit & exurit, ubicunque ferale sortitur receptaculum. Denique extinguit herbas, necat arbores, ipsas etiam corrumpit auras, ita ut aëra nulla alitum impune transvolet infectum spiritu pestilenti. Intuitu interrimere, vix crederem, quis enim primus vidisset. Halitus pestilens interitus causa, qui per aërem diffusus, homini se insinuat. Ideo Nicander:

*Tam teter vacuas odor hinc exhalat in auras,
Atq; propinquantès penetant non segniter artus.*

Venenum etiam per tela currere, & manum invadere apud Lucanum habetur: *Morsus ex inflammatione, vulneris flavedine, & capillorum defluvio colligitur.* Id Dioscorides, ex Erasistrato, hoc Aëtius prodidit. Remedio est colubrinum lignum, quod ex insula Zeilan adfertur. Adhiberi ibi contra serpentem coronatum, qui Hispanis Cobras de capolo dicitur, & sine dubio Basiliscus est, Carolus Clusius prodidit. Animalculum etiam quod ibi cum

Mela. 1. 2.

C. 4.

Cicero de

N. D. 1. 2.

Herodot.

1. 2.

Scaliger

Exerc. 1. 2.

Æl. H. A.

1. 2. c. 7.

Descriptio.

Galen. lib.

de Theriaca

ad Pisonem.

Plin. H. N.

1. 8. c. 21.

Encelius

ce re me-

tal. lib. 3.

d. 54.

Æl. H. A.

1. 3. c. 31.

Generatio.

Amipathia.

Plin. 1. c.

Solin. c. 27.

Æl. H. A.

1. 5. c. 31.

Solin. 1. c.

Venenum.

Plin. H. N.

1. 8. c. 21.

Solin. c. 27.

Lucan.

Phar. 1. 9.

Diosc. 1. 6.

c. 55.

Clus. Exot.

1. 1. c. 44.

Draco ex Raia effictus
Aldrou.



Draco alter ex Raia

exsiccata concinnatus
Aldro.



Basiliscus in solitudine Africæ vivens
Aldro.



Basiliscus ex Raia

effictus prone et supine pictus
Aldro.





*Draco bipes apteros captus in
Agra Bononiensi.*



*Draco alatus Apes
ex Greuino Aldro.*



Figura ex Pareo.



Draco Aethiopicus.



cum eodem pugnat, eo sese munire observatum.

*Differen-
tie.* Quidam tria Basiliscorum genera constitunt, *Helyochryson*, qui quæ vidit accendit, & inflammat, aurei coloris; *Chrysocephalon*, capitis aurei, qui quod videt perterrefacit, & occidit: & *Hematiten*, sanguinei coloris, ad cuius ictum carne animal nudatur. Sed has ego fabulas esse puto. Encelius in *Sylvestres* & *Domesticos* distinguit. De reliquis ita ex Cardano Ambrosinus: Recitat Cardanus quod circulator quidam Serpentem, in maceris domus dirutæ Mediolani inventum fervebat, qui *caput* ovi magnitudine, & pro ratione corporis prægrande habebat, *dentes* in utraque mandibula viperinos, corpore & forma stellioni simili. *Pedes* illi inerant duo, cruraque breviora: unde constabat non satis proportionatum animal à natura fuisse fabricatum, cum longitudini corporeæ quatuor pedes necessarij fuissent. Tales pedes erant magni: Et *ungulis* veluti folium muniti, *cauda* longitudinem totius animalis adæquabat, cuius extremitas capiti stellionis æquali erat prædita. Cardanus ex genere Basilisci hunc fuisse credidit: Siquidem dum stabat, gallo similis esse videbatur, nisi quod corio, & non plumis tegebatur, alique carebat. Denique in volumine de ostentis observatur icon cuiusdam Basilisci in solitudinibus Africæ stabulantis, quæ quoniam est figura animadversione digna, diciturque animal, sibilo, halitu cæteras animantes necare herbasque exficcare: libuit ante legentium oculos talem iconem repræsentare.

PUNCTUM II.

De Exoticis, nempe Dracone Pythio, & serpentibus Bamba.

DE Dracone Pythio pauca occurrunt. Putatur ita dictus, quod post Deucalionis diluvium ex putredine terræ natus fuisset. Suidas Delphinem etiam fuisse dictum testatur, quod ex Apollonii Argonauticis habet. Ratio nominis à Delphici oraculi custodia sumpta est. Dicitur habuisse os triplici dentium ordine armatum, oculos magnos, & visum acutum, magna sub mento palearia, & corpus ex flavo rutilans. Fere tamen & virides & cærulei, ut apud Statium videre est; Cyanei, quod Claudianus reliquit. Eminentibus fulgidis & duris squamis tegebatur. Iconem ex Grevino damus. Ex terra post Deucalionis diluvium genitum Poëtæ fabulati sunt. Ideo Deucalionæus dicebatur. De *serpentibus Bamba* ita Nierembergius: Serpentes sunt magnitudinis horrendæ, si conferantur cum nostratibus, & præcipue *palustres*, quorum a-

liqui longitudine 25. & in latitudine 5. spiritus excedunt, ventre tam capaci, ut totum cervum, aut aliud ejus magnitudinis animal una vice devorent. Ex aquis egrediuntur & pasti eo redeunt: unde & ab incolis *magne natrices* appellatur. Ascendunt quasvis altissimas arbores, in quibus vagabunda animalia, quasi è specula confluunt: & ubi ea victum quærentia acceperunt, summa vi se in ea demittunt, atque ita & morsu, & mole occisa, in solitudinem aliquam vicinam tracta, tota cum pelle ossibus & carnibus deglutiunt. Et sæpius etiam accidit, ut cibo nimium repleti, quasi ebrii reddantur, & in somnum maximum incidant; ita ut puer etiam illos occidat, durat hæc fatietas ac somnolentia per quinque aut sex dies continuos, post quos demum experrecti, ad consuetas suas venationes redeunt. Pellem statim temporibus mutant. Aliquando etiam nimia dilatatione ex cibo nimio rugosam ante tempus exuunt, quæ inventa, homines in admirationem, belluæ magnitudinem inde cognoscentes, rapit. Magni ejus carnes tostas faciunt Æthiopes, & gallinarum habentur multum delicatiores, sed vix eas adipisci possunt, nisi cum aliquando nimio calore incenduntur sylvæ, & tum omnes, quæ à suis lacubus, aliquando fuerunt remota, semitostæ inveniuntur, & in magnis habentur deliciis. Viperæ præterea inveniuntur ibi adeo venenatæ, ut morsu ab iis, post 24. horas summo cum dolore moriantur. Incolæ itaque diligenter se muniunt herba, quam ejus antidotum esse norunt.

Idem de illis & Jaricus prodit. Quod autem addit, esse quoddam genus, in cauda rotundam lagenulam, quæ dum se movet, strepitum edit habens, ad illum quem Teuhtlacahuqui vocari diximus, referendum est.

PUNCTUM III.

De Bitin, & serpentibus Senegæ.

AD Exoticos quoque spectant *Bitin* Nieremb.
& *Serpentes Senegæ*. Incola montanorum locorum *Bitin* est, aspectu serpens terrifico, nigris punctis, rubeis ac candidis, vitulino capite, ampla fronte adusque *oculos*, qui nigri sunt lucidique, sed virenti circumdati iride, rictu oris magno, munito multis & acutis dentibus, caninis quaternis, digitum prolixis, sese mutuo invicem excipientibus, quatuor ulnarum longitudine & crassitudine hominis. Conscendit arbores, unde se vibrat appensus cauda: Rapit boves & apros, & alia hujus generis animalia, devorans ea quandoque integra, & hoc venatu vivens. Amat insulam Cubu, visusque est in Insula Lutajà militibus

Apollon.
Argon. l. i.
Stat. Theb.
lib. cit.

Nieremb.
A. E. l. 12.
c. 38.

tibus Hispanis, cum vellent naves exonerare. De *Serpentibus Senega* superius diximus.

ARTICULUS II.

De Draconibus non alatis pedatis.

PUNCTUM I.

De Hydra.

Nomen.
Plautus in
Perseo.
Eurip. in
Hercule
furente.

DRACONIBUS non alati pedatis, sunt *Hydra* & *Dracobipes Bononiensis*. *Hydra* nomen $\delta\alpha\delta\acute{o}\varsigma$ & $\acute{\upsilon}\delta\alpha\tau\omicron\varsigma$ accepit. Virgilius belluam *Lerna*, à lacu *Lernæo*, in quo à *Hercule* interfecta dicitur: Plautus *Excetram*, seu ut *Isidorus* *Excetram*, quod uno capite truncato, duo vel tria excreverent vocabit. Euripides $\kappa\acute{\upsilon}\nu\alpha$ dixit.

Plurium capitum esse, Poetæ fabulantur. Εννεακέφαλον *Alcæus*, Πεντηκοντακέφαλον , *Simonides*. Unum habere *Pausanias* prodidit, quod verisimile: magnitudine à reliquis hydrys discerni. Quarum Icones apposuvimus, arti ortum debent. Una visa *Venetis* in thesauro Principis, incredibilis ob raritatem pretii, ut *Gesnerus* ex amico accepit, septiceps. Altera est *Equitis* de *Corneto*. Allatam A. C. 1530. mense *Januario*, *Venetias* ex *Turcia* totidem capitum, Regique *Gallorum* oblatam, icon testis est. Visa ibidem non multis ab hinc annis bipes, sex unguibus armata, ut *Ambrosinus* reliquit. Lata valde corpori, septem artificio singulari forinata capita, annexa erant. *Cardani* illa, quam *Meona Pisanus* fictitiam sectione comperit, medium Caput longius & crassius gerebat, viperarum omnia æmulabatur. Oculi post aures, hiatus maximus, dentes canini, lingualata, Colla maculosa erant. Cauda toto corpore dimidio longior; pedes unguibus parvis armati. Magnitudine cuniculum æquabat. Color sub ventre candidus, circa dorsum flavus, seu viridi dilutus.

Locus.
Virgil. *Æneid.* l. 6.
Pausan.
Corinth. l. 2.
Ortus.

Apud inferos stabulari Poetæ dixerunt, Virgilius inprimis. *Pausanias* sub *Platano* quadam ad fontem *Amymone* altam scribit. In lacu *Lernæo* *Argivis* & *Mycenis* contermino vixisse, vulgaris est opinio.

Hesiodus *Echidnæ* ex *Typhone* filiam fecit. Ex fordibus in *Lernam* coniectis, ibidemque putrescentibus, extitisse verisimile est.

Vel ipso afflatu exitium attulisse, multi tradiderunt: sanguine infecta *Herculis*, qui eam superavit tela, exitialia fuisse, passim apud Poetas occurrit. Toxicum veterum, quod quidam napellum, alii taxum, nonnulli venenum *Scythicum* esse volunt, non facile dixerim. Linguam, si in illud incurras, inflammat, tussim siccam, phrenitidem, & tremorem cordis excitat.

Cutis adusta quasi, *Corii* flammæ admodum instar, facile rumpitur. *Æger* in ululatus & vociferationes solvitur, quas strictum in se videns ensẽ excitare consuevit. Remedium à *Colocasia*, panace *Asclepio*, Carne inprimis *cydoniorum*, & sanguine hircino, quod apud *Dioscoridem* habemus, petitur.

PUNCTUM II.

De Dracone Bononiensi bipede.


DRACO hic Anno Christi 1572. III. Idus Martii primum in loco *Malavolta* sibilum edidit: post diem *Ascensionis* vero, juxta sepem apparuit, & à rustico currum & boves, qui eo viso ulterius progredi non audebat, hasta ictus & interfectus est.

Descriptionem ejus, verbis *Ambrosini* apponam. Admirabilis hic *Draco*, inquit ille, à capite ad extremitatem usque caudæ erat duorum cubitorum: ab ore ad initium usque latitudinis corporeæ dodrans inter corporis latitudinem & caudæ principium observatur. Deinde ad extremitatem usque caudæ longitudo cubitalis, nempe duorum dodrantum, hujusmodi partem adæquabat. Prope collum erat latitudinis duorum digitorum, & à capite ad primum usque & anteriorem pedem dodrantalis longitudinis & à primo pede ad eam usque partem, viperæ assimilabatur. Et corpus in ea parte latitudinis sesquipalmaris, nimirum sex digitorum visebatur. Posteriorem colli partem torques albus exornabat, ad instar *Natricis* torquata, vel instar *Anatis sylvestris* torquata, quæ *Italica* vulgo *Cesone* nuncupatur, vel tandem instar merulæ alpestris torquata quæ vulgo *Merla della collana* cognominabatur. Cæterum in hoc dracone torques non erat mutilus, ut in multis aliis animantibus observatur, sed absoluti circuli torquem integrabant. Supra dorsum squamæ latæ apparebant, æmulantes squamas *Cyprini* piscis *Aristotelis*, qui vulgo *Raina* appellatur. Major pars harum squamarum ad viriditatem tendebat: imo aliquæ erant subrubræ, sed inter has quædam nigrescebant: hinc deprehensum est hoc animal ad genus *Draconum* referendum esse. Propterea quod *Dracones*, ut plurimum, virides effigiari soleant. Pars alvi *Draconem* proprie representans squamis viridibus erat exornata. Si pedes contemplerur. Primum advertendum est quod femur junctum tibiæ erat latitudinis pollicis, & digiti suis articulationibus connectebantur ut in lacertorum digitis observatur. Dignitatem tamen non erant quini, ut in lacertis, sed tantum quatuor brevibus unguibus armati, qui adhuc eorum primordia præ se ferebant: unde *Draconem* juvenem esse con-

Ambros.
Hist. Serp.
pent. l. 2
cap. 5.

jecta-

Basiliscus suus regulus Greuini
Aldro




Ouum galli putatum Aldro



Ouum galli natum Regii anno 1628 Aldro

Draco Apicios Greuini
Aldro.




Hydra Septiceps Ges. Aldro.



Hydra Septiceps :
Aldro.





jectavimus: quemadmodum etiam ex dentibus dignosci poterat. Præterea altitudo *pedum* latitudinem corporis adæquabat. Immo magna admiratione tenebamur, quod pedes ex opposito juncti non essent: veluti in cæteris animalibus quadrupedibus, & in aliis exanguibus multipedibus observamus: sed *pedum* unus erat anterior altero, distantia sex digitorum; neque in eodem latere; immo per *Diametrum* erant oppositi: ut facilius forte corpus movere posset: propterea quod media pars corporis motu progressivo impellebatur, reliquæ autem partes, nempe colli, & caudæ per lubricos fluxus ritu serpentino movebantur. *Podex* ab extremitate caudæ duabus distabat palmis, pars caudæ superior viperæ erat similis, inferior vero dissimilis: siquidem squamæ partim nigræ, partim virides erant, hoc tamen ordine, & figura, ut quasi singulæ formam semicircularem referrent, & binæ tantum latitudinem caudæ amplectebantur. Secus vero in vipera se habent, quoniam squamæ rectæ sunt per totam corporis partem inferiorem. In hoc autem Dracone à podice ad caput usque squamæ inferiores, tam residuæ caudæ, quam ventris, & totius colli ad os usque rectæ erant, ut in vipera, hoc tamen ordine, ut imbricatim sitæ essent, colore usque ad alvum partim albo, partim nigro, sub ventre albæ, & latiores dimidio fere digito. At in extremitate squamarum rectarum non nihil coloris viridis conspiciebatur. Demum extremitas caudæ durissimo, & corneo fere apice munita erat, cujus una pars squamulis tegebatur, & extremitas apicis nigerrima, & aculeus instar literæ C. seu instar Centri scorpionis, erat repandus. Quamobrem verisimile fuit, hoc animal hujusmodi aculeo, pro tutela adversus cætera animantia uti. Cæterum, ut melius forma hujus draconis intelligatur, de nunc singulas partes considerabimus. *Caput* erat admodum simile viperino, pars capitis superior juxta extremitatem, erat nigra, novem nigris squamis integrata, reliqua autem pars squamis majoribus leucophæis trigonam figuram æmulantibus. *Oris* hiatus longitudo erat duorum digitorum: *lingua* tenuis, longa & bifida, more aliorum serpentum conspiciebatur. Singula oris latera *dentes* ferrati, & graciles armabant, anterioribus tamen in vipera observatis carebat. Hinc colligimus hoc animal non valde fuisse venenosum. *Oculos* in comparatione ad molem corpoream magnos habebat, & aurei coloris: qua de re draconem hunc solaris naturæ fuisse judicavimus. Foramina *aurium*, ritu avium, habebat; deinde auriculis carebat, quamvis in Helvetiis Anno 99. supra millesimum & quadringentesimum Draco auribus lon-

gissimis præditus fuerit inventus. Idcirco ad monstrum in genere serpentum reducendum fuisse putavimus.

CAPUT II.

De Draconibus alatis.

DRacones alatos dari negat Ammianus, comprobatur experientia. Dari in Æthiopia certum. Visus & in agro Pistoriensis squamosus, bipes, dentibus magnis, auribus urfi instar pilosis, cujus alæ, cubitum longæ & latæ, multis intertextebantur nervis. Sirenes Æthiopibus dari Isidorus author est. Descripsit & Scaliger longitudine pedum quatuor, crassitie brachii humani, cui alæ cartilagineæ de lateribus dependebant. Similem in agro Santonico occisum, & ad Regem Franciscum delatum, Galliam vidisse Brodæus testis est. Cardanus quoque Lutetiæ tam diligenter exsiccatus, ut vivi viderentur, bipedes, alis exiguis, capite serpentino, colore lurido, pilis nullis, cuniculi magnitudine vidit. Ex India allatæ dicebantur. Bellonius integræ eorundem cadavera, diligenter condita se vidisse dicit, & quidem de eorundem genere, qui ex Arabia in Ægyptum advolant. Crassi hi circa alvum, bipedes, alis vespertilionum, & anguina cauda instructi. Respondit eis icon quam Gabriel Barbarus Aldrovando communicavit: & Æthiopicus exsiccatus Draco, quem à Francisco Cetenensi accepit, tubercula quinque in dorso prominentia si excipias, Squammæ virides, & subnigricantes erant; pedes bini, ungue armati, auriculæ totidem, alæ ad volandum factæ, Os dentibus acutis instructum; nares binæ; pars capitis inferior versus auriculas plana; Oculi pupilla cum circulo semiluteo nigra; Cauda longa flexuosa, subluteis squammis tecta. Nos hic quatuor icones exhibemus; quarum prior est ex Grevino; altera ex Pareo; reliquæ duæ Æthiopicos expriment, unum sine eminentiis in dorso; alterum cum eminentiis, quarum modo mentionem fecimus. Reperiuntur in Arabia, & si Herodoto fides, circa arbores thuriferas, si Plinio, circa Cassiæ. Inde in Ægyptum avolant & ab ibidibus consumuntur. Cicero Lybia discedere scripsit. In antris plerumque degunt. Cum aquila & elephanto dimicare, Plinius author est. Et tantum de Serpentibus & Draconibus. Si quæ interim occurrent, vel in Paralipomenis, vel in editione iterata, reponentur, volente Deo, cui laus, honor & gloria, in sempiterna secula. Amen.

Brodæus
Miscell. l. 3.
c. 1.
Cardan. de
Variet. rer.
l. 7. c. 29.

Cicero l. 1. r.
de Nation.
Deorum.
Plin. H. N.
l. 8.

I N D E X

I N HISTORIAM NATURALEM D E SERPENTIBUS,

I O A N N I S I O N S T O N I Med. Doctoris :

. Prior numerus Historicae descriptionis locum exhibet , posterior Tabulam
Iconisimi demonstrat.

A.
A Contias, *Ängelschläng* / *Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Natura, Differentia, Vfus*. Pag. 20. Tab. 4.
Aguafen. p. 15.
Ahucyatli. p. 13.
Ammodytes, *Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Remedia*. p. 11. 12. t. 1.
Amphisbana, *Nomen, Descriptio, Locus, Natura, Venenum, Differentia, Vfus*. p. 18. t. 5.
Anguis Angioleta Neap. p. 23.
Æsculapii, *Nomen, Descriptio, Locus, Natura, Vfus, Differentia*. p. 22. t. 5.
Bisognola Bononiens. p. 23.
Capimulgus. p. 30.
Cerveri. p. 22.
Cervonis. p. 22.
Apochycoatl. p. 26.
Argoli. p. 27.
Aspis, *Nomen, Descriptio, Locus, Sympathia & Antipathia, Natura*. p. 15. t. 3. *Venenum, Vfus*. p. 16.
B.
Basiliscus, *Nomen, Generatio, Venenum, Differentia*. Pag. 34. 35. Tab. 11.
In solitudinibus Africæ. p. 35. t. 12.
ex Raja effictus prone & supine pfectus. t. 12.
Bitin. p. 35.
Boa. p. 30.
Bodry. p. 20.
Boicininga. p. 23. t. 6.
Boicinininga. p. 23. t. 6.
Boiquira. p. 23. t. 6.
Boiguacu. p. 25. t. 6.
Bojobi. Brail. p. 26.
Boitiapo. p. 26.
Boquatrara. p. 31.
Borobi. p. 25.
C.
Caninana. p. 23. 26.
Cacavela Lusit. p. 23.
Cæcilia *Blindschleich* / *Nomen, Descriptio, Natura, Vfus, Differentia*. p. 20. t. 4.
Cega Lusit. p. 19.
Cenchrus, *Nomen, Descriptio, Natura, Vfus, Differentia*. p. 19. t. 4.
Cerales, *Gchödnich e Schläng* / *Nomen, Descriptio, Locus, Natura, Venenum, Differentia*. p. 12. t. 2.
Cefone. p. 36.
Chersydrus. p. 19. 20. t. 8.
Cobra de Cipo, Lus. p. 26.

Cobra de Coral. p. 25.
Cobra de Veado. p. 25. 26.
Cobre Verde. p. 27.
Cuilcahuilia. p. 26.
Cumcoatl. p. 27.
Curucucu. p. 14.
D.
Decurtati. p. 21.
Dipfas, *Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Differentia*. p. 17. t. 3.
Domina Serpentum Nieremb. p. 24. t. 7.
Draco, *Nomen, Descriptio, Locus, Viftus Generatio*. p. 32. *Antipathia, Venenum, Mores, Vfus in Cibus, Differentia*. p. 32. t. 10. 11.
æthiopicus. p. 37. t. 10.
bipes Bononiensis. p. 36. t. 10.
Pythius. p. 35. t. 11.
ex Raja effictus Aldr. t. 12.
alter ex Raja exiccata Ald. t. 12.
Dryinus, *Stinch-flangh* / *Nomen, Descriptio, Venenum*. p. 21. t. 5.
E.
Excedra Ifidori. p. 36.
Excetra Plauti. p. 36.
Elaps, seu Elops, Elaphis, *Nomen*. p. 22. t. 5.
Descriptio. p. 22.
H.
Hæmorrhous, *Nomen, Descriptio*. p. 13. t. 2.
Locus, Natura, Venenum, Differentia. p. 13. 14.
Hoacoati Mexic. p. 24.
Hyæna Eliani. p. 27.
Hydra, *Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Ortus*. p. 36. c. 11.
Hydrus marinus. p. 31. c. 8.
Hydrus, *Nomen, Descriptio*. p. 28. *Locus, Viftus, Natura, Vfus*. p. 28. t. 8. *Differentia*. p. 29.
Hypnalis. p. 15.
I.
Ibiboboca Bras. p. 25. t. 6.
Ibyara Marcgr. p. 18. t. 3.
Ilicinus. p. 21.
Iraraca. p. 26. t. 6.
K.
Kokob. p. 13.
L.
Laphiati. p. 22.
M.
Maquizcoatli. p. 18.
Maripeti angues. p. 31.
Mater formicarum. p. 25. t. 7.
Mergoli. p. 27.

Miliaris. p. 20.
N.
Natrices magna. p. 35.
Natrix. p. 28.
Torquata. p. 30. t. 8.
Rubetaria, *Nomen, Descriptio, Natura*. p. 30. t. 8.
P.
Padalica Polon. p. 30.
Polpoch. p. 21.
Q.
Querculus. p. 20.
R.
Riattel-flangh. p. 23.
S.
Scolopendramarina. p. 28. 31. t. 9.
amerysthini coloris. p. 31. t. 9.
Scytale, *Nomen, Descriptio, Natura*. p. 18. t. 4.
Seps, *Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Differentia*. p. 14. t. 2. & 3.
Serpentes in genere, *Nomen, Descriptio*. p. 1.
Locus. p. 2. *Viftus, Generatio*. p. 3. *Sympathia*. p. 4. 5. *Natura & mores, Venenum*. p. 5. *Vfus*. p. 6. *Differentia*. p. 6.
Serpens alatus. p. 26.
americanus Indicus. p. 34. t. 9.
biceps. t. 1.
Manufectus. p. 26.
mari Norwegico familiaris. p. 31. t. 9.
Suetico. p. 31. t. 9.
marinus. p. 31. t. 9.
Serpentes aquatici. p. 18.
Bambæ. p. 35.
exotici. p. 23. t. 9.
Senegæ. p. 35.
Terrestres. p. 7.
Veterum. p. 27.
Situla. p. 17.
T.
Tangedor Lusit. p. 23.
Tetrauchcoatli. p. 27.
Teutlacocauhqui Mexic. p. 24.
Texmineni. p. 20.
Tezauhcoatl. p. 18.
Tleoa. p. 27.
Trinhuitili. p. 27.
V.
Vipera, *Nomen*. p. 7. t. 1. *Descriptio*. p. 7. *Locus, Viftus*. p. 8. 9. *Temperamentum, Generatio, Antipathia, Venenum, Remedia*. p. 9. 10. *Vfus*. p. 10.
Vipera Chiappæ. p. 11.

Admonitio ad Bibliopegum quo quævis Tabula
suo fit loco inferenda.

<i>TABVLA</i>	<i>I.</i>	pag. 8.	<i>VII.</i>	p. 23.
	<i>II.</i>	p. 12.	<i>VIII.</i>	p. 28.
	<i>III.</i>	p. 14.	<i>IX.</i>	p. 31.
	<i>IV.</i>	p. 17.	<i>X.</i>	p. 36.
	<i>V.</i>	p. 21.	<i>XI.</i>	p. 34.
	<i>VI.</i>	p. 23.	<i>XII.</i>	p. 35.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01645 5958